

TÜRKMENISTANYŇ BILIM MINISTRRLIGI
MAGTYMGULY ADYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET
UNIWERSITETI

B. Kömekow, O. Annaorazow, H. Geldiýew, A. Öwezow

ALGEBRA

Ýokary okuw mekdepleriniň talypalary üçin okuw kitaby

*Türkmenistanyň Bilim ministrlygi
tarapyndan hödürlenildi*

Aşgabat – 2010

B. Kömekow, O. Annaorazow, H. Geldiýew, A. Öwezow

Algebra. – Aşgabat, 2010

Okuw kitabynda algebra dersiniň esasy düşüňjeleri beýan edilýär. Köpsanly mysallar işlenip görkezilýär. Bu kitapdan talyplar we matematika mugallymlary peýdalanyp bilerler.

© B. Kömekow we başg., 2010 ý.

Giriş

Mälim bolşy ýaly ylmy-tehniki progresiň häzirki pajarlap ösýän döw-
ründe matematikany çuňňur öwrenmekligiň zerurlygy öňkä garanyňda has
artdy. Bu okuw kitbynda ýokary algebranyň esasy düşüňjeleri beýan
edilýär. Okuw kitaby algebra dersi boýunça okuw maksatnamalaryna doly
gabat gelýär. Getirilýän nazary maglumatlary berkitmek üçin köp sanly
anyk mysallar işlenip görkezilýär. Okuw kitaby matematika hünärini ele
alýan talyplara niýetlenendir.

1.Çyzykly deňlemeler sistemasyny çözmegin Gauss (näbellileri yzygiderli ýok etmek) usuly

Algebranyň mekdep kursunyň esasy öwrenýän meselesi bolup, deňlemäni çözmek meselesi durýardy. Bu meseläni öwrenmeklik $ax=b$, $a \neq 0$ san görnüşdäki bir näbellili çyzykly deňleme diýilip atlandyrylýan deňlemäni öwrenmekden başlanypdy. Soňra bu meseläni öwrenmeklik aşakda görkezlen 2-ugur boýunça dowam etdirilipdi.

- 1) 2 näbellili 2 sany ýa-da 3 näbellili 3 sany çyzykly deňlemeleriň sistemasyny çözmek.
- 2) Bir näbelliden kwadrat deňlemäni ($ax^2+bx+c=0$) hem-de bir näbelliden ýokary, derejeli deňlemeleriň käbir hususy ýagdaýlaryny öwrenmeklik.

Algebranyň häzirki öwreniljek kursunda bu görkezilen ugurlaryň ikisi hem özleriniň has umumy ýagdaýda öwrenilmeklerine mynasyp bolýarlar. Ýagny biz islendik sanda näbellileri bolan islendik sandaky çyzykly deňlemeleriň sistemasyny şeýle hem bir näbelliden islendik derejeli deňlemeleriň käbir görnüşlerini öwrenmek göz önünde tutulýandyr. Goý bize N sany näbellileri bolan S sany çyzykly deňlemeleriň sistemasy berlen bolsun. Bu sistemany ýazmak üçin indiki belgilemeleri girizeliň:

Näbellileri indekslenen Y harpy bilen (y_1, y_2, \dots, y_n) ; sistemanyň deňlemeleri tertipleşdirilen hasap edip, onuň i -nji deňlemesinde saklanýan y_j näbelliniň kofisientini a_{ij} bilen Mysal üçin:

(a_{23} sistemanyň 2-nji deňlemesindeki y_3 näbelliniň kofisienti) we B_i bilen i -nji deňlemäniň azat çlenini belgiläris.

Onda öwreniljek sistema indiki ýaly ýazylar:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, \quad i = 1, 2, \dots, S \quad (1)$$

Bu sistemanyň koeffisientlerinden indiki tablisany düzmek

mümkindir.

$$\begin{pmatrix} a_{11}a_{12}\dots a_{1n} \\ a_{21}a_{22}\dots a_{2n} \\ \dots\dots\dots \\ a_{s1}a_{s2}\dots a_{sn} \end{pmatrix}$$

Bu S sany setirleri hem-de n sany sütünleri bolan tablisany (s Ý n) ölçegli gönüburçly matrisa diýip atlandyrylar. Bu tablisany düzyän a_{ij} sanlara, onuň elementleri diýilýär. S=n bolan ýagdaýynda bu matrisa n-nji tertipli kwadrat matrisa diýilip aýdylýar. Onuň çep ýokarky burçundan aşaky sag burçuna gidýän diagonalyna ýagny a_{11}, a_{22}, a_{nn} elementlerden düzülen diagonal matrisanyň baş diagonaly, beýleki diagonalyna bolsa onuň gapdal diagonaly diýilip aýdylýar.

Kesgitleme: Eger-de (1)-nji sistemanyň haýsy hem bolsa 2 sany deňlemelerinden galanlaryny üýtgetmän ol 2 deňlemeleriniň bolsa, özara orunlaryny çalşyrylyp, täze bir sistema alynan bolsa, oňa (1) sistemadan 2 görnüşli elementar özgertmäniň üsti bilen alnypdyr diýilýär. Eger-de käbir çyzykly deňlemeler sistemasy (1) sistemadan käbir deňlemesinden galanlaryny üýtgetmän onuň bu 1 deňlemesiniň ornuna bolsa onuň käbir hemişelik sana köpeldilen başga bir deňlemesi bilen jemi alynan bolsa, bu täze sistema (1) sistemadan 2 görnüşli elementar özgertmäniň üsti bilen alnypdyr diýilýär.

Kesgitleme: Eger-de (1) sistemadaky näbellileriň ornuna degişlilikde K_1, K_2, \dots, K_n sanlary goýanmyzda onuň her bir deňlemesi tożdestwo öwrülýän bolsa (kanagatlanýan bolsa), onda K_1, K_2, \dots, K_n sanlaryň toplumuna bu sistemanyň çözüwi diýilýär. Ol çözüw $Y_1=K_1, Y_2=K_2, \dots, Y_n=K_n$, ýa-da (K_1, K_2, \dots, K_n) görnüşünde belgilenýär.

Çyzykly deňlemeler sistemasynyň çözüwe eýe bolmazlygy hem mümkindir. Bu ýagdaýda oňa kökdeş däl (ylalaşmaýan ýa-da sygyşmaýan) sistema diýilýär. Mysal üçin:

$$\left. \begin{matrix} x_1 + 2x_2 = 5 \\ x_1 + 2x_2 = 7 \end{matrix} \right\} \text{ sistema kökdeş däl. Çünki onuň deňlemeleriniň}$$

çep taraplary deň bolup, sag taraplary bolsa dürlidirler. Şoňa görä-de, bu deňlemeleriň ikisi hem bir bada näbellileriň hiç bir bahasynda hem kanagatlanyp bilmez.

Kesgitleme: Eger-de çyzykly deňlemeler sistemasynyň çözüwi bar bolsa, oňa kökdeş (ylalaşýan ýa-da sygyşýan) sistema diýilýär. Kökdeş sistemanyň çözüwi ýek-täk bolsa, oňa kesgitlenen tersine ýagdaýda (çözüwleriniň sany 1-den köp bolsa), oňa kesgitlenmedik sistema diýilýär.

Kesgitleme: Şol bir ölçeglerdäki (deň sandaky näbellileri bolan şol bir mukdardaky deňlemeleriň sistemalary) 2 sany çyzykly deňlemeleriň sistemalarynyň ikisi hem bir bada ýa kökdeş bolmasalar ýa-da kökdeş halatlarynda ikisi hem şol bir çözüwlere eýe bolsalar bu sistemalara ekwiwalent (ýa-da deňgüýçli) sistemalar diýilýär.

Eger-de berlen çyzykly deňlemeler sistemasynda tükenikli sanda 1 we 2 görnüşli elementar özgertmeleri yerine ýetirmek bilen alynýan täze sistemanyň başdaky sistema bilen ekwiwalent bolandygyny görmek kyn däldir.

Indi (1) sistemany çözmek üçin ulanylýan Gauss usulyny öwrenmeklige girişeliň. (1ž) çyzykly deňlemeler sistemasynyň birinji deňlemesinden galanlaryndan Y_1 näbellini ýok eder ýaly, elementar özgertmeleri geçireliň şunlukda biz umumylyga hiç bir şikes, ýetirmeýän $a_{11} \neq 0$ şert kanagatlanýar diýip hasap etjekdiris. Bu ýagdaý-

da (1) sistemanyň 1-nji deňlemesini $\frac{a_{21}}{a_{11}} - e$ köpeldip, 2-nji deň-

lemesinden aýralyň soňra bu 1-nji deňlemäni $\frac{a_{31}}{a_{11}} - e$ köpeldip

sistemanyň 3-nji deňlemesinden we şuna meňzeşlikde dowam etmek bilen sistemanyň soňky deňlemesinden onuň 1-nji deňlemesini

$\frac{a_{s1}}{a_{11}} - e$ köpeldip aýrarsys. Şeýlelikde indiki sistemany alarys:

$$\left. \begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1, \\ a'_{22}x_2 + \dots + a'_{2n}x_n &= b'_2, \\ a'_{32}x_2 + \dots + a'_{3n}x_n &= b'_3, \\ a'_{s2}x_2 + \dots + a'_{sn}x_n &= b'_s \\ &\dots\dots\dots \end{aligned} \right\} \quad (2)$$

Bu alnan sistemada onuň 1-nji 2 deňlemelerinden galanlaryndan y_2 näbellini ýok edýän elementar özgertmeleri geçireliň şunlukda biz umumylyga hiç hili şikes ýetirmeýän, $a'_{22} \neq 0$ talap ýerine ýetýär diýip hasap etjekdiris. Mundan başga-da bu alnan sistemada çep tarapyndaky koeffisientleriniň ählisi 0-la deň bolan deňleme ýok diýip hasap etjekdiris. Eger-de şeýle deňleme bar bolsa, onda onuň azat çleniniň 0-la deňdigine ýa-da deň däldigine baglylykda alnan sistemada bu deňlemäni alyp taşlap, onuň galan deňlemeleriniň sistemasynda ýokarda aýdylan özgertmeleri geçirmek hakynda ýa-da bu alnan sistemanyň şeýle hem oňa ekwiwalent bolan başga berlen deňlemeler sistemasynyň kökdeş dälidiği hakynda netijä geleris. Onda bu alnan sistemanyň ilkinji 2 deňlemesini boluşlary ýaly ýazyp onuň 3-nji, 4-nji we şuna meňzeşlikde iň soňky deňlemesinden bu

sistemanyň 2-nji deňlemesini degişlilikde $\frac{a'_{32}}{a'_{22}}, \frac{a'_{42}}{a'_{22}}$ we şuna

meňzeşlikde $\frac{a'_{s2}}{a'_{22}}$ sanlara köpeldip, aýryp alarys:

$$\left. \begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1, \\ a'_{22}x_2 + \dots + a'_{2n}x_n &= b'_2, \\ a'_{33}x_3 + \dots + a'_{3n}x_n &= b'_{3'} \\ a''_{t3}x_3 + \dots + a''_{tn}x_n &= b''_t \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

Bu ýerde $t \leq S$ çünki geçirilýän özgertmeler netijesinde sistemadaky deňlemeleriň sanynyň azalmagy mümkindir. Bu alnan sistemada ýokarda aýdylan näbellileriň koeffisientleriniň ählisi 0-a deň bolan azat çleni 0-dan tapawutly bolan deňleme bar bolsa alnan sistemanyň şeýle hem oňa ekwiwalent bolan 1-nji sistemanyň kökdeş dälidiği hakyndaky netijä geleris. Eger-de şeýle deňleme ýok bolsa, onda ýokarda görkezilşi ýaly näbellileri yzygiderli ýok etmekligi dowam etdirmek bilen indeks görnüşdäki kökdeş bolan sistema alnar.

$$\left. \begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a'_{22}x_2 + \dots + a'_{2n}x_n &= b_2 \\ a''_{33}x_3 + \dots + a''_{3n}x_n &= b_3 \\ a^{(k-1)}_{kk}x_k + \dots + a^{(k-1)}_{kn}x_n &= b^{(k-1)}_k \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

Bu ýerde $k \leq t$, $k \leq n$ bolup, $a_{11} \neq 0$, $a'_{22} \neq 0$, $a''_{33} \neq 0$, $a^{(k-1)}_{kk} \neq 0$.

Eger-de bu alnan sistemada $k=n$ bplaýsa onda ol üçburçlyk gönüşündäki ýagdaýa eýe bolar.

$$\left. \begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1, \\ a'_{22}x_2 + \dots + a'_{2n}x_n &= b'_2, \\ a''_{33}x_3 + \dots + a''_{3n}x_n &= b''_3, \\ a^{(n-2)}_{n-1}x_{n-1} + a^{(n-2)}_{nn}x_n &= b^{(n-2)}_{n-1}, \\ a^{(n-1)}_{nn}x_n &= b^{(n-1)}_{nn}. \end{aligned} \right\} \quad (5)$$

Bu ýerde: $a_{11} \neq 0$, $a'_{22} \neq 0$, $a^{(n-2)}_{n-1} \neq 0$, $a^{(n-1)}_{nn} \neq 0$

alnan sistemanyň ýeketäk bolan çözüwi aşakdaky ýol bilen tapyl-

ýandyr. Onuň soňky deňlemesinden y_n näbelli üçin $x_n = \frac{b^{(n-1)}_n}{a^{(n-1)}_{nn}}$

ýeketäk bolan bahasyny tapýarys. Soňra bu tapylan bahany iň soňky-nyň oň ýanyndaky deňlemede ornuna goýmak bilen x_{n-1} näbelli üçin ýeketäk kesgitlenýän bahany taparys. Şu usulda (5) sistemanyň deňlemelerinde aşakdan ýokarlygyna hereket etmek bilen be ýleki x_{n-2} , x_{n-3} , x_2 , x_1 näbellilileriň hem ýeke-täk bolan bahalaryny taparys.

Şeýlelikde (1) sistema elementar özgeritmeleriň üsti bilen (5) görnüşli üçburçluk ýagdaýyna getirilen ýagdaýynda ol kesgitlenendir.

Eger-de indi (4) sistema $k < n$ diýsek, onda bu sistema trapesiýa gör-

nüše eýe bolup, (onuň soňky deňlemesindeki näbellileriň sany birden köpdür) ol şeýle hem oňa ekwiwalent bolan birinji sistema tükeniksiz çözüwe eýedirler, başgaça aýdanyňda ol sistemalar kesgitlenen dälidirler. Bu çözüwleri tapmak üçin (4) sistemanyň soňky deňlemesindeki näbellileriň birden galanlaryny Mysal üçin y_k -dan beýlekilerini “beýlekilerini” “azat näbelliler” diýip atlandyryp, hem-de olara erkin bahalary berip, bu y_k näbelliniň şol bahalara bagly ýeke-täk bolan bahasyny taparys. Soňra bu tapylan bahany (4) sistemanyň deňlemeleriniň soňkysynyň oň ýanyndaky ornuna goýmak bilen y_{k-1} näbelli üçin ýeketäk bahany taparys. Soňra şu prosesi sistemanyň deňlemelerine aşakdan ýokarlygyna dowam etdirmek bilen galan y_{k-2}, \dots, y_2, y_1 näbellileri üçin hem azat näbellilere bagly bolan ýeke-täk bahalary taparys. Şu usul üçin (4) sistemaň azat näbellilere berlen erkin bahalaryna bagly çözüwi tapylar. Ýöne azat näbellileriň bahalaryny tükeniksiz köp dürli usullar bilen saýlamak mümkinçiliginiň bardygyny nazara alsak $k < n$ bolan halatynda (4) sistemanyň tükeniksiz köp çözüwine eýe bolarys. Şeýlelik bilen indiki netijä eýe bolarys. Gauss usuly bilen islendik çyzykly deňlemeler sistemasyny çözmek mümkin bolup, eger-de sistemada elementar özgertmeleri geçirenimizde çep tarapyndaky kofisientleriň ählisi 0-a deň bolan azat çleni bolsa, 0-dan tapawutly bolan deňleme alynaýsa, onda alynan sistemamyz şeýle hem oňa ekwiwalent bolan başda berlen sistemamyz kökdeş däl bolar, tersine ýagdaýda ýagny agzalan görmüşdäki deňlemä gabat gelinmese onda sistema kökdeşdir. Ol elementar özgertmeler netijesinde ýa $k < n$ -den bolan trapesiýa görnüşli diýilýän (4) ýagdaýa üçburçluk görnüşli diýilýän (5) ýagdaýa getiriler. Şunlukda eger-de ol (4) görmüşe eýe bolan bolsa, berlen sistema kesgitlenmedikdir. Eger-de (5) görmüşe eýe bolan bolsa ol kesgitlenendir.

Bellikler:

- 1) Gauss usuly uniwersal bolup ol çyzykly deňlemeleriň islendik sistemasyn çözmäge ulanylyp bilinýär.
- 2) Bu usul örän ýönekeý bolup, birmeňzeş hasaplamalara esaslanandyr. (Özgertmeler geçirenimizde her gezek deňlemeleriň birinden başga birini käbir sana köpeldilip aýrylýar). Şonuň üçinde sistemany çözmekde EHM-den peýdalanylan halatlarynda bu usul has oňaýlydyr.

3) Sistemany Gauss usulyndan peýdalanyp çözenimizde bu usul berlen sistemanyň kofisientleriniň hem-de azat çlenleriniň üsti bilen onuň kökdeşdigi ýa-da däldegi, kesgitlenendigi ýa-da däldegi hakynda netijä gelmäge mümkinçilik bermeýär diňen netijä gelmek üçin biz sistemany doly çözmeli bolýarys.

Indi (1) çyzykly deňlemeler sistemasynyň deňlemeleriniň ählisiniň azat çlenleriniň 0-a deň bolan hususy ýagdaýyna ýagny birjynsly çyzykly deňlemeleriň sistemasyna seredeliň.

$$\left. \begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= 0 \\ a_{s1}x_1 + a_{s2}x_2 + \dots + a_{sn}x_n &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (6)$$

Bu sistema elmydama kökdeşdir. Çünki onuň $(0, 0, \dots, 0)$ çözüwiniň bardygyny düşnükli. Eger-de şeýle sistemada deňlemeleriň sany S , näbellileriň n sanyndan az bolsa ($s < n$ bolsa) onda bu sistema elementar özgertmeleriň üsti bilen diňe trapesiýa görnüşine getiriler. Bu diýildigi şeýle sistemanyň çözüwleriniň sany tükeniksiz köp bolup, onuň 0-däl çözüwe (näbellileriniň käbiriniň bahalarynyň 0-dan tapawutly bolan çözüwi) eýedigini alarys.

2. 2-nji we 3-nji tertipli kesgitleýjiler olaryň çyzykly deňlemeleriň kwadratlik sistemasyny çözmäge ulanylşy (Kramer düzgüni)

Goý bize 2 sany näbellileri bolan 2 sany çyzykly deňlemeleriň sistemasy berlen bolsun.

$$\left. \begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 &= b_2 \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

Bu sistemanyň matrisasy diýlip, onuň näbellileriniň kofisientlerinden düzlen 2-nji tertipli kwadratlik matrisa aýdylýar.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \quad (2)$$

Bu matrisanyň a_{11} we a_{22} elementlerinden düzülen diagonalyna onuň baş diagonaly beýlekisine bolsa gapdal ýa-da 2-nji diagonaly diýilýär. (1) sistema-nyň 1-nji deňlemesini $a_{22}-2$, 2-nji deňlemesini bolsa $(-a_{12})$ köpeldip alnan deňlemeleri goşalyň.

$$(a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21})\dot{y}_1=b_1a_{22}-a_{12}b_2. \quad (3)$$

Edil şuna meňzeşlikde (1) sistemanyň 1-nji deňlemesini $(-a_{21})$ -e, 2-nji deňlemesini bolsa a_{11} -e köpeldip, alnan deňlemeleri goşmak bilen taparys.

$$(a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21})\dot{y}_2=a_{11}b_2-b_1a_{21}. \quad (4)$$

3 we 4 deňlemeleriniň näbellileriniň kofisientleri meňzeşdirler. Şol kofisenti

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11}a_{12} \\ a_{21}a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

2-nji matrisa degişli bolan 2-nji tertipli kesgitleýji ýa-da ýöne (1)-nji sistemanyň kesgitleýjisi (determinanty) diýip atlandyralyň. Görnüşi ýaly 2-nji tertipli kesgitleýji degişli matrisanyň baş diagonalynyň elementleriniň köpeltmek hasylyndan onuň, beýleki diagonalynyň köpeltmek hasylynyň aýrylmagyndan alynan san bolýan eken. (3) we (4) deňlemeleriň sag taraplaryndaky aňlatmalar hem 2-nji tertipli kesgitleýji görnüşinde ýazylyp bilerler. Hakykatdan hem ola-ryň 1-nji sütünini (1) sistemanyň azat çlenleriniň sütüni bilen çalşyrylyp alynan b-azat çlen.

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} b_1a_{12} \\ b_2a_{22} \end{vmatrix} = b_1a_{22} - a_{12}b_2,$$

Ikinjisi bolsa, Δ -kesgitleýjiniň 2-nji sütünini bu azat çlenlar sütüni bilen çalşyrylyp alynan

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11}b_1 \\ a_{21}b_2 \end{vmatrix} = a_{11}b_2 - b_1a_{21}$$

kesgitleýjilerdir.

Şeýlelikde (1) sistemanyň $\Delta \neq 0$ şerti kanagatlandyran halatynda ýeke-täk çözüwi bar bolup, ol (3) we (4) deňliklerden tapyýan deňlikler bilen kesgitlenilýän çözüwdir.

$$X_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta}; \quad X_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} \quad (5)$$

$$\Delta x_1 = \Delta_1 \quad (3), \quad \Delta x_2 = \Delta_2 \quad (4) \quad X_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta}, \quad X_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta}$$

(1) sistemanyň $\Delta \neq 0$ bolan ýagdaýynda bar bolan ýeke-täk çözüwiniň görkezilen görnüşde tapylyş usulyna Kramer düzgüni onuň tapylyş (5) formulalaryna bolsa, Kramer formulalary diýilýär.

Indi bolsa, 3 sany näbellileri bar bolan, 3 sany çyzykly deňlemeleriň sistemasyna seredeliň.

$$\left. \begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 &= b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 &= b_2, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 &= b_3 \end{aligned} \right\} \quad (6)$$

Onuň matrisasynyň $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ (7) görnüşde ýazylyjakdygy

düşnükli. (6) sistemanyň 1-nji deňlemesini $a_{22}a_{33}-a_{23}a_{32}$ sana, 2-nji deňlemesini $a_{13}a_{32}-a_{12}a_{33}$ sana, 3-nji deňlemesini bolsa $a_{12}a_{23}-a_{13}a_{22}$ sana köpeldip alynan deňlemeleri tarapma-tarap goşup, meňzeş näbellili çenleri toplanymyzdan soňra

$$(a_{11}a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}a_{31}+a_{13}a_{21}a_{32}-a_{13}a_{22}a_{31}-a_{12}a_{21}a_{33}-a_{11}a_{23}a_{32}) \cdot Y_1 = b_1a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}ab_3+a_{13}b_2a_{32}-a_{13}a_{22}b_3-b_1a_{23}a_{32}-a_{12}b_2a_{33} \quad (8)$$

Bu deňlikde çep tarapyndaky skobkanyň içindäki aňlatmany (7)-nji matrisanyň kesgitleýjisi diýip atlandyryp, hem-de ony görnüşünde belgiläp,

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

Onda $\Delta = (a_{11}a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}a_{31}+a_{13}a_{21}a_{32}+a_{13}a_{22}a_{31}-a_{12}a_{21}a_{33}-a_{11}a_{23}a_{32})$

(6) sistemanyň $\Delta \neq 0$ bolan ýagdaýynda, y_1 näbellisine baha tapmak üçin (8) deňligiň onuň iki tarapyňy hem $\Delta \neq 0$ sana bölmelidigi düşnükli. Şunlukda 3-nji tertipli Δ - kesgitleýjiniň kesgitlemesinden onuň hasaplanýş formulasynyň çyşyrymlydygyna garamazdan onuň hasaplanýş düzgüniň aňsatlyk bilen ýatda saklanyp

bilinjekdigini belläliň. Hakykatdan hem Δ -kesgitleýji degişli (7) matrisanyň elementleriniň 3-3-den alynýan köpeltmek hasyllarynyň algebraýik jemi bolup, bu köpeltmek hasyllarynyň alamatlary indiki aşakda getiriljek iki sany düzgüne görä kesgitleýändirler,

$$\text{I (+)} \begin{vmatrix} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{vmatrix} \quad \text{II (-)} \begin{vmatrix} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{vmatrix}$$

Diýmek bu kesgitlemeden peýdalansak (8) deňligiň sag tarapa hem 3-nji tertipli kesgitleýji bolup onuň Δ -kesgitleýjiden birinji sütüniň ornuna (6) sistemanyň azat çenleriniň sütüni ýazylyan

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} b_1 a_{12} a_{13} \\ b_2 a_{22} a_{23} \\ b_3 a_{32} a_{33} \end{vmatrix}$$

kesgitleýji bolýandygyny görmek kyn däldir.

Edil şuna meňzeşlikde \dot{y}_2 we \dot{y}_3 näbelliler üçin hem adalatly bolan

$$\{\Delta \cdot X_2 = \Delta_2 \quad \text{we} \quad \Delta \cdot X_3 = \Delta_3 \quad \} \quad (9)$$

Bu ýerde deňliklere eýe bolarys.

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} b_1 a_{13} \\ a_{21} b_2 a_{23} \\ a_{31} b_3 a_{33} \end{vmatrix} \quad \Delta_3 = \begin{vmatrix} a_{11} a_{12} b_1 \\ a_{21} a_{22} b_2 \\ a_{31} a_{32} b_3 \end{vmatrix}$$

Şeýlelikde (6) sistemanyň Δ -kesgitleýjisiniň 0-dan tapawutly bolan ýagdaýynda ($\Delta \neq 0$) ýeketäk çözüwi bar bolup, ol çözüw (8) we (9) deňlikler den olaryň 2 taraplaryny hem bu Δ -sana bölmek bilen tapylyandyrlar. Ýagny

$$X_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta}, \quad X_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta}, \quad X_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta} \quad (10)$$

(6) sistemanyň $\Delta \neq 0$ bolanda bar bolan ýeketäk çözüwniň tapylmagynyň (10) formulalaryna Kramer formulalary bu düzgüniň özüne bolsa Kramer düzgüni diýlip aýdylyar. Ýokarda aýdylanlardan Kramer düzgüniň 2 sany we 3 sany näbellileri bolan çyzykly deňlemelerin kwadryatik sistemalaryny çözmäge diňe olaryň degişli kesgit-

leýjileri 0-dan tapawutly bolan halatlarynda ulanylyp bilinýändiginden görýäris. Ýöne mysal işleneninde çözülmegi talap edilyän şeýle sistemanyň kesgitleýjisiniň 0-a deň bolup çykmagy bu sistemanyň kökdeşdäldigini aňladýan däldir. Ol diňe bu sistemanyň kesgitlenen däldigini (bu diýildigi sistema ýa kökdeş däldir ýa-da kökdeş halatynda kesgitlenmedikdir) aňladýandyr.

3. Çalşyrmalar we ornuna goýmalar

Geljekgi temalar öwrenilende tükenikli sandaky elementleri bolan köplükleriň häsýetlerine degişli käbir düşüňjeleri hem-de tassyklamalary öwreneliň. Goý, bize erkin n sany elementleriň $M = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ köplügi berlen bolsun. biz-iň meselelerimizde bu köplügiň elementleriniň tebigatynyň hiç kimi rol oýnama-ýandygy üçin biz seredilyän M köplük 1-nji n sany natural sanlaryň köplügi diýip kabul etjekdiris: Ýagny $M = \{1, 2, \dots, n\}$ bolsun. Bu köplügiň elementlerini dürli usullar bilen ýerleşdirip ýazmak mümkindir. Mysal üçin : $n=3$ bolanda $M = \{1, 2, 3\}$ bolup, onuň elementlerini

1,2,3; 1,3,2; 2,1,3;
2,3,1; 3,1,2; 3,2,1;

Ýaly dürli usullar bilen ýerleşdirip ýazmak mümkindir:

Kesgitleme: Berlen $1, 2, \dots, n$ sanlaryň islendik tertipde ýerleşdirip, ýazylmagyna bu sanlardan çalşyрма diýlip aýdylýar, ýokarda getirilen mysaldaky $1, 2, 3$ sanlaryň 6 sany dürli görnüşdäki ýazgylarynyň her biri bu sanlardan çalşyrmadyr. Indiki tasyklama birinji n sany natural sanlardan dürli çalşyrmalaryň mümkin bolanlarynyň sanyny bilmäge mümkinçilik berýändir:

Teorema: Birinji n sany $1, 2, \dots, n$ natural sanlardan mümkin bolan dürli çalşyrmalaryň sany $n!$ (n -faktorial) $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n$ köpeltmek hasylyna deňdir.

Subudy: 1-nji n sany natural sanlardan çalşyrmany umumy ýagdaýda i_1, i_2, \dots, i_n (1) Bu ýerde i_s -leriň her biri $1, 2, \dots, n$ sanlaryň haýsy hem bolsa birini kabul edip olaryň iki sany dürlisi birmeňzeş baha kabul edip bilýändäldir. Ýagny $k \neq l$ bolanda $i_k \neq i_l$ (l -el) görnüşde ýazylyandyr. Bu ýazgydaky i_1 – element n sany dürli

usullar bilen saýlanyp biliner çünki ol $1, 2, \dots, n$ sanlaryň islendik birini kabul edip bilýändir. Eger-de i_1 - elementiň bahasy belli bolsa, onda i_2 elemente derek $1, 2, \dots, n$ sanlaryň arasynda i_1 tarapyndan baha der-egne kabul edilmedikleriniň (olaryň sany $n-1$) islendik biri alnyp biliner. Bu diýdigi i_2 elementiň ($n-1$) sany dürli usullar bilen saýlanylmak mümkin-çiliginiň bardygyny aňladýar: Şeýlelikde i_1 we i_2 elementler bilelikde $n(n-1)$ sany dürli usulda saýlanmak mümkinçiligine eýedirler.

Şu prosesi dowam etdirmek üçin ahyr soňunda (1) ýazgydaky soňky i_n elementiň diňe ýeketäk usul bilen saýlanylyp bilinýändigine eýe bolarys. Bu diýildigi (1) ýazgynyň $n(n-1) \dots 2 \cdot 1 = n!$ sany dürli görnüşe eýe boljakdygyny alarys. **Teorema subut edildi.**

Kesgitleme: Çalşyrmada i we j elementler, $i > j$ kanagatlandyryp, i element j - den öňürti gelse olar inwerssiýa (tertipsizlik) emele getirýärler diýilip aýdylýar.

Eger-de çalşyrmadaky inwersiýalaryň sany (ol i -harpy bilen belgilenýär) jübüt bolsa, çalşyrmanyň özüne hem jübüt tersine ýagdaýda tak çalşyрма diýilýär.

Mysal üçin: $4, 1, 2, 3, 5$ çalşyrmadaky inwerssiýalaryň sanyny: $i = 3 + 1 + 0 + 0 = 4$ jübüt bolanlygyna görä, bu çalşyрма hem jübütdir. Eger-de berlen çalşyrmada käbir iki sany elementlerinden galanlary öňki orunlarynda saklap bu 2 elementleriň bolsa özara orunlarynlarýny çalşyrsak täze bir çalşyrmany alarys. Soňky çalşyрма başdaky çalşyrmadan şol iki sany elementleriň transpozissiýalary netijesinde alnypdyr diýlip aýdylýar. Şol 2 elementlere bolsa, transponirlenýän elementler diýilýär.

Mysal üçin: $5, 3, 1, 4, 2$ çalşyrmadan 2 we 3 elementleriň transpozissiýasy netijesinde alynandyr. Indiki häsýetleri belläp geçeliň.

Teorema: $n \leq 2$ bolanda n elementden düzmek mümkin bolan ähli jübüt çalşyrmalaryň sany tak çalşyrmalaryň sanyna ýagny $n! \cdot 2$ deňdir.

Teorema: Çalşyrmadaky geçirilýän islendik iki sany elementleriň transpozissiýasy onuň jübütligini üýtgedýändir. Indi 1-nji 4 sany natural sanlardan iki sany çalşyrmanyň birini beýlekisiniň aşagynda ýazyp, olary ýaý skobkalar bilen gurşalyň:

$\begin{pmatrix} 4123 \\ 2134 \end{pmatrix}$ bu 4-nji derejeli ornuna goýmanyň belgisi bolup, ol

4 2 2 -geçýär 1 1 geçýär. Ýa-da 1 öz ornunda saklanýar. 2 3 – e geçýär, 3 4-e geçýär diýlip okalýar. Kesgitlemeden görnüşi ýaly 4-nji derejeli ornuna goýma 1-nji 4 sany natural sandan çalşyrmadan edil şol sanlardan başga bir çalşyрма geçmekligi aňladýandyr. Başgaça aýdanyňda ol $\{1,2,3,4\}$ sanlaryň köplüginin öz-özüne özara bu belgili şekillendirmesidir. Edil şuna meňzeşlikde n -nji derejeli ornuna goýmada kesgitleniýändir. Kesgitlemeden görnüşi ýaly ýokarda berlen 4-nji derejeli ornuna goýma birnäçe usullar bilen ýazylyp berilmekleri mümkindir. Olaryň biri beýlekisinden sütünleriniň transpozissiýalary arkaly alnyp bilinýärler.

Mysal üçin: Ýokarda getirilen 4-nji derejeli ornuna goýmany indiki görnüşde ýazmak mümkindir.

$\begin{pmatrix} 3124 \\ 4132 \end{pmatrix}$ bu ýazgy ýokarda berileninden 1-nji we 4-nji sütünlerini

transpozissiýalary arkaly alynýandyr. $E = \begin{pmatrix} 12...n \\ 12...n \end{pmatrix}$ Berlen n

derejeli ornuna goýma n -nji derejeli toždestwen ornuna goýma diýlip aýdylýar. Eger-de iki sany birmeňzeş derejeli A we B ornuna goýmalaryň $A B$ köpeltmek hasylynyň olaryň yzygiderli ýerne ýetirmeklerinden hasyl bolýan şol derejedäki ornuna goýma bolýandygyny.

Mysal üçin:

$$A = \begin{pmatrix} 4132 \\ 2143 \end{pmatrix} \quad we \quad B = \begin{pmatrix} 1243 \\ 2134 \end{pmatrix}$$

bolanlarynda netije:

$$AB = \begin{pmatrix} 4132 \\ 1234 \end{pmatrix} \text{ bolýandygyny hasaba alsak, bu } E\text{-toždestwen}$$

ornuna goýmanyň islendik A şonuň derejesi üçin deň derejeli ornuna goýma bilen, $E A = A E = A$ deňlikleri kanagatlandyryandygyny aňsatlyk bilen göreris. Bu deňlikleriniň adalatlydyklaryny ornuna goýmanyň kesgitlemesinden almak mümkindir. Sebäbi kesgitlemä görä,

toždestwen ornuna goýmada ähli elementler öz orunlarynda ütgemän galyandyrlar. Şonuň içinde A we E ornuna goýmalar yzygiderli ýerine ýetirlenlerinde olaryň tertibi hiç hili rol oýnamazdan netijede alynýan şekillendirme A ornuna goýmanyň aňladýan şekilendirmesi bilen gabat gelyändir.

Kesgitleme: A ornuna goýmanyň ters ornuna goýmasy A^{-1} diýilip, $A^{-1}=A^{-1}$. $A=E$ deňlikleri kanagatlandyryýan ornuna goýma aýdylyar.

Onda ornuna goýmalaryň köpeltmesiniň birmeňzeş derejedäki ornuna goýmalary üçin kesgitlenýändigini nazara alsak A^{-1} derejedäki ornuna goýmanyň derejesiniň A-nyň derejesi bilen gabat gelmelidigini alarys:

Mysal: $A = \begin{pmatrix} 4132 \\ 2143 \end{pmatrix} \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} 2143 \\ 4132 \end{pmatrix}$ ornuna goýmanyň tersi A^{-1} ;

ornuna goýmadyr. Hakykatdan hem muny subut etmek üçin bize: $AA^{-1}=A^{-1}A=E$ deňlikleriň ýerne ýetýändiklerini görkezmek yeterlikdir. Diýmek islendik ornuna goýmanyň aşaky hem-de ýokarky setirlerniň özara orunlaryny çalşyrmak üçin oňa ters ornuna goýmany almak mümkin eken.

$$A A^{-1} = \begin{pmatrix} 2143 \\ 2143 \end{pmatrix} = E$$

Kesgitleme: Eger-de ornuna goýmanyň aşaky hem-de ýokarky setirlerinde bar bolan inwersiýalaryň umumy sany jübüt bolsa, oňa jübüt ták bolýsa onuň özüne-de ták ornuna goýma diýilýär.

Ornuna goýmadaky inwersiýalaryň umu-my sanyny I harpy bilen belgiläp, ony kesgitlemä göää ýokarky setirindäki inwersiýalaryň i_1 we aşaky setirindäki inwersiýalaryň i_2 sanlarynyň jemi görnüşünde: Ýagny $I=i_1+i_2$ ýaly kesgitleýärler.

Mysal üçin: A ornuna goýma $A = \begin{pmatrix} 4132 \\ 2143 \end{pmatrix}$

$I = i_1+i_2=(3+1)+(1+0+1)=6$ bolanlygy üçin jübüt ornuna goýmadyr.

Ornuna goýmanyň n derejesiniň 2-den kiçi bolmadyk halatynda $AB=BA$ deňligiň ýerne ýetmezligi mümkindir.

4. Islendik tertipli kesgitleýjiler olaryň ýönekeý häsýetleri

Islendik n -natural san üçin n -nji tertipli kesgitleňjini kesgitlemek üçin 2-nji we 3-nji tertipli kesgitleýjileriň aňlatmalaryny jemiň alamatynyň üsti bilen ýazalyň.

$$\begin{vmatrix} a_{11}a_{12} \\ a_{21}a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} = \sum (-1)^s a_1\alpha_1, a_2\alpha_2,$$

Bu ýerde $\alpha_1\alpha_2$ $\overline{1,2}$ sanlardan käbir çalşyрма, $S - \begin{pmatrix} 1,2 \\ \alpha_1\alpha_2 \end{pmatrix}$

ornuna goýmadaky inwersiýalaryň umumy sany bolup, jem alamaty ähli mümkin bolan, α_1, α_2 çalşyrmalar boýunça alynýandyr.

Edil şuna meňzeşlikde

$$\begin{vmatrix} a_{11}a_{12}a_{13} \\ a_{21}a_{22}a_{23} \\ a_{31}a_{32}a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} =$$

$$= \sum (-1)^s a_1\alpha_1, a_2\alpha_2, a_3\alpha_3$$

Bu ýerde $\alpha_1\alpha_2\alpha_3 - 1,2,3$ sanlardan çalşyrmadyr;

$S - \begin{pmatrix} 1,2,3 \\ \alpha_1\alpha_2\alpha_3 \end{pmatrix}$ ornuna goýmadaky inwersiýalaryň sany bolup, hem

ähli mümkin bolan $\alpha_1\alpha_2\alpha_3$ çalşyrmalar boýunça alynýandyr. (2)

we (3)-nji tertipli kesgitleýjileriň aňlatmalarynyň ýokarda berlen jem alamatynyň üsti bilen ýazgylaryndan alynýan umumy kanuna laýyklyry n -nji tertipli kesgitleýjileriň kesgitlemesi üçin ulanallyň şol ýazgylara görä, (2) we (3)-nji tertipli kesgitleýjiler olaryň degişli matrisalarynyň dürli setirlerinden hem-de dürli sütünlerinden bir-birden element alynyp, düzülen iki sany ýa-da üç sany (degişlilikde) elementleriň köpeltmek hasyllarynyň ähli mümkin bolanlarynyň algebraik jemidir. Bu jemiň goşulysynyň alamaty bolsa, onuň indekslerinden düzülen ornuna goýmanyň jübütligine ýa-da täkdigine baglylykda (+) ýa-da (-) bolýandyr.

Goý bize n -nji tertipli kwadrat matrisa berlen bolsun.

$$\begin{pmatrix} a_{11}a_{12}...a_{1n} \\ a_{21}a_{22}...a_{2n} \\ \\ a_{n1}a_{n2}...a_{nn} \end{pmatrix} \quad (1)$$

Kesgitleme: (1) matrisa degişli bolan. (ýada 1-nji matrisanyň kesgitleýlisi diýilip) n -nji tertipli kesgitleýji diýilip, her bir goşulyjy-sy bu matrisanyň dürli setirlerinden hem-de dürli sütünlerinden bir-birden element alynyp düzülen n -sany elementleriň köpeltmek hasyly bolan algabraik jeme aýdylyar.

Bu jemiň goşulyjylarynyň sany $n!$ bolup, onuň her bir çleniniň alamaty köoeltmek hasylyny düzyän elementleriň indekslerinden

.....
düzülen ornuna goýmanyň jübütligine ýa-da täkdigine baglylykda (+) ýa-da (-) bolýandyr. Şeýle hem ýokarda aýdylan görnüşdäki köpeltmek hasyllarynyň ähli mümkin bolanlaryny bu jemde goşulyjy bolup, hyzmat edýändirler. Şeýlelikde (1) matrisa degişli kesgitleýjini hem (2)-nji we (3)-nji tertipli kesgitleýjilere meňzeşlikde

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11}a_{12}...a_{1n} \\ a_{21}a_{22}...a_{2n} \\ a_{n1}a_{n2}...a_{nn} \end{vmatrix} \quad \text{görnüşinde belgilesek, ol ýokarda berlen}$$

kesgitlemeden indiki görnüşde matematiki aňladylyp biliner.

$$\Delta = \sum (-1)^s a_1 \alpha_1 a_2 \alpha_2 a_n \alpha_n;$$

Bu ýerde $\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_n$ $1, 2, ..., n$ sanlardan çalşyrma.

$$S - \begin{pmatrix} 1, 2, ..., n \\ \alpha_1 \alpha_2 ... \alpha_n \end{pmatrix} \quad \text{ornuna goýmadaky inwersiýalaryň sany.}$$

\sum - ähli mümkin bolan $\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_n$ çalşyrmalary boýunça alynýandyr.

Indi n -nji tertipli kesgitleýjilere degişli yönekeý häsýetleri öwreneliň.

$$\text{Kesgitleme: } \begin{pmatrix} a_{11}a_{21}a_{n1} \\ a_{12}a_{22}a_{n2} \\ a_{1n}a_{2n}a_{nn} \end{pmatrix} \quad (1) \text{ matrisanyň setirlerini deňişli}$$

sütünler edilip alnan matrisa (1) marisadan transponirlenip alhandyr diýilýär. (Soňky matrisa (1) matrisanyň transponirleneni hem diýilýär). Edil şuna meňzeşlikde deňişli düşünje kesgitleýji üçin hem berilýändir.

Häsiýet:1. Trasnsponirleme kesgitleýjini üýtgetmeýär bu diýildi.

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11}a_{12}a_{1n} \\ a_{21}a_{22}a_{2n} \\ a_{n1}a_{n2}a_{nn} \end{vmatrix} \quad \bar{\Delta} = \begin{vmatrix} a_{11}a_{21}a_{n1} \\ a_{12}a_{22}a_{n2} \\ a_{1n}a_{2n}a_{nn} \end{vmatrix}$$

Hakykatdan hem n-nji tertipli kesgitleýjiniň kesgitlemesine görä, Δ -nyň her bir $a_1\alpha_1 a_2\alpha_2 \dots a_n\alpha_n$ (2) (görnüşdäki her) çleni Δ -kesgitleýjide hem çlen bolup hyzmat edýändir. Şünki onuň her bir köpeljisi bu kesgitleýjide hem dürli setirlerde hem-de dürli sütünlerde ýerleşendirler. Bu diýildi Δ -nyň her bir çleniniň $\bar{\Delta}$ -da hem, hem-de tersine çlen bolýandygyny aňladýar. Onda bu çleniň Δ we $\bar{\Delta}$ kesgitleýjilerdäki alamatlarynyň hem gabat gelýändigini görkezmek galýar 2-nji çleniň Δ -daky alamaty ornuna goýmadaky $\bar{\Delta}$ -ky

$$\text{alamaty bolsa, } \begin{pmatrix} 1,2\dots n \\ \alpha_1\alpha_2\dots\alpha_n \end{pmatrix} \quad (3) \quad \begin{pmatrix} \alpha_1,\alpha_2\dots\alpha_n \\ 1,2\dots n \end{pmatrix} \quad (4)$$

ornuna goýmadaky inwersiýalaryň sanlary bilen kesgitlenýändirler. Ýöne (3) we (4) ornuna goýmadaky inwersiýalaryň sanlary birmeňzeşdirler. Şünki olar biri-birinden setirlerniň ýerleşiş tertipli bilen tapawutlanýarlar. Bu diýildi Δ we $\bar{\Delta}$ kesgitleýjileriň birmeňzeş goşulçulara eýe bolan algebraik jemleridiginden başgada olaryň bir meňzeş goşulyjylarynyň alamatlarynyň hem gabat gelýändigini aňladýandyr. Diýmek Δ we $\bar{\Delta}$ kesgitleýjiler biri-birine deňdirler.

Belik: Bu subut edilen häsiýetden kesgitleýjiniň setirlerniň hem-de sütünleriň deňgüşlidikleri (deň hukuklydyklary) gelip çykýandyr.

Şoňa gäde, kesgitleýjiniň setirlerne mahsus bolan häsýetleriň ählisi onuň sütünleri üçin hem-de dogrydyr. Şeýlelikde glejekde öwreniljek kesgitleýjiniň ýönekeý häsýetleri onuň setirleri üçin aýdysada şol häsýetleriň sütünler üçin hem adalatlydyklary hasaba almalydyrys.

Häsiýet:2. Diňe nol elementlerden durýan (ähli elementleri o-la deň) setiri özünde saklaýan kesgitleýji o-la deňdir. Hakykatdan hem Δ -nyň her bir (2) çleniniň dürli setirlerden hem-de dürli sütünlerden birden element alnyp düzülen köpeltmek hasylydygna görä, ol diňe 0-l elementleri özünde saklaýan setirden hem bir elementi köpeliji görnüşünde saklaýandyr. Bu diýildigi (2)-nji köpeltmek hasylynyň 0-la deň boljakdygyny aňladýar. Onda seredilýän ýagdaýda Δ -ta kesgitleýji diňe 0-dan durýan goşuljylaryň. Bu bolsa onuň 0-la deňdigi aňladýar. Eger-de i-setiriň ähli elementleri 0-la deň bolsalar ýagny: $a_{i1} = a_{i2} = \dots = a_{in} = 0$ bolsa onda kesgitleýjä görä,

$$\Delta = \sum (-1)^s a_1 \alpha_1 a_1 \alpha_2 a_n \alpha_n = \sum (-1)^s 0 = 0.$$
 häýetiň subuduny aňladar.

Häsiýet:3. Keskitleýjini islendik iki setirniň transpozisiýasy onuň diňe alamatyny ütgetyär. Hakykatdanda hem Δ -ta kesgitleýjiniň i we j setirleriniň özara orunlary çalşyryp galan setirlerini bolsa öňki orunlarynda goýyp, alnan kesgitleýji Δ_0 -görnüşünde belgilenen bolsun. (hakykatdan hem) kesgitleýjiniň kesgitlemesinden Δ -nyň her bir $a_1 \alpha_1, a_2 \alpha_2, a_n \alpha_n$ (2) çleni Δ_0 -da-da çlen bolup hyzmat edýändir. (çünki onuň köpelijileri Δ -da-da dürli setirlerde hem-de dürli sütünlerde ýerleşendirler). Diýmek Δ we Δ_0 kesgitleýjiler meňzeş goşuljylaryň algebraik jemleridir. Ýöne şol bir (2)-nji çleniň almaty bu kesgitleýjilerde dürlüdür. Sebäbi $i \rightarrow j$ bolan halatynda (2)-nji Δ -da

$$\begin{pmatrix} 1, 2, \dots, j, \dots, i, \dots, n \\ \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_j \dots \alpha_i \dots \alpha_n \end{pmatrix} \quad (3) \text{ ornuna goýmanyň jübütligi bilen}$$

kesgitlenilýän alamata Δ_0 -da bolsa,

$$\begin{pmatrix} 1, 2, \dots, i, \dots, j, \dots, n \\ \alpha_1, \alpha_2, \alpha_j, \alpha_i, \dots, \alpha_n \end{pmatrix} \quad (4) \text{ ornuna goýmanyň jübütligi}$$

bilen kesgitlenilýän alamata eýedir. Ýöne (3) we (4) ornuna goýmalar

garşylykly jübütliklere eýedirler. ((3) we (4) ornuna goýmalarda aşaky setirleriň birmeňzeşdikleri i we j elementleriň transpozisiýalarynyň elementleriň ýerleşýän sütünlerine täsir etmeýänligindendir.)

Diýmek Δ we Δ_0 birmeňzeş goşuljylaryň algebráýik jemleri bolup, meňzeş goşuljylar bu jemlerde garşylykly alamatlara eýedirler.

Häsiýet: 2 sany meňzeş setirleri bolan kesgitleýji 0-a deňdir.

Hakykatdan hem goý Δ -da i we j-nji setirler birmeňzeş bolsunlar ýagny islendik $k=1,2,\dots,n$ $a_{ik}=a_{jk}$ bolsun. Eger-de bu kesgitleýjide i-nji we j-nji setirleriň transpozisiýalaryny gejrsek onda (3) –häsiýete görä, täze alnan Δ_0 -berlen Δ -a garşylykly alamat bilen deňdir.

Ýagny $\Delta_0 = -\Delta$ 2-nji bir tarapdan meňzeş setirleriň transpozisiýalary netijesinde alnan täze kesgitleýji berlen Δ -kesgitleýjiniň özüne deň bolar. Ýagny $\Delta_0 = \Delta$ onda soňky 2 deňlikleri deňeşdirmek bilen $\Delta = -\Delta$ bolmalydygyny taparys. Bu ýerden $2\Delta = 0$ $\Delta = 0$ deňlige eýe bolar.

Häsiýet:5 Eger-de kesgitleýjiniň bir setiriniň ähli elementlerini şol bir k hemişelik sana köpeltsek, onda Δ -kesgitleýjiniň özi hem bu k sana köpeldiler.

$$\text{Ýagny } \Delta = \begin{vmatrix} a_{11} \dots a_{1n} \\ a_{i1} \dots a_{in} \\ a_{n1} \dots a_{nn} \end{vmatrix} \text{ bolanda } \bar{\Delta} = \begin{vmatrix} a_{11} \dots a_{1n} \\ ka_{i1} \dots ka_{in} \\ a_{n1} \dots a_{nn} \end{vmatrix} = k \cdot \Delta$$

hakykatdan hem kesgitleýjiniň kesgitlemesine görä.

$$\bar{\Delta} = \sum (-1)^s a_1 \alpha_1 \dots (ka_i \alpha_i) \dots a_n \alpha_n = k \cdot \sum (-1)^s a_1 \alpha_1 \dots a_i \alpha_i \dots a_n \alpha_n = k \cdot \Delta$$

Bellik: Subut edilen häsiýetden kesgitleýjiniň setiriniň ýa-da sütüniniň (ähli elementleriniň umumy köpeljisi kesgitlemäniň alamatynyň önüme çykarylyp alynýandygy gelip çykýandyr.)

Kesgitleme: Eger-de kesgitleýjiniň käbir setirleriniň ähli elementleri onuň başga bir setirlerniň degişli elementlerinden şol bir hemişelik sana köpeldilip alynýan bolsalar onda bu setirlere proporsional setirler diýilýär.

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & -1 & 4 \\ 1 & 4 & 3 & 2 \\ 6 & 5 & -3 & 12 \\ 1 & 0 & 3 & 1 \end{vmatrix} \text{ kesgitleýjide 1-nji we 3 setirler}$$

proporsionaldyrlar. Çünki 3 setiriň elementlerini 1-nji setiriň degişli elementlerinden 3 –e köpeldip, alyp bolýar.

Häsiýet:6 Proporsional setirleri bolan kesgitleýji 0-la deňdir.

Hakykatdan hem eger-de Δ -nyň (her bir elementi) j-nji setrleriň her bir elementini onuň i-nji setiriniň degişli elementinden k sana köpeldip alynýan bolsa, ýagny $a_{jm}=k \cdot a_{im}$ deňlik her bir m nomer üçin dogry bolsa, onda ýokarda edilen bellige görä j setiriň ähli elementleriniň k hemişelik köpeljisini kesgitleýjiniň alamatlarynyň önüne çykarsak, onda bu kesgitleýjiniň özünde i-nji we j-nji setirler meňzeş bolarlar. Şoňa göräde bu kesgitleýji 0-la deňdir.

Häsiýet:7 Eger-de n-ji tertipli Δ -kesgitleýjiniň käbir mysal üçin i-nji setiriniň ähli elementleri iki sany goşuljylaryň jemleri ýagny

$a_{ij}=b_j+c_j, j=1,2,\dots,n$ (5) görnüşde aňladylyp, bilinýän bolsalar, onda

Δ -nyň özi hem iki sany Δ' we Δ'' n-nji tertipli kesgitleýjileriň jemi görnüşinde aňladylyp alynýandyr. Bu kesgitleýjileriň şol i-nji setirlerinden galanlary Δ -nyň degişli setirleri bilen gabat gelýändirler. Olaryň i-nji setirleri bolsa, birinde diňe b_j 1-nji goşuljylardan beýlekisinde bolsa, 2-nji c_j goşuljylaryndan durýandyr.

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} \dots & a_{1n} \\ b_1 + c_1 \dots & b_n + c_n \\ a_{n1} \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} \dots & a_{1n} \\ b_1 \dots & b_n \\ a_{n1} \dots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} \dots & a_{1n} \\ c_1 \dots & c_n \\ a_{n1} \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \Delta' + \Delta''$$

hakykatdan hem n-nji tertipli kesgitleýjiniň kesgitlemesine görä,

$$\begin{aligned} \Delta &= \sum (-1)^s a_1 \alpha_1 \dots a_2 \alpha_2 \dots a_i \alpha_i + a_n \alpha_n = \sum (-1)^s a_1 \alpha_1 \dots a_2 \alpha_2 \dots (b_{ai} + c_{ai}) \dots a_n \alpha_n = \\ &= \sum (-1)^s a_1 \alpha_1 \dots a_2 \alpha_2 \dots b_{ai} \dots a_n \alpha_n + \sum (-1)^s a_1 \alpha_1 \dots a_2 \alpha_2 \dots c_{ai} \dots a_n \alpha_n = \Delta' + \Delta'' \end{aligned}$$

Bellik: Bu häsiýet 2 sany goşuljylar üçin subut edilen hem bolsa, ol islendik tükenikli sandaky goşuljylar üçin hem orunlydyr.

Kesgitleme: Eger-de kesgitleýjiniň käbir setiriniň Mysal üçin i-nji setiriniň her bir a_{im} elementini galan setiriň degişli elementleriň şol bir hemişelik sanlara köpeltmek hasyllarynyň jemi güşünde aňlatmak mümkin bolsa, ýagny şeýle bir $k_1, k_2, \dots, k_{i-1}, k_{i+1}, \dots, k_n$

hemişelik sanlar bor bolup, $a_{im}=k_1a_{1m}+k_2a_{2m}+k_{i-1}a_{i-1m}+k_{i+1}a_{i+1m}+\dots+k_na_{nm}$ deňlik her bir m nomer üçin ýerine ýetýän bolsa, kesgitleýjiniň i -nji setiri onuň galan setirleriniň çyzykly kombinasiýasyndan durýar diýilip aýdylýar. Ýokardaky aňlatmamyzda käbir k sanlaryň 0 -la deň bolmaklary hem mümkindir. (Hususan ählisiniň hem).

Häsiýet:8 kesgitleýjiniň käbir setiri onuň galan setirleriniň çyzykly kombinasiýasy bolsa, şeýle kesgitleýji 0 -la deňdir. Bu häsiýetiň subudy (7) (6) (4) häsiýetlerden gelip çykyandyr.

Häsiýet:9 Eger-de kesgitleýjiniň 1 setiriniň elementlerine onuň başga bir setiriniň degişli elementlerini şol bir hemişelik k sana köpeldip, goşulsa kesgitleýji üýtgemeyär. Ýagny

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ a_{i1} & \dots & a_{in} \\ a_{j1} & \dots & a_{jn} \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ a_{i1} + ka_{j1} & \dots & a_{in} + ka_{jn} \\ a_{j1} & \dots & a_{jn} \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad \text{deňlik dogrydyr.}$$

Bu häsiýeti subut etmek üçin ýazylan deňligiň sag tarapyndaky kesgitleýjiniň 2 sany onuň özüniň tertibindäki kesgitleýjileriň jemine deňdiginden olaryň i -nji setirlerinden galanlarynyň bu kesgitleýjiniň degişli setirleri bilen gabat gelýändiklerinden hem-de bu goşuljylaryň biriniň i -nji we j -nji setirleriniň proporsionaldyklaryna görä, onuň 0 -la deňdiginden peýdalanmak ýeterlidir. Ýagny :

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ a_{i1}ka_{j1} & \dots & a_{in}ka_{jn} \\ a_{j1} & \dots & a_{jn} \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ a_{i1} & \dots & a_{in} \\ a_{j1} & \dots & a_{jn} \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ ka_{j1} & \dots & ka_{jn} \\ a_{j1} & \dots & a_{jn} \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ a_{i1} & \dots & a_{in} \\ a_{j1} & \dots & a_{jn} \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

Bellik: Bu häsiýetde aýdylan k sanyň otirisatel bolmagynyň hem mümkindigine görä, bu häsiýeti kesgitleýjiniň käbir setiriniň ýa-da sütüniň bir elementinden galanlarynyň, ählisiniň 0 -la öwürülmepleri üçin geçirýän özgertmäni ýerine ýetirmäge ulanylmakda amatlydyr. Mysal üçin:

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 34 \\ 0 & 1 & 25 \\ 6 & 7 & 14 \\ 7 & 2 & 10 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 5 \\ 0 & 1 & 0 \\ 6 & 7 & -13 \\ 3 & 2 & -3 \end{vmatrix}$$

5.Dürli tertipdäki minorlar. Algebraýik doldurgyçlar.

Goý bize n -nji tertipli Δ -kesgitleýji we k $1 \leq k \leq n-1$ san

berlen bolsun.
$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

Bu kesgitleýjide erkin k sany setirleri hemde k sany sunleri saýlap alyp olaryň kesişmesinde duran elementlerden matrissa düzsek onuň k -njy tertipli kwadrat matrissa boljakdygy düşnüklidir. Şeýle usul bilen alynan islendik k -njy tertipli kwadrat matrissanyň kesgitleýjisine berilen Δ -kesgitleýjiniň k -njy tertipli minory diýilýär. Mysal üçin: Δ -da ilkinji 2 sany setiri hem-de ilkinji 2 sany sütüni saýlap alsak, onda olaryň kesişmelerinde duran

elementlerden. 2-nji tertipli kwadrat matrissany düzeris.
$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

Onuň
$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$
 kesgitleýjisi Δ -nyň 2-nji tertipli

minorlarynyň biridir kesgitlemeden görnüşi ýaly Δ -nyň islendik a_{ij} elementi onuň birinji tertipli minory hasap edilip alynýar. (Bu kesgitleýjide 1 setir hem 1 sütün saýlanylyp alynandygyny aňladýar. Berlen k -njy tertipli minoryň elementleriniň duran (ýerleşen) setirlerini hem-de sütünlerini çyzanymyzdan soň Δ -nyň bir gezek hem çyzylmadyk elementlerinden $(n-k)$ -njy tertipli kwadrat matrissany düzmek mümkindir onuň kesgitleýjisine bu k -njy tertipli M minoryň goşmaça (ýa-da dolduryjy) minory diýilýär we ol $M^{\tilde{n}}(n-k)$ görnüşinde belgilenýär. Aslynda k -njy tertipli minoryň belgilemesi üçin M_k bilen belgiläp ulanylýandyr. Ýokarda mysal görnüşinde getirilen,

$$M_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \text{ 2-nji tertipli minoryň goşmaça minory,}$$

$$M'_{(n-2)} = \begin{vmatrix} a_{33} & a_{3n} \\ a_{n3} & a_{nn} \end{vmatrix} - (n-2)\text{-nji tertipli kesgitleýjidir.}$$

Hususan birinji tertipli $M_{ij}=a_{ij}$ minoryň (Δ -nyň a_{ij} elementiniň) goşmaça minory M_{ij}^n Δ -da i -nji setir hem-de j -nji sütün çyzanymyzdan soňçyzylman galan elementlerden düzülen $(n-1)$ -nji tertipli kesgitleýjidir. Mysal üçin:

$$M'_{11} = \begin{vmatrix} a_{22}a_{2n} \\ a_{32}a_{3n} \\ a_{n2}a_{nn} \end{vmatrix} \text{ kesgitleýjidir kesgitleýjiniň elementleriniň algebraik}$$

doldurgyjy diýilip (A_{ij}) onuň $(-1)^{i+j}$ alamat bilen alynan goşmaça M_{ij}^n minoryna aýdylyar. Ýagny $A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}^n$.

Eger-de Δ -nyň k -njy tertipli minory onuň i_1, i_2, \dots, i_k nomerli setirlerinde hem-de j_1, j_2, \dots, j_k nomeri sütünlerinde ýerleşen bolsa, onda onuň algebraik doldurgyjy diýilip onuň $(-1)^{sm}$ (bu ýerde $S_n=(i_1+i_2+\dots+i_k)+(j_1+j_2+\dots+j_k)$), Şol alamat bilen alynan goşmaça minoryna aýdylyar.

Teorema: Δ -kesgitleýjiniň islendik k -njy tertipli minorynyň onuň algebraýik doldurgyjyna köpeltmek hasyly bu kesgitleýjiniň käbir çlenlerinde durýan algebraýik çemdir. Bu çemiň goşuljylarynyň alamatlary hem olaryň kesgitleýjidäki alamatlary bilen gabat gelýändirler.

Subudy: Ilki bilen teoremany k -njy tertipli M —minoryň Δ -nyň çep ýokarky burçunda ýagny onuň birinji k setirlerinde hem-de birinji k sütünlerinden ýerleşen ýagdaýy üçin subut edeliň:

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} \dots a_{1k} \dots a_{1,k+1} \dots a_{1n} \\ a_{k1} \dots a_{kk} \dots a_{k,k+1} \dots a_{kn} \\ a_{k+1,1} a_{k+1,k} a_{k+1,k+1} a_{k+1,n} \\ a_{n1} \dots a_{nk} \dots a_{n,k+1} \dots a_{nn} \end{vmatrix}$$

M k -njy tertipli minoryň islendik çlenini ýazsak, ol: $a_{1\alpha_1} a_{2\alpha_2} a_{k\alpha_k}$

(1) görnüşde ýazylýar. Bu ýerde $\alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_k - 1, 2 \dots k$ sanlardan

çalşyrmadyr. Bu çleniň alamaty $(-1)^l$, $L = \begin{pmatrix} 1, 2 \dots k \\ \alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_k \end{pmatrix}$ ornuna

goýmadaky inwersiýalaryň umumy sany, bolar. Edil şuna meňzeşlikde M^n goşmaça minoryň erkin $a_{k+1}, b_{k+1} \cdot a_{k+2}, b_{k+2} \cdot a_n b_n$ (2)

çlenine alsak, (bu ýerde $\begin{pmatrix} b_{k+1}, b_{k+2} \dots b_n \\ k+1, k+2, n \end{pmatrix}$ sanlardan çalşyrmadyr.

Onuň alamaty $(-1)^{l'}$, bu ýerde $l' = \begin{pmatrix} k+1k+2 \dots n \\ b_{k+1} b_{k+2} \dots b_n \end{pmatrix}$ ornuna

goýmadaky inwersiýalaryň sany, bolar.

Biziň bu seredýän ýagdaýmyzda S_M :

$$S_M = (1+2+\dots k) + (1+2+\dots k) = 2(1+2+\dots k) = k(k+1)$$

Islendik biri jübüt bolsa, şol köpeltmek hasyl hem jübüt bolýar.

S_M jübüt bolanlygyna görä, M minoryň algebraýik doldurgyjy.

Onuň M^n goşmaça bolen gabat geler. Şeýleklikde bizi $M \cdot M^n$ köpeltmek hasyly we bu algebraýik goşuljylarynyň alamatlary gyzyklandyrýar. $M \cdot M^n$ köpeltmek hasylynyň

$$a_1 \alpha_1 \quad a_k \alpha_k \quad a_{k+1} B_{k+1} \quad a_n B_n \quad (3) \quad \text{erkin çlenini alsak, onuň alamaty}$$

$$(-1)^l \cdot (-1)^{l'} = (-1)^{l+l'} \quad \text{bolar. Çünki} \quad \begin{pmatrix} 12 \dots k \dots k+1 \dots n \\ \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_k \dots B_{k+1} \dots B_n \end{pmatrix}$$

ornuna goýmadaky inwersiýalaryň umumy sany hem α_k -laryň β_k -lar bilen hiçhili inwersiýa emele getirmeýändiglerine görä, (α -laryň hiç biri, β -laryň hiç birinden uly däldir) $\alpha_i \leq k \quad \beta_i \geq k+1$

ikinci bir tarapdan (3) köpeltmek hasylynyň köpeljileri Δ -ta kesgitleýjide dürli setirlerde hem-de dürli sütünlerde ýerleşendirler. Onda bu köpeltmek hasyly Δ -ta kesgitleýjiniň käbir çlenidir. Bu diýildigi $M \cdot M^n$ köpeltmek hasyly käbir algebraýik jem bolup, onuň her bir goşuljysy Δ -nyň hem goşuljysydyr. Ýöne ýokarda edilen bellige görä, bu goşuljynyň Δ -ky alamatynyň hem $(-1)^{l+l'} = e$, deňdigi gelip çykýar. Şeýleklikde $M \cdot M$ köpeltmek hasyly Δ -ta kesgitleýjiniň käbir çlenlerinden durýan algebraýik jem bolup bu goşuljylaryň alamatlary olaryň Δ -ky alamatlary bilen gabat gelýändigirler. Bu bolsa, teoremanyň tasykلامasynyň özidir.

Indi Δ -nyň M minory onuň islendik $i_1 < i_2 < \dots < i_k$ nomerli setirlerinde hem-de $j_1 < j_2 < \dots < j_k$ nomerli sütünlerinde ýerleşen bolsun. Setirleriniň hem-de sütünleri transpozissiýalarynyň ýardamynda bu minory kesgitleýjiniň çep ýokarky burçuna süşürelil.

Munuň üçin ilki bilen i_1 setiriň ($i_1=1$) –nji setir bilen transpozissiasyny soňra (i_1-1 -nji setiriň ornundaky) i_1-2 -nji setir bilen we şuna meňzeşlikde ol tä Δ -nyň 1-nji setirniň ornuny eýeleýänçä özünden ýokardaky ähli goňşy setirler bilen transpozissiyalaryny geçireliň. Munuň üçin umumy (i_1-1) sany goňşy setirleriň transpozissiyalaryny geçirmek bolar. Soňra berlen kesgitleýjiniň i_2 setirniň özünden ýokardaky goňşy setirler bilen yzly yzyna (i_2-2) sany transpozissiyalaryny geçirip, onuň kesgitleýjiniň 2-nji setirniň ornuny eýelemegini gazanarys. Şu prosessi dowam etdirmek bilen ahyr soňunda (i_k-k) sany goňşy setirleriň transpozissiyalarynyň ýardamynda i_k -nny setiriň kesgitleýjiniň k -nny setirniň ornuny eýelemegini gazanarys. Şu gejrilen $(i_1-1)+(i_2-2)+\dots+(i_k-k)=i_1+i_2+\dots+i_k-(1+2+\dots+k)$ sany goňşy setirleriň transpozissiyalary M minory 1-nji k sany setirlere süşürer edil şuna meňzeşlikde $j_1+j_2+\dots+j_k-(1+2+\dots+k)$ sany goňşy sütünleriň geçiren transpozissiyalary M minory kesgitleýjiniň 1-nji k sany sütünlerne süşürer şeýlelikde Δ kesgitleýjide gejrilen $i_1+i_2+\dots+i_k+j_1+j_2+\dots+j_k-2(1+2+\dots+k)$ goňşy setirleriň hem-de goňşy sütünleriň transpozissiyalary täze alnan Δ' -kesgitleýjide $M-k$ -nny tertipli minoryň ilkinji k setirlerde hem-de ilkinji k sütünlerde ýerleşmegni üpjün eder. Şu özgertmeler netijesinde M minoryň goşmaça M^n minorynyň ütgemeyändigigi düşnüklidir. Çünki onuň onuň elementleri transpozissiyalarda goltaşmaýarlar, hem-de goňşy sütünleriniň transpozissiyalarynyň ýerne ýetirýändiklerine görä onuň setirleriniň hem-de sütünleriniň başdaky tertipleri hem saklaýandyr, teoremanyň subut edilen bölegne görä, $M \cdot M^n$ köpeltmek hasyly Δ' -kesgitleýjiniň käbir çlenleriniň algebräyk jemi bolup, bu jemiň her bir goşuljysynyň alamaty onuň Δ' -däki alamaty bilen gabat gelyändir ýöne kesgitleýjiniň ýönekeý häsýetlerinden onuň islendik iki setirniň transpozissiasy diňe kesgitleýjiniň alamatyny ütgedýändigine görä, täze alnan Δ' -kesgitleýjiniň öňki Δ -dan $(-1)^{S_M} - 2(1+2+\dots+k) = (-1)^{S_M}$ sana köpeltmek bilen alnyp bilinjekdigi bellidir. Şeýlelikde $(-1)^{S_M} \cdot M \cdot M'$ köpeltmek hasyly (bu bolsa, Δ -nyň M minorynyň özüniň algebräyk doldurgyjyna köpeltmek hasylydyr) Δ -ta kesgitleýjiniň käbir çlenleriniň

algebraik jemidir. onuň her bir goşuljysynyň alamaty bu goşuljynyň Δ -ta kesgitleýjiniň düzümidäki alamaty bilen gabat gelýändir.

$$\Delta' = (-1)^{S_M} \Delta.$$

6. Kesgitleýjileri hasaplamak (kesgitleýjini setiri boýunça dagytmak; Laplas teoremasy)

Islandik n natural san üçin n -nji tertipli Δ -ta kesgitleýjini aňladýan 2-nji we 3-nji tertipli kesgitleýjileriňkä meňzeş aňlatmalary ýazmaklygyň anyk düzgüni ýokdyr.

Emma ýokary tertipli kesgitleýjileriň hasaplanmagy üçin olaryň kesgitlemesinden ugur alyp, onuň aňlatmasyny ýazyp, şol aňlatma göräde, bu kesgitleýjiniň bahasyny hasaplamak mümkinjiligi bar bolsada, ol oňaýsyz usuldur. Şonuň üçinde ýokary tertipli kesgitleýjileri hasaplamaklygyň düzgüni öwrenmek ähmiýete eýedir. Goý bize n -nji tertipli

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad \text{kesgitleýji berlen bolsun we } i \quad 1 \leq i \leq n \quad (1 \text{ bilen } n$$

arasyndaky erkin bir nomer bolsun).

Bu i -nji setiriň ähli elementleriniň olaryň algebraýik doldurgyçlarna köpeltmek hasyllarna seredeliň.

$$a_{i1} \cdot A_{i1}, \quad a_{i2} \cdot A_{i2}, \quad a_{in} \cdot A_{in} \quad (1)$$

geçen temada subut edilen teoremadan bu köpeltmek hasyllarynyň her biri Δ -kesgitleýjiniň käbir çlenleriniň algebraýik jemi bolup, ol goşuljylaryň alamatlary hem olaryň Δ -daky alamatlary bilen gabat gelýändir. (Biz bu ýerde her bir a_{im} , $1 \leq m \leq n$ elementiň Δ -nyň

1-nji tertipli minorylygyndan ugur alýarys). Eger-de 1-nji (1) sistemadaky köpeltmek hasyllarynda bar bolan, algebraýik doldurgyçlary degişli goşmaça minorlar bilen çalysarsak hem-de her bir goşmaça minoryň $(n-1)$ -nji tertipli kesgitleýjini nazara alsak bu köpeltmek hasyllarynyň her biri degişli alamatlary bilen alnan elementiň goşmaça minoryna köpeltmek hasylyna öwrilen we ol köpeltmek hasyllaryň her biri Δ -nyň $(n-1)!$ çlenleriniň algebraýik jemi bolar.

$$a_{ik} A_{ik} = a_{ik} (-1)^{i+k} \cdot M_{ik}' = (-1)^{i+k} a_{ik} M_{ik}'$$

2-nji bir tarapdan (1) sistemanyň 2-sany dürli köpeltmek hasyllary birmeňzeş çlenleri saklaýan algebraýik jemler däldir.

Hakykatdan hem Mysal üçin : $a_{i1}A_{i1}$ we $a_{i2}A_{i2}$ köpeltmek hasyllaryna seretsek olaryň i -nji setirinden biriniň a_{i1} elementi özünde saklaýan Δ -nyň käbir çlenleriniň algebraýik jemdigine beýlekisiniň bolsa, bu setirden a_{i2} elementi özünde saklaýan Δ -nyň käbir çlenleriniň algebraýik jemdigini alarys kesgitlemä görä, kesgitleýjiniň her bir jileniň her setirden hem-de her sütünden bir-birden element alnyp düzülen n sany elementleriň köpeltmek hasylydygy görä, bu 2 sany köpeltmek hasyly meňzeş çlenleri özünde saklap bilmezler. Diýmek (1) sistemanyň her bir köpeltmek hasylynyň Δ -nyň $(n-1)!$ sany goşulyjylarynyň algebraýik jemdigine hem-de ol köpeltmek hasyllarynyň sanynyň $n - e$ deňdigini we ýokarda bellenen bellige görä, bu köpeltmek hasyllarynyň 2 sany dürlisiniň Δ -nyň şol bir çleni saklap bilmeýänligine görä n -nji tertipli Δ -kesgitleýjiniň $n!$ sany goşulyjylarynyň her biri bu köpeltmek hasyllarynyň birine we diňe birine girip bilýändigini alarys (şunlukda Δ -nyň ähli $n!$ sany goşulyjylary bu köpeltmek hasyllarynyň goşulyjy bolup girýändirler) diýmek indiki deňligi alarys

$$\Delta = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \dots + a_{in}A_{in}, \quad \forall_i (1 \leq i \leq n) \quad (2)$$

2-nji formula kesgitleýjini i -nji setiri boýunça dagatmagyň formulasy diýip aýdylyar. Şeýlelikde subut edilen gatnaşykdan (teoremany setiri boýunça) kesgitleýjini subudy boýunça dagytmagyň teoreması diýilýän indiki tasyklamany alarys.

Teorema: Kesgitleýjiniň islendik setirniň ähli elementleriniň özleriniň algebraýik doldurgyçlaryna köpeltmek hasyllarynyň jemi bu kesgitleýjiniň özüne deňdir : Ýagny islendik i nomer üçin

$$\forall 1 \leq i \leq n \quad \Delta = \sum_{k=1}^n a_{ik} A_{ik} \quad k \text{ 1-den } n\text{-e çenli.}$$

Edil şuna meňzeş tassyklama kesgitleýjiniň sütünleri üçin hem dogrydyr. Bu ýagdaýda alynýan fomulany ýagny $\forall 1 \leq m, \leq n$

$$\text{nomer üçin} \quad \Delta = \sum_{i=1}^n a_{im} A_{im}$$

i 1-den n-e çenli deňligi kesgitleýjini sütüni boýunça dagytmagyň formulasy diýip atlandyryrlar. Bu alynan formulalardan görmüş i ýaly n-nji tertipli kesgitleýjini hasaplamaklyk birnäçe (n-1)-nji tertipli kesgitleýjileri hasaplamaklyk bilen çalşyrylýandygyny görýäris. Şunlukda saýlanyp alynan setirde ýa-da sütünde (saýlanan) 0-la deň elementleriň sany näçe köp bolsa, şonçada bu formulany ulanmak oňalydyr. Sebäbi 0-la deň bolan elementleriň algebräýik doldurgyçlaryny hasaplamaklygyň zerurlygy ýokdur. Şunuň üçinde bu teoremany ulanyp kesgitleýjini hasaplamaga başlamazdan önürti kesgitleýjiniň ýönekeý häsiýetlerini ulanmak bilen onuň käbir setiriniň ýa-da sütüniň mümkin boldugyça köp elementlerini 0-la öwürmäge çalyşýarlar. Kesgitleýjini setiri boýunça dagytmagyň teoremasyny özünde hususy hal görünüşinde saklaýan Laplas teoremasy ady bilen belli indiki tassyklamany subutsyz getireliň.

Teorema: (Laplas teoremasy). Goý n-nji tertipli Δ kesgitleýjide erkin k ($1 \leq k \leq n-1$) setir (ýa-da k sany sütün) saýlanyp alynan bolsun. Onda bu saýlanyp alynan setirlerde (ýa-da sütünlerde) düzmek mümkin bolan ähli k -njy tertipli minorlaryň özleri algebräýik doldurgyçlaryna köpeltmek hasyllarynyň jemi bu kesgitleýjiniň özüne deňdir.

7. Käbir hususy görnüşdäki kesgitleýjileri hasaplamaklygyň düzgünleri

1. Eger-de kesgitleýjiniň baş diagonalyndan bir tarapda ýatan elementleriň ählisi 0-a deň bolsa, OA kesgitleýji baş diagonalyň elementleriň köpeltmek hasylyna deňdir.

Ýagny,

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \dots a_{1n} \\ 0 & a_{22} \dots a_{2n} \\ 0 & 0 \dots a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} \cdot \dots \cdot a_{nn}.$$

Bu düzgüni matematiki induksiýanyň usulundan peýdalanyp, aňsatlyk bilen subut edip bileris. Hakykatdan hem aýdylan tasyklama 2-nji tertipli kesgitleýji üçin dogrydyr.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ 0 & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}0 = a_{11}a_{22}$$

Bu tasyklama tertibi $n-1$ -e çenli bolan ähli kesgitleýjiler üçin dogry hasap edip, (ýerne ýetýär hasap edip), onuň n -nji tertipli kesgitleýji üçin hem adalatlydygyny gö rkezeliň. (Induktiv talap diýilýär) hakykatdan hem berlen kesgitleýjiniň onuň 1 -nji sütüni boýunça

$$\text{dagytmak} \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \dots a_{1n} \\ 0 & a_{22} \dots a_{2n} \\ 0 & 0 \dots a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & \dots a_{2n} \\ 0 & a_{33} \dots a_{3n} \\ 0 & 0 \dots a_{nn} \end{vmatrix} \text{ deňlik alynar.}$$

Induktiv talaby deňligiň sag tarapyndaky ($n-1$) –nji tertipli kesgitleýji üçin ulansak

$$\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \dots a_{2n} \\ 0 & a_{33} \dots a_{3n} \\ 0 & 0 \dots a_{nn} \end{vmatrix} = a_{22} a_{33} \dots a_{nn}$$

deňlik alynar we ol öň ýanyndaky deňlik bilen tasyklamany subudyňy berer.

2.Wandermond kesgitleýjisi.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \dots 1 \\ a_1 & a_2 \dots a_n \\ a_1^2 & a_2^2 \dots a_n^2 \\ \vdots & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} \dots a_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j)$$

Ähli mümkin bolan tapawutlaryň köpeltmek hasylyna deňdir. Hakykatdan hem tassyklama 2 -nji tertipli kesgitleýji üçin ýerne ýetýändigini görmek aňsatdyr.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ a_1 & a_2 \end{vmatrix} = a_2 - a_1.$$

Onda bu tassyklama tertibi $(n-1)$ -e çenli bolan ähli Wandermond kesgitleýjileri üçin adalatly diýip hasap edip, (induktiv talap) onuň n -nji tertipli Wandermond kesgitleýjisi üçin hem dogrudugyny görkezeliň. Bu ýagdaýda aýdylan tassyklamanyň matematiki induksiýa usulunyň ýardamynda subudy ýerne ýetirildigi bolardy onda berlen n -nji tertipli Wandermond kesgitleýjisiniň 2 -nji

setirinden onuň 1-nji setirini a_1 -e köpeldip aýyryp, 3-nji setirden bolsa, 2-nji setirini a_1 -e köpeldip aýyryp, we şuna meňzeşlikde ahyr soňunda iň soňky setirinde onuň öň ýanyndaky setirini a_1 -e köpeldip aýyrmak bilen alarys.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \dots 1 \\ 0 & a_2 \dots a_n \\ a_1^2 & a_2^2 \dots a_n^2 \\ a_1^{n-2} & a_2^{n-2} \dots a_n^{n-2} \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} \dots a_n^{n-1} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \dots 1 \\ 0 & a_2 - a_1 a_n - a_1 \\ 0 & a_2 - a_1 \cdot a_2 a_n^2 - a_1 \cdot a_n \\ 0 & a_2 - a_1 \cdot a_2^2 a_n^3 - a_1 \cdot a_n^2 \\ 0 & a_2^{n-1} a_1 a_2^{n-2} a_n^{n-1} a_1 a^{n-2} \end{vmatrix} = \\
 = 1 \cdot A_{11} = (-1)^{1+1} M'_{11} = M'_{11} = \begin{vmatrix} a_2 - a_1 \dots a_n - a_1 \\ a_2(a_2 - a_1) \dots a_n(a_n - a_1) \\ a_2^2(a_2 - a_1) \dots a_n^2(a_n - a_1) \\ a_2^{n-2}(a_2 - a_1) \dots a_n^{n-2}(a_n - a_1) \end{vmatrix} = \\
 = (a_2 - a_1) \cdot (a_3 - a_1) \dots (a_n - a_1) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \dots 1 \\ a_2 & a_3 \dots a_n \\ a_2^2 & a_3^2 \dots a_n^2 \\ a_2^{n-2} & a_3^{n-2} \dots a_n^{n-2} \end{vmatrix} = \\
 = (a_2 - a_1)(a_3 - a_1) \dots (a_n - a_1) \cdot \prod (a_i - a_j) = \\
 = \prod_{i=2}^n (a_i - a_j) \cdot \prod (a_i - a_j) = \prod (a_i - a_j).$$

$$2 \leq j < i \leq n$$

$$2 \leq j < i \leq n \quad 1 \leq j < i \leq n$$

kesgitleýjiniň ýönekeý häsiýetlerinden hem-de subut edilen tassyklamadan

$$\begin{vmatrix} a_1^{n-1} a_2^{n-1} \dots a_n^{n-1} \\ a_1^2 a_2^2 \dots a_n^2 \\ a_1 a_2 \dots a_n \\ 1 1 \dots 1 \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (a_j - a_i) \quad \text{deňligiň ýerne ýetýändigini almak}$$

kyn dälär. Eger-de n -nji tertipli Δ kesgitleýji $\begin{vmatrix} M_1 & M_2 \\ 0 & M_1' \end{vmatrix}$, Bu

ýerde M_1 -k-njy tertipli kwadrat matrisalar M_2 $-(k \times n-k)$ ölçegli göniburçly matrisa. 0 - $(n-k \times k)$ ölçegli 0 elementden durýan 0 -l matrisa görnüşdäki kesgitleýji bolsun. Onda $\Delta = |M_1| \cdot |M_1'|$ deňlik dogrydyr.

8. Islendik sandaky näbellileri bolan çyzykly deňlemeleriň kwadrat sistemasyny çözmäge Kramer düzügi.

Goý bize n sany näbellileri bolan çyzykly deňlemeleriň kwadrat sistemasy.

$$\begin{vmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{vmatrix} \quad (1)$$

berlen bolsun onuň näbellileriniň kafisentlerinden düzülen kesgitleýji

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11}a_{12} \dots a_{1n} \\ a_{21}a_{22} \dots a_{2n} \\ a_{n1}a_{n2} \dots a_{nn} \end{vmatrix} \neq 0 \quad (2)$$

şerti kanagatlandyryň bolsun. (0 -a deň däl bolsun) j -nomer $1 \leq j \leq n$ deňsizlikleri kanagatlandyryň islendik nomer bolsun. 1 -nji sistemanyň 1 -nji deňlemesini A_{1j} -e 2 -nji deňlemesini A_{2j} -e we şuna meňzeşlere iň soňky n -nji deňlemesini bolsa, A_{nj} -e köpeldip alynan aňlatmalary goşup soňra birmeňzeş näbelli çlenleri toplaşdyranymyzdan soň alarys:

$$0 \leq r_1 < b \quad (2) = b_1 A_{1j} + b_2 A_{2j} + \dots + b_n A_{nj} \quad (3)$$

$$(a_{11}A_{1j} + a_{21}A_{2j} + \dots + a_{n1}A_{nj})x_1 + (a_{12}A_{1j} + a_{22}A_{2j} + \dots + a_{n2}A_{nj}) \cdot x_2 = b_1 A_{1j} + b_2 A_{2j} + \dots + b_n A_{nj} \quad (4) \quad (a_{1n}A_{1j} + a_{2n}A_{2j} + \dots + a_{nn}A_{nj}) \cdot x_n$$

Bize öňden belli bolşuna görä, $\Delta - ny \Delta \Delta n$ -nji sütüni boýunça dagytsak.

$$\begin{vmatrix} a_{11} \dots a_{1j} \dots a_{1n} \\ a_{21} \dots a_{2j} \dots a_{2n} \\ \dots \\ a_{n1} \dots a_{nj} \dots a_{nn} \end{vmatrix} = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \dots + a_{nj}A_{nj}$$

Eger-de bu deňligiň sag tarapyndaky aňlatmada $a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{nj}$ sanlary b_1, b_2, \dots, b_n sanlar bilen çalşyrsak onda alynýan $b_1A_{1j} + b_2A_{2j} + \dots + b_nA_{nj}$ aňlatma Δ -kesgitleýjide onuň j -nji sütünleriniň b_1, b_2, \dots, b_n sanlaryň sütüni bilen çalşyrylyp kesgitleýjä deň bolar.

$$\begin{vmatrix} a_{11} \dots b_1 \dots a_{1n} \\ a_{21} \dots b_2 \dots a_{2n} \\ \dots \\ a_{n1} \dots b_n \dots a_{nn} \end{vmatrix}$$

(çünki bu elementleriň algebraik doldurgyçlary olaryň özlereine bagly däldirler) onda bu kesgitleýjini Δ_j diýip belgilesek

$\Delta_j = b_1A_{1j} + b_2A_{2j} + \dots + b_nA_{nj}$ bolar.

Bu diýildiği (4) deňligiň sag tarapyň Δ_j kesgitleýjä (Δ -dan onuň j -nji sütüni (1) sistemany azat çenleriniň sütüni bilen çalşyrylyp alnan kesgitleýjä) deňdigini aňladýar. 2-nji bir tarapdan bize belli bolan kesgitleýjini sütüni boýunça dagytmagyň formulasyna görä, islendik k nomer üçin $1 \leq k \leq n$ $a_{1k}A_{1k} + a_{2k}A_{2k} + \dots + a_{nk}A_{nk} = \Delta$ bolýandygy bellidir ýöne ýokarda ýazylyan

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} a_{11} \dots b_1 \dots a_{1n} \\ a_{21} \dots b_2 \dots a_{2n} \\ \dots \\ a_{n1} \dots b_n \dots a_{nn} \end{vmatrix} = b_1A_{1j} + b_2A_{2j} + \dots + b_nA_{nj} \quad (5)$$

deňlikde b_1, b_2, \dots, b_n sanlary Δ -nyň başga bir t -nji sütüniň ($m \neq j$) elementleri bilen çalşyrsak alynýan

$$a_{1m}A_{1j} + a_{2m}A_{2j} + \dots + a_{nm}A_{nj} = \begin{vmatrix} a_{11} \dots a_{1m} \dots a_{1m} \dots a_{1n} \\ a_{21} \dots a_{2m} \dots a_{2m} \dots a_{2n} \\ \vdots \\ a_{n1} \dots a_{nm} \dots a_{nm} \dots a_{nn} \end{vmatrix} = 0$$

bolýandygyna eýe bolarys. Bu diýildigi (deňligiň çep tarapyny oka-
sak) kesgitleýjiniň 1(m-nji) sütüniniň ähli elementleriniň onuň başga
bir (j-nji) sütüniniň degişli elementleriniň algebraik doldurgyçlaryna
köpeltmek hasyllarynyň jeminiň 0-la deňdigini aňladýar. Şeýlelikde
bu alynan gatnaşygy ýokarda getirilen kesgitleýjini sütüni boýunça
dagytmagyň formulasy bilen birleşdirip, indiki görnüşde ýazmak
mümkindir.

$$a_{1m}A_{1j} + a_{2m}A_{2j} + \dots + a_{nm}A_{nj} = \begin{cases} \Delta, j = m & bolanda \\ 0, j \neq m & bolanda \end{cases} \quad (6)$$

Şeylelikde (4) deňlik (6)-njy gatnaşyklary peýdalanmak bilen indiki görnüşde ýazylar.

$$\Delta \cdot x_j = \Delta_j \quad (7) \quad \Delta - (a_{1j} \cdot A_{1j} + a_{2j} \cdot A_{2j} + \dots + a_{nj} \cdot A_{nj})$$

Onda $\Delta \neq 0$ diyilip edilen şerte görä, bu deňlikden \dot{Y}_j -näbelli üçin

yeketäk bolan $X_j = \frac{\Delta_j}{\Delta}$ bahany taparys. $j(1 \leq j \leq n)$ nomeriň

erkindigine göre, $X_1 = \frac{\Delta_1}{\Lambda}, X_2 = \frac{\Delta_2}{\Lambda}, \dots, X_n = \frac{\Delta_n}{\Lambda}$ (8)

deňlikler bilen näbellilere ýeketäk bolan bahalar kesgitlenilýär.

(8) deňliklere Kramer formulalary diýilip aýdylýar. Hem-de Δ kesgitleýjisi 0-a deň bolmadyk n -sany näbellileri bolan çyzykly deňlemeleriň kwadrat sistemasyny çözmekligiň bu usulyňa Kramer düzgüni diýilýär. (8) formulalar bilen tapylýan näbellileriň bahalarynyň (1) sistemanyň çözüwi bolýanlygyny görmek aňsatdyr. Hakykatdan hem (1)sistemanyň islendik i -nji ($1 \leq i \leq n$) deňlemesiniň çep tarapynda näbellileriň (8)deňlikler bilen tapylýan bahalaryny orunlaryna goýsak.

$$\begin{aligned}
a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n &= a_{i1} \frac{\Delta_1}{\Delta} + a_{i2} \frac{\Delta_2}{\Delta} + \dots + a_{in} \frac{\Delta_n}{\Delta} = \\
&= a_{i1} \frac{b_1A_{11} + b_2A_{21} + \dots + b_nA_{n1}}{\Delta} + a_{i2} \frac{b_1A_{12} + b_2A_{22} + \dots + b_nA_{n2}}{\Delta} + \dots + a_{in} \frac{b_1A_{1n} + b_2A_{2n} + \dots + b_nA_{nn}}{\Delta} = \\
&\cdot = \frac{1}{\Delta} \{b_1(a_{i1}A_{11} + a_{i2}A_{12} + \dots + a_{in}A_{1n}) + b_2(a_{i1}A_{21} + a_{i2}A_{22} + \dots + a_{in}A_{2n}) + \\
&+ \dots + b_i(a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \dots + a_{in}A_{in}) + \dots + b_n(a_{i1}A_{n1} + a_{i2}A_{n2} + \dots + a_{in}A_{nn})\} = \\
&= \frac{1}{\Delta} b_i \Delta = b_i.
\end{aligned}$$

Soňky deňlik näbellileriň Kramer formulalary boýunça tapylan bahalarynyň sistemasynyň i -nji deňlemesini kanagatlandyryandygyny görkezýär. I -nomeriň erkindigine görä, bolsa ol bahalaryň sistemasynyň deňlemeleriniň ählisini kanagatlandyryandyklaryny görýäris. Indi çyzykly deňlemeler sistemasynyň hususy ýagdaýyna ýagny n -sany näbellileri bolan bir jynysly çyzykly deňlemeleriň kwadrat sistemasyna

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = 0, i = 1, 2, \dots, n \quad (9)$$

seredeliň. Bu sistemanyň kofisientlerinden düzülen

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \neq 0.$$

bolan halatynda onuň çözüwini tapmak üçin Kramer formulasyndaky Δ_i kesgitleýjileriniň i -nji sütünleriniň diňe 0 -lardan durýandyklaryna görä, olaryň ählisi hem 0 -la deň bolup, näbelliler üçin $\dot{y}_1=0, \dot{y}_2=0, \dots, \dot{y}_n=0$ bolan bahalary taparys. Diýmek n näbellili birjynysly çyzykly deňlemeleriniň kwadrat sistemasynyň Δ kesgitleýjisi 0 -la deň bolmasa, onda ol sistema ýeketäk 0 çözüwe eýedir.

Bellik: çyzykly deňlemeleriň kwadrat sistemasynyň kesgitleýjisi $\Delta \neq 0$ bolsa onda bu sistema ýeketäk çözüwe eýedir. We ony tapmak üçin Kramer formulalaryndan peýdalanmak mümkin. Kramer düzgüniň ähmiýetli talapy diňe Δ -ni hasaplamak arkaly sistemanyň

çözüwiniň ýeketäkdigi ýa-da däldigi hakynda netije çikaryp bolýar. (Birden $\Delta = 0$ bolaýsa, onda sistemanyň ýa çözüwiniň ýokdygy ýa-da onuň çözüwiniň ýeketäk däldigi hakynda netijä gelmeli bolarys) Kramer düzgüniniň näbellileriň n sany uly bolan ýagdaýynda $n+1$ sany n -nji tertipli kesgitleýjileri hasaplamaklygy talap edýändigine görä, onuň zähmeti köp talap edýän oňaysyz usulygydygy gelip çykýandyr. (Şu manyda Gauss usuly has oňaly hasap edilýär). Ol usul bilen sistemany çözmek n uly bolanda (näbellileriň sany köp bolanda) diňe ýekeje n -nji tertipli kesgitleýjini hasaplamak bilen deňgüýşlidir.

9. Halka we meýdan

Islendik sanlaryň M köplüğine halka diýlip aýdylýar, eger-de bu köplükden alnan islendik iki sanyň jemi, tapawudy hem-de köpeltmek hasyly ýene-de şu köplüğe degişli sanlar bolýan bolsa.

Eger-de, M köplügiň islendik iki sany sanlarynyň jemi, tapawudy we köpeltmek hasyly bilen birlikde ondan alnan islendik sanyň nol däl sana bolan paýy hem şu köplüğe degişli san bolsa, bu köplüğe meýdan emele getirýär diýlip aýdylýar.

Mysal üçin :

a) Ahli bitin polozitel sanlaryň köplügi halkany emele getirmeyärler. Çünki, iki sany polozitel sanlaryň tapawudynyň bu köplüğe degişli bolmazlygy hem mümkindir.

b) Ahli bitin sanlaryň köplügi halkany emele getirýändir. Çünki islendik iki sany bitin sanyň jemi, tapawudy hem-de köpeltmek hasyly ýene-de bitin sandyr.

c) Ahli bitin sanlaryň köplügi meýdan emele getirýän däl. Çünki bu köplükden alnan bitin sanyň başga bir nul däl bitin sana gatnaşygynyň bitin san bolmazlygy mümkindir.

d) Ahli rasional sanlaryň toplumy meýdany emele getirýändir ler.

Hakykatdan hem, eger-de $\frac{p_1}{q_1}$ we $\frac{p_2}{q_2}$ ($p_2 \neq 0$) rasional sanlar

üçin 1) $\frac{p_1}{q_1} \pm \frac{p_2}{q_2} = \frac{p_1 q_2 \pm p_2 q_1}{q_1 q_2}$ -rasional

$$2) \frac{p_1}{q_1} \cdot \frac{p_2}{q_2} = \frac{p_1 p_2}{q_1 q_2} - \text{rasional}$$

$$1) \frac{p_1}{q_1} : \frac{p_2}{q_2} = \frac{p_1}{q_1} \cdot \frac{q_2}{p_2} = \frac{p_1 q_2}{q_1 p_2} - \text{rasional.}$$

Edil şuna meňzeşlikde, islendik elementli M köplük üçin hem halka we meýdan düşüňjeleri kesgitlenýändirler.

Kesgitleme. Islendik elementleriň M köplüğinde elementleri goşmak hem-de köpeltmek amalary kesgitlenip bu amallar orun çalşyрма, utgaşdyрма häsiýetlere eýe bolup, olar bilelikde paýlaşdyрма kanun bilen baglanşykly bolsalar, ýagny bu köplügiň islendik a, b, c elementleri üçin :

$$a \cdot b = b \cdot a$$

$$(a \cdot b)c = a(b \cdot c)$$

$$a + b = b + a$$

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

$$(a + b)c = ac + bc$$

talaplar ýerine ýetýän bolsa, şeýle hem goşmak amaly üçin oňa ters bolan aýyrmak amaly hem bu köplükde kesgitlenen bolsa, onda M köplüğine erkin elementleriöplügi diýilýär.

Kesgitleme. Eger-de erkin elementleriň halkasynda nul däl elementi bölmek amaly hem kesgitlenen bolsa, onda oýdan emele getirýär diýilýär.

Teorema. Islendik sanlar meýdanynda rasional sanlar meýdany saklanýandyr.

10. Ters matrisa

Eger-de, n -nji tertipli A kwadrat matrisanyň kesgitleýjisi nuldан tapawutly bolsa, oňa aýratyn däl, tersine ýagdaýda bolsa aýratyn matrisa diýlip aýdylýar.

Bu kesgitlemeden hem-de kesgitleýjileri köpeltmegiň teorema-syndan birnäçe sany n -nji tertipli matrisalaryň köeltmek hasylynyň aýratyn däl bolmaklary üçin zerur hem ýeterlik şert bolup ol matrisalaryň her biriniň aýratyn däl matrisa bolmalydygy hyzmat edýändir.

$A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_k$ -aýratyn däl bolmaklary üçin A_i -leriň her birleri aýratyn dälir.

A_1, A_2, \dots, A_k aýratyn däl bolsa, A_i -leriň her biri aýratyn däl we tersine.

$$0 \neq |A_1 A_2 \dots A_k| = |A_1| \cdot |A_2| \cdot \dots \cdot |A_k|$$

Şeýle hem birnäçe n -nji tertipli matrisalaryň köpeltmek hasylynyň aýratyn bolmaklygynyň zerur hem ýeterlik şertiniň olaryň hiç bolmanda biriniň aýratyn matrisa bolmaklygydygyny subut etmek aňsatdyr, ýagny:

2) $A_1 A_2 \dots A_k$ -aýratyn

3) A_i -leriň hiç bolmanda biri aýratyndyr

tassyklamalaryň ekwiwalentdigini hem kesgitleýjileri köpeltmegiň teoremesyndan gelip çykýandyр.

Eger-de n -nji tertipli A matrisa üçin $AA^{-1} = E$, deňligi kanagatlandyryýan A^{-1} matrisasyna A -nyň sagyndan ters matrisasy diýilýär. Edil şuna meňzeşlikde $A^{-1}A = E$ deňligi kanagatlandyryýan A^{-1} matrisa A -nyň çepinden ters matrisa diýilýär.

Eger-de, käbir B matrisa bir agtyň özünde A -nyň hem sagyndan, hem çepinden ters matrisalary bolup hyzmat edýän bolsa, ýagny, (1) $B \cdot A = A \cdot B = E$ deňlikler ýerine ýetýän bolsa, onda B matrisa A -nyň ters matrisasy diýilýär we ol A^{-1} görnüşde belgilenýär.

Ters matrisanyň kesgitlemesindäki ulanylan E birlik matrisa islendik A berlen tertipdäki matrisa bilen $EA=AE=A$ (2) deňlikleri kanagatlandyryýan ýeke -täk matrisadyр.

n -nji tertipli A matrisa aýratyn bolan halatynda onuň sagyndan hem, çepinden hem ters matrisasy ýokdur. Bu halatda ters matrisa hakynda asla gürrüň hem bolup bilmez.

Hakykatdan hem, aýratyn A matrisanyň sagyndan tersiniň, ýagny $AA^{-1} = E$ deňligi kanagatlandyryýan A^{-1} derejeli matrisanyň ýokdugyny görkezeliň. $AA^{-1} = E$ deňlikde kesgitleýjileri köpeltmegiň teoremasyny ulanyp taparys :

$$0 = |A| \cdot |A^{-1}| = |AA^{-1}| = |E| = 1$$

Bu alnan mümkin däl deňlik biziň aýratyn matrisa üçin sagyndan ters matrisanyň bardygy hakyndaky eden gümanymyzyň hädogrudygyny görkezýär.

Indi n-nji tertipli

$$A = \begin{pmatrix} a_{11}a_{12}...a_{1n} \\ a_{21}a_{22}...a_{2n} \\ \\ a_{n1}a_{n2}...a_{nn} \end{pmatrix}$$

matrisa aýratyn däl ($\Delta = |A| \neq 0$) bolanda onuň ters matrisasyny hasaplamagyň formulasyny getireliň. Bu matrisanyň elementleriniň algebraik doldurmuşlaryndan düzülen :

$$A^* = \begin{pmatrix} A_{11}A_{12}...A_{1n} \\ A_{21}A_{22}...A_{2n} \\ \\ A_{n1}A_{n2}...A_{nn} \end{pmatrix}$$

matrisa A matrisanyň özara matrisasy diýilýär. A-nyň ters matrisasyny A^* matrisany köpeltmek bilen ýagny :

$$A^{-1} = \frac{1}{\Delta} A^* = \begin{pmatrix} A_{11}A_{12}...A_{1n} \\ A_{12}A_{22}...A_{n2} \\ \\ A_{1n}A_{2n}...A_{nn} \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\Delta} = \begin{pmatrix} \frac{A_{11}}{\Delta} & \frac{A_{21}}{\Delta} & ... & \frac{A_{n1}}{\Delta} \\ \frac{A_{12}}{\Delta} & \frac{A_{22}}{\Delta} & ... & \frac{A_{n2}}{\Delta} \\ \\ \frac{A_{1n}}{\Delta} & \frac{A_{2n}}{\Delta} & ... & \frac{A_{nn}}{\Delta} \end{pmatrix} \quad (3)$$

formula görä hasaplanylýar.

Bellik. Berlen aýratyn däl matrisanyň ters matrisasy ýeke-täkdir.

Bellik. Mysal işlenende ilki bilen berlen matrisanyň aýratyn dældigine göz ýetirmelidiris. Eger-de, ol aýratyn bolaýsa, onuň ters matrisasy ýokdur.

Berlen matrisa aýratyn däl bolan halatynda bu matrisanyň elementleriniň algebraik doldurmuşlaryny tapyp soňra olary (3)

belgilemeleri girizmek bilen berlen bu sistemany $AX = B$ (2) görnüşde ýazyp bileris.

$\Delta = |A| \neq 0$ bolandygyna görä geçen temada edilen bellikden ikinji matrisa deňlemäniň çözüwiniň $X = A^{-1}B$ (3) formula görä tapylyp bilinýändigini alarys. Onda ters matrisany hasaplamagyň formulasyndan peýdalanmak bilen (3) deňlikden

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} = A^{-1}B = \frac{1}{\Delta} \begin{pmatrix} A_{11}A_{21}\dots A_{n1} \\ A_{12}A_{22}\dots A_{n2} \\ \dots \\ A_{1n}A_{2n}\dots A_{nn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_n \end{pmatrix} = \frac{1}{\Delta} \begin{pmatrix} A_{11}b_1 + A_{21}b_2 + \dots + A_{n1}b_n \\ A_{12}b_1 + A_{22}b_2 + \dots + A_{n2}b_n \\ \dots \\ A_{1n}b_1 + A_{2n}b_2 + \dots + A_{nn}b_n \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{\Delta} \begin{pmatrix} \Delta_1 \\ \Delta_2 \\ \dots \\ \Delta_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\Delta_1}{\Delta} \\ \frac{\Delta_2}{\Delta} \\ \dots \\ \frac{\Delta_n}{\Delta} \end{pmatrix} \quad (\text{bu ýerde } \Delta_i = \sum_{k=1}^n A_{ki}b_k - \Delta \text{ kesgitleň } i\text{-nji})$$

sütüniň (1) sistemanyň azat çlenleriniň sütüni bilen çalşyryp alnan Δ_i kesgitleýjiniň bu i-nji sütüni boýunça dagytmasydyr).

Soňky alnan deňlikde iki matrisanyň deňliginiň kesgitlemesinden peýdalanmak bilen (degişli elementleriň deň bolmawlaryndan)

$$X_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta}, X_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta}, \dots, X_n = \frac{\Delta_n}{\Delta} \quad (4)$$

Bu alnan deňlikler (1) sistemanyň näbellilerine kesgitli bahalary bermek bilen onuň ýeke-täk çözüwie eýedigini aňladýandyrlar. Şeýle hem bu deňlikler Kramer formulalarynyň hut özüdir.

12. Köpçenler halkasy

X näbelliden $a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n = 0$ (1) görnüşdäki aňlatma n tertipli deňleme diýilýär.

Bu deňlemäniň çözüwini tapmak ony kanagatlandyryan X näbelliniň ähli bahalaryny tapmakydyr. Bu deňlemäni çözmekligi adatyça onuň çep tarapy

$$f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_{n-1} x + a_n, a_0 \neq 0$$

diýip belgilesek, bu $f(x)$ aňlatma n derejeli köpçlen diýilýär.

Kesgitlemeden görnüşi ýaly $n=0$ bolanda a sana nul derejeli köpçlen hökmünde garalýandygy gelip çykýandyr. Şeýle hem, nul san hem köpçlen hökmünde seredilip ol derejesi kesgitli bolmadyk ýeketäk köçlendir.

Kesgitlemedäki a_i sanlara $f(x)$ köpçleniň koeffisientleri diýilýär.

Eger-de, $f(x)$ köpçlen berlen birlikde başgada bir

$$g(x) = b_0 x^s + b_1 x^{s-1} + \dots + b_{s-1} x + b_s, b_0 \neq 0$$

köpçlen berlen bolsa, onda $n \geq s$ bolanda olaryň jemi diýilip n -den uly bolmadyk

$$f(x) + g(x) = d_0 x^n + d_1 x^{n-1} + \dots + d_{n-1} x + d_n$$

köpçlene düşünilýändir. Şunlukda $d_i = a_i + b_i, i = \overline{0, n}$ deňlik bilen kesgitlenilýän bolup, $n > s$ bolanda $b_{s+1} = b_{s+2} = \dots = b_n = 0$.

Biz şu kesgitlemede hem-de geljekde birmeňzeş derejeleriň önündäki koeffisientleri gabat gelýän köpçlenler diýip düşunjekdiris.

Kesgitlemeden görnüşi ýaly $n=s$ bolanda $f(x) + g(x)$ jemiň derejesiniň n -den kiçi bolmagy hem mümkindir.

$g(x)$ we $f(x)$ köpçlenleriň köpeltmek hasyly diýlip

$g(x) \cdot f(x)$ görnüşli belgilenýän we köpelijiler näbellileriň derejeleriniň artýan tertibinde ýagny,

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n, a_n \neq 0$$

$$g(x) = b_0 + b_1 x + \dots + b_s x^s, b_s \neq 0$$

Yazylan ýagdaýynda

$$f(x)g(x) = \theta_0 + \theta_1 x + \theta_2 x^2 + \dots + \theta_{n+s} x^{n+s}$$

n derejeli ýazylan deňlemä aýdylyar. Bu kesgitlemeden

$$\theta_0 = a_0 b_0, \theta_1 = a_1 b_0 + a_0 b_1, \theta_2 = a_2 b_0 + a_1 b_1 + a_0 b_2$$

$f(x)$ köpçlene garşylykly köpçlen diýilip :

$-f(x) = -a_0 - a_1x - \dots - a_nx^n$ görnüşdäki köpçlene aýdylyar.

Bu ýagdaýda $f(x)$ bilen muňa garşylykly bolan $-f(x)$ jeminiň nul köpçleni ýagny, $f(x) + (-f(x)) = 0$ deňligiň ýerine ýetýändigini aýdyňdyr.

Bu kesgitlemeden $f(x)$ köpçlenden $g(x)$ köpçleni aýrylanda alynýan, olaryň tapawudy bolan $f(x) - g(x)$ köpçleniň $f(x)$ we $g(x)$ -a garşylykly bolan $g(x)$ köpçlenleriň $f(x) + (-g(x))$ jemi görnüşinde hasaplanyp bilinjekdigi gelip çykyandyr. Şeýlelikde, ähli köpçlenleriň köplüğünde olary goşmak hem-de köpeltmek amallary bilen birlikde goşmak amalyňa ters bolan aýrmak amalyňyň hem kesgitlenenidigi gelip çykyandyr.

Kesgitlemä görä köpçlenleri goşmak hem-de köpeltmek amallarynyň kommutativ, assosiativ häsiýetleri kanagatlandyrmak bilen birlikde distributiv kanun bilen baglanyşyklydyklary hem gelip çykyandyr. Diýmek, ähli köpçlenleriň köplügi halkany emele getirýändir.

İki sany nul däl köpçlenleriň paýynyň elmydama köpçleni bermeýändigini hasaba alsak, köpçlenler köplüğünde bölmek amalyňyň kesgitlenmeýändigini gelip çykyandyr. Bu diýildigi köpçlenleriň köplüğiniň halkany emele getirmegi bilen birlikde meýdany emele getirmeýändigini gelip çykyandyr.

Indiki tassyklama köpçlenler üçin galyndyly bölünmegiň algoritmi ady bilen meşhurdyr.

T Islendik $f(x)$ we $g(x)$ köpçlenler üçin ýeke-täk kesgitlenilýän $q(x)$ we $r(x)$ köpçlenleri bar bolup, $f(x) = g(x)q(x) + r(x)$ (2) deňlik ýerine ýetýändir. Bu ýerde $r(x)$ ýa nula deňdir ýa-da ol derejesi $g(x)$ -yň derejesinden kiçi köpçlendir ;

(2) deňlikdäki $q(x)$ köpçlenine $f(x) - y$ $g(x)$ -a bölenimizde ýetýän paý, $r(x)$ -a bolsa bu bölmedäki galýan galyndy diýilýär.

13. Galyndyly bölmegiň algoritmi

Teorema1: Islendik $f(y)$ we $g(y)$ köpçlenler üçin ýeketäk kesgitlenilýän $q(y)$ we $r(y)$ köpçlenleri bar bolup olardan $r(y)$ ýa 0-a

deňdir, ýa-da $g(y)$ -iň derejesinden kiçi derejeli köpçlen bolup $f(y)=g(y) \cdot s(y)+r(y)$ (*) deňlik ýerine ýetýändir.

Bu deňlikde $s(y)$ köpçleni $f(y)$ köpçleni $g(y)$ köpçlene bölünende ýetýän paý. $r(y)$ bolsa bu bölünmedäki galyndy diýlip aýdylýar.

Bu tassyklamany subut etmek üçin ilki bilen aýdylan gatnaşygy kanagatlandyryan $s(y)$ hem-de $r(y)$ köpçlenleriň ýeketäk kesgitlenýändiklerini, soňra bolsa şeýle köpçlenleriň bardyklaryny görkezmelidiris.

Bu tassyklama algebrada örän köp ulanylyşlara eýe bolmak bilen, geljekki öwrenilmelerde ulanylyşlaryň mysallary örän köp düş geler. Olardan biri bolup Ewklid algoritminiň yzygiderli bölünmeklerini görkezmek mümkindir.

Indi bolsa birnäçe mysallara garalyň.

14. Köpçlenleriň bölüjilik häsiýetleri.

Goý koeffisientleri kompleks holdan tapawutly $f(y)$ we $\varphi(y)$ köpçlenler berilen bolsun. Eger-de $f(y)$ köpçlen $\varphi(y)$ -e bölünende galyndy hola deň bolsa $f(y)$ $\varphi(y)$ -e bölünýär, bu ýagdaýda $\varphi(y)$ -e $f(y)$ -iň bölüjisi diýilýär.

$\varphi(y)$ -niň $f(y)$ köpçleniň bölüjisi bolmagynyň zerur hem ýeterlik şerti bolup $\psi(y)$ köpçleniň tapylp

$$f(y) = \varphi(y) \psi(y) \quad (1)$$

deňligiň ýerine ýetmekligi hyzmat edýändir.

Hakykatdan eger $\varphi(y)$ $f(y)$ -niň bölüjisi diýsek, $\psi(y)$ -iň ornuna $f(y)$ -ni $\varphi(y)$ -e bölenimizde ýetýän paýyň alynmalydygy, tersine eger-de (1) deňlik ýerine ýetende

$$f(y) = \varphi(y)s(y)+r(y)$$

deňlikde $r(y)=0$ bolandygy aýdyňdyr.

(1) deňlikde $\psi(y)$ -iň hem $f(y)$ köpçleniň bölüjisi bolýandygy, şeýle hem $\varphi(y)$ -iň derejesiniň $\varphi(y)$ -iň derejesiniň $f(y)$ -iňkiden uly daldigi düşnüklidir.

Eger-de $f(y)$ we $\varphi(y)$ köpçlenleriň ikisiniň hem koeffisientleri rasional ýa-da hakyky bolsalar onda $\psi(y)$ -niň koeffisientleri hem degişlikde rasional ýa-da hakykydyrlar. Ýöne rasional ýa-da hakyky koef-

fisientli köpçleniň koeffisientleri Rasional ýa-da hakyky bolmadyk bölüjä hem eýe bolmagy mümkindir. Mysal üçin, $\sqrt{y^2+1}=(y+i)(y-i)$ Geljekde köp ulanyşlara eýe bolan indiki häsiýetleri belläp geçeliň.

1. Eger-de $f(y)$ $g(y)$ -e $g(y)$ bolsa $h(y)$ -e bölünýär bolsa, onda $f(y)$ hem $h(y)$ -a bölünýändir.
2. Eger-de $f(y)$ we $g(y)$ $\varphi(y)$ -e bölünýän bolsalar olaryň jemi hem-de tapawudy hem $\varphi(y)$ -e bölünýärler.
3. Eger-de $f(y)$ $\varphi(y)$ -e bölünýän bolsa $F(y)$ -iň islendik $g(y)$ -e köpeltmek hasyly hem $\varphi(y)$ -e bölünýändir.
4. Eger-de $f_1(y), f_2(y), \dots, f_k(y)$ köpçlenleriň her biri $\varphi(y)$ -e bölünýän bolsa, onda islendik $g_1(y), g_2(y), \dots, g_k(y)$ köpçlenler üçin $f_1(y)g_1(y) + f_2(y)g_2(y) + \dots + f_k(y)g_k(y)$ hem $\varphi(y)$ -e bölünýändir.
5. Islendik $f(y)$ köpçlen nolunjy derejeli islendik köpçlene bölünýär.
6. Eger-de $f(y)$ $\varphi(y)$ -e bölünýän bolsa, onda ol islendik $c \neq 0$ san bilen $cf(y)$ köpçlene hem bölünýär.
7. $c \neq 0$ san bilen $cf(y)$ köpçlenler we diňe şolar $f(y)$ -iň özüniň derejesine deň bolan derejeli bölüjileridir.
8. $f(y)$ we $g(y)$ köpçlenleriň biri-birine bölünmeleriniň zerur hem ýeterlik şerti $c \neq 0$ san bilen $g(y) = cf(y)$ deňligiň ýerine ýetmekligidir.
9. $c \neq 0$ san bolanda $f(y)$ we $cf(y)$ köpçlenleriň biriniň islendik bölüjisi beýlekisiniň hem bölüjisidir.

15. Iki köpçleniň iň uly umumy bölüjisini tapmagyň Ýewklid algoritmi.

Goý $f(y)$ we $g(y)$ -islendik köpçlenler bolsun. Eger-de $\varphi(y)$ bu köpçlenleriň her biriniň bölüjisi bolsa, onda oňa şol köpçlenleriň umumy bölüjisi diýilýär. $f(y)$ we $g(y)$ köpçlenleriň umumy bölüjisi bolup, hususan, islendik nolunjy derejeli köpçleniň hyzmat etjekdigi düşnüklidir. Bu iki köpçlenleriň başga umumy bölüjisi ýok bolsa, onda olara öz-ara ýönekeý diýilýär. Umumy ýagdaýda bu köpçlenleriň y -e bagly bolan umumy bölüjä hem eýe bolmagy mümkindir. $f(y)$ we $g(y)$ köpçlenleriň umumy bölüjisi bolan $d(y)$ olaryň beýleki umumy

bölüjilerinin her birine bölünýän bolsa bu $d(y)$ berilen $f(y)$ we $g(y)$ köpçenleriniň iň uly umumy bölüjisi diýilýär we $d(y)=(f(y),g(y))$ görnüşinde belgilenýär.

$$\begin{aligned} f(y) &= g(y)s_1(y) + r_1(y), \\ s(y) &= r_1(y)s_2(y) + r_2(y), \\ r_1(y) &= r_2(y)s_3(y) + r_3(y), \end{aligned} \quad (1)$$

.....

$$\begin{aligned} r_{k-2}(y) &= r_{k-1}(y)s_k(y) + r_k(y), \\ r_{k-1}(y) &= r_k(y)s_{k+1}(y) \end{aligned}$$

(1) deňlemedäki $r_1(y), r_2(y), \dots, r_k(y)$ galyndylaryň derejeleriniň deňsizlikde $g(y), r_1(y), r_2(y), \dots, r_{k-1}(y)$ derejelerinden kiçdikleri düşnüklidir. Şeýle hem bu deňliklerde aşakdan ýokary hereket etmek bilen $r_k(y)$ köpçelene $r_{k-1}(y), r_{k-2}(y), \dots, r_1(y), g(y)$ we $f(y)$ köpçenleriniň ählisiniň bölünýändiglerini, başgaça aýdanyňda $r_k(y)$ -niň $f(y)$ we $g(y)$ köpçenleriniň umumy bölüjisidigini alarys.

$\varphi(y)$ bilen $f(y)$ köpçenleriniň islendik bir umumy bölüjisini belgiläp (1) deňliklerde ýokardan aşaklygyna hereket etmek bilen $\varphi(y)$ -e $r_1(y), r_2(y), \dots, r_k(y)$ galyndylaryň ählisiniň bölünýändiglerine eýe bolarys. Bu diýildiği $f(y)$ we $g(y)$ köpçenleriniň umumy bölüjisi bolan $r_k(y)$ -niň olaryň islendik $\varphi(y)$ -umumy bölüjisine bölünýändigine, ýagny $r_k(y)=(f(y),g(y))$ bolýandygyna eýe bolarys.

Bellik. Köpçenleriniň bölüjilik häsiýetlerinden iki sany köpçenleriniň iň uly umumy bölüjisiniň nolynjy derejeli köpeliji takyklygynda kesgitlenýändigini gelip çykýar. Şeýlelikde iki sany köpçenleriniň öz-ara ýönekeý bolmaklarynyň zerur hem ýeterlik şertiniň olaryň iň uly umumy bölüjisiniň bire deň bolmaklygy diýip tassyklamak adalatlydyr.

16. Köpçleni çyzykly iki çlene bölmegiň Gorner usuly

Goy bize $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n, a_0 \neq 0$

n derejeli köpçen we $x - c$, bu ýerde c käbir kompleks san, berlen bolsun. $f(x)$ köpçleni $x - c$ çyzykly z çlene bölenimizde ýetýän paýy we galyndyny tapmak üçin Gorner usuly diýilýän indiki

düzgünden peýdalanmak mümkindir.Ýokarda aýdylan galyndy bölünýän algoritmden bu ýagdaýda ýeke-täk kesgitlenilýän

$$q(x) = b_0x^{n-1} + b_1x^{n-2} + \dots + b_{n-1}$$

paý we bu bölünmedäki galyndyny berýän käbir r kompleks san bar bolup, $f(x) = (x - c)[b_0x^{n-1} + b_1x^{n-2} + \dots + b_{n-1}] + r$ deňlik ýerine ýetýändir. Onda

$$a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n = b_0x^n + (b_1 - cb_0)x^{n-1} + (b_{n-1} - cb_{n-1})x + r - cb_{n-1}$$

deňlikden birmeňzeş derejeleriň önündäki koeffisientleri deňeşdirmek bilen

$$a_0 = b_0$$

$$a_1 = b_1 - cb_0$$

.....

$$a_{n-1} = b_{n-1} - cb_{n-2}$$

$$a_n = r - cb_{n-1}$$

deňlikleri ýa-da başgaça aýdanymyzda

$$b_0 = a_0$$

$$b_1 = a_1 + cb_0$$

$$b_2 = a_2 + cb_1$$

.....

$$b_{n-1} = a_{n-1} + cb_{n-2}$$

$$r = a_n + cb_{n-1}$$

bolýandyklaryny alarys.Bu bölünmäni ýerine ýetirmek üçin Gerner tablisasynyň

	a_0	a_1	a_2		a_{n-1}	a_n
c	$b_0 = a_0$	$b_1 =$ $= a_1 + cb_0$	$b_2 =$ $= a_2 + cb_1$		$b_{n-1} = a_{n-1} +$ $+ b_{n-2}c$	$r = a_n + cb_{n-1}$

17. Köpçleni çyzykly ikiçlenleriň köpeltmek hasylyna dagytmak

Kompleks sanlar algebrasynyň esasy teoremasy diýilýän indiki tassyklamany subutsyz getireliň:

Derejesi birden kiçi bolmadyk islendik san koeffisenleri bolan köpçleniň umumy ýagdaýda kompleks bolan hiç bolmanda bir köki bardyr. Goý $n \geq 1$ bolup,

$$f(y) = a_0 y^n + a_1 y^{n-1} + \dots + a_n \quad (1)$$

n -nji derejeli köpçlen berilen bolsun.

Ýokarda getirilen esasy teorema bu köpçleniň kompleks ýa-da hakyky bolan α_1 kökiniň bardygy, şoňa görä-de

$$f(y) = (y - \alpha_1) \varphi(y)$$

aňlatmanyň adalatlydygyny aňladýar. Bu ýerde $\varphi(y)$ -niň kompleks ýa-da hakyky koeffisientleri bolan köpçlendigine görä, esasy teoremadan onuň käbir α_2 köke eýedigini alynar.

Şeýlelikde $f(y) = (y - \alpha_1)(y - \alpha_2) \psi(y)$ aňlatma alynar. Bu pikir ýöretmäni dowam etdirmek bilen n -nji derejeli $f(y)$ köpçleniň n sany çyzykly köpelijileriň köpeltmek hasyly görnişindäki aňlatmasyny alarys. $f(y) = a_0(y - \alpha_1)(y - \alpha_2) \dots (y - \alpha_n)$. (2)

a_0 koeffisientiň alynmagy onuň ornuna başga bir b - san alynyp skobkalary açsak $f(y)$ -niň baş çleniň $a_0 y^n$ bolandygyna garamazdan onuň $b y^n$ bilen gabat gelmelidirini, bu ýerde $a_0 = b$ bolmalydygyny taparys. (2) aňlatmanyň $f(y)$ köpçlen köpelijiler tertibi takyklygynda şol görnişdäki ýeke- täk aňlatmadygy düşnüklidir. Tersine, ýagny $f(y)$ üçin

$$f(y) = a_0(y - \beta_1)(y - \beta_2) \dots (y - \beta_n) \quad (3)$$

dagytm hem adalatly diýseň, (2) we (3) aňlatmalardan

$$a_0(y - \alpha_1)(y - \alpha_2) \dots (y - \alpha_n) = a_0(y - \beta_1)(y - \beta_2) \dots (y - \beta_n) \quad (4)$$

gatnaşyk alynar. Eger-de α_i ähli β_i -lerden tapawutly diýsek (4)-de y -iň ornuna $-\alpha_i$ goýmak bilen bu deňligiň çep tarapyňyň 0, sagynyň bolsa 0-dan tapawutly bolýandygyny alarys. Diýmek her bir α_i käbir β_i sana deň hemde tersine bolmalydyr. Bu ýerden entek (3) we (4) aňlatmalaryň gabat gelýändikleri alynýan däl. Hakykatdan hem α_i -leriň arasynda öz-ara deňleriniň bar bolmaklary mümkindir. Goý olaryň 8 sanysy α_i -e deň bolup β -leriň arasynda α_i -e deňleri t sany bolsun diýeliň. $s=t$ bolýandygyny görkezmelidir. $s>t$ diýsek (4) gatnaşygyň iki tarapyňy hem $(y - \alpha_i)^t$ derejä bölmek bilen alynan

deňligiň çepinde $(y-\alpha_i)$ köpeliji bar bolup sagynda şeýle köpeliji saklanýan dälär. Bu bolsa ýokarda aýdylana tersdir. Şeýlelikde (2) dagytma ýeke-täkdir. Birmeňzeş köpelijileri toplaşdyrmak bilen $f(y)=a_0(y-\alpha_1)^{k_1}(y-\alpha_2)^{k_2}\dots(y-\alpha_l)^{k_l}$, (5) bu ýerde $k_1+k_2+\dots+k_l=n$ aňlatma eýe bolarys. Şunlykda $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_l$ sanlaryň sanlaryň arasynda deňleri ýokdyr. (5) aňlatmadaky k_i san ($i=1, 2, \dots, l$) α_i kökiň $f(y)$ -däki gaýtalygydyr. Hakykatdan hem bu gaýtalyk s_i bolsa $k_i \leq s_i$ bolan kesgitlemä görä $f(y)=(y-\alpha_i)^{s_i} \varphi(y)$. Bu deňlikde $\varphi(y)$ -ni onuň çyzykly köpelijilere dagytmany bilen çalşyryp $f(y)$ köpçleniň (2)-den tapawutly bolan çyzykly köpelijilere dagytmasyny alarys. Bu bolsa şeýle dagytmanyň ýeke-täkligine garşylykly netije bolar.

18. Köpçleniň kökleri

Eger-de $f(y)=a_0y^n+a_1y^{n-1}+\dots+a_n$ (1) käbir köpçlen, c bolsa käbir san bolanda $f(c)=a_0c^n+a_1c^{n-1}+\dots+a_n$ sana $f(y)$ -de näbelliniň ornuna c sany goýmakdan alynan) $f(y)$ köpçleniň $y=c$ nokatdaky bahasy diýilýär.

Eger-de $f(y)=0$ bolsa, onda sana $f(y)$ köpçleniň köki diýilýär (başgaça aýdanyňda c san $f(y)=0$ deňlemäniň köki diýilidigidir). Eger-de $f(y)$ köpçleni birinji derejeli (başgaça çyzykly köpçlene) köpçlene bölenimizde galyndynyň ya nolunjy derejeli, ya-da 0 köpçlen boljakdygy düşnükli. Indiki tassyklama bu galyndyny bölmäni yerine yetirmezden tapmaga esas beryär.

TEOREMA: $f(y)$ köpçleni $y-c$ iklene bölenimizde galýan galyndy $f(c)$ baha deňdir.

Subudy: Hakykatdan hem $f(y)=(y-c)\varphi(y)+r$, bu ýerde r käbir san deňlikde $y=c$ nokatdaky bahany deňligiň, iki tarapynda hem hasaplamak bilen $f(c)=(c-c)\varphi(c)+r=r$ bolýandygyna, ýagny tassyklama eýe bolarys.

NETIJE: c sanyň $f(y)$ köpçleniň köki bolmagynyň zerur hem ýeterlik şerti $f(y)$ -niň $y-c$ çyzykly iklene bölünmegidir.

Şeýlelikde Gorner usuly diýilýän $f(y)$ köpçleni $y-c$ çyzykly iklene bölmegiň indiki usuly öwrenilmäge mynasypdyr.

$$\text{Goý } f(y)=a_0y^n+a_1y^{n-1}+\dots+a_n \quad (2)$$

$$\text{we } f(y)=(y-c)\varphi(y)+r \quad (3)$$

bolup, $\varphi(y) = b_0 y^{n-1} + b_1 y^{n-2} + \dots + b_{n-1}$ bolsun. (3) deňlikde y näbelliniň birmeňzeş derejeleriniň koeffisientlerini deňeşdirmek bilen taparys:

$$\begin{aligned} a_0 &= b_0, \\ a_1 &= b_1 - cb_0, \\ a_2 &= b_2 - cb_1, \\ &\dots\dots\dots \\ a_{n-1} &= b_{n-1} - c b_{n-2}, \\ a_n &= r - c b_{n-1}. \end{aligned}$$

Bu ýerden $b_0 = a_0$, $b_n = cb_{n-1} + a_n$, $k=1, 2, \dots, n-1$ deňlikler alynar. Şeýle hem $r = cb_{n-1} + a_n$ bolar.

Gorner usulynyň köpçleniň nokatdaky bahasyny hasaplamaga ulanylmagynyň hem mümkindigini belläliň.

Eger-de $f(y)$ köpçlen $(y-c)^k$ derejä bölünip $(y-c)^{k+1}$ derejäde bölünmeýän bolsa, c san $f(y)$ -iň k gaýta (kratny) köki diýilýär.

k sana bolsa c kökiň $f(y)$ köpçlendäki gaýtalanmasy diýilýär.

Indiki tassyklama adalatlydyr.

Eger-de c san $f(y)$ -iň k - gaýta köki bolsa, onda $k > 1$ bolanda ol $f(y)$ -niň $(k-1)$ - gaýta kökidir. Şunlukda $k=1$ bolaysa c san $f(y)$ önümiň köki dälär.

19. Hakyky koeffisientli köpçlenleriň kompleks kökleriniň çatyrymylygy

Kompleks sanlar algebrasynyň esasy teoremasynda alynýan netijelerden birine seredeliň.

Goý hakyky koeffisientli $f(y) = a_0 y^n + a_1 y^{n-1} + \dots + a_{n-1} y + a_n$ köpçlen α - kompleks köke eýe bolsun, ýagny

$$a_0 \alpha^n + a_1 \alpha^{n-1} + \dots + a_{n-1} \alpha + a_n = 0$$

deňlik adalatly bolsun. Bu deňlikdäki ähli sanlary çatyrymylary bilen çalşyrsak hem bu deňlik ýerine ýeter. a_0, a_1, \dots, a_n hem-de 0 sanlaryň hakykatdyklaryna görä olar bu çalşyrmadan üýtgeşsiz galarlar, şeýlelikde $a_0 \alpha^{-n} + a_1 \alpha^{-n+1} + \dots + a_{n-1} \alpha^{-1} + a_n = 0$, ýagny $f(\alpha^{-1}) = 0$.

deňlige eýe bolarys. Bu diýildigi, eger-de α - kompleks san hakyky koeffisientli $f(y)$ köpçleniň köki bolsa, onuň α^{-1} çatyrymylsy hem $f(y)$ köki bolýandygyny aňladýar. Diýmek $f(y)$ köpçlen $\varphi(y) = (y-\alpha)(y-\alpha^{-1}) = y^2 - (\alpha + \alpha^{-1})y + \alpha\alpha^{-1} = 1$

koeffisientleri hakyky bolan, kwadrat üççlene bölünýändir. Şundan ugur alyp, $f(y)$ -de α we α^{-} kökleriň birmeňzeş gaýtalyklara eýediklerini görkezeliň. Bu kökler deňşilikde k we l gaýtalyklara eýe hem-de $k>l$ bolsun diýeliň.

Onda $f(y)$ köpçlen $\phi^l(y)$ derejä böliner, ýagny

$$f(y) = \phi^l(y) \cdot \varphi(y)$$

deňlik ýerine ýetip, $\varphi(y)$ paý hakyky koeffisientli bolmalydyr (hakyky koeffisientli köpçlenleriň paýy bolýandygyna görä). Ýöne $\varphi(y)$, ýokarda aýdylanyňa ylalaşman, α kompleks sany özüniň $(k-l)$ gaýta köki hökümünde saklaýan hem bolsa α^{-} san onuň köki däl. Bu ýerden $k=l$ bolmalydygyny alynar. Diýmek, hakyky koeffisientli köpçlenleriň kompleks kökleriniň ikibir çatyrymlydyklary düşnükli. Şeýlelikde indiki netije alynar:

Her bir hakyky koeffisientli $f(y)$ köpçlen köpeldijileriň tertibi takyklygynda ýeke-täk usul bilen özüniň a_0 baş koeffisientiniň hem-de onuň hakyky köklerine deňişli $y-\alpha$ görnüşdäki çyzykly hem-de çatyrymly köklerine deňişli bolan

$$\varphi(y) = y^2 - (\alpha + \alpha^{-})y + \alpha\alpha^{-}$$

görnüşdäki kwadrat köpçlenleriň köpeltmek hasyly görnüşinde aňladylyandyr.

20. Wiýet formulalary

Goý, baş koeffisiýenti bire deň bolan n -nji derejeli

$$f(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \dots + a_{n-1} x + a_n \quad (1)$$

köpçleniň kökleri $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ bolsun. Onda köpçleni çyzykly ikiçlenleriň köpeltmek hasylyna dagytmaklygyň düzgüninden

$$f(x) = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \dots (x - \alpha_n)$$

aňlatmany alarys. Bu deňligiň sag tarapyndaky skobkalary köpeldiştirip meňzeş çlenleri toplaşdyrmak bilen alynan koeffisiýenleri (1) ýazgydaky deňişli koeffisientler bilen deňeşdirip, Wiýet formulalary diýilýän indiki deňlikleri alarys:

$$a_1 = -(\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n),$$

$$a_2 = \alpha_1 \alpha_2 + \alpha_1 \alpha_3 + \dots + \alpha_1 \alpha_n + \alpha_2 \alpha_3 + \dots + \alpha_{n-1} \alpha_n,$$

$$a_3 = -(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 + \alpha_1 \alpha_2 \alpha_4 + \dots + \alpha_{n-2} \alpha_{n-1} \alpha_n),$$

$$a_{n-1} = (-1)^{n-1} (\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_{n-1} + \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_{n-2} \alpha_n + \dots + \alpha_2 \alpha_3 \dots \alpha_n),$$

$$a_n = (-1)^n \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n$$

Görşimiz ýaly k-njy deňligiň sag tarapy k-nyň jübütligine ýa-da täkdigine baglylykda goşmak ýa-da aýyrmak alamaty bilen alynan k sany kökleriň ähli mümkin bolan köpeltmek hasyllarynyň jemine deňdir. Şeýle hem bu deňlikler $n=2$ bolanda elementar algebradaky kwadrat üç çleniň kökleri bilen koeffisiýenleriniň arasyndaky baglanyşyklary aňladýan gatnaşyklara öwrüýänler.

Wiýet formulalary köpçleni onuň kökleriniň üsti bilen aňlatmaklygyň oňaýly usulydyr. Şunlukda $f(y)$ baş koeffisiýentli birden tapawutly a_0 a_0 san bolsa, bu formulalary ulanmak üçin, köpçleniň köklerine hiç hili täsir etmeýän, onuň ähli koeffisiýenlerini bu a_0 sana bölüp çykalydyrys. Şeýlelikde, bu ýagdaýda, Wiýet formulalary ähli koeffisiýenleriň bu baş koeffisiýente paýlary üçin aňlatmalary berýändirler.

21. Kardano formulasy.

Esasy teorema gora san koefisiýenly islendik n -nji derejeli köpçleniň n sany kompleks kökleriniň bardygyny gelip cykyandyr. Yöne bu tassyklama ol kökleriň bardygyny aňlatmak bilen çaklenip, olary tapmaklygyny usulyny bermeyar. Seýle meselanin çözgüdini kwadrat denlemanin köklerini tapmagyny formulasyna menzes bolan formulany tapmaklyga urunmakdan baslap gozlediler.

Goy, $y^3 + ay^2 + by + c = 0$ (1) islendik san koeffisientleri bolan kub denleme berilen bolsun. Bu denlemedeki y nabellini

$$y = x - \frac{a}{3} \quad (2)$$

denlik bilen baglansykly y nabelli bilen calsyralyn. Onda taze nabelliniň kwadraty saklanmayan

$y^3 + py + q = 0$ (3) gornusdagi denlemanin alarys.

Egerde (3) denlemanin kokuni tapsak (2) gatnasykdan (1) denlemanin hem kokuni tapap bileris. (3) denleme esasy teorema gora uc sany kompleks koklere eyedir. Goy y_0 bu koklerin biri

bolsun. Taze u komekci nabellini alyp $f(u)=u^2 - y_0u - \frac{p}{3}$ kopcleni

owrenelin. onun koeffisientlerinin kompleks sanlardygyna gora bu kopclen iki sany α we β kompleks koklere eye bolap Wiyet

formulasyna gora $\alpha + \beta = y_0$, (4). $\alpha \times \beta = -\frac{p}{3}$, (5)

denlikler dogrudyr. (3)-denlemeler y_0 -yn (4)-den anlatmasyny goymak bilen alarys:

$$\begin{aligned} (\alpha + \beta) + p(\alpha + \beta) + q &= 0 \\ \alpha^3 + \beta^3 + (3\alpha\beta + p)(\alpha + \beta) + q &= 0 \end{aligned} \quad \text{ya-da basgaca,}$$

Yone (5)-den $3\alpha\beta + p = 0$ alynyp biz $\alpha^3 + \beta^3 = -q$ (6)

denlige eye bolarys. Ikinji bir tarapdan (5) denlik $\alpha^3 \beta^3 = -\frac{p^3}{27}$ (7)

bolyandygyny anladyar. Diymek (6) we (7) denliklerden α^3

hemde β^3 sanlaryn $z^2 + sz - \frac{p^3}{27} = 0$ (8)

kompleks koeffisientli kwadrat denlemanin kokleridigini alarys. Ony

cozmek bilen $z_{1,2} = -\frac{q}{2} \pm \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}$, yada bu yerden

$$\alpha = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}} \quad \beta = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}} \quad \text{gatnasyklary alarys.}$$

Seylelik bilen (3) denlemanin koklerini onun koeffisientlieinin usti bilen anladylyan

$$y_0 = \alpha + \beta = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}} + \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}}$$

Kordano formulasy diyilyan denlige eye bolarys.

Kub köküň uc sany bahalara eyediginine gora (9) denlikler α we β ululyklaryn her birine uc baha beryandyr. Yone Kardano formulasyny ulanylanda bu bahalar erkin utgasdyrlyp

bilinmeyarlər: α -nyn berilən bahasına β -nyn uc bahalarynyn
dine (5) serti kanagatləndyryany alynyandy.

Goy $\alpha_1 - \alpha$ radikalyn uc bahasyyn isləndik biri bolsun. Onda

galan iki bahalary α_1 -in $\sqrt[3]{1}$ kökünü ε we ε^2 bahalaryna kopelt-
mek hasyly gornusinde tapylyrlar : $\alpha_2 = \alpha_1 \varepsilon$ $\alpha_3 = \alpha_1 \varepsilon^2$ β_1

bilen β -nyn uc bahalarynyn $\alpha_1 \beta_1 = -\frac{p}{3}$ denligi kanagatləndyryan

bahasyyn belgiləlin. Onda beyləki iki bahalary $\beta_2 = \beta_1 \varepsilon$ we

$\beta_3 = \beta_1 \varepsilon^2$ bolarlar. Seyləlikde $\varepsilon^3 = 1$ boləndygyna gora

$\alpha_2 \beta_3 = \alpha_1 \beta_1 \varepsilon^3 = \alpha_1 \beta_1 = -\frac{p}{3}$ bolup, α_2 bəha β_3 bahəyn gəbat

gəlyəndigini goryaris. Suna mənəsləlikde α_3 bəha β_2 -nin
dəgislidigini alarys. Seyləlide (3) denləmanin əhli uc kəklerini
tapmaklygyn

$y_1 = \alpha_1 + \beta_1$, $y_2 = \alpha_2 + \beta_3 = \alpha_1 \varepsilon + \beta_1 \varepsilon^2$, $y_3 = \alpha_3 + \beta_2 = \alpha_1 \varepsilon^2 + \beta_1 \varepsilon$
duzgunlərini alarys.

Köpçəlenin köklerini takmynan tapmak.Sturm sistemasy.

Bizə bellə bolsuna gora san koeffisientli kəpçəlenin kəklerini tapmak-
lygyn umumy tərə yokdyr. Yonə birnəce əməly məsələlərin cəzgu-
di kəpçənlərin, kə halətlərdə bəla oran yokəry dərəcəli kəpçənlə-
rin kəklerini əwrenməklə bilən bəglənsəkylydyr. Həkyky koeffisien-
tli kəpçəlenin həkyky kəklerinsənyyn, bu kəkleri gursəyan əracək-
ləri tapmaklygyn tərleri əwreniləndir. Seylə hən kəklerin takmy-
nan təpylsənyyn tərleri hən dərneləndir. Bir əntək əməly məsələlərdə
səylə kəklerin bərilən təkykykdə təpylan bahəlyryny kəsgitləmək
hən yətərləkdir. Həkyky koeffisientli $f(y)$ kəpçəlenin həkyky kək-
lərini əwrenməkləgi bu kəpçəlenin gəfigini əwrenməkdən bəslə-
mək əmətly hən pəydəlydyr. Bu kəpçəlenin həkyky kəkleri bolup
onun grsfiginin O'y okuny kəsyan nəkətlərynyn əbsissəlyrynyn həz-
mət ətjəkdikləri dəsnuکلidir. Həkyky koeffisientli $f(y)$ kəpçəlenin hə-
kyky kəklerinin ənyk sənyyn tapmaklygyn in onəyly bolup Sturm
tərə həzmat ədyar. Gəytə kəkleri bəlmədyk həkyky koeffisientli $f(y)$

kopclene seredelin (bu talabyn kanagatlanmadyk yagdayynda kopcleni onun ozunin we onunin uly umumy böljisine böleris).

Tukenikli sandaky noldan tapawutly hakyky koeffisientli

kopclenlerin $f(y)=f_0(y), f_1(y), f_2(y), \dots, f_s(y)$ (1)

kopclenin tertiplesdirilen sistemasy ucin

- 1) (1) sistemanyn gonsy kopclenleri umumy koke eye dal;
- 2) Sonky $f_s(y)$ kopclenin hakyky koki yokdur;
- 3) Egerde α san (1) sistemanyn icki $f_k(y), 1 \leq k \leq s-1$ kopclenlerinin birinin koki bolsa, onda $f_{k-1}(\alpha)$ we $f_{k+1}(\alpha)$ bahalar durli alamatkydyr.
- 4) Egerde α san $f(y)$ kopclenin hakyky koki bolsa $f(y)$ $f_1(y)$ kopeltmek hasyly y artmak bilen α nokatdan gecende alamatyny minusdan plyusa geciryar.

talaplar yerine yetyan bolsa, ona $f(y)$ kopclen ucin Sturm sistemasy diyilyar. Hakyky koklerin sanyny tapmaklyga Sturm sistemasynyn peydalaysyny gorkezelin. Egerde c hakyky sany $f(y)$ kopclenin koki bolmasa, (1) bolsa bu kopclen ucin Sturm sistemasy diysek $f(c), f_1(c), f_2(c), \dots, f_s(c)$ hakyky sanlaryn sistemasyna seretsek we ondaky nola den bolanlaryny cyzsak we $w(c)$ bilen cyzylman galanlaryn sistemasyndaky alamat calysmalaryn sanyny belgilesek, bu $W(c)$ sany $f(y)$ kopclen ucin (1) Sturm sistemasyndaky $y=c$ bolanda alamat calysmalaryn sany diyip atlandyrsak indiki tassyklama adalatlydyr.

TEOREMA(Sturm teoremasy) Egerde $a < b$ bolanda a we b hakyky sanlar gayta koki bolmadyk $f(y)$ kopclenin kokleri bolmasalar, onda $W(a) \geq W(b)$ hemde $W(a) - W(b)$ tapawut $f(y)$ kopclenin a we b sanlar arasyndaky hakyky koklerinin sanyna dendir.

Hakyky koeffisientli gayta koki bolmadyk $f(y)$ kopclen ucin elmydama Sturm sistemasyny duzulisinin bir tarini gorkezelin: $f_1(y)=f'(y)$ diysek, Sturm sistemasynyn 4) talaby kanagatlanyar. Hakykatdan hem $\alpha - f(y)$ -in hakyky koki bolsa, onda $f'(\alpha) \neq 0$.

Egerde $f'(\alpha) > 0$ bolsa $f'(y) > 0$ densizlik α nokadyn towereginde yerine yetyandir, sona gorade α nokatdan gecende $f(y)$ minusdan plyusa alamatyny uytgedyandir. Bu aydylany $f(y)$ $f_1(y)$ kopeltmek

hasyly ucin hem dogrudyr. Edil suna menzes pikir yoretmeler $f'(\alpha) < 0$ bolanda hem adalatlydyr. Sonra $f(y)$ -i $f_1(y)$ -e bolyaris we bu bolmanin ters alamaty bilen alynan galyndysyny $f_2(y)$ hokuminde alarys: $f(y) = f_1(y) - f_2(y)$. Seylelikde, egerde $f_{k-1}(y)$ we $f_k(y)$ edyan tapylan bolsalar, onda $f_{k+1}(y)$ hokmunde $f_{k-1}(y)$ -i $f_k(y)$ -e bolenmizde galyan galyndy ters alamaty bolen alarys: $f_k(y) = f_k(y) - f_{k+1}(y)$ (2) Beyan edilen duzugun $f(y)$ we $f'(y)$ kopclenler ucin ulanylan Yewklid algoritiminden tapawutlydyr.

22. n-ölçegli wektorlar ginişligi

Çyzykly deňlemeleriň ulgamlarynyň umumy nazaryetini gurmak üçin wektor giňişligi düşüňjesi zerurdyr.

Analitiki geometriýadan bell i boluşyna görä tekizligiň her bir nokady (koordinatalar oklary belli bolanlarynda özüniň iki sany koordinatalary tekizligiň her bir wektory bolsa özüniň iki sany komponentalary hakyky sanlaryň iki sanysynyň tertipleşdirilen ulgamysy bilen kesgitlenýändir. Şuňa meňzeşlikde üç ölçegli giňişligiň her bir nokady özüniň üç sany koordinatalary bilen, giňişligiň her bir wektory bolsa özüniň üç sany komponentalary bilen kesgitlenýär.

Ýöne geometriýada, mehanikada we fizikada üç sany hakyky sanlaryň ulgamysynyň berilmegi bilen doly kesgitlenmeýän obýektler hem öwrenilýändirler. Mysal üçin üç ölçegli giňişlikde şarlaryň topluny öwrenilende şaryň doly kesgitlenen bolmagy üçin onuň merkeziniň koordinatalarynyň we radiusynyň, ýagny dört sany hakyky sanlaryň tertipleşdirilen ulgamysynyň berilmegi zerurdyr.

Bu mysaldan görnüşi ýaly n sany hakyky sanlaryň ähli mümkin bolan tertipleşdirilen ulgamlarynyň öwrenilmegi ähmiýeti eýedir.

n sany sanlaryň tertipleşdirilen

$$\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n) \quad (1)$$

ulgamysyna n -ölçegli wektor diýilýär. Bu ýagdaýda $a_i, i=1, 2, \dots, n$ sanlara α wektoryň komponentalary diýilip aýdylýar. Eger-de α bilen n -ölçegli

$$\beta = (b_1, b_2, \dots, b_2) \quad (2)$$

wektoryň deňişli komponentalary deň bolsalar bu iki wektorlaryň özleri hem deň hasap edilýärler.

(1) we (2) wektorlaryň jemi diýilip her bir komponentasy olaryň deňişli komponentalarynyň jemine deň bolan

$$\alpha + \beta = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n) \quad (3)$$

wektora aýdylyar. Wektorlary goşmak amalynyň orun çalşyрма we utgaşdyрма häsiýetlerine eýedigi bu kesgitlemeden görünüýändir.

Nul wektor diýilýan

$$0 = (0, 0, \dots, 0) \quad (4)$$

wektorlar goşulanda nolyň ornyny tutýandyr.

Hakykydan hem

$$\alpha + 0 = (a_1 + 0, a_2 + 0, \dots, a_n + 0) = (a_1, a_2, \dots, a_n) = \alpha$$

α wektorya garşylykly diýilip

$$-\alpha = (-a_1, -a_2, \dots, -a_n) \quad (5)$$

wektora aýdylyar. $\alpha + (-\alpha) = 0$ deňlik aýandyr. Şeýle hem goşmak amalyňa ters aýyrmak amalynyň baradygy hem aňsatlyk bilen görkezilip biliner. Hakykyatdan hem (1) we (2) wektorlaryň tapawudy bolup

$$\alpha - \beta = \alpha + (-\beta) \text{ wektor, ýagny}$$

$$\alpha - \beta = (a_1 - b_1, a_2 - b_2, \dots, a_n - b_n) \quad (6)$$

wektor hyzmat eder.

α wektoryň k sana köpeltmek hasyly diýilip

$$k\alpha = (k a_1, k a_2, \dots, k a_n) \quad (7)$$

wektora aýdylyar.

Bu kesgitlemeden

$$k(\alpha \pm \beta) = k\alpha \pm k\beta \quad (8)$$

$$(k \pm l)\alpha = k\alpha \pm l\alpha \quad (9)$$

$$k(l\alpha) = (kl)\alpha \quad (10)$$

$$1 * \alpha = \alpha \quad (11)$$

$$0 * \alpha = 0 \quad (12)$$

$$(-1)\alpha = -\alpha \quad (13)$$

$$k * 0 = 0 \quad (14)$$

eger-de $k\alpha = 0$ bolsa ýa $k=0$, ýa-da $\alpha=0$. (15)

n-ölçegli wektoryň ählisiniň toplumy özünde kesgitlenen wektorlary goşmak we sana köpeltmek amallary bilen n-ölçegli wektorlaryň giňişligi diýilip aýdylýar.

23. Wektorlaryň çyzykly baglansyklylygy

Eger-de n-ölçegli wektorlar α we β üçin käbir k san bar bolup $\beta = k\alpha$ deňlik ýetýän bolsa β wektor α wektora proporsional diýilýär. Hususan, 0 wektor islendik α wektora proporsionaldyr. ($0 = 0 \cdot \alpha$), Eger-de $\beta = k\alpha$ bolup $\beta \neq 0$ bolsa bu ýerden $k \neq 0$ bolup $\alpha = k^{-1}\beta$ deňlik alynar. Bu diýildigi proporsionallygyň nul däl wektorlar üçin simmetrik häsiýete eýedigini aňladýar. Eger-de käbir l_1, l_2, \dots, l_n sanlar bar bolup

$$\beta = l_1 \alpha_1 + l_2 \alpha_2 + \dots + l_n \alpha_n$$

Deňlik dogry bolsa β wektora $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ wektorlaryň çyzykly kombinasiýasy diýilip aýdylýar.

Kesgitleme: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{r-1}, \alpha_r$ ($r \geq 2$) (1)

wektorlaryň hiç bolmanda biri golanlarynyň çyzykly kombinasiýasy bolsa, olar çyzykly baglansykly, tersine ýagdaýda bolsa, çyzykly baglansyksyz diýilip aýdylýar. Bu kesgitlemäni indiki görnüşde hem bermek mümkindir.

Kesgitleme: Eger-de hiç bolmanda biri nuldandan tapawutly bolan k_1, k_2, \dots, k_r sanlar bar bolup,

$$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_r \alpha_r = 0$$

deňlik ýerine ýetýän bolsa (1) ulgamy baglansykly diýilip aýdylýar. Bu iki kesgitlemeleriň ekwiwalentdiklerini subut etmek aňsatdyr. Şeýle hem ikinji kesgitlemäniň ulgamydaky wektorlaryň sany bire deň bolanda hem ulanylyp biljekdigi aýdyňdyr: diňe bir α wektordan durýan ulgamynyň çyzykly baglansykly bolmagynyň zerur hem eterlik şerti bu α wektoryň nul wektor bolmaklygydyr. Hakykatdan hem, eger-de $\alpha = 0$ bolsa, onda islendik $k = 0$ üçin hem $k\alpha = 0$ boljakdygy düşnükli. Tersine, eger-de $k\alpha = 0$ we $k = 0$ bolsa $\alpha = 0$ alynar.

Teorema 1. (1) ulgamynyň käbir bölek ulgamysy baglansykly bolsa, onda ulgamynyň özi hem baglansyklydyr.

Subuty. Hakykatdan hem göýý (1) ulgamyda $s < r$ bolup $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ wektorlar hiç bolmandan biri noldan tapawutly k_i bilen

$$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_s \alpha_s = 0$$

[illegible]

k_1, k_2, \dots, k_s sanlaryň bardygyny aňladýar. Teorema subut edildi.

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r \quad (6)$$

Ýokarda aýdylanlardan n -ölçegli wektorlaryň n sanysyndan burýan islendik çyzykly baglansýksyz ulgamysynyň maksimaldygy hem-de bu giňişligiň islendik maksimal çyzykly baglansýksyz ulgamysynyň n -den köp bolmadyk wektorlary saklaýandygy gelip çykýar. Şeýle hem n -ölçegli islendik çyzykly baglansýksyz ulgamysynyň hiç bolmanda bir maksimal çyzykly baglansýksyz ulgamysynda saklanýandygy gelip çykýandyr.

$$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s(8)$$

Ulgamynyň başga ulgamynyň üsti bilen çyzykly aladylmagy düşunjesi tranzitiw häsiýete eýedir.

70

Teorema 3. N -ölçegli wektor giňişliginiň wektorlarynyň, iki

(II) $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$

Subudy. $R > s$ diýiliň.şerte görä

$$\left. \begin{aligned} \alpha_1 &= a_{11}\beta_1 + a_{12}\beta_2 + \dots + a_{1s}\beta_s \\ \alpha_2 &= a_{21}\beta_1 + a_{22}\beta_2 + \dots + a_{2s}\beta_s \\ &\dots\dots\dots \\ \alpha_r &= a_{r1}\beta_1 + a_{r2}\beta_2 + \dots + a_{rs}\beta_s \end{aligned} \right\} (9)$$

$$\left. \begin{array}{l} \gamma_1 = (a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1s}) \\ \gamma_2 = (a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2s}) \\ \dots\dots\dots \\ \gamma_r = (a_{r1}, a_{r2}, \dots, a_{rs}) \end{array} \right\}$$

$$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_r \alpha_r = 0$$

$$\sum_{i=1}^r k_i a_{ij} = 0, j=1,2,\dots,s \quad (10)$$

$$k_1a_1 + \dots + k_ra_r = \sum_{i=1}^r k_ia_i = \sum_{i=1}^r k_i \left(\sum_{j=1}^s a_{ij} \beta_j \right) = \sum_{j=1}^s \left(\sum_{i=1}^r k_ia_{ij} \right) \beta_j = 0$$

Netije 1. Çyzykly baglanşyksyz iki sany ekwiwalent ulgamylardaky wektorlaryň sany birmeňzeşdir.

Netije 2. n-ölçegli wektor ginişliginiň islendik maksimal çyzykly baglanşyksyz ulgamysyndaky wektorlaryň sany n-e deňdir.

Netije3. Eger-de wektorlaryň çyzykly baglanşykly ulgamysynda iki sany maksimal çyzykly baglanşyksyz bölek ulgamylary alynan bolsa olarda saklanýan wektorlaryň sany deňdir.

Berilen wektorlar ulgamysynyň islendik maksimal çyzykly baglanşyksyz bölek ulgamysyna girýän wektorlaryň sanyna bu ulgamynyň rangy diýilip aýdylýar.

Teorema 4. Goý çyzykly baglanşyksyz bolmaky hökman bolmadyk n -ölçegli wektorlaryň iki sany

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r \quad (11)$$

$$\text{we } \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s \quad (12)$$

ulgamylary berilen bolup (11) ulgamynyň rabgy k sana (12) ulgamynyňky bolsa l sana deň bolsun. Eger-de (11) ulgamy (12) -niň üsti bilen çyzykly aňladylýan bolsa, onda $k \leq l$ eger-de ol sistemlar ekwiwalent bolsalar $k=l$ gatnaşyk dogrydyr.

24. Matrisanyň rangy

n-ölçegli wektorlaryň berilen ulgamynyň baglanşyklydygy ýa-da baglanşyksyzlygy hakyndaky sowalyň ýüze çykmagy tebigydyr. Bu sowalyň jogabyny tapmagyň bir usuly matrisanyň rangy düşüňjesi bilen ýakýndan baglanşyklydyr.

Goý

$$A = \begin{pmatrix} a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n} \\ a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2n} \\ \dots\dots\dots \\ a_{s1}, a_{s2}, \dots, a_{sn} \end{pmatrix}$$

matrisadaky ölçegleri görkesýän s we n sanlar özara hiç hili baglanşykda bolmasynlar. A matrisanyň çyzykly baglanşyksyz sütünleriniň maksimal sanyna, başgaça aňda A matrisanyň sütünleriniň ulgamynyň rangyna bu matrisanyň rangy diýilip aýdylýar.

A matrisada erkin k setir we k sütün ($k \leq \min(s, n)$) saýlanan bolsun. Olaryň kesişmesinde duran elementlerden düşülen k -njy minory diýilip aýdylýar. Bizi A -nyň nuldandan tapawutly A -nyň ähli k -njy tertipli minorlary nula deň bolanlarynda onuň k -dan uly tertipli minorlarynyň hem ählisiniň nula deňdigi hakyndaky aýdyň tassyklama örän peýdalydyr. Hakykatdan hem bu tassyklamany subut etmek üçin $k < k+j \leq \min(s, n)$ bolan $(k+j)$ -nji tertipli minory onuň k sany sütüni boýunça Laplas teoremasyna görä dagytmak ýeterlikdir.

Teorema. (*matrisanyň rangy hakyndaky*) Matrisanyň noldan tapawutly minorlarynyň iň ýokary tertipli bu matrisanyň rangyna deňdir.

Subuty. Goý A matrisanyň nuldandan tapawutly minorlarynyň iň ýokary tertipli r -e deň bolsun. Umumylygy kemeltmekden

$$A = \begin{pmatrix} a_{11}, a_{1r}, a_{1,r+1}, \dots, a_{1n} \\ \dots \dots \dots \\ a_{r1}, a_{rr}, a_{r,r+1}, \dots, a_{rn} \\ a_{r+1,1}, \dots, a_{r+1,r}, a_{r,r+1}, \dots, a_{r+1,n} \\ \dots \dots \dots \\ a_{s1}, \dots, a_{sr}, a_{s,r+1}, \dots, a_{sn} \end{pmatrix}$$

matrisanyň çep ýokary burçyndaky r -nji tertipli D minory nuldandan tapawutly bolsun diýeliň. Onda A -nji birinji r sany sütünleri özara çykykly baglanşyksyzdyrlar, tersine ýagdaýda $D=0$ bolardy.

A matrisanyň $r < l \leq n$ deňsizlikleri kanagatlandyryan her bir l -nji sütüniň onuň birinji r sütünleriniň çyzykly kombinasiýasy bolýandygyny görkezeliň. Isledik $1 \leq i \leq s$ nomerde $(r+1)$ -nji tertipli (d minory i -nji setiriň we l -nji sütüniň gurşamagy bilen alynýan)

$$\Delta_i = \begin{vmatrix} a_{11} \dots a_{1r} a_{1l} \\ \dots \dots \dots \\ a_{r1} \dots a_{rr} a_{rl} \\ a_{i1} \dots a_{ir} a_{il} \end{vmatrix}$$

Komekçi kesgitleýjini düzeliň. i -nji isledik bahasynda $\Delta_i = 0$. Hakykatdan hem, eger-de $i > r$ bolsa Δ_i $(r+1)$ -nji tertipli minopr bolup ol nula deň bolar. Eger-de $i \leq r$ bolsa Δ_i iki sany deň setirleri bolan kesgitleýji hökümünde nula deň bolar. Δ_i -niň saňky setiriniň elementleriniň algebrayik doldurgyçlaryna seredeliň. a_{il}

$$A_j = (-1)^{r+1+j} \begin{vmatrix} a_{11} \dots a_{1,j-1} & a_{1,j+1} \dots a_{1r} & a_{1l} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{r1} \dots a_{r,j-1} & a_{r,j+1} \dots a_{rr} & a_{rl} \end{vmatrix}$$
$$a_{j1}A_1 + a_{j2}A_2 + \dots + a_{jr}A_r + a_{j1}D = 0$$
$$a_{il} = -\frac{A_1}{D} a_{i1} - \frac{A_2}{D} a_{i2} - \dots - \frac{A_r}{D} a_{ir}$$

sütunleriniñdeğişlilikde $-\frac{A_1}{D}, -\frac{A_2}{D}, ..., -\frac{A_r}{D}$ koeffisientler bilen alynan

Netije 1 Her bir matrisanyň çyzykly baglansyksyz setirleriniň maksimal sany onuň çyzykly baglansyksyz sütünleriniň maksimal sanyna, ýagny onuň rangyna deňdir.

hem A -nyň sütünleriniň çyzykly kompinişasydyr. Diýmek A we A matrisalaryň sütünlerinden durýan ulgamylar özara ekwiwalentdirler, onda ýokarda getirilen tassyklamadan A we A matrisalaryň ranglarynyň deňdigini alarys.

2. Goý $r(A)=r(A)$ bolsun. Bu ýagdaýda A -nyň islendik maksimal çyzykly baglanşyksyz sütünleriniň ulgamysy A matrisada hem çyzykly baglanşyksyz sütünleriň maksimal ulgamysy bolup hyzmat eder, onda A -nyň soňky sütüni hem bu maksimal ulgamynyň sütünleriň çyzykly kompinişasydyr. Şeýlelikde käbir k_1, k_2, \dots, k_n , sanlar bar bolup A -nyň soňky sütüni A -nyň sütünleriniň bu koeffisientler bilen alynan çyzykly kompinişasy görnüşinde aňladylar. Diýmek k_1, k_2, \dots, k_n sanlar (1) ulgamynyň käbir çözüwidir. Teorema subut edildi.

Bu tassyklama mysal işlemekde ulanylanda ilki A -nyň rangyny hasaplamaly, munuň üçin A -nyň bu minory gurşap alyar ähli minorlary nula deň bolan noldan tapawutly käbir M minaryny taparys. Soňra A matrisanyň A -da saklamaýan ýöne M -minory gurşaýan ähli minorlarynyň hasaplaýarys.

Eger-de (1) ulgamynyň häsiýetlendiriji kesgitleýjileri diýilýän bu minorlaryň ählisi nula deň bolsalar $r(A)=r(A)$ bolup (1) ulgamy kökdeş bolar. Şoňa göräde aýdylan tassyklama indiki görnüşde hem aýdylyp biliner.

Teorema. Çyzykly deňlemeleriň ulgamysynyň kökdeşliginiň zerur hem ýeterlik şerti bolup ähli häsiýetlendiriji kesgitleýjileriniň nula deň bolmaklygy hyzmat edýändir.

(1) ulgamy kökdeş bolan halatynda onuň bar bolan çözüwlerini tapmaklyk indiki usulda amala aşyrylýar. Goý $r(A)=r$ bolsun. Onda A matrisanyň çyzykly baglanşyksyz setirleriniň maksimal sany hem r -e deňdir. Anyklyk üçin A -nyň ilkinji r setirleri çyzykly baglanşyksyz diýeliň. Bu ýagdaýda A -nyň ilkinji r setirler hem çyzykly baglanşyksyzdyrlar. A we A matrisalaryň ranglarynyň deňliginden (1) ulgamynyň islendik deňlemesiniň käbir koeffisientler bilen alynan ilkinji r sany deňlemesiniň jemi görnüşinde aňladyljakdygy gelip çykyandyr. Bu diýildigi (1) ulgamynyň ilkinji r deňlemeleriniň ulgamysynyň islendik umumy çözüwiniň ähli ulgamynyň hem çözüwi boljagyny aňladýar. Diýmek bizi

$$\left. \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_2 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots\dots\dots \\ a_{r1}x_1 + a_{r2}x_2 + \dots + a_{rn}x_n = b_r \end{array} \right\} (2)$$

ulgamynyň çözüwlerini öwrenmek ýeterlikdir.(2) ulgamynyň näbellilerniň koeffisientlerinden düzülen matrisanyň setirleriniň cyzykly baglansykyzydyklaryna,başgaça aýdanynda onuň koeffisientlerinden düzülen matrisanyň rangynyň r bolanlygyna göre $r \leq n$ bolmak bilen bu matrisanyň r -nji tertipl minorlarynyň hiç bolmakda biri nuldand tapawutlydyr.Eger-de $r=n$ bolsa (2) kwadrat ulgamy bolup ýeke-täk çözüwe eýedir.

Eger-de $r < n$ diysek, kesgitlilik için ilkinji r năbellilerin koeffisientlerinden düzilen r -nji tertipli minor nula deň dăl diysek (2) ulgamynyň ähli deňlemelerinde $\dot{y}_{r+1}, \dot{y}_{r+2}, \dots, \dot{y}_n$ năbellileri deňliklerin sagyna geçirip we olara $c_{r+1}, c_{r+2}, \dots, c_n$ bahalary saylap r sany $\dot{y}_1, \dot{y}_2, \dots, \dot{y}_r$ năbellilerde

[illegible]

ulgamyny alarys.

Bu ulgamy Kramer düzgüni ulanarlykly bolup, ol ýeke-täk c_1, c_2, \dots, c_r çözüwe eýedir. Onda $c_1, c_2, \dots, c_r, c_{r+1}, \dots, c_n$ sanlar toplumynyň (2) ulgamynyň çözüwidigi alynar. Ýöne $c_{r+1}, c_{r+2}, \dots, c_n$ bahalaryň “azat näbelliler” diýilýän $\dot{y}_{r+1}, \dot{y}_{r+2}, \dots, \dot{y}_n$ üçin erkin saýlanylyp bilinýänliginden bu usul bilen (2) ulgamynyň tükeniksiz köp çözüwlerini taparys. Ilkinji bir tarapdan (2) ulgamynyň islendik çözüwi görkezilen usul bilen tapylyp biliner.

Teorema(kesgitlilik kriterisi) Kökdeş ulgamynyň kesgitli bolmagynyň zerur hem ýeterli şerti bolup onuň matrisasynyň rangynyň ulgamynyň näbellileriniň sanyna deň bolmagy hyzmat edýändir.

26. Birjynysly çyzykly deňlemeleriň ulgamy

ýagdaýynda bolup biljekdigi düşnüklidir.Şunlukda (1) ulgamynyň bar bolan fundamental ulgamylary ekwiwalent bolup birmeňzeş sandaky çözüwlerden durýarlar.

Teorema. Eger-de çyzykly birjynysly deňlemeleriň (1) ulgamynyň koeffisientlerinden matrisanyň r rangy näbellileriň n sanyndan kiçi bolanda onuň çözüwleriniň islendik fundamental ulgamysy $n-r$ sany çözüwlerden durýar.

Subuty. Üçin $(n-r)$ -iň (1) ulgamynyň azat näbellileriň sanyny aňladýandygyny bellemelidir.Goý,olar $ý_{r+1},...,ý_1$ bolsunlar. $(n-r)$ -nji tertipli nuldandan tapawutly indiki d kesgitleýjä garalyň

$$d = \begin{vmatrix} c_{1,r+1}, c_{1,r+2} \dots c_{1n} \\ c_{2,r+1}, c_{2,r+2} \dots c_{2n} \\ \dots \dots \dots \\ c_{n-r,r+1}, c_{n-r,r+2} \dots c_{n-r,n} \end{vmatrix}$$

Bu kesgitleýjiniň i -nji $(1 \leq i \leq n-r)$ setiriniň elementlerini erkin näbellilere baha deregine alsak, $ý_1, ý_2, \dots, ý_r$ näbelliler üçin ýeke-täk bahalary,ýagny (1) ulgamynyň kesgitli bir çözüwini taparys.Ol çözüi

$$\alpha_i = (c_{i1}, c_{i2}, \dots, c_{ir}, c_{i,r+1}, \dots, c_{in})$$

Şeýle usul bilen tapylyan $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-r}$ ulgamy (1)-iň çözüwleriniň fundamental ulgamysydyr.Hakykatdan hem setirleri α_i wektorlaryň komponentalary bolan matrisanyň $(n-r)$ -nji tertipli nuldandan tapawutly d minorynyň bardygyny aýandyr.Ikinji bir tarapdan

$$\beta = (b_1, b_2, \dots, b_r, b_{r+1}, \dots, b_n)$$

(1) ulgamynyň çözüwe diýsek onuň $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-r}$ wektorlaryň üsti bilen çyzykly aňladýandygyny görmek kyn däldir.

α bilen $(i=1, 2, \dots, n-r)$ $n-r$ -ölçegli wektor hökümünde seredilýän d kesgitleýjiniň i -nji setirini belgiläliň.Onda

$$\beta = (b_{r+1}, b_{r+2}, \dots, b_n)$$

belgilesek $(n-r)$ sany çyzykly baglanşyksyz $\alpha_1, \dots, \alpha_{n-r}$

wektorlar bilen β ž wektory goşmak bilen bilelikde alynan

$$\alpha_1^1, \alpha_2^1, \dots, \alpha_{n-r}^1, \beta^1$$

çyzykly baglanşykly ulgamydyr.Diýmek käbir k_1, k_2, \dots, k_{n-r} sanlar

bar bolup $\beta^1 = k_1 \alpha_1^1 + k_2 \alpha_2^1 + \dots + k_{n-r} \alpha_{n-r}^1$ (*)

deňlik ýerine ýetýändir.

Şunlukda $\delta = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_{n-r} \alpha_{n-r} - \beta$

2. (2) ulgamynyň islendik iki çözüwleriniň tapawudy getirilen
(3) ulgamy üçin çözüwdür.

Hakykatdan hem, eger-de

$C = (c_1, c_2, \dots, c_n)$ we $C^1 = (c_1^1, c_2^1, \dots, c_n^1)$ (2) –niň çözüwleri

$$\text{bolsalar } \sum_{j=1}^n a_{kj} (c_j - c_j^1) = \sum_{j=1}^n a_{kj} c_j - \sum_{j=1}^n a_{kj} c_j^1 = b_k - b_k = 0$$

27. Çyzykly giňişlikler

Goý $R(a, b, \dots)$ elementler köplüginde onuň her bir a we b elemenleriniň jübütine bu köplügiň käbir $a+b$ (olaryň jemi diýilýän) elementini degişli edýän düzgün-goşmak amaly bilen birlikde R köplügiň her bir a elementine we α -hakyky sana R köplügiň a ementiniň α hakyky sana köpeltmek hasyly diýilýän αa ýeke-täk elemntini degişli edýän düzgün-elementiň hakyky sana köpeltmek diýilýän amal kesgitlenen bolsun. Bu köplügiň elementleri wektorlar, onuň özi bolsa hakyky çyzykly giňişlik diýilip atlandyrylýan eger-de bu amallar üçin indiki aksiomalar ýerine ýetýän bolsa

I. Goşmak amaly kommutatiw $a+b=b+a$

II. Goşmak assosiatiw $(a+b)+c=a+(b+c)$

III. R köplügiň nul elementi diýän her bir $a \in R$ üçin $a+0=a$ deňligi kanagatlandyryýan ýeke-täk element bardyr.

IV. R köplügiň her bir a elementi üçin oňa garşylykly diýilip atlandyrylýan we $a+(-a)=0$ deňligi kanagatlandyryýan a -nyň garşylyklýsy diýilýän $-a$ element bardyr.

V. islendik $a, b \in R$ we α -hakyky san üçin $\alpha(a+b) = \alpha a + \alpha b$

VI. islendik $a \in R$ we α hem β hakyky sanlar üçin
 $(\alpha + \beta)a = \alpha a + \beta a$

VII. islendik $a \in R$ we α hem β hakyky sanlar üçin $\alpha(\beta a) = (\alpha \beta)a$

VIII. islendik $a \in R$ üçin $1 * a = a$

Bu aksiomalardan gelip çykýan käbir häsiýetleri belläliň.

1. $\alpha * a = 0$ bolsa ýa $\alpha = 0$ ýa-da $a = 0$ Hakykatdan hem

$$\alpha a = \alpha(a+0) = \alpha a + \alpha * 0 \Rightarrow \alpha * 0 = \alpha a - \alpha a = 0.$$

$$\alpha a = (\alpha + 0)a = \alpha a + 0 * a \Rightarrow 0 \alpha = \alpha a - \alpha a = 0 \text{ Umuman}$$

$$\alpha * a = 0 \text{ bolup } \alpha \neq 0 \text{ bolsa } a = 1 * a = \alpha * \alpha^{-1} * a = \alpha^{-1} * 0 = 0.$$

2. $\alpha(-a) = -\alpha a$. Hakykatdan hem $\alpha a = +\alpha(-a) = \alpha \ddot{a} a + (-a) \ddot{o} = 0$

3. $(-\alpha)a = -\alpha a$. Hakykatdan hem $\alpha a + (-\alpha)a = \alpha \ddot{a} a + (-\alpha)\ddot{o} a = 0 * a = 0$

$$4. \alpha(a-b) = \alpha \cdot a + (-b) \cdot \alpha = \alpha a + \alpha(-b) = \alpha a + (-\alpha b) = \alpha a - \alpha b$$

$$5. (\alpha - \beta)a = \alpha a + (-\beta)a = \alpha a - \beta a$$

Eger-de hakyky çyzykly giňişligiň kesgitlemesindäki sanlar köplüğinden bolmalydyklary hakyndaky talap olaryň islendik kompleks sanlar bolup bilmekleri bilen çalşyrylsa biz kompleks çyzykly giňişligiň kesgitlemesine alýarys. Hakyky çyzykly giňişligiň mysaly bolup n -ölçeqli hakyky wektor giňişligi hyzmat edip biler.

28. Çyzykly giňişligin bazisi we ölçegi

Elementleri y, y, \dots bolan R -erkin hakyky çyzykly giňişligi öwreneliň.

R giňişligiň y, y, \dots, z elementleriniň çyzykly kombinasiýasy diýilip olartyň käbir hakyky sanlar köpeltmek hasyllarynyň islendik jemine aýdylýar.

Kesgitleme 1. Eger-de R giňişligiň y, y, \dots, z elementleri üçin hiç bolmanda biri nuldandan tapawutly $\alpha, \beta, \dots, \mu$ hakyky sanlar bar bolup

$$\alpha y + \beta y + \dots + \mu z = 0 \quad (1)$$

deňlik ýerine ýetýän bolsa ol elementlere çyzykly baglansykly diýilýär.

Çyzykly baglansykly bolmadyk y, y, \dots, z elementlere çyzykly baglansyksyz diýilip aýdylşgara aýdanynda (1) deňlik diňe $\alpha = \beta = \dots = \mu = 0$ bolanda ýerine ýetýän bolsa y, y, \dots, z elementlere çyzykly baglansyksyz diýilýär.

Teorema 1. R giňişligiň y, y, \dots, z elementleriniň çyzykly baglansykly bolmalygynyň žerur hem ýetirlik şerti bolup olaryň biriniň galanlarynyň çyzykly kombinasiýasy bolmalygyna hyzmat edýär.

Subuty. 1. Zerurlygy. Göý y, y, \dots, z elementler çyzykly baglansykly bolsun, onda (1 = deňlik $\alpha, \beta, \dots, \mu$ sanlaryň hiç bolmanda biri nuldandan tapawutly bolanda ýerine ýetýändir. Kesgitlelik üçin $\alpha \neq 0$

diýeliň, onda $\lambda = -\frac{\beta}{\alpha}, \dots, \psi = -\frac{\mu}{\alpha}$ belgiläp $y = \alpha y + \dots + \mu z$ (2)

bolýandygyna geleris.

2. Ýeterlikligi. Göý y, y, \dots, z elementleriň biri (mysal üçin y) galanlarynyň çyzykly kombinasiýasy bolsan. Bu ýda α, \dots, μ sanlar bar bolup (2) deňlik ýerine ýetýär; onda

$$(-1)y + \lambda y + \dots + \mu z = 0 \quad (3)$$

alınar. -1, λ , ..., μ sanlaryň biri noldan tapawutly bolanlygyna görä \dot{y}, y, \dots , z elementler çyzykly baglansyklydyrlar. Teorema subut edildi.

Indiki tassyklamalaryň subutlary aňsatdyr.

1. Eger-de \dot{y}, y, \dots, z elementleriň arasynda nul element bar bolsa olar çyzykly baglansyklydyrlar, $\dot{y}=0$ bolanda (2) $\alpha=1, \beta=0, \dots, \mu=0$ ýagdaýda ýerine ýetýär.
2. \dot{y}, y, \dots, z elementleriň käbirleri çyzykly baglansykly bolsalar olaryň ählisi hem çyzykly baglansyklydyrlar.

Hakykatdan hem y, \dots, z çyzykly baglansykly elementler bolsa hiç bolmanda biri noldan tapawutly β, \dots, μ sanlar5 bilen $\beta y + \dots + \mu z = 0$ deňlik kanagatlanar. Onda olar hem-de $\alpha=0$ san bilen (2) deňlik hem dogry bolar.

Kesgitleme. R giňişligiň l_1, l_2, \dots, l_n çyzykly baglansyksyz elementlerine bu giňişligiň bazisi diýilip aýdylýar, eger-de R giňişligiň islendik \dot{y} elementi üçin $\dot{y}_1, \dot{y}_2, \dots, \dot{y}_n$ hakyky sanlar bar bolup

$$\dot{y} = \dot{y}_1 l_1 + \dot{y}_2 l_2 + \dots + \dot{y}_n l_n \quad (4)$$

aňlatma ýerine ýetýän bolsa, bu ýagdaýda (4) deňlige \dot{y} elementiň l_1, l_2, \dots, l_n bazise görä ýeke-täk usul bilen dagytmak mümkindir. Goý \dot{y} element üçin (4) deňlikde başga-da

$$\dot{y} = \dot{y}_1^1 l_1 + \dot{y}_2^1 l_2 + \dots + \dot{y}_n^1 l_n \quad (5)$$

dagytma bar bolsun. Onda (4)-den (5) i tarapma-tarap aýryp alarys.

$$(\dot{y}_1 - \dot{y}_1^1) l_1 + (\dot{y}_2 - \dot{y}_2^1) l_2 + \dots + (\dot{y}_n - \dot{y}_n^1) l_n = 0 \quad (6)$$

Bazis elementleriň baglansyksyzdyrlaryna görä (6)-dan

$$\dot{y}_1 - \dot{y}_1^1 = \dot{y}_2 - \dot{y}_2^1 = \dots = \dot{y}_n - \dot{y}_n^1 = 0$$

Deňlikler gelip çykar. Bu ýerden $\dot{y}_1 = \dot{y}_1^1, \dot{y}_2 = \dot{y}_2^1, \dots, \dot{y}_n = \dot{y}_n^1$

Teorema. R çyzykly giňişligiň islendik iki elementi goşulanda olaryň islendik bazise görä koordinatalary hem goşulýarlar, islendik elementi islendik λ sana köpeldilende bolsa bu elementiň ähli koordinatalary hem λ sana köpeldilýärler.

Subuty. Goý l_1, l_2, \dots, l_n - R giňişligiň islendik bir bazisi bolsun

$$\dot{y} = \dot{y}_1 l_1 + \dot{y}_2 l_2 + \dots + \dot{y}_n l_n \text{ we } y = y_1 l_1 + y_2 l_2 + \dots + y_n l_n$$

giňişligiň erkin elementleri diýeliň, onda

$$\dot{y} + y = (\dot{y}_1 + y_1) l_1 + (\dot{y}_2 + y_2) l_2 + \dots + (\dot{y}_n + y_n) l_n$$

$$\lambda \dot{y} = (\lambda \dot{y}_1) l_1 + (\lambda \dot{y}_2) l_2 + \dots + (\lambda \dot{y}_n) l_n$$

deňlikler çyzykly giňişligiň kesgitlemesinden alınarlar.

Kesgitleme. R çyzykly giňşlikde n çyzykly baglanşyksyz elementler bar bolup, onuň islendik (n+1) sany elementleri çyzykly baglanşykly giňşlige n ölçegli diýilip aýar. Şunlukda n sana R giňşligiň ölçegi diýilýär. Adatça R giňşligiň ölçegi $\dim(R)$ görnüşde belgilenýär.

Kesgitleme. R çyzykly giňşlikde islän sanyndaky çyzykly baglanşyksyz elementler bar bolsa oňa tükeniksiz ölçegli diýilýär.

Teorema. Eger-de $\dim(R) = n$ bolsa, onda bu giňşligiň islendik n sany çyzykly baglanşyksyz elementleri onuň bazise düzýärler.

Subuty. Goý l_1, l_2, \dots, l_n -n sany baglanşyksyz elementleriň islendik ulgamysy (şeýle ulgamynyn barlygy kesgitlemeden gelip çykýar) bolsun. Onda R giňşligiň islendik ý elementi bilen bilelikde alynan

$$\alpha_0 l_1 + \alpha_1 l_2 + \dots + \alpha_n l_n$$

Ulgamy çyzykly baglanşyklydyr, ählisi nula deň däl $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ sanlar bilen

$$\alpha_0 l_1 + \alpha_1 l_2 + \dots + \alpha_n l_n = 0 \quad (7)$$

$\alpha_0 \neq 0$ bolanlygyndan (tersine ýagdaýda l_1, l_2, \dots, l_n çyzykly baglanşykly bolardy)

$$l_1 = -\left(\frac{\alpha_1}{\alpha_0}\right)l_2 - \left(\frac{\alpha_2}{\alpha_0}\right)l_3 - \dots - \left(\frac{\alpha_n}{\alpha_0}\right)l_n = x_1 l_2 + \dots + x_n l_n$$

-erkin ý elementiň l_1, l_2, \dots, l_n elementleriň üsti bilen çyzykly aňladylýandygyna eýe bolarys. Teorema subut edildi.

Teorema. Eger R çyzykly giňşlik n elemntden durýan bazise eýe bolsa, onda $\dim(R) = n$

Subuty. Goý l_1, l_2, \dots, l_n n elemntleriň ulgamysy R giňşligiň bazisi bolsun. Teoremanyň subuty üçin R-iň islendik (n+1) sany l_1, l_2, \dots, l_n elementleriň çyzykly baglanşyklydyklaryny görkezmek ýeterlikdir. Bu elementlere bazise görä dagytmal bilen

$$l_i = a_{i1} l_1 + a_{i2} l_2 + \dots + a_{in} l_n, \quad i=1, 2, \dots, n+1$$

Deňlikleri alarys. Bu ýerde a_{ik} -käbir hakyky sanlardyr.

l_1, l_2, \dots, l_{n+1} elementleriň çyzykly baglanşyklydyr

$$A = \begin{pmatrix} a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n} \\ a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2n} \\ \dots\dots\dots \\ a_{n+1,1}, a_{n+1,2}, \dots, a_{n+1,n} \end{pmatrix}$$

Matrisanyň setiriniň çyzykly baglansyklylygy bilen deňdir. Ýöne bu matrisa tertibi n -den ýokary bolan minora eýe bolup bilmez. Onda onuň setirleri çyzykly baglansyklydyr. Teorema subut edildi.

29. Çyzykly giňişlikleriň izomorflygy.

Birmeňzeş ölçegli dürli çyzykly giňişlikleriň olarda kesgitlenilen amallara görä iş ýüzünde biri-birinden tapawutlanmaýandyklaryny göreliň.

Kesgitleme. Eger-de erkin R we $R\tilde{z}$ çyzykly giňişlikleriň elementleriň arasynda özara birbelgili deňişlilik bar bolup, oňa görä R giňişligiň \dot{y}, y , elementlerine $R\tilde{z}$ giňişligiň $\dot{y}\tilde{z}, y\tilde{z}$ elemente $\dot{y}\tilde{z}+y\tilde{z}$ islendik λ hakyky san üçin $\lambda\dot{y}$ elemente $\lambda\dot{y}\tilde{z}$ element deňişli bolsalar bu R we $R\tilde{z}$ giňişliklere izomorf diýilýär.

Eger-de R we $R\tilde{z}$ çyzykly giňişlikler izomorf bolsalar R giňişligiň nul elementine $R\tilde{z}$ giňişlikde hem nul element deňşlidir. R we $R\tilde{z}$ çyzykly giňişlikler izomorf bolup, R -iň \dot{y}, y, \dots, z elementlerine $R\tilde{z}$ -iň $\dot{y}\tilde{z}, y\tilde{z}, \dots, z\tilde{z}$ elementleri deňişlilikde deňişli bolsalar $\alpha\dot{y}+\beta y+\dots+\mu z$ çyzykly kombinasiýanyň R -iň nul elementi bolmagynyň zerur hem ýeterlik şerti $\alpha\dot{y}\tilde{z}+\beta y\tilde{z}+\dots+\mu z\tilde{z}$ çyzykly kombinasiýanyň nula deň bolmaklygydyr. Şeýlelikde indiki tassyklamar dogrudylar.

1. R we $R\tilde{z}$ izomorf bolsalar olarydaky çyzykly baglansykly däl elementleriň maksimal sany birmeňzeşdir;

2. Iki izomorf diňişlikler birmeňzeş ölçeglidirler.

Teorema. Islendik iki sany n ölçegli R we $R\tilde{z}$ çyzykly giňişlikler izomorfdylar.

Subudy. R -de käbir l_1, l_2, \dots, l_n bazisi, $R\tilde{z}$ bolsa l_1, l_2, \dots, l_n bazisi saýlalyň. R giňişligiň $\dot{y}=\dot{y}_1 l_1+\dot{y}_2 l_2+\dots+\dot{y}_n l_n$ elementine $R\tilde{z}$ -de $\dot{y}=\dot{y}_1 l_1+\dot{y}_2 l_2+\dots+\dot{y}_n l_n$ elementi deňişli edeliň. Şeýle usul bilen kesgitlenen deňişlilik özara birbelgilidir.

Şeýlelikde bize R -iň \dot{y}, y elementlerine deňişlilikde $R\tilde{z}$ -iň $\dot{y}\tilde{z}, y\tilde{z}$ elementleri deňişli bolanlarynda R -iň $\dot{y}+y$ hem-de $\lambda\dot{y}$ (λ -hakyky san) elementlerine deňişlilikde $R\tilde{z}$ -iň $\dot{y}\tilde{z}+y\tilde{z}$ hem-de $\lambda\dot{y}$ elementleriň deňişliliklerini hasaba alaymak galýar. Teorema subut edildi.

30. Çyzykly giňişlikleriň bölek giňişlikleri

R çyzykly giňişligiň käbir L bölek köplüge indiki talaplary

kanagatlandyrsyn.

1. Eger-de \dot{y}, y elementler L bölekköplüğe degişli bolsalar, $\dot{y}+y$ jem hem bu bölekköplüğe degişlidir.

2. Eger-de \dot{y} element L bölekköplüğe degişli bolsa, islendik λ -hakyky san bolanda $\lambda\dot{y}$ element hem L bölek köplügiň elementidir.

Ýokarda getirilen 1 we 2 häsiýetlere eýe L bölek köplük üçinm çyzykly giňişlikleriň 8 sany aksiomalarynyň hem ýerine

ýetýändiglerine göz ýetirmek kyn dälär. Hakykyatdan hem olaryň 3-nji we 4-njilerinden galanlary R çyzykly giňişligiň ähli elementleri üçin dogrudyr. 3 we 4 aksiomalaryň dogrudyklary $\dot{y} \in L$ üçin $\lambda=0$ bolanda $0 \cdot \lambda = -1$ bolanda \dot{y} -iň garşylykly $-\dot{y}$ elemente öwrülýänliginden alynar.

Kesgitleme. R çyzykly giňişligiň 1 we 2 häsiýetlere eýe islendik L bölek köplügiňe bölek giňişlik diýilýär.

R çyzykly giňişligiň bölek giňişliginiň ýonekeý mysaly bolup diňe 0 elementden durýan bölek köplük hem-de $R\dot{z}$ giňişligiň özi hyzmat edip biler. Bu bölek giňişliklere hususy bolmadyk diýilýär.

Kesgitleme. R giňişligiň \dot{y}, y, \dots, z elementleriniň $\alpha, \beta, \dots, \mu$ hakyky sanlar bilen ýazylýan

$$\alpha\dot{y} + \beta y + \dots + \mu z$$

görnüşdäki ähli elementleriniň köplügiňe \dot{y}, y, \dots, z elementleriň çyzykly gabygy diýilýär we ol $L(\dot{y}, y, \dots, z)$ ýaly belgilenýär. Indiki bir tarapdan \dot{y}, y, \dots, z elementleri özüde saklaýan bölekgiňişlikleriň her biri bu elementleriň islendik çyzykly kombinasiýasyny hem özüde saklaýandyr. Şeýlelikde bu bölekgiňişlikleriň her biri $L(\dot{y}, y, \dots, z)$ gabygy özüde dolulygyna saklaýandyr.

Bu kesgitlemelerden n ölçegli R çyzykly giňişligiň islendik bölek giňişliginiň ölçeginiň n -den uly dældigi gelip çykyandyr.

Eger-de R giňişlikde käbir l_1, l_2, \dots, l_n bazis saýlanan bolsa onuň L bölek giňişliginiň bazis elementleriniň bu bazise düşmezlikleri hem mümkindir. Ýöne indiki tassyklama dagrudyr.

Teorema 1. Eger-de l_1, l_2, \dots, l_k elementler n -ölçegli R çyzykly giňişligiň k -ölçegli bölekgiňişliginiň bazisini düzyän bolsalar, onda ony R -iň l_1, l_2, \dots, l_n elementleri bilen baziser bolar ýaly doldurmak mümkindir.

Subudy. Eger-de $k < n$ bolsa, $\exists l_{k+1} \in R$ bolup $l_1, l_2, \dots, l_k, l_{k+1}$ çyzykly baglanşyksyz bolar (tersine ýagdaýda $\dim(R)=k$ bolar). Soňra, eger-de $k+1 < n$ bolsa \exists bolup çyzykly baglanşyksyz bolar (tersine ýagdaýda $\dim(R)=k+1$ bolar). Bu pikir ýöretmeleri dowam edip teoremanyň subudyny alarys.

Teorema 2. $\dim(L(\acute{y}, y, \dots, z))$ \acute{y}, y, \dots, z elementleriň arasyndaky çyzykly baglanşyksyzlarynyň maksimal sanyna deňdir. Hususy \acute{y}, y, \dots, z elementleriň sanyna deňdir. (bu elementleriň özleri bolsa $L(\acute{y}, y, \dots, z)$ gabygyň bazisini düzýärler).

Subuty. \acute{y}, y, \dots, z elementleriň arasynda r sany çyzykly baglanşyksyzlary bar bolup, islendik $(r+1)$ sany bolsa çyzykly baglanşykly bolsun. Onda \acute{y}, y, \dots, z elementleriň her biriniň elementleriň çyzykly kombinasiýasy bolanlygyna görä $L(\acute{y}, y, \dots, z)$ gabygyň her bir elementiniň hem elementleriň çyzykly kombinasiýasy bolanlygyna düşnüklidir. Bu bolsa çyzykly baglanşyksyz elementleriň $L(\acute{y}, y, \dots, z)$ gabygyň bazisini düzýändigini aňladýar. Teorema subut edildi.

31. Bölek giňişlikleriň jemi we kesişmesi

Goý L_1 we $L_2 - R$ çyzykly giňişligiň bölek giňişlikleri bolsun. R giňişligiň L_1 we L_2 bölek giňişlikleriň ikisinde deňişli bolan ähli elementleriniň toplumyna (ol R -iň bölek giňişligidigi düşnüklidir) L_1 we L_2 bölek giňişlikleriň kesişmesi diýilýär.

R giňişligiň ähli $y+z, y \in L_1$ we $y \in L_2$ görnüşde aňladylýan elementleriniň köplügi hem L_1 we L_2 bölek giňişlikleriň jemi diýilip atlandyrylýan bölek giňişligi emele getirýändirler.

Teorema. Tükenikli ölçegli R çyzykly giňişligiň L_1 we L_2 bölek giňişlikleriniň ölçeglerini jemi olaryň jeminiň we kesişmesiniň ölçegleriniň jemini deňdir.

Subuty. L_0 bilen L_1 we L_2 -leriň kesişmesine L bilen bolsa olaryň jemini belgiläliň. $\dim(L_0)=k$ hasap edip, onda

$$l_1, l_2, \dots, l_n \quad (1)$$

Bazisi saýlalyň. Bilişimize görä (1) bazisi L_1 bölek giňişligiň

$$l_1, l_2, \dots, l_n, g_1, \dots, g_l \quad (2)$$

Bazisine çenli we L_2 -niň

$$l_1, l_2, \dots, l_n, f_1, \dots, f_m \quad (3)$$

Bazisine çenli dolduralyň. Maksada ýetmek üçin

$$g_1, \dots, g_l, l_1, l_2, \dots, l_n, f_1, \dots, f_m \quad (4)$$

Elementleriň L -niň bazisini düzýändiklerini görkezmek

ýeterlikdir. Munuň üçin olaryň çyzykly baglanşyksyzdyklaryny hemde her bir ýeň elementiniň (4) ulgamynyň üsti bilen çyzykly aňladylýandygyny görkezmek ýeterlikdir. Ilki bilen

$$\alpha_1 g_1 + \dots + \alpha_l g_l + \beta_1 l_1 + \dots + \beta_k l_k + \mu f_1 + \dots + \mu_m f_m = 0 \quad (5)$$

$$\text{Ýa-da } \alpha_1 g_1 + \dots + \alpha_l g_l + \beta_1 l_1 + \dots + \beta_k l_k = -\mu f_1 - \dots - \mu_m f_m \quad (6)$$

Bolsun diýeliň (6) –nyň çep tarapynyň L_1 -iň, sag tarapyna bolsa L_2 -niň elementi bolýandygyna görä olar L_0 bölek giňişligiň elementleridir. Onda (6)-nyň sag tarapy (1) elementleriň käbir

$$\text{çyzykly kombinasiýasydyr } -\mu_1 f_1 - \dots - \mu_m f_m = \lambda_1 l_1 + \dots + \lambda_k l_k \quad (7)$$

(3)-iň bazisdigine görä (7) deňlik diňe bolanlarynda mümkindir. Bu

ýagdaýda (5) deňlikde alynar, ýöne ol diňe bolanlarynda

mümkindir. Diýmek (5) diňe koeffisientleriň ählisi nula deň

bolanlarynda mümkindir. Başgaça aýdanyňda (4) çyzykly

baglanşyksyzdyrlar. L jemiň her bir ýeň elementi (2) we (3)

ulgamylaryň çyzykly kombinasiýalary bolan elementleriniň jemi

bolanlygyna görä (4) ulgamynyň elementleriniň çyzykly

kombinasiýasydyr. Bu diýildigi (4) ulgamy L jemiň bazisidir. Teorema subut edildi.

32. Hakyky Ewklid giňişlikleri

Kesgitleme. Indiki iki sany talaplary kanagatlandyran çyzykly giňişlide hakyky Ewklid giňişligi diýilip aýdylyar.

- I. R giňişliginiň islendik y we y elementleri üçin olaryň skalýar köpeltmek hasyly diýilýän (y, y) görnüşde belgilenýän käbir hakyky sany degişli edýän düzgün kesgitlenen bolsun.
- II. Bu düzgün aşadaky dört aksiomalary kanagatlandyran.

1. $(y, y) = (y, y)$ (kommutatiwlik);
2. $(y_1 + y_2, y) = (y, y) + (y_2, y)$ (assasiatiwlik);
3. $(\lambda y, y) = \lambda (y, y)$, islendik λ hakyky san üçin (birjynysly)
4. $(y, y) > 0$, eger-de $y \neq 0$ bolsa; $(y, y) = 0$, eger-de $y = 0$ bolsa.

33. Koşi-Bunýakowskiň deňsizligi

Teorema. Her bir Ewklid giňşliginde islendik iki sany y, y elementleri üçin Koşi –Bunýankowskiý deýilýän $(y, y)^2 \leq (y, y)(y, y)$ (1)

deňsizlik dogrudyr.

Subuty. Her bir λ hakyky san üçin skalýar köpeltmäniň dördünji aksiomasyna görä $(\lambda y - y, \lambda y - y) = 0$

bolup, beýleki aksiomalardan gelip çykýar. Ýöne ol deňsizligiň zerur hem ýeterlik şerti çep tarapyndaky kwadrat üç çleniň diekrinantynyň položitel däldigi hyzmat edýändir.

$$(y, y)^2 - (y, y)(y, y) \leq 0 \quad (2)$$

Diýmek tassyklama adalatlydyr. teorema subut edildi.

Kesgitleme. Eger-de çzykly R giňligi üçin

I. Onuň her bir y elementi üçin bu elementiň normasy (y -da uzynlygy) diýilýän we $\|y\|$ görnüşde belgilenýän käbir hakyky sany degişli edýän düzgün kesgitlenen bolsa,

II. Bu düzgün indiki üç sany aksioma tabyn bolsa

1) $\|y\| > 0$, eger-de $y \neq 0$ we $\|y\| = 0$ eger-de $y = 0$ bolsa;

2) $\|\lambda y\| = |\lambda| \|y\|$ deňlik islendik y element we λ -hakyky san üçin ýerine ýetýän bolsa;

3) Islendik iki sany y we z elementler çtün üçburçluk (y -da Minkowskiý) deňsizligi diýilýän

$$\|y + z\| \leq \|y\| + \|z\| \quad (3)$$

densizlik dogrudyr.

Tapallar ýerine ýetýän bolsa, oňa normirlenen diýilýär.

Teorema. Her bir Ewklid giňsliginiň y elementiniň normasy

$$\|y\| = \sqrt{(y, y)} \quad (4)$$

deňlik bilen kesgitläp ony normirlenen etmek mümkindir.

Subuty. Kesgitlemäniň ikinji talabynyň ýerine ýetýändigini

görkezmek ýeterlikdir. Normanyň 1-nji aksiomasy skalýar

köpeltmäniň 4-nji häsiýetinden, 2-nji aksiomasy bolsa skalýar

köpeltmäniň 1-nji we 3-nji aksiomalarynda dogrudygyny barlamak ýeterlikdir. Koşi-Bunýokowskiý deňsizligini

$$|(y, z)| \leq \sqrt{(y, y)} * \sqrt{(z, z)}$$

görnüşde ýazyp, bu ýazgydan hem-de skalýar köpeltmäniň

aksiomalaryndan we normanyň kesgitlemesinden peýdalanmak

ýeterlikdir.

$$\begin{aligned}\|x + y\| &= \sqrt{(x + y, x + y)} = \sqrt{(x, x) + 2(x, y) + (y, y)} \leq \\ &\leq \sqrt{(x, x) + 2\sqrt{(x, x)}\sqrt{(y, y)} + (y, y)} = \\ &= \sqrt{[\sqrt{(x, x)} + \sqrt{(y, y)}]^2} = \|x\| + \|y\|\end{aligned}$$

Teorema subut edildi.

Netije.Elementiň normasy (4) deňlik bilen kesgitlenýän Ewklid giňişliginiň islendiginde Minkowskiý deňsizligi adalatlydyr.

Islendik hakyky Ewklid giňişliginiň islendik iki ý we y elementleriniň arasyndaky burç diýilip kosinusy.

$$\cos \varphi = \frac{(x, y)}{\|x\| * \|y\|} = \frac{(x, y)}{\sqrt{(x, x)}\sqrt{(y, y)}}$$

formula bilen kesgitlenýän 0-dan Π -e çenli üýtgeýän φ burça aýdylýar.Koşi-Bunýakowskiý deňsizliginden soňky deňligiň sag tarapynyň 1-den uly dældigini görýaris.

Ewklid giňişliginiň iki ý we y elementiniň skalýar köpletmek hasyly nula deň bolsa,olara ortogonal diýilýär.Bu ýagdaýda olaryň arasyndaky φ burçyň kosinusy nula deňdir.Wektor algebrasyna salgyylanmak bilen ý we y ortogonal wektorlaryň üstünde gurulan üçburçlygyň gipotenuzasy diýip $y+y$ jemi atlandyrmak bilen islendik Ewklid giňişliginde Pifagoryň teoremasynyň adalatlydygyna ynanarys.Hakykyatdan hem ý we y ortogonal bolanlarynda $(y, y)=0$ deňligi nozara almak bilen

$$\begin{aligned}\|y+y\|^2 &= (y+y, y+y) = (y, y) + 2(y, y) + (y, y) = \\ &= \|y\|^2 + \|y\|^2\end{aligned}$$

Soňky häsiýet n sany jübüt-jübiden ortogonal elementleriň jemi üçin hem dogrudyr.

$z=y_1+y_2+\dots+y_n$ - iki bir ortogonal elementleriň jemi diýsek

$$\begin{aligned}\|z\|^2 &= (y_1+y_2+\dots+y_n, y_1+y_2+\dots+y_n) = (y_1, y_1) + (y_2, y_2) + \dots + (y_n, y_n) = \\ &= \|y_1\|^2 + \|y_2\|^2 + \dots + \|y_n\|^2.\end{aligned}$$

34. Ortogonallaşdyрма

Ýewklid giňişliginiň \vec{a} we \vec{b} wektorlary üçin $(\vec{a}, \vec{b}) = 0$ bolsa, olara ortogonal diýilip aýdylyar.

Kesgitlemä görä $\vec{0}$ wektoryň islendik \vec{b} wektor bilen ortogonaldygy aýandyr:

$$(\vec{0}, \vec{b}) = (0 * \vec{a}, \vec{b}) = 0 * (\vec{a}, \vec{b}) = 0.$$

Wektorlar ulgamynyň islendik iki b wektorylary ortogonal bolsalar, bu ulgamyň özünehem ortogonal diýilip aýdylyar.

Teorema 1. Nol däl wektorlaryň islendik ortogonal ulgamy çyzykly baglansyksyzdyr.

Bu tassyklamanyň subudyny almak üçin

her bir $1 \leq i \leq k$ nomerde $\vec{a}_i \neq \vec{0}$ $((\vec{a}_i, \vec{a}_i)) > 0$ we islendik

$1 \leq i \neq j \leq k$ nomerlerde $(\vec{a}_i, \vec{a}_j) = 0$ bolan $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_k$

wektorlar ulgamy käbir $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \dots, \vec{\alpha}_k$ hemişelik sanlar bilen

$$\alpha_1 \vec{a}_1 + \alpha_2 \vec{a}_2 + \dots + \alpha_k \vec{a}_k = \vec{0} \quad (1)$$

deňligi kanagatlandyryýar diýip hasap etsek

$$\left(\sum_{j=1}^k \alpha_j \vec{a}_j, \vec{a}_i \right) = \sum_{j=1}^k \alpha_j (\vec{a}_j, \vec{a}_i) = \alpha_i (\vec{a}_i, \vec{a}_i) = 0$$

deňligiň $\alpha_i = 0$ bolanda mümkindigini alarys. Onda (1) deňlik diňe ähli $\alpha_i = 0$ bolanda mümkindir. Bu bolsa aýdylan tassyklamanyň özüdir.

Bu tassyklamanyň käbir manyda üstüni ýetirýän indiki ortogonallaşdyрма hem adalatlydyr.

Teorema 2 Islendik k sany çyzykly baglansyksyz wektorlaryň ulgamyndan k sany nol däl wektorlardan durýan ortogonal ulgamy almak mümkindir.

Subudy Hakykatdan hem $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \dots, \vec{\alpha}_k$ çyzykly baglansyksyz

wektorlar ulgamy bolsa täze alynýan ulgamyň birinji \vec{b}_1 wektory

onuň ilkinji \vec{a}_1 wektory bilen gabat gelýar, ýagny $\vec{b}_1 = \vec{a}_1$, diýip

hasap edýäris. Soňra täze ulgamyň ikinji \vec{b}_2 wektoryny

$\vec{b}_2 = \alpha_1^{(1)} \vec{b}_1 + \vec{a}_2$ deňlik bilen kesgitläp $\vec{b}_2 \neq 0$ hasaba alyp, $\alpha_1^{(1)}$

koeffisiýenti $(\vec{b}_1, \vec{b}_2) = 0$ şerden kesgitläris:

$$\alpha_1^{(1)} (\vec{b}_1, \vec{b}_1) + (\vec{b}_1, \vec{a}_1) = 0$$

$$\alpha_1^{(1)} = - \frac{(\vec{b}_1, \vec{a}_1)}{(\vec{b}_1, \vec{b}_1)}$$

Şu usulda dowam etmek bilen eýýäm nol däl wektorlaryň

$$(\vec{b}_1, \vec{b}_2, \dots, \vec{b}_l)$$

ortogonal ulgamy alynan, şunlukda her bir \vec{b}_i wektor $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_i$, wektorlaryň käbir çyzykly kombinasiýasy ýaly kesgitlenen diýip

hasap edip, \vec{b}_{l+1} wektory

$$\vec{b}_{l+1} = \alpha_1^{(1)} \vec{b}_1 + \alpha_2^{(2)} \vec{b}_2 + \dots + \alpha_l^{(l)} \vec{b}_l + \vec{a}_{l+1}$$

görnüşde kesgitläris. (bu ýagdaýda \vec{b}_{l+1} wektor $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_{l+1}$, wektorlaryň çyzykly kombinasiýasy bolmak bilen noldan tapawutlydyr.) Isledik $1 \leq i \leq l$ nomer üçin

$$(\vec{b}_{l+1}, \vec{b}_i) = \sum_{j=1}^l \alpha_j^{(j)} (\vec{b}_j, \vec{b}_i) + (\vec{b}_i, \vec{a}_{l+1}) = \alpha_i^{(i)} (\vec{b}_i, \vec{b}_i) + (\vec{b}_i, \vec{a}_{l+1}) = 0$$

Bolýanlygyndan $\alpha_i^{(i)} = - \frac{(\vec{b}_i, \vec{a}_{l+1})}{(\vec{b}_i, \vec{b}_i)}$ bahalary kesgitläris. Şeýle dowam

etdirme bilen aýdylan ortogonal ulgama eýe bolarys.

35. Kompleks Ýewklid giňişlikleri

Hakyky çyzykly giňşligiň kesgitlemesinde ulanylan λ, μ, \dots sanlar hakyky sanlar köplüğinden alnypdy. Egerde bu talapden ýüz öwürsek, ýagny λ, μ, \dots sanlar islendik kompleks sanlar bolmalary mümkin diýsek, onda biz kompleks çyzykly giňşligi düşünjesine eýe bolarys. Hakyky çyzykly giňşlik üçin öwrenilen häsiýetleriň ählisi diýen ýaly kompleks çyzykly giňşliginde hem dowam etdirilme hökümünde öwrenilýändir.

Indi kompleks Ýewklid giňşligini kesgitleliň:

Kompleks çyzykly giňşliginde

I. her bir iki \vec{x} we \vec{y} elementlere olaryň skalýart köpeltmek

hasyly diýilip atlandyrylýan hem-de (\vec{x}, \vec{y}) görnüşinde belgilenýär käbir kompleks sany degişli edýän düzgün kesgitlenen;

II aýdylan bu düzgün indiki dört sany talaplara tabyn bolsa :

$$1) (\vec{x}, \vec{y}) = (\vec{y}, \vec{x});$$

$$2) (\vec{x}_1 + \vec{x}_2, \vec{y}) = (\vec{x}_1, \vec{y}) + (\vec{x}_2, \vec{y});$$

$$3) \text{islendik } \alpha \text{ -kompleks san üçin } (\alpha \vec{x}, \vec{y}) = \alpha (\vec{x}, \vec{y});$$

$$4) (\vec{x}, \vec{x}) - \vec{x} \text{ wektoryň skalýar kwadraty diňe } \vec{x} = \vec{0} \text{ bolanda nola}$$

deň bolan otrisatel däl hakyky sandyr.

talaplar ýerine ýetýän bolsa, onda ol kompleks Ýewklid (ýa-da unitar) giňşligi diýilýär.

Kesgitlemeden $(\vec{x}, \alpha \vec{y}) = \alpha (\vec{x}, \vec{y})$, bu ýerde α — α kompleks

$$\text{sanyň çatyrymlysy } (\vec{y}, \vec{x}_1 + \vec{x}_2) = (\vec{y}, \vec{x}_1) + (\vec{y}, \vec{x}_2)$$

gatnaşyklary almak aňsatdyr.

Hakyky Ýewklid giňşliginde adalatly häsiýetleriň köpüsini, kesgitlemedäki tapawutlanmalary nazara alanynda, kompleks Ýewklid giňşliginde hem tassyklamak mümkindir. Mysal üçin, islendik kompleks Ýewklid giňşliginde Koşi- Bunyakowskiý deňsizligi indiki ýalydyr:

$$\left| \begin{pmatrix} \vec{x} & \vec{y} \end{pmatrix}^2 \right| \leq \begin{pmatrix} \vec{x} & \vec{x} \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} \vec{y} & \vec{y} \end{pmatrix}$$

36. Ortonormirlenen bazis.

Ewklid giňşliginde ortonormirlenen diýilip atlandyrylýan has oňaly bazisler bardyr. (Çyzykly giňşlikde ähli basiz,er deňdüyçlidirler)

Kesgitleme. Eger- de n-ölçegli Ewklid giňşliginiň

l_1, l_2, \dots, l_n elementleri üçin

$$(l_i, l_k) = \begin{cases} 1, i = k \text{ bolanda,} \\ 0, i \neq k \text{ bolanda} \end{cases} \quad (1)$$

deňlikler dogry bolsalar, onda bu elementler ortonormirlenen bozisi emele getirýärler diýilip aýdylyar.

Kesgitlemäniň korrektligini görkezmek üçin (1) şerti

kanagatlandyryan l_1, l_2, \dots, l_n elementleriň baglansyksyzdygyny

görkezmek ýeterlikdir. Eger-de $\alpha_1 l_1 + \alpha_2 l_2 + \dots + \alpha_n l_n = 0$ (2)

doýsak, islendik $1 \leq k \leq n$ nomer üçin bu deňligi l_k elemente skalýar köpeldip taparys: $\alpha_k = 0$ onda (2) diňe $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0$ bolanlarynda mümkindir.

Teorema. Islendik n-ölçegli ewklid giňşliginiň ortonormirlenen bazise bardyr.

Subutyny getirmän berilen n sany baglansyksyz f_1, f_2, \dots, f_n sany elementleriň ulgamysyndan normalary bize deň özara (ikibir) ortogonal l_1, l_2, \dots, l_n elementleriň ulgamysyny almaklygyň algoritmini görkeze-liň: Bu algoritim adatça f_1, f_2, \dots, f_n -çyzykly baglansyksyz elementleri ortogonallaşdyrmak prosessi diýilip atlandyrylyar.

Bellik. Her bir n-ölçegli Ewklid giňşliginde dürli ortonormirlenen bazisler bardyr. Hakykatdan hem çyzykly baglansyksyz f_1, f_2, \dots, f_n elementlerden ortogolaşdyrmak prosessi bilen ortonormirlenen bazis gyrylanda dürli f_k elementlerden başlamak bilen dürli ortonormirlenen bazisleri almak mümkindir.

$$(\vec{y}, \vec{y}) = \vec{y}_1 y_1 + \vec{y}_2 y_2 + \dots + \vec{y}_n y_n$$

Görnüşi ýaly islendik iki elementleriň ortonormirlenen bazisde skalýar köpeltmek hasyly bu eleemntleriň degişli koordinatalarynyň köpletmek hasyllarynyň jemine deňdir.

Indi n -ölçegli Ewklid giňişliginiň ortonormirlenen bolmagy hökman bolmadyk erkin bazisi f_1, f_2, \dots, f_n berilipdir.

Eger-de f_1, f_2, \dots, f_n n -ölçegli Ewklid giňişliginiň käbir ortonormirlenen bazisi bolsa we f_1, f_2, \dots, f_n diýsek, islendik $1 \leq k \leq n$ nomer üçin

$$(x, l_k) = \left(\sum_{i=1}^n x_i l_i, l_k \right) = \sum_{i=1}^n x_i (l_i, l_k) = x_k$$

Bu diýildigi ortonormirlenen bozise görä islendik elementiň koordinatalary bu elementiň degişli bazis elementlere skalýar köpletmek hasyllaryna dňdiginio aňladýandyr.

Kesgitleme. E giňişliginiň G bölek giňişligiň her bir y elementine ortogonal y elementleriniň ählisiniň F köplüğine G -niň ortogonal doldurgyjy diýilip aýdylýar.

F köplügiň özüniň hem bölek giňişligi emele getirýändigini görmek kyn dälär.

Indiki tassyklamany belläliň.

Teorema. Her bir n -ölçegli Ewklid E giňişligi özüniň islendik G bölek giňişliginiň hem-de onuň ortogonal F doldurgyjynyň göni jemidir.

37. Ewklid giňişlikleriniň izomorflygy

Kesgitleme. Eger-de E we $E\tilde{z}$ Ewklid giňişlikleriniň elementleriniň arasynda öz-ara bir belgili deňşililik bar bolup oňa görä E -niň y, y elementlerine $E\tilde{z}$ de deňşililikde $\tilde{y}\tilde{z}, y\tilde{z}$ elementler deňşli bolanlarynda $y+y$ elemente $\tilde{y}\tilde{z}+y\tilde{z}$ element, islendik λ -hakyky san bilen λy elemente $\lambda \tilde{y}\tilde{z}$ element deňşli bolup $(y, y) = (\tilde{y}\tilde{z}, y\tilde{z})$ deňlik ýerine ýetýän bolsa bu giňişliklere izomorf diýilýär.

Diýmek Ewklid E we $E\tilde{z}$ giňişlikleriniň izomorf bolmaklary üçin olar çyzykly giňişlikleriň izomorflyk talaplaryny kanagatlandyrmak bilen birlikde bu izomorflyk skalýar köpeltmäniň ululygyny hem saklamagy gerek eken.

Teorema. Ähli n ölçegli Ewklid giňişlikleri öz-ara izomorfdyrlar.

Subuty. Hakykatdan hem n -ölçegli E we $E\tilde{z}$ Ewklid giňişliklerinde deňşililikde l_1, l_2, \dots, l_n (l) hem-de $\tilde{l}_1, \tilde{l}_2, \dots, \tilde{l}_n$ (\tilde{l}) bazisleri alyp E -niň her

bir $a = \sum_{i=1}^n \alpha_i l_i$ elementine $E\tilde{z}$ -de $a = \sum_{i=1}^n \alpha_i \tilde{l}_i$ elementi deňşli

etsek, bu eğişliđiň çyzykly giňşlikleriň izomorflyk şertini kanagatlandyryandygyny,şeyly hem

$$b = \sum_{i=1}^n b_i l_i, \quad b' = \sum_{i=1}^n b_i l'_i \text{ bolanlarynda } (a, b) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \beta_i = (a', b')$$

deňlikleriň kanagatlanýandyklaryny alarys.

Teorema subut edildi.

Kesgitleme. Kompleks çyzukly R giňşligi indiki talaplary.

Bu düzgün aşakdaky dört aksiomalara tabyn bolsun.

- 1) $(y, y) = (y, y)$
- 2) $(y + y, y) = (y, y) + (y, y)$
- 3) $(\lambda y, y) = \lambda(y, y)$
- 4) (y, y) -käbir otrisatel bolmadyk hakyky san bolup diňe $y=0$ bolanda nula deňdir. Kanagatlandyryan bolsa, oňa kompleks Ewklid giňşligi diýilip aýdylyar.

Kesgitlemeden $(y, \lambda y) = \lambda(y, y)$ we $(y, y_1 + y_2) = (y, y_1) + (y, y_2)$ gatnaşyklar aňsat alynýar.

38. Toparyň kesgitlemesi

Goý, G tükenikli ýa-da tükeniksiz elementli käbir köplük bolsun. Bu köplügiň elementleri bolup sanlar, matrissalar, özgertermeler we ş.m hyzmat edip bilerler.

Goý, G köplügiň elementleri üçin käbir $*$ amal kesgitlenen bolsun.

Kesgitleme. Eger G köplükde kesgitlenen $*$ amal:

1. G köplügiň a we b elementleri üçin

$$a * b \in G$$

2. G köplügiň islendik a, b we c elementleri üçin, assosiativlik kanuny dogrudyr, ýagny

$$(a * b) * c = a * (b * c)$$

3. G köplükde käbir e element bar bolup, bu köplügiň islendik a elementi üçin

$$a * e = e * a$$

ýerine ýetýändir:

4. G köplügiň her bir a elementi üçin, bu köplükde \tilde{a} element tapylan

$$a * \tilde{a} = \tilde{a} * a = e$$

ýerine ýetýändir:

şertleri kanagatlandyryan bolsa, onda G köplüge $*$ amala görä topar emele getirýär diýilýär.

Eger G toparyň islendik a we b elementleri üçin

$$a * b = b * a$$

kommutatiwlik ýerine ýetýän bolsa, onda bu topara kommutatiw ýada abel topary diýilýär.

Eger toparyň elementleriniň sany tükenikli bolsa, onda oňa tükenikli topar: elementleri tükeniksiz bolan ýagdaýda bolsa, tükeniksiz topar diýilýär.

Tükenikli toparyň elementleriniň sanyna onuň tertibi diýilýär. Geljekde biz G toparyň tertibini $|G|$ simbol bilen belgilejekdiris.

Eger toparda goşmak amaly kesgitlenen bolsa, onda oňa additiw topar, köpeltmek amaly kesgitlenende bolsa, multiplikatiw topar diýilýär.

Geljekde biz e elementi additiw topar üçin nul element, beýleki toparlar üçin bolsa birlik element diýip atlandyryjakdyrys. Bu toparlar üçin \tilde{a} elementi deňşililikde a elementiň garşylykly we ters elementi diýip atlandyryjakdyrys.

Indi toparlaryň, aşakdaky mysallaryna seredeliň.

Mysal 1. Bitin sanlaryň köplügiň goşmak amalyna görä topar emele getirýändigini görkezmeli.

Çözülişi.

Goşmak amaly berlen köplügiň elementleri üçin 1-4 şertleri kanagatlandyryandygyny görkezeliň

1. Islendik iki bitin sanyň jemi ýene-de bitin sandyr.

2. Goşmak amaly assosiatiwdir.

3. Islendik bitin K san üçin

$$K+0=0+K=K$$

4ň. Islendik bitin K san üçin $(-K)$ ýene-de bitin san bolup

$$K + (-K) = -K + K = 0$$

ýerine ýetýändir.

Şeýlelikde, biz bitin sanlaryň tükeniksiz additiw abel toparyny alarys.

Mysal 2. Bitin sanlaryň köpeltmek amalyňa görä topar emele getirmeýändigini görkezmeli.

Çözülişi.

Bu ýerde 4-nji şert ýerine ýetmeýär. Sebäbi K bitin sanyň ters K^{-1} elementi bitin san däldir (*birden başga sanlar üçin*).

Mysal 3.

$G = \{1, -1\}$ köplügiň multiplikatiw abel topar bolýandygyny görkezmeli.

Çözülişi.

Iň. $1 \cdot (-1) = -1; -1 \cdot (-1) = 1; 1 \cdot 1 = 1$

2ň. bu amalyň assosiativligi duşnuklidir:

3ň. $-1 \cdot 1 = 1 \cdot (-1) = -1$. Bu ýerde $e=1$:

4ň. $-1 \cdot (-1) = 1$

Bu toparyň tertibi 2-ä deňdir, ýagny $|G| = 2$.

Mysal 4. 2-nji tertipli kwadrat matrisalaryň

$$A_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = E; A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A_3 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, A_4 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, A_5 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

köplügiň 6-nji tertipli multiplikatiw topary emele getirýändigini görkezmeli.

Çözülişi.

Iň. Bu matrisalaryň islendik ikisiniň köpeldilmegi ýene-de şol matrisalaryň haýsy hem bolsa birine deňdir.

$$E \cdot A_i = A_i \ (i = 0, 1, 2, 3, 4, 5), A_1 \cdot A_2 = A_5, A_1 \cdot A_3 = A_4, A_1 \cdot A_1 = E,$$

$$A_1 \cdot A_4 = A_3, A_1 \cdot A_5 = A_2, A_2 \cdot A_3 = A_5, A_2 \cdot A_4 = A_1, A_2 \cdot A_2 = E$$

$$A_3 \cdot A_4 = A_2, A_3 \cdot A_5 = A_1, A_4 \cdot A_5 = E, A_3 \cdot A_3 = E, A_4 \cdot A_4 = A_5, A_5 \cdot A_5 = A_4$$

$$2\text{ň } (A_i \cdot A_j) \cdot A_k = A_i \cdot (A_j \cdot A_k), (i, j, k = 0, 1, 2, 3, 4, 5)$$

$$3\text{ň. } E \cdot A_i = A_i \cdot E = A_i, (i = 1, 2, 3, 4, 5)$$

$$4\text{ň. } E \cdot E = E, A_1 \cdot A_1 = E, A_2 \cdot A_2 = E, A_3 \cdot A_3 = E, A_4 \cdot A_5 = A_5 \cdot A_4 = E$$

Bu ýerden görnüşi ýaly

$$E^{-1} = E, A_2^{-1} = A_2, A_3^{-1} = A_3, A_4^{-1} = A_5, A_5^{-1} = A_4$$

bolýandyr. Bu topar abel toparý däldir.

Gönükmeler.

Aşakdaky köplükleriň berlen amallara görä topar emele getirýändiglerini ýa-da getirmeýändiglerini kesgitlemeli.

1. Aýyrmak amalyňa görä, bitin sanlaryň köplügi.

2. Köpeltmek amalyňa görä, palažitel sanlaryň köplügi.

3. Köpeltmek amalyňa görä, moduly bire deň bolan kompleks sanlaryň köplügi.

$$4. \quad a * b = a^b$$

görnüşde kesgitlenen amala görä, palažitel sanlaryň köplügi.

5. Köpeltmek amalyňa görä, n -nji tertipli aýratyn däl kwadrat matrisalaryň köplügi,

6. Köpeltmek amalyňa görä, birin $\sqrt[n]{1}$ köküniň bahalarynyň köplügi.

39. Simmetrik we alamaty çalyşýan toparlar

Goý bize n elementden ybarat bolan ýerleşdirmeler berlen bolsun. Eger biz bu ýerleşdirmelerde iki elementniň ýerini çalyşsak, onda başga bir ýerleşdirmäni alarys. Şonuň üçin ýerleşdirmelere çalyşymalar hem diýilýär.

n elementden düzülen hemme çalyşymalaryň sany $n!$ deňdir. Bu çalyşymadan beýleki çalyşma geçende, haýsy elementleriň ýerlerini çalyşyrylýandygyny bellemek üçin ornuna goýma termini ulanylýar. Sebäbi bu ýerde her bir elementiň ornuna başga käbir element goýulýar (**element öz ornunda üýtgedilmän hem galdyrylýar**).

Goý bize $1, 2, 3, 4$ sanlardan düzülen 2143 we 4321 çalyşymalar berlen bolsun. Bu çalyşymalaryň birinjisinden ikinjisine geçende 2 -in ornuna 4 , 1 -in ornuna 3 , 4 -ornuna 2 , 3 -ornuna 1 goýulýar.

Seredilen ornunagoýmany

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 & 3 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

görnüşde ýazalyň. Ornunagoýmada sanlaryň ýerleşikleri möhüm bolman, haýsy sanyň haýsy san bilen çalşyrylýandygy möhümdir. Şonuň üçin ýokardaky ornunagoýmany

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

görnüşde ýazmak bolar.

Goý bize iki sany

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

we

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

ornunagoýmalar berlen bolsun. Bu ornunagoýmalaryňzygider ýerine ýetirilmesi bize C ornunagoýmany berer. C ornunagoýmany tapalyň:

A-da $1 \rightarrow 3$, B — $de\ 3 \rightarrow 3$ diýmek C-de $1 \rightarrow 3$: A-da

$2 \rightarrow 1$. B-de $1 \rightarrow 4$, diýmek C-de $2 \rightarrow 4$: A-da $3 \rightarrow 2$. B-de

$2 \rightarrow 1$, diýmek C-de $3 \rightarrow 1$: A-da $4 \rightarrow 4$. B-de $4 \rightarrow 2$, diýmek C-de $4 \rightarrow 2$.

Şeýlelikde, $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ ornunagoýmany alarys. C

ornunagoýma A ornunagoýmanyň B ornunagoýma köpeldilmesi diýilýär we $C = A \cdot B$ belgilenilýär.

Ornunagoýmalary köpeltmek kommutatiwlik kanunyna tabyn däl, ýagny $A \cdot B \neq B \cdot A$.

Käbir hususy ýagdaýlarda kommutatiwlik kanunynyň dogry bolmagy hem mümkindir.

Indi ornunagoýmalary köpelmekde assosiatiwlik kanunyny dogrylygyny görkezeliň.

Ornunagoýmany gysgaça $\begin{pmatrix} r \\ s \end{pmatrix}$ simbol bilen belgiläliň. Bu ýerde r berlen sanlary I -nji setirdäki ýerleşmesi, s -bolsa olaryň 2 -nji setirdäki ýerleşmesidir. B ornunagoýmany biz $\begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix}$ görnüşde ýazalyň. Sebäbi B -niň sütünleriniň ýerini çalşyryp, ony $\begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix}$ görnüşde getirmek mümkindir. C ornunagoýmany bolsa $\begin{pmatrix} t \\ u \end{pmatrix}$ Görnüşde ýazalyň. Onda.

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} r \\ s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \\ t \end{pmatrix}$$

we

$$BC = \begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ u \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s \\ u \end{pmatrix}$$

alarys. Bu ýerden,

$$(AB)C = \begin{pmatrix} r \\ t \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} t \\ u \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \\ u \end{pmatrix}$$

we

$$A(BC) = \begin{pmatrix} r \\ s \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} s \\ u \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \\ u \end{pmatrix}$$

alarys. Şeýlelikde.

$$(AB) \cdot C = A \cdot (B \cdot C),$$

ýagny ornunagoýmalar üçin assosiativlik kanunyny alarys.

Indi I -nji we 2 -nji setirleri gabat gelýän

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ 1 & 2 & \dots & n \end{pmatrix}$$

Ornunagoýma seredeliň. Bu ornunagoýma birlik n -da toždestwolaýynň ornunagoýma diýilýär. Ol ornunagoýmalary köpeltmekde I -iň roluny ýerine ýetirýär. Bu ýerde berlen $I, 2, 3, \dots$, sanlardan düzülen islendik A ornunagoýma üçin

$$A \cdot E = E \cdot A = A$$

deňligiň dogrydygyna göz ýetirmek kyn däldir.

Eger biz berlen A ornunagoýmanyň I -nji we 2 -nji setirleriniň ornuny çalşysak, onda täze ornunagoýmany alarys. Oňa A -nyň ters ornunagoýmasy diýilýär we A^{-1} görnüşde belgilenilýär. Bu ýerde

$$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = E$$

bolýanlygyna göz ýetirmek kyn däl.

Ýokardaky aýdylanlardan 1,2,3,...,sanlardan düzülen ornunagoýmalaryň köplüginin multiplikatiw topar emele getirýändigini gelip çykýar. Onuň tertibi bolsa $n!$ deňdir. Bu topara n -nji derejeli simmetrik topar diýilýär we S_n bilen belgilenilýär.

Eger ornunagoýmanyň setirlerindäki tertipsizlikleriniň önversialaryň jemi jübüt bolsa, onda oňa jübüt ornunagoýma, tak bolan ýagdaýynda bolsa tak ornunagoýma diýilýär. S_n toparda $\frac{n!}{2}$ sany jübüt ornunagoýma bardyr. Olaryň köplügi topar emele getirýändir. Ol topara alamaty çalyşýan topar diýilýär we A_3 bilen belgilenilýär.

Eger biz tak ornunagoýmany tak ornunagoýma köpeltsek ýa-da jübüt ornunagoýmany jübüt ornunagoýma köpeltsek, onda jübüt ornunagoýma alarys.

Tak we jübüt ýa-da jübüt we tak ornunagoýmalaryň köpeldilmesi bolsa bize tak ornunagoýma berer.

Indi bolsa, alamaty çalyşýan toparyň mysalyna seredeliň.

Mysal. 3-nji derejeli jübüt ornunagoýmalaryň köplüginin tertibi $\frac{3!}{2}$ deň bolan alamaty çalyşýan multiplikatiw topary emele getirýändigini görkezmeli.

Çözülişi.

3-nji derejeli ornunagoýmalaryň hemmesi

$$S_0 = E = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, S_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix},$$

$$S_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, S_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix},$$

$$S_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, S_5 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

S_3 topary emele getirýändir, ýagny

$$S_3 = \{S_0, S_1, S_2, S_3, S_4, S_5\}.$$

Bu topardaky S_0, S_3, S_4 ornunagoýmalar jübütlerdir. Olartň topar bolmaklygynyň I-4 şertlerini kanagatlandyryandyklaryny görkezeliň.

$$1. S_0 \cdot S_i = S_i \cdot S_0 = S_0 \quad (i = 0, 3, 4),$$

$$S_3 \cdot S_4 = S_4 \cdot S_3 = S_0$$

2. Ýokarda görkezilşi ýaly:

$$(S_i \cdot S_j) S_k = S_i \cdot (S_j \cdot S_k), \quad (i, j, k = 0, 3, 4),$$

$$3. S_i \cdot S_0 = S_0 \cdot S_i = S_i \quad (i = 0, 3, 4),$$

$$4. S_0 \cdot S_0 = S_0, \quad S_3 \cdot S_4 = S_4 \cdot S_3 = S_0,$$

$$S_3^{-1} = S_4, S_4^{-1} = S_3$$

Döýmek, $A_3 = \{S_0, S_3, S_4\}$ we $|A_3| = 3$.

Göniümler.

1. Ornunagoýmalar da assosiativlik kanunyny barlamaly:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

2. Ornunagoýmalar da assosiativlik kanunyny barlamaly:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

3. Ornunagoýmanyň ters ornunagoýmasyny tapmaly:

$$a) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}; \quad b) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

40. Bölktoparlar

Kesgitleme 1. Eger G toparyň A bölökköplügi bu toparda kesgitlenen amala görä topar emele getirýän bolsa, onda A bölökköplüge G toparyň bölktopary diýilýär.

Teorema. Eger A we B G toparyň bölktoparlary bolsa, onda $A \cap B$, ýagny A we B bölktoparlaryň ikisine-de degişli bolan elementleriniň köplügi hem G -nyň bölktoparlarydyr.

Subudy. Teoremany subut etmek üçin $A \cap B$ kesişmäniň elementleriniň G toparda kesgitlenen amala görä birinji paragrafdaky I-4 şertleri kanagatlandyryandygyny barlamak ýeterlikmidir.

I. Goý x we $y \in A \cap B$ kesişmä degişli bolan erkin elementler bolsun, onda $x, y \in A$ we $x, y \in B$ A -nyň we B -nyň G toparyň bölektoparlary bolmaklaryndan $x * y \in A$ we $x * y \in B$ alarys. Bu ýerden bolsa $x * y \in A \cap B$ gelip çykýar.

2. $A \cap B$ kesişmäniň elementleri G topardan alnan elementlerdir. G toparyň elementleri üçin bolsa assosiativlik kanuny dogrudyr.

3. A we B bölektoparlarda birlik element bardyr, ýagny $e \in A$ we $e \in B$. Bu ýerden $e \in A \cap B$ gelip çykýar.

4. Goý $x \in A \cap B$ kesişmäniň erkin elementi bolsun, onda $x \in A$ we $x \in B$.

Bölektoparlaryň kesgitlemesine görä A we B bölektoparlarda

$$x * \tilde{x} = \tilde{x} * x = e$$

şerti kanagatlandyran \tilde{x} element bardyr. Bu ýerden, $\tilde{x} \in A \cap B$ gelip çykýar.

Subut eden teoremanyndan aşakdaky netijäniň gelip çykýandygyny görkezmek kyn däldir.

Netije. G toparyň bölektoparlarynyň islendik sanysynyň kesişmesi ýene-de G toparyň bölektoparydyr.

G toparyň diňe e elementden ybarat bolan bölekköplügiň hem bölektopar bolýandygyna göz ýetirmek kyn däldir. Oňa G -niň birlik bölektopary diýilýär. G toparyň özüne hem G -niň bölektoparlarynyň biri hökmünde garamak bolar.

Kesgitleme 2. G toparyň birlik we özüne deň bolmadyk, ýagny $A \neq e$ we $A \neq G$ bölektoparlaryna onuň hususy bölektopary diýilýär

Indi G -toparyň käbir S bölekköplüğine seredeliň. Bu bölekköplügi özünde saklaýan G toparyň hemme bölektoparynyň

maşgalasyny $\{H_i/i \in I\}$ bilen belgiläliň. Onda ýokardaky netijä görä bu bölektoparlarynyň kesişmesi

$$\langle S \rangle = \bigcap_{\{i \in I: S \leq H_i\}} H_i$$

bölektopar bolýandyr. Bu bölektoparyň S bölekköplügi özünde saklaýan bölektoparlaryň iň kiçisi boljakdaky düşnüklidir. $\langle S \rangle$ bölektopara S köplügiň G -toparda döreden bölektopary, S -e bolsa $\langle S \rangle$ bölektoparyň emelegerijileriniň köplügi diýilýär.

Mysallara seredeliň.

Mysal 1. Jübüt sanlaryň köplüginin bitin sanlaryň additiv toparynyň bölektoparydygyny görkezmeli.

Çözülişi. Jübüt sanlaryň köplügi bitin sanlaryň bölek köplügi bolmak bilen goşmak amalyňa görä topar emele getirýändir. Şonuň üçin bu köplük bitin sanlaryň additiv toparynyň bölektoparydyr.

Mysal 2. A_n –alamaty çalşýan toparynyň S_n -simmetrik toparyň bölektoparydygyny görkezmeli.

Çözülişi. A_n -jübüt ornunagoýmalaryň köplügi S_n -toparyň bölekköplügidir.

Onuň topar emele getirýändigine bolsa, biz ikinji paragrafda seredipdik.

Mysal 3. $E = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ we $S = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

ornunagoýmalardan ybarat köplügiň S_3 -simmetrik toparyň bölektoparydygyny görkezmeli.

Çözülişi. Bu ýerde bize birinji paragrafdaky 1 we 4 şertleri barlamak ýeterlikdir.

$$S \cdot S = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

1-nji şertden S -iň ters ornunagoýmasynyň ýene-de S bolýandygy gelip çykýar.

Gönükmeler.

1. Berlen K sana kratny bolan sanlaryň köplüginin bitin sanlaryň additiv toparynyň bölektoparydygyny görkezmeli.

2. S_3 -simmetrik toparyň hemme bölektoparlaryny tapmaly.
3. $\{1; -1; i; -i\}$ -multiplikatiw toparynyň hususy bölektoparyny tapmaly.
4. n-nji derejeli tak ornunagoýmalaryň köplügi S_n -simmetrik toparyň bölektopary bolup bilermi ?

41. Siklik toparlar. Elementiň tertibi.

I. Goý bize erkin G toparyň käbir a elementi berlen bolsun, onda geçen paragrafdan bilşimiz ýaly $\langle a \rangle$ bölektopar a elementi özünde saklaýan G toparyň bölektoparlarynyň iň kiçisi bolar. Bu $\langle a \rangle$ bölektopara G toparyň siklik toparyň bölektopary, a elemente bolsa onuň emele getirijisi diýilýär.

Her bir $\langle a \rangle$ siklik topary, onuň multiplikatiw topary ýa-da additiw toparygyny baglylykda deňşililikde $\{a^n / n \in \mathbb{Z}\}$ ýada $\{na / n \in \mathbb{Z}\}$ görnüşde ýazmak bolarň \mathbb{Z} bitin sanlaryň köplügi ñ.

Bu ýerden görnüşi ýaly siklik topar abeltopary bolýandyr.

Mysallara seredeliň.

Mysal I. Jübüt sanlaryň additiw toparynyň siklik topar bolýandygyny görkezmeli.

Çözülişi. Berlen topary $\{\dots, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, \dots\}$ görnüşde ýazalyň. Bu ýerden, onuň emele getirijisi 2 ýa-da -2 bolan siklik topar bolýandygy görünýär.

Mysal 2. Birin n-nji derejeli köküniň bahalarynyň emele getiren toparynyň siklik topar bolýandygyny görkezmeli.

Çözülişi. Kompleks sanlar temasyndan bize belli bolşy ýaly $\sqrt[n]{1}$ bahalarynyň köplügin $\{\varepsilon_0, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{n-1}\}$ görnüşde ýazmak bolar, bu ýerde

$$\varepsilon_k = \cos \frac{2\pi k}{n} + i \sin \frac{2\pi k}{n}, k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Muawryň formulasynda peýdalanyň, bu bahany

$$\varepsilon_k = \left(\cos \frac{2\pi k}{n} + i \sin \frac{2\pi k}{n} \right)^k = \varepsilon_1^k, K = 0, 1, \dots, n-1,$$

görnüşde ýazalyň. Şeýlelikde, berlen toparý $\{\varepsilon_1^0, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_1^{n-1}\}$ görnüşde ýazmak mümkindir.

Bu topar bolsa, emele getirijisi $\varepsilon_1 = \cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n}$ belli siklik topardyr.

Mysal 3. Alamaty çalyşýan A_3 toparýň siklik topardygyyny görkezmeli.

Çözülişi. A_3 topar

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Ornuna goýmalardan düzülendir, berlen A_3 toparýň emele getirijisi

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ ornunagoýama bolan siklik topardygyyny, ýagny

$$A_3 = \langle \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \rangle$$

gelip çykýar.

Bellik. A_3 toparý emele getirijisi $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ ornunagoýama bolan siklik topar görnüşde hem ýazmak bolar.

II. Goý ýene-de G erkein topar bolup, a onuň käbir elementi bolsun.

Kesgitlemek üçin, G toparý multiplikatiw topar diýip hasap edip, aşakdaky iki mümkinçilige garalyň: 1) a elementiniň hemme derejeleri dürli ýagny $m \neq n$ üçin $a^m \neq a^n$ bolsun. Bu ýagdaýda a elementiniň tükeniksiz tertibi bar diýilýär. 2) Goý $m \neq n$ üçin $a^m = a^n$ bolsun. Bu ýerden, $a^{m-n} = e$ ($m > n$) ýazyp bileris. Bu deňlik bize a elementiniň bire deň bolan paläzitel derejeleriniň bolup biljekdigini görkezýär.

Şeýle derejeleriň iň kiçisine a elementiniň tertibi diýilýär.

Indi aşakdaky teoremany subud edeliň.

Teorema. Iskendik $a \in G$ elementiň tertibi, onuň döreden siklik toparynyň tertibine deňdir. Eger käbir K san üçin $a^K = e$ bolsa, onda ol san a elementiň tertibine bölünýändir.

Subudy. Goý a elementiň tertibi q bolsun. Bu ýerden, elementiň tertibiniň kesgitlemesine görä

$$e, a, a^2, \dots, a^{q-1}$$

dürli elementleri alarys. Bu elementleriň tertibi q bolan $\langle a \rangle$ siklik topary düzýändigine göz ýetirmek kyn däl. Diýmek,

$$|\langle a \rangle| = q.$$

Indi käbir K -san üçin $a^K = e$ diýeliň. Bu ýerde galyndyly bölmeginiň algaritiminden peýdalanyň, ol K sany

$$K = S \cdot q + r, \quad 0 \leq r < q$$

görnüşde ýazyp bileris. Bu ýerden,

$$a^K = a^{Sq+r} = (a^q)^S \cdot a^r = e \cdot a^r = a^r$$

alarys. $a^K = e$, onda $a^r = e$ alarys. Bu ýerden $r=0$ gelip çykyar. Şeýlelikde, $K=Sq$.

Indi toparyň elementiniň tertibiniň tapylşynyň mysallaryna garalyň.

Mysal 4. S_4 -simmetrik toparyň

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

elementiniň tertibini tapmaly.

Çözülişi. Bu ornunagoýmanyň dördünji derejesi birlik ornunagoýma deňdir, ýagny

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}^4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

bu bolsa berlen ornunagoýmanyň tertibiniň 4-e deňligini görkezýär.

Mysal 5. 2-nji tertipli aýratyn däl kwadrat matrisalaryň multiplikatiw toparynyň

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

elementiniň tertibini kesgitlemeli.

Çözülişi. Berlen matrisanyň kwadraty birlik matrisa deňdir, ýagny $A^2 = E$. Bu deňlik A matrisanyň tertibiniň ikä deňdigini görkezýär. Gönükmeler.

1. Aşakdaky toparlaryň elementleriniň tertibini tapyň:

$$a) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 5 & 4 & 1 \end{pmatrix} \in S_5 ; \quad b) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} \in S_6$$

2. A_4 toparda tertibi ikä deň bolan näçe element bar?

3. Islendik topardaky $\chi * \gamma = \gamma * \chi$ elementleriň tertipleriniň deňdiklerini subud ediň.

4. 8-nj tertipli

$$\langle a \rangle = \{e, a, a^2, a^3, a^4, a^5, a^6, a^7\}$$

siklik topardaky tertibi alta deň bolanda hemme elementleri tapyň.

42. Toparlaryň izomorflylygy

Goý, G we G' toparlarda deňişlilikde $*$ we 0 amallar kesgitlenen bolsun. G toparyň G' topara öwürülmesini f bilen belgiläliň, ýagny $f: G \rightarrow G'$.

Kesgitleme. Eger $f: G \rightarrow G'$ öwürmede:

1. G toparyň islendik a we b elementleri üçin

$$f(a * b) = f(a) * f(b)$$

bolsa, we

2. f biýektiw, ýagny özara birbelgili öwürme bolsa, onda G we

G' toparlara özara izomorf diýilýär.

Indi bu toparlaryň f izomorfiziminiň ýönekeýje häsiýetlerine garap geçeliň.

1°. f izomorfizimde G toparyň birlik e elementi G' toparyň

e' birlik elementine geçýändir. Hakykatdan-da, 1-nji şertden peýdalanyň

$$f(a) = f(e * a) = f(e) * f(a)$$

we

$$f(a) = f(a * e) = f(a)of(e)$$

deňlikleri ýazyp bileris. Bu deňliklerden $f(e)$ elementini

G' toparyň birlik elementidigi gelip çykýar, ýagny $f(e) = e'$.

$$2^{\circ}. \text{Eger } f(a) = a' \text{ bolsa, onda } f(a^{-1}) = (a')^{-1}$$

bolar.

Hakykatdan-da. I-nj şertden we I° häsiýetden peýdalanyň

$$e' = f(e) = f(a * a^{-1}) = f(a)of(a^{-1}) = a' \circ f(a^{-1})$$

we

$$e' = f(e) = f(a^{-1} * a) = f(a^{-1})of(a) = f(a^{-1}) \circ a'$$

deňlikleri ýazyp bileris. Bu deňliklerden bolsa $f(a^{-1}) = (a')^{-1}$ bolýandygy görünýär.

Teorema 1. Şol bir tertipdäki hemme siklik toparlar özara izomorfdyrlar.

Subudy. Bu teoremany subut etmek üçin n -nji tertipli siklik toparlaryň $\sqrt[n]{1}$ -in bahalarynyň multiplikatiw siklik toparyna izomorfdyklaryny görkezmek ýeterlikdir.

Teorema 2. Tükeniksiz tertipli hemme siklik toparlar özara izomorfdyrlar.

Subudy. Teoremany subut etmek üçin tükeniksiz tertipli hemme siklik toparlaryň bitin sanlaryň additiw toparyna izomorfdyklaryny görkezmek ýeterlikdir.

Mysal 1. Polažitel hakyky sanlaryň multiplikatiw toparynyň hemme hakyky sanlaryň additiw toparyna izomorfdygyny görkezmeli.

Çözülişi. Birinji toparynyň her bir a polažitel elementine ikinji toparynyň $\ln a$ elementini deňli edýän öwürmäni f bilen belgiläliň, ýagny $f = \ln$.

Bu öwürmäniň biýektiwligi düşnükli. Logarifmiň

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b$$

häsiýetden bolsa, f öwürmäniň **I**-nji şerti kanagatlandyryandygy gelip çykýar.

Mysal 2. **I**.- **I**, i , $-i$ sanlardan ybarat bolan multiplikatiw toparynyň

$$A_0 = E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, A_1 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

matrisalardan ybarat multiplikatiw topara izomorfdygyny görkezmeli.

Çözülişi. Birinji toparyň elementlerini degişlilikde ikinji toparyň elementlerine geçirýän öwürmäniň izomorf öwürmedigini görkezeliň.

Berlen toparlaryň tertipleriniň deňleginden garaýan öwürmäniň biýektiwligi gelip çykýar.

Ikinji toparyň abel toparydygyny nazarda tutup, aňakdaky deňliklerden:

$$f(a_0 \cdot a_i) = f(a_i) = A_i = A_0 \cdot A_i = f(a_0) \cdot f(a_i),$$

$$(i = 0, 1, 2, 3; a_0 = 1, a_1 = -1, a_2 = i, a_3 = -i),$$

$$f(a_1 \cdot a_2) = f(a_3) = A_3 = A_1 \cdot A_2 = f(a_1) \cdot f(a_2),$$

$$f(a_1 \cdot a_3) = f(a_2) = A_2 = A_1 \cdot A_3 = f(a_1) \cdot f(a_3),$$

$$f(a_2 \cdot a_3) = f(a_0) = A_0 = A_2 \cdot A_3 = f(a_2) \cdot f(a_3).$$

izomorflylygyň kesgitlemesiniň birinji şertiniň ýerine ýetýändigini görýäris. Onda, kesgitlemä görä, berlen toparlaryň izomorfdyklary gelip çykýar.

Gönükmeler.

1. Bitin sanlaryň additiw toparynyň jübüt sanlaryň additiw toparyna izomorfdygyny görkezmeli.

2. Položitel rasional sanlaryň multiplikatiw topary hemme hakyky sanlaryň additiw toparyna izomorfdygyny görkezmeli.

3. n -nji tertipli islendik tükenikli toparyň S_n -simmetrik topara izomorfdygyny görkezmeli.

4. Özüniň hususy bölektoparyna izomorf bolan toparlary tapyň.
Rasional funksiýalaryň topary.

Aşakdaky alty funksiýanyň

$$\varphi_0 = x, \varphi_1 = \frac{1}{x}, \varphi_2 = 1 - x, \varphi_3 = \frac{x}{x-1}, \varphi_4 = \frac{x-1}{x}, \varphi_5 = \frac{1}{1-x}$$

köplüğine seredeliň. Bu köplügi $G = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ bilen belgiläliň. Bu köplügiň iki elementiniň arasyndaky amaly birinji funksiýadaky x -iň ornuna ikinji funksiýany goýmak bilen kesgitläliň. Meselem,

$$\varphi_4 \cdot \varphi_3 = \frac{\varphi_3}{\varphi_3} = \frac{\frac{x}{x-1} - 1}{\frac{x}{x-1}} = \frac{x - (x-1)}{x} = \frac{1}{x} = \varphi_1$$

Bu funksiýalaryň ýokardaky usul bilen kesgitlenen amala görä topar emele getirýändigini görkezeliň.

1. $\varphi_i \cdot \varphi_j = \varphi_k$, ($i, j, k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$) bolýanyandygyna göz ýetirmek kyn dälär.

2. Bu funksiýalar üçin assosiativlik kanuny dogrudyr. Bu kanunyň dogrulygyny $\varphi_1, \varphi_3, \varphi_5$ funksiýalarda görkezeliň.

$$(\varphi_1 \cdot \varphi_3) \cdot \varphi_5 = \frac{1}{\varphi_3} \cdot \varphi_5 = \frac{1}{\frac{x}{x-1}} \cdot \varphi_5 = \frac{x-1}{x} \cdot \varphi_5 = \frac{\varphi_5 - 1}{\varphi_5} = \frac{\frac{1}{1-x} - 1}{\frac{1}{1-x}} = \frac{1 - (1-x)}{1} = x = \varphi_0$$

$$\varphi_1 \cdot (\varphi_3 \cdot \varphi_5) = \varphi_1 \cdot \frac{\varphi_5}{\varphi_5 - 1} = \varphi_1 \cdot \frac{\frac{1}{1-x}}{\frac{1}{1-x} - 1} = \varphi_1 \cdot \frac{1}{1 - (1-x)} = \varphi_1 \cdot \frac{1}{x} = \varphi_1 \cdot \varphi_1 = \frac{1}{x} \cdot \varphi_1 =$$

$$= \frac{1}{\varphi_1} = \frac{1}{\frac{1}{x}} = x = \varphi_0.$$

3. φ_0 funksiýa bu toparda birlik elementdir.

Hakykatdan-da,

$$\varphi_0 \cdot \varphi_i = x \cdot \varphi_i = \varphi_i,$$

$$\varphi_i \cdot \varphi_0 = \varphi_i, (i = 0, 1, 2, 3, 4, 5).$$

4. Her bir φ_i , ($i = 0, 1, 2, 3, 4, 5$) funksiýa üçin

$\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \varphi_4, \varphi_5$ funksiýalaryň arasynda

$$\varphi_i \cdot \varphi_j = \varphi_j \cdot \varphi_i = \varphi_0$$

deňligi kanagatlandyryan φ_j funksiýany tapmak bolar, Meselem.

$$\varphi_4 \cdot \varphi_5 = \frac{\varphi_5 - 1}{\varphi_5} = \frac{\frac{1}{1-x} - 1}{\frac{1}{1-x}} = \frac{1 - (1-x)}{1} = x = \varphi_0$$

$$\varphi_5 \cdot \varphi_4 = \frac{1}{1 - \varphi_4} = \frac{1}{1 - \frac{x-1}{x}} = \frac{x}{x - (x-1)} = \frac{x}{1} = x = \varphi_0$$

Bu ýerde, φ_5 funksiýanyň φ_4 -iň ters funksiýasy bolýandygyny görüňär.

Funksiýalaryň bu toparynyň tertibi alta deňdir.

Funksiýalaryň bu topary abel topary däldir.

Hakykatdan-da,

$$\varphi_1 \cdot \varphi_3 = \frac{1}{x} \quad \varphi_3 = \frac{1}{\varphi_2} = \frac{1}{\frac{x}{x-1}} = \frac{x-1}{x} = \varphi_4$$

$$\varphi_3 \cdot \varphi_1 = \frac{x}{x-1} \quad \varphi_1 = \frac{\varphi_1}{\varphi_1 - 1} = \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{x} - 1} = \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1-x}{x}} = \frac{1}{1-x} = \varphi_5$$

Bu ýerden, $\varphi_1 \cdot \varphi_3 \neq \varphi_3 \cdot \varphi_1$ gelip çykýar.

$A = \{ \varphi_0, \varphi_4, \varphi_5 \}$ seredilen toparyň bölektoparydyr.

A bölektopar emele getirijisi φ_4 bolan siklik topardyr.

Hakykatdan-da

$$\varphi_4^2 = \varphi_4 \cdot \varphi_4 = \frac{x-1}{x} \cdot \varphi_4 = \frac{\varphi_4 - 1}{\varphi_4} = \frac{\frac{x-1}{x} - 1}{\frac{x-1}{x}} = \frac{-1}{x-1} = \frac{1}{1-x} = \varphi_5,$$

$$\varphi_4^3 = \varphi_4^2 \cdot \varphi_4 = \varphi_5 \cdot \varphi_4 = \frac{1}{1-x} \varphi_4 = \frac{1}{1-\varphi_4} = \frac{1}{1-\frac{x-1}{x}} = \frac{x}{1} = x = \varphi_0,$$

$$\varphi_4 = \varphi_4, \quad \varphi_4^2 = \varphi_5, \quad \varphi_4^3 = \varphi_0,$$

Diýmek, $A = \langle \varphi_4 \rangle$

$G = \{ \varphi_0, \varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \varphi_4, \varphi_5 \}$ topar 2-nji tertipli

$$A_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = E, \quad A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A_3 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_4 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_5 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

kwadrat matrisalaryň multiplikativ toparyna izomorfdyr.

Hakykatdan-da, eger biz

$$f(\varphi_i) = A_i, \quad (i = 0, 1, 2, 3, 4, 5)$$

diýsek, onda

$$f(\varphi_i \cdot \varphi_j) = f(\varphi_i) \cdot f(\varphi_j), \quad (i = 0, 1, 2, 3, 4, 5)$$

Deňligiň ýerine ýetjekdigini barlamak kyn däl. Bu şertiň φ_3 we φ_4 funksiýalar üçin barlanyşyny görkezeliň:

$$\varphi_3 \cdot \varphi_4 = \frac{x}{x-1} \varphi_4 = \frac{\varphi_4}{\varphi_4 - 1} = \frac{\frac{x-1}{x}}{\frac{x-1}{x} - 1} = \frac{x-1}{-1} = 1 - x = \varphi_2.$$

Bu ýerde

$$f(\varphi_3 \cdot \varphi_4) = f(\varphi_2) = A_2$$

alarys.

$$f(\varphi_3) \cdot f(\varphi_4) = A_3 \cdot A_4 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = A_2$$

Soňky iki deňlikden $f(\varphi_3 \cdot \varphi_4) = f(\varphi_3) \cdot f(\varphi_4)$ gelip çykýar.

Gönükmeler.

1. Deňtaraply üçburçlugyň aýlanmalaryndan taparyň hemme bölek toparyny tapyň we olaryň haýsylarynyň siklik topar bolýandygyny görkeziň.
2. Rasional funksiýalaryň ýokardaky seredilen toparynyň hemme bölek toparyny tapyň we olaryň haýsylarynyň siklik topar bolýandygyny görkeziň.
3. Berlen $\varphi_0, \varphi_1, \varphi_3, \varphi_4, \varphi_5$ funksiýalaryň hemme jübütleri üçin $f(\varphi_i \cdot \varphi_j) = f(\varphi_i) \cdot f(\varphi_j)$, $(i, j = 0, 1, 2, 3, 4, 5)$ şertiň ýerne ýetändigini görkeziň.

43. BÖLEKTOPAR BOÝUNÇA ÇATYK KLASLAR. LAGRANŽ TEOREMASY.

Geljekde biz temalaryň beýan edilşiniň ýönekeýligi üçin, köplenç ýagdaýda topar amalyňa derek köpeltmegi ulanjakdyrys.

Goý bize G toparyň käbir erkin A bölek topary berlen bolsun. Eger G toparyň haýsy hem bolsa islendik bir x elementini alyp, ony A bölek toparyň hemme elementlerine çepinden köpeltsek, onda biz xA köplügi alarys. Bu köplüge G toparyň A bölek topary boýunça x elementiniň döreden çep çatyk klasy diýilýär. Sag çatyk klas Ax hem edil şunuň ýaly usul bilen kesgitlenilýär. Sag çatyk klaslaryň çep çatyk klaslar ýaly kesgitleneni üçin geljekde biz diňe çep çatyk klaslar barada gürrüň etjekdiris.

Indi çep çatyk klaslaryň käbir häsýetlerine garalýň:

1. Eger $x \in A$ bolsa, onda $xA = A$
2. Eger $x^{-1}y \in A$ bolsa, onda xA we yA çatyk klaslar gabat gelmeýär.
3. Eger çatyk klaslaryň umumy elementi bar bolsa, onda olar gabat gelýändir.
4. xA çatyk klas x elementi özünde saklaýandyr.

Subudy:

1. Eger toparyň hemme elementlerini onuň haýsy hem bolsa bir elementine köpeltsek, onda ýenede şol toparyň elementi alynar.
2. Bu ýerde $x \cdot x^{-1} = e$ bolýanlygyny we $x^{-1}y \in A$ şerti nazara tutup, 1 häsýetden peýdalanyp

$$yA = eyA = (x \cdot x^{-1})yA = x(x^{-1}y)A = xA$$
alarys. Bu bols 2 häsýeti subut edýär.

Goý bize xA we yA çatyk klaslar berlip, olaryň umumy a elementi bar diýeliň. Onda A bölek toparda g we h elementler tapylyp, umumy elementi xg we xh görnüşlerde ýazmak bolar, yagny

$$a = xg, \quad (xg \in xA) \quad a = yh, \quad (yh \in yA)$$

Bu ýerden $xg = yh$ deňligi alarys. Soňky deňligiň iki bölegini hem çepden x^{-1} sagdan bolsa h^{-1} köpeltsek

$gh^{-1} = x^{-1}y$ deňligi alarys. g we h elementleriň A bölektopara degişli bolandyklary sebäpli $gh^{-1} \in A$, bu ýerden $x^{-1}y \in A$ alarys. Subut edilen 2 häsýetden bolsa $xA = yA$ gelip çykýar.

4. Islendik bölektoparyň birlik e elementi özünde saklaýandygy bize bellidir. Egerde biz A bölek topary x elemente köpeltsek, onda ol e element hem x köpeldiler. Bu ýerden bolsa $x \in xA$ gelip çykýar.

3 häsýetden şeýle netije gem gelip çykýar:

Iki çep çatyk klas ya gabat gelýär, yada olaryň umumy elementleri ýokdur.

Şeýlelikde, G toparyň her bir elementini diňe belli bir çep çatyk klaslar boýunça paýlanylýandyr. Bu çep çatyk klaslaryň birleşmesiniň G topary berjekdigi düşnüklidir, yagny

$$G = \bigcup_i g_i A$$

bu yerde $g_i \in G$

Kesgitleme. Birleşmesi G topary berýän kesişmeýän çep çatyk (ýada sag çatyk) klaslaryň sanyna A bölektoparyň G topardaky indeksi diýilýär.

Lagranž teoremasy: Tükenikli toparyň tertibi özüniň islendik bölektoparynyň tertibine bölünýändir.

Subudy: Goý bize tertibi ne deň bolan G topar we tertibi m -e deň bolan onuň käbir A bölektopary berlen bolsun. Onda berlen G topary A bölektopar boýunça kesişmeýän çatyk klaslaryň jemine deň dagatmak bolar. Ol çatyk klaslary A_1, A_2, \dots, A_k görnüşde nomerläliň. Onda

$$G = \bigcup_{i=1}^k A_i$$

alarys. Her bir $A_i \ (\overline{1, k})$ çatyk klasyň tertibi A bölektoparyň tertibi bilen gabat geýjändir, ýagny $|A_i| = |A|, (1, 2, \dots, k)$.

Şonuň üçin

$$|G| = k \cdot |A_i| = k \cdot |A|$$

ýazyp bileris. $|G| = n$ we $|A| = m$ şertleri nazarda tutup, soňky deňligi $n = k \cdot m$

görmüşde ýazmak bolar. Ýagny, G toparyň n tertibi A bölektoparyň m tertibine bölünýär.

Teorema subut edildi.

Netije. I. Toparyň tertibi onuň islendik elementiniň tertibine bölünýändir.

Subudy. Hakykatdan-da, islendik $g \in G$ elementiň tertibi onuň döreden $\langle g \rangle$ siklik toparyň tertibi bilen gabat gelýär. Bu siklik topar bolsa G -niň bölektoparydyr.

Netije. 2. Tertibi p ýönekeý p san bolan topar siklik topardyr.

Subudy. Şerte görä $|G| = p$. Eger biz G toparyň haýsy hem bolsa erkin $\neq e$ elementiň $\langle g \rangle$ siklik toparyny H bilen belgilesek, onda Lagranž teoremasyna görä

$$p = |H| \cdot 1$$

bolar. Bu ýerden $G = \langle g \rangle$ gelip çykýar.

G toparyň tertibiniň islendik bölüjisi üçin G toparda tertibi şol bölüjä deň bolan bölektopary gözlemek umumy ýagdaýda dogry däl. Meselem, tertibi 12 bolan alamaty çalyşýan 4-nji derejeli toparda tertibi 6 bolan bölektopar ýokdyr.

Ýöne siklik toparlar üçin aşakdaky teorema adalatlydyr.

Teorema. Siklik toparyň tertibiniň islendik bölüjisi üçin tertibi şu bölüjä deň bolan bu toparyň siklik bölek topary bardyr.

Subudy.Goý,berlen siklik toparyň tertibi ş bolsun.Onuň haýsy hem bolsa bir erkin bölüjisini d bilen belgiläliň we $\varphi=dm$ diýeliň.Eger a element berlen toparyň emele getirijisi bolsa,onda

$$a^a = a^{dm} = (a^m)^d = e$$

bolar.Bu ýerden d sanyň $< a^m >$ siklik toparyň tertibidigi gelip çykýar.Bu siklik topar bolsa berlen toparyň bölektoparydyr.

Teorema subut edildi.

Mysallara garalyň.

Mysal I. Goý bize

$$A_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = E, A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

matrisalardan berlen bolsun.

G toparyň A bölektoparyň boýunça çep çatyk klaslaryny tapmaly we A-nyň G-däki indeksini kesgitlemeli.

Çözülişi.G toparyň A bölektopar boýunça çep çatyk klaslaryny düzeliň:

$$EA = \{E \cdot E, E \cdot A_2\} = \{E, A_2\} = E,$$

$$A_1 \cdot A = \{A_1 \cdot E, A_1 \cdot A_2\} = \{A_1, A_3\} = A^*,$$

$$A_2 \cdot A = \{A_2 \cdot E, A_2 \cdot A_2\} = \{A_2, E\} = A,$$

$$A_3 \cdot A = \{A_3 \cdot E, A_3 \cdot A_2\} = \{A_3, A_1\} = A^*.$$

Bu ýerden,

$$A \cup A^* = G$$

bolýandygy görünýär.A bölektoparyň G topardaky indeksi üçe deňdir.

Mysal 2.Goý G bitin sanlaryň topary we A bolsa üçe kratny bolan bitin sanlaryň topary bolsun.A bölektoparyň G topardaky indeksini kesgitleliň.

Çözülişi.Şerte görä,

$$G = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

we

$$A = \{\dots, -9, -6, -3, 0, 3, 6, 9, \dots\}$$

G toparyň A bölektopar boýunça kesişmeýän çatyk klaslaryny düzeliň:

$$0+A=A,$$

$$1 + A = \{ \dots, -8, -5, -2, 1, 4, 7, 10, \dots \},$$

$$2 + A = \{ \dots, -7, -4, -1, 2, 5, 8, 11, \dots \}.$$

Beýleki çatyk klaslar şu çatyk klaslaryň haýsy hem bolsa biri bilen gabat gelýändirler. Eger biz bu üç çatyk klasy birleşdirsek, onda G topary alarys, ýagny

$$G = A \cup (1 + A) \cup (2 + A)$$

Diymek, A bölektoparyň G topardaky indeksi üçe deňdir.

Mysal 3. Tertibi 12 bolan $\langle a \rangle$ siklik topary hemme bölektoparlaryny tapmaly.

Çözülişi. Berlen toparyň tertibiniň bölüjileri 1, 2, 3, 4, 6, 12 sanlar bolarlar. Tertipleri deňşililikde bu sanlara deň bolan

$$\langle a^{12} \rangle, \langle a^6 \rangle, \langle a^4 \rangle, \langle a^3 \rangle, \langle a^2 \rangle, \langle a \rangle$$

siklik toparlar berlen bolsun toparyň hemme bölektoparlarydyr. Bu toparlary aşakdaky görnüşde ýazalyň:

$$\langle a^{12} \rangle = \{e\},$$

$$\langle a^6 \rangle = \{e, a^6\},$$

$$\langle a^4 \rangle = \{e, a^4, a^8\},$$

$$\langle a^3 \rangle = \{e, a^3, a^6, a^9\},$$

$$\langle a^2 \rangle = \{e, a^2, a^4, a^6, a^8, a^{10}\},$$

$$\langle a \rangle = \{e, a, a^2, a^3, \dots, a^{11}\}.$$

Bu ýerden toparyň 2 sany hususy däl bölektoparynyň, ýagny $\langle a^{12} \rangle, \langle a \rangle$ we 4 sany hususy bölektoparynyň, ýagny $\langle a^6 \rangle, \langle a^4 \rangle, \langle a^3 \rangle, \langle a^2 \rangle$ bardyklary görünýär.

Göniükmeler.

I. Simmetrik S_3 toparyň alamatyçalyşýan A_3 bölektopar boýunça çep we sag çatyk klaslaryny tapmaly.

2. Elementleri

$$\varphi_0 = x, \varphi_1 = \frac{1}{x}, \varphi_5 = 1 - x, \varphi_3 = \frac{x}{x-1}, \varphi_4 = \frac{x-1}{x}, \varphi_5 = \frac{1}{1-x}$$

funksiyalardan ybarat bolan G toparyň $A = \{\varphi_0, \varphi_1\}$ bölektopar boýunça çep çatyk klaslaryny tapmaly we A -nyň G -däki indeksini kesgitlemeli.

3. Tertipleri:

aňl8 : bň70 : çň125 : dň p^n ñp-ýönekeý sanň: bolan siklik toparlaryň hemme bölektoparlaryny tapmaly.

§8. Normal bölektoparlar.

Kesgitlemesi I. Goý G toparyň A käbir bölektopary bolsun. Eger G toparyň islendik ý elementini üçin

$$xA = Ax \quad \text{ňlň}$$

ýerine ýetse, onda A bölektopara G toparyň normal bölektopary ñinwariant bölektopary ýa-da normal bölüjisiniň diýilýär.

Bu kegitmeden, ýagny ñlň deňlikden G toparyň islendik x elementi we $a \in A$ üçin

$$\left. \begin{array}{l} xa \leq a'x \\ ax = xa'' \end{array} \right\} \quad /2/$$

deňlikleri kanagatlandyryan a' we a'' elementleri A -dan tapmak mümkindigini gelip çykýar.

2. G siklik toparyň islendik G/A faktoar-topary siklik topardyr.

Subudy: Eger G siklik topar bolsa, onda ony özüniň birlik elementinden tapawutly käbir g elementini döreden topary ýaly ýazyp bileris, ýagny $G = \langle g \rangle$. Indi G/A faktoryň gA çatyk klasyň döreden siklik topary bolýandygyny görkezeliň. Goý xA G/A faktor-toparyň erkin çatyk klasy bolsun. Bu $x \in G$ elementi g emele getirijiniä kşbir derejesi görnüşinde ýazmak bolar, ýagny $x = g^k$

Bu ýerden,

$$xA = g^k A = g^k A^k = (gA)^k$$

gelip çykýar.

3. G/A faktor-toparyň tertibi G toparyň tertibiniň bölüjisidir.

Subudy: G/A faktor-topar G toparyň A normal bölektopar boýunça kesişmeýän çatyk klaslaryndan ybaratdyr. Bu klaslaryň sany bolsa, A bölektoparyň G topardaky indeksine, ýagny $|G/A|$ deňdir. Bu ýerden,

$$|G| = |G/A| \cdot |A|$$

gelip çykýar.

Mysallara garalyň.

Mysal 1. S_3/A_3 faktor-topary tapmaly.

Çözülişi. Geçen paragrafymyzyň 1-nji mysalyndan biziň bilşimiz ýaly A_3 normal bölektopardyr we S_3 toparyň A_3 normal bölektopar boýunça diňe iki sany dürli çatyk klasy bardyr, ýagny

$$A_3 = \{S_0, S_2, S_4\}, \quad A_3^* = \{S_1, S_3, S_5\}.$$

Bu iki A_3 we A_3^* çatyk klaslaryň topar emele getirýändigini görkezmek kyn däldir. Şeýlelikde,

$$G/A = \{A_3, A_3^*\}.$$

Bu ýerde A_3 çatyk klas G/A faktor-toparyň birlik elementidir.

Mysal 2. Bitin sanlaryň additiw toparynyň üçe kratny bolan sanlaryň additiw topary boýunça faktor-topary emele getirýändigini görkezmeli.

Çözülişi: berlen toparlary

$$G = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\},$$

$$A = \{\dots, -9, -6, -3, 0, 3, 6, 9, \dots\}$$

görmüşlerde ýazalyň. Biz çatyk klaslary öwrenemizde G toparyň A normal bölek topar boýunça dürli 3 çatyk klasynyň

$$A, 1 + A, 2 + A$$

bardygyny belläpdik. Beýleki çatyk klaslar bu çatyk klaslaryň haýsy hem bolsa biri bilen gabat gelýändir. Meselem, eger k bitin (otrisatel ýa-da položitel) san bolsa, onda

$$3k + A, (3k + 1) + A = 1 + (3k + A) = 1 + A,$$

$$(3k + 2) + A = 2 + (3k + A) = 2 + A$$

bolýandyr.

Bu çatyk klaslaryň $G/A = \{A, 1 + A, 2 + A\}$ köplüginň topar emele getirýändigini görkeziliň.

1. Bu köplügiň islendik iki elementiniň jemi ýene-de şol köplügiň elementini berýändir. Hakykytdan-da,

$$A + A = A, 1 + A + A = 1 + A, 2 + A + A = 2 + A, 1 + A + 1 + A = 2 + A$$

$$1 + A + 2 + A = 3 + A = A, 2 + A + 2 + A = 4 + A = 1 + 3 + A \\ = 1 + A.$$

2. Bu elementleriň jeminiň assosiyatiwligi düşnüklidir.

3. A element G/A köplügiň birlik elementidir. Hakykytdan-da,

$$A + A, 1 + A + A = 1 + A, 2 + A + A = 2 + A.$$

4. Bu köplükde her bir elementniň ters (garşylykly) elementi bardyr, ýagny $1 + A$

element üçin $2 + A, 2 + A$ element üçin bolsa $1 + A$ ters element bolup hyzmat edýär. Hakykatdan-da,

$$1 + A + 2 + A = 3 + A = A.$$

Gönükmeler.

1. Jübüt sanlaryň toparynyň alta kratny bolan topar boýunça emele getirýän faktor-toparyny tapmaly.

1. Aşakdaky ýagdaýlarda G/A faktor-topary tapmaly:

a) G -kompleks sanlaryň additiw topary, A -hakyky sanlaryň bölektopary.

b) G -noldan tapawutly kompleks sanlaryň multiplikatiw topary, A -hakyky položitel sanlaryň bölektopary.

c) G -noldan tapawutly kompleks sanlaryň

d) multiplikatiw topary, A -moduly 1-e deň bolan kompleks sanlaryň bölektopary.

2. Racional funksiýalaryň
 $G = \{\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \varphi_4, \varphi_5\}$ multiplikativ toparyň
 $A = \{\varphi_0, \varphi_4, \varphi_5\}$ normal bölektopar boýunça emele getirýän
 faktor-toparyny tapmaly.

3. Eger
 $G = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right\}$
 $A = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right\}$
 we

bolsa, onda G/A faktor-topar tapmaly.

44. Gomomorfizler.

Normal bölektopar we faktor-topar düşüňjeleri izomorfizmiň umumlaşdyrylan düşüňjesi bolan gomomorfizm bilen ýakyndan baglanyşyklydyr.

Kesgitleme. Goý G we G' deňşlilikde $*$ we $^\circ$ amallar kesgitlenen käbir toparlar bolsun. Eger G toparyň G' topara $f: G \rightarrow G'$ öwürmesi, islendik $a, b \in G$ elementler üçin

$$f(a * b) = f(a)^\circ f(b) \quad (I)$$

şerti kanagatlandyrylan bolsa, onda ol öwürme gomorfizm diýilýär.

f gomorfizm G toparyň hemme elementlerini G' toparyň elementleriniň käbir bölekköplüğine öwürýändir.

Eger f gomorfizm biektyw bolsa, onda bize önünden belli bolan izomorfizm alynar.

Izomorfizmiň belenilip geçlen yönekeyje 1° we 2° häsiýetleri gomorfizm üçin hem ýerine ýetýändir.

Teorema 1. Eger $f: G \rightarrow G'$ toparyň G' topara gomomorf öwürmesi bolsa, onda $f(G)$ köplük G' toparyň bölektoparydyr.

Subudy. Teoremany subut etmek üçin topar bolmaklygyň 1-4 şertleriniň ýerine ýetýändigini görkezmek ýeterlikdir.

1. Goý a' we $b' \in f(G)$ köplügiň elementleri bolsa, onda

$$f(a) = a', \quad f(b) = b'$$

deňlikleri kanagatlandyran a we b elementleri G topardan tapmak mümkindir. (I) deňlikden peýdalanyň

$$f(a * b) = f(a) \circ f(b) = a' \circ b'$$

Alarys. Bu ýerden $a' \circ b' \in f(G)$ gelip çykýar.

2. $f(G)$ köplügiň G' toparyň bölekköplügi bolany üçin onuň elementleri assosioatiwdirler.

3. G toparyň islendik a elementi üçin

$$f(a) = f(a * e) = f(a) \circ f(e) = a' \circ e'$$

$$\text{we } f(a) = f(e * a) = f(e) \circ f(a) = e' \circ a'$$

deňlikleri ýazyp bileris. Bu ýerden, e' elementiň $f(G)$ -niň birlik elementdigi gelip çykýar.

4. G toparyň erkin a we e birlik elementleri üçin

$$f(e) = f(a * a^{-1}) = f(a) \circ f(a^{-1}) = a' \circ f(a^{-1})$$

$$f(e) = f(a^{-1} * a) = f(a^{-1}) \circ f(a) = f(a^{-1}) \circ a'$$

deňlikleri ýazyp bileris. Bu ýerden $f(a^{-1})$ elementiň a' elementiň ters elementdigi görünýär, ýagny $f(a^{-1}) = (a')^{-1}$ teorema subut edildi.

Gomomorfizmiň ýadrosy.

Kesgitleme. $f: G \rightarrow G'$ gomomorf öwürmede G' toparyň e' birlik elementine geýýän G toparyň elementleriniň köplügi f gomomorfizmiň ýadrosy diýilýär we $\text{Ker } f$ bilen belgilenýär. (Ker belgi iňlis Kernel-sözünden alnandyr). Ýagny

$$\text{Ker } f = \{a \in G \mid f(a) = e'\}$$

Teorema 2. Islendik gomomorfizmiň ýadrosy normal bölektopardyr.

Subudy. Goý bize $f: G \rightarrow G'$ gomomorfizm berlen bolsun. Ilki bilen $\text{Ker } f$ -iň G toparyň normal bölektoparydygyny görkezeliň. Onuň üçin topar bolmaklygyny 1,3 we 4 şertleriniň ýerine ýetýändigini görkezmek ýeterlikdir.

1. Goý $\forall a, b \in \text{Ker } f$ (ýagny $f(a) = e', f(b) = e''$) islendik elementler bolsun, onda gomomorfizmiň kesgitlemesine görä

$$f(a * b) = f(a) o f(b) = e' o e'' = e''$$

Alarys. Bu ýerden $a * b \in \text{Ker } f$ gelip çykýar.

3. Izomorfizmiň $f(e) = e'$ häsiýetiniň gomomorfizm üçin hem dogrulygyndan $e \in \text{Ker } f$ gelip çykýar.

4. $a \in \text{Ker } f$ islendik element bolsun, onda

$$e' = f(e) = f(a * a^{-1}) = f(a) o f(a^{-1}) = e' o f(a^{-1}) = f(a^{-1})$$

alarys. Bu ýerden $a^{-1} \in \text{Ker } f$ gelip çykýar.

Indi bolsa $\text{Ker } f$ -iň özüniň islendik elementi bilen çatyrymlanan hemme elementleri özünde saklaýandygyny görkezeliň.

Goý $x * a * x^{-1}$ islendik $a \in \text{Ker } f$ element bilen çatyrymlanan element bolsun, onda

$$f(xa * x^{-1}) = f(x) o f(a) o f(x^{-1}) = f(x) o e' o f(x^{-1}) = e'$$

alarys. Bu ýerden $x * a * x^{-1} \in \text{Ker } f$ gelip çykýar.

Teorema subut edildi.

Gomomorfizmler hakynda teorema.

Goý A bölektopar G toparyň normal bölektopary bolsun. Eger biz G toparyň her bir x elementine şol elementiň ýatan $x * A$ çatyk klasyny degişli etsek, onda G toparyň G/A faktor-topara öwürmesini alarys.

İki çatyk klasyň köpeltmesiniň ýene-de çatyk klas bolýandygynan φ öwürmesiniň gomomorfizmdigi gelip çykýar. Hakykatdan-da G -toparyň islendik x we y elementleri üçin

$$f(x * y) = (x * y) * A = (x * y) * A * A = x * A * y * A = f(x) o f(y)$$

ýerine ýetýändir.

Alnan gomomorfizme G toparyň G/A faktor-topara bolan tebigy gomomorfizmy diýilýär. Bu gomomorfizmiň ýadrosy bolup A normal bölektoparyň hyzmat etjekdigi düşnüklidir.

Bu ýerden, G toparyň diňe normal bölektoparynyň bu toparyň gomomorfizmleriniň ýadrolary bolup hyzmat etjekdikleri gelip çykýar.

Bu netije normal bölektoparyň ýene-de bir kesgitlemesi hökmünde seretmek bolar.

Teorema 3. Goý G toparyň G' topara f gomomorfizmi berlip, A bu gomomorfizm ýadrosy bolsun. Onda G' topar G/A faktor-topara izomrfdyr, özi hem ol bu toparlaryň birinjisiniň ikinjisine şeýle bir φ izomorf öwürmesi bolup, f we φ öwürmeleriniň yzygider ýerine ýetirilmeginiň netijesi G toparyň G/A faktor-topara tebigy gomomorfizmi bilen gabat gelýär.

Subudy: Goý G' toparyň käbir erkin elementi x' bolsun, y bolsa $f(x) = x'$ deňligi kanagatlandyryan G toparyň elementi bolsun. f gomomorfizmiň A ýadrosynyň islendik a elementi üçin $f(a) = e'$ bolýandygyna görä

$$f(x * a) = f(x) o f(a) = x' o e' = x'$$

ýerine ýetýändir. Bu ýerden f gomomorfizmiň $x * A$ çatyk klasyň hemme elementlerini x' elemente öwürýändigini gelip çykýar.

Beýleki tarapdan, eger \tilde{z} element $f(\tilde{z}) = x'$ deňligi kanagatlandyryan G toparyň islendik bir elementi bolsa, onda

$f(x^{-1} * \check{z}) = f(x^{-1}) o f(\check{z}) = [f(x)]^{-1} o x^{-1} = (x')^{-1} o x' = e'$
 ýagny $x^{-1} * \check{z} = a$ diýsek, onda $\check{z} = x * a$, ýagny \check{z} element $x * A$ çatyk klasda saklanýandyr.

Şeýlelikde, f gomomorfizmda G' toparyň berlen x' elementine öwrülýän elementleri bir ýere toplusak, onda biz çatyk klasy alarys.

G' toparyň her bir x' elementine, f gomomorfizmda obrazy x' bolýan G toparyň hemme elementleriniň toplumy bolan G -toparyň A normal bölektopar boýunça çatyk klasyny deňişli edýän deňişlik G toparyň G/A faktor-topara özara birbelgili öwürmesi bolar.

Bu φ öwürme izomorfizmdir. Sebäbi

$$\varphi(x') = x * A, \quad \varphi(y') = y * A$$

(bu ýerde $f(x) = x', f(y) = y'$ we $f(x * y) = f(x) o f(y)$) deňliklerden

$$\varphi(x' o y') = x * y * A = x * y * A * A = x * A * y * A = \varphi(x') * \varphi(y')$$

geliş çykýar.

Şeýlelikde, G toparyň $f(x) = x'$ deňligi kanagatlandyryýan islendik x elementi üçin $\varphi[f(x)] = \varphi(x') = x * A$

deňlik ýerine ýetýär. Bu bolsa f gomomorfizmiň we φ izomorfizmiň yzygider ýerine ýetirilmesiniň G toparyň islendik elementini G/A faktor-toparyň $x * A$ çatyk klasyna öwürýändigini görkezýär.

Teorema subut edildi.

Mysal 1. Goý G bitin sanlaryň additiw topary, G' bolsa e birlik we b elementlerden ybarat bolan topar bolsun. G toparyň jübüt we tak elementlerini G' toparyň deňişli e' we b' elementlerine geçirýän f öwürmäniň gomomorfizmdigini görkezmeli.

Çözülişi. Goý k we m G toparyň erkin elementleri bolsun. Eger olaryň ikisem jübüt san bolsa, onda $k + m$ hem jübütdir we

$$f(k+m) - e' o e' = f(k) o f(m) \text{ alarys.}$$

Eger ol sanlaryň biri jübüt (meselem k), beýlekisi täk bolsa, onda $k+m$ täk sandyr we $f(k+m) = b = e' o b = f(k) o f(m)$

alarys. Eger k we m sanlaryň ikisem täk bolsa, onda $k+m$ jübütdir we $f(k+m) = e' = b o b = f(k) o f(m)$

alarys. Bu ýerden, gomomorfizmiň kesgitlemesine görä f öwürmäniň gomomorfizmdigi gelip çykýar. Jübüt sanlaryň bölektopary bolsa, f gomomorfizmiň ýadrosy bolup hyzmat edýär.

Mysal 2. Tertibi 4-e deň bolan siklik $G = \{e, a, a^2, a^3\}$ toparyň, tertibi 6-a deň bolan siklik $G' = \{e', b, b^2, b^3, b^4, b^5\}$ topara bolan gomomorfizmleriniň hemmesini tapmaly.

Cözülişi. Toparlaryň berlişinden görnüşi ýaly a we b elementler deňşlilikde G we G' toparlaryň emele getirijileridir. Gomomorfizmiň kesgitlemesinden we onuň $f(e) = e'$ häsiýetinden peýdalanyň, $a^4 = e$ bolýandygyny nazarda tutup

$$e' = f(e) = f(a^4) = f(a)f(a)f(a)f(a) = [f(a)]^4$$

deňligi alarys. Indi G' toparyň

$$[f(a)]^4 = e'$$

Deňligi kanagatlandyryan elementlerini tapalyň. G' toparda şeýle elementleriň diňe ikisi, ýagny e' we b^3 bardyr. Bu elementleriň başga islendik elementiň 4-nji derejesi birlik elemente deň bolup bilmez.

Şeýlelikde, biz iki gomomorfizmi, ýagny $f_1(a) = e'$ we $f_2(a) = b^3$ alarys. Olaryň birinjisinde G toparyň hemme elementleri G' toparyň e' elementine gecer, ýagny $f_1: e, a, a^2, a^3 \rightarrow e'$. Bu ýerde f_1 gomomorfizmiň ýadrosy G toparyň özi bilen gabat gelýär, ýagny $\text{Ker } f_1 = G$.

Indi f_2 gomomorfizme seredeliň.

$$f_2(a) = b^3, f_2(a^2) = (b^3)^2 = e', \quad f_2(a^3) = (b^3)^3 = e' \cdot b^3 = b^3, \\ f_2(a^4) = f_2(e) = e'$$

deňliklerden a we a^3 elementiň b^3 elemente, a^2 we e elementleriň bolsa e' elemente geçýändigini görüňýär. Şeýlelikde, $f_2: e, a^2 \rightarrow e'; a, a^2 \rightarrow b^3$ gomomorfizmi alarys. Bu ýerde f_2 gomomorfizmiň ýadrosy e we a^2 elementlerden ybaratdyr, ýagny $\text{Ker } f_2 = \{e, a^2\}$.

Mysal 3. S_3 simmetrik toparyň S_3/A_3 faktor-topara bolan tebigy gomomorfizmini tapmaly.

Cözülişi. Bize A_3 alamaty çalyşýan toparyň S_3 toparyň normal bölek topardygy öňden bellidir. S_3 toparyň A_3 topar boýunca dürli iki catyk A_3 we A_3^* klasy bardyr.

A_3 catyk klas jübüt orna goýmalardan, A_3^* bolsa ták orna goýmalardan ybaratdyr. S_3 toparyň S_0, S_2, S_4 — jübüt orna goýmalaryny A_3 çatyk klasa, S_1, S_3, S_5 — ták orna goýmalary bolsa A_3^* çatyk klasa geçirýän ψ öwürme S_3 toparyň S_3/A_3 topara bolan tebigy gomomorfizmidir, ýagny $\psi: S_0, S_2, S_4 \rightarrow A_3; S_1, S_3, S_5 \rightarrow A_3^*$.

Gönişlikler.

1. Bütün sanlaryň toparynyň - 1 we 1 sanlardan düzülen multiplikatiw topara bolan gomomorfizmlerini tapmaly.

2. Siklik $G = \langle a^n \rangle$ toparyň siklik $G' = \langle a^m \rangle$ topara bolan gomomorfizmleriniň hemmesini tapmaly we olaryň ýadrolaryny görkezmeli:

- a/ $n = 4, \quad m = 4$
- b/ $n = 4, \quad m = 12$
- c/ $n = 12, \quad m = 4$
- d/ $n = 12, \quad m = 15$

3. Rasional funksiýalaryň $G = \{\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \varphi_4, \varphi_5\}$ multiplikativ toparynyň S_3 topara bolan gomomorfizmleriniň hemmesini tapmaly we olaryň ýadrolaryny görkezmeli.

4. Rasional sanlaryň additiv toparyny bütün sanlaryň additiv toparyna gomomorf öwürüp bolmaýandygyny subut etmeli.

45. Çatrymly elementleriň klaslary. Toparyň merkezi.

Çatrymly elementleriň aşakdaky elementlerine seredeliň:

1. Her bir element özi bilen çatrymlydyr, ýagny $a = eae^{-1}$.

2. Eger a element b element bilen çatrymly bolsa, onda b hem a bilen çatrymlydyr.

Hakykatdan-da, goý $a = xbx^{-1}$ bolsun. Bu ýerden,

$$x^{-1}ax = x^{-1}xbx^{-1}x = b$$

alarys.

3. Eger a element b element bilen çatrymly b bolsa c element bilen çatrymly bolsa, onda a element c bilen çatrymlydyr.

Hakykatdan-da, goý $a = xbx^{-1}$ we $b = yby^{-1}$ bolsun., onda

$$a = xycx^{-1}y^{-1} = xyc(xy)^{-1}$$

ýagny a we c elementleriň çatrymlylygyny alarys.

Berlen element bilen çatrymly elementleriň köplügi çatrymly elementleriň klasyny düzýär. Şoňa görä her bir topary jübüt-jübüt-den kesişmeýän klaslara dagytmak bolar.

Kesgitleme 1. G toparyň hemme elementleri bilen kommutativ bolan bu toparyň elementleriniň köplüğine, ýagny

$$Z(G) = \{z \in G: za = az, \text{ hemme } a \in G\}$$

G toparyň merkezi diýilýär.

Teorema 1. $Z(G)$ köplük G toparyň normal bölek toparydyr.

Subudy. Ilki bilen $Z(G)$ köplügiň G toparyň bölek

toparydygyny görkezeliň. Onuň üçin toparyň 1,2, we 4 şertlerini barlalyň.

1.Goý $x, y \in Z(G)$ islendik elementler bolsun. Onda merkeziň kesgitlemesine görä, islendik $a \in G$ üçin $xa = ax$ we $ya = ay$ gogrudy. Bu ýerden,
 $xya = xay = axy$
 ýagny, $xy \in Z(G)$ alarys.

3. $ea = ae$ bolany üçin $e \in Z(G)$ alarys.

4. Goý $x \in Z(G)$ erkin element bolsun, onda merkeziň kesgitlemesine görä $xa = ax$ deňligi alarys. Bu deňligiň iki bölegiň hem cepden we sagdan x^{-1} elemente köpeldip $ax^{-1} = x^{-1}a$ deňligi alarys. Bu ýerden, $x^{-1} \in Z(G)$ gelip cykýar.

Diýmek, $Z(G)$ köplük G toparyň bölek toparydyr.

Indi onuň G toparyň normal bölek toparydygyny görkezeliň. Goý $z \in Z(G)$ islendik element bolsun, onda G toparyň her bir a elementi üçin $za = az$ deňligi alarys. Bu ýerden, $a^{-1}za = z$ alarys, ýagny $Z(G)$ bölek toparyň her bir elementi özi bilen catyrymlydyr. Bu bolsa $Z(G)$ merkeziň G toparyň bölek toparydygyny görkezýär. Teoreme subut edildi.

Kesgitleme 2. Berlen $z \in G$ element bilen kommutatiw bolan G hemme elementleriň köplüğine, ýagny
 $C(z) = \{a \in G: za = az\}$

z elementiň merkezleşdirijisi diýilýär.

Teorema 2. $C(z)$ köplük G toparyň bölek toparydyr.

Subudy. Teoremany subut etmek üçin toparyň 1,3 we 4 şertleriniň ýerine ýetýändigini barlamak ýeterlikdir.

1.Eger $a, b \in C(z)$ islendik elementler üçin kesgitlemä görä

$za = az$ we $zb = bz$ deňlikleri alarys. Bu ýerden bolsa,

$$zab = azb = abz \text{ ýagny } ab \in C(z) \text{ alarys.}$$

3. $ez = ze$ deňlikden, e elementiniň $C(z)$ köplüğe deňşlidigi görünýär.

4. Goý $a \in C(z)$ erkin element bolsun, onda $az = za$ deňlik dogrudyr. Bu deňligiň iki bölegini hem cepden we sagdan a^{-1} elemente köpeldip

$$za^{-1} = a^{-1}z$$

deňligi, ýagny $a^{-1} \in C(z)$ alarys.

Şeýlelikde, $C(z)$ köplük G toparyň bölek toparydyr.

Dürli elementler arkaly a element bilen catyrymlanan elementleriň gabat gelmekleri hem mümkindir. Berlen a element bilen catyrymlanan elementleriň sanyny bilmek üçin aşakdaky teoremany peýdalanmak bolar.

Teorema 3. Berlen a element bilen catyrykly elementler G toparyň $C(a)$ normal bölektopary boýunca cep catyk klaslary bilen özara birbelgilideňşlilikde bolýarlar, ýagny şol catyrykly elementleriň sany $C(a)$ bölektoparyň G topardaky indeksine deňdir.

Subudy. Goý bize a element bilen catyrymly iki sany xax^{-1} we yay^{-1} element berlen bolsun. Bu elementlere $x C(a)$ we $y C(a)$ catyk klaslary deňşli edeliň we $xax^{-1} = yay^{-1}$ bolanda $x C(a) = y C(a)$ bolýandygyny görkezeliň. $xax^{-1} = yay^{-1}$

Deňligiň iki bölegini hem cepden y^{-1} elemente, sagdan bolsa y elemente köpeldip $y^{-1} x a x^{-1} = a$ deňligi alarys. Bu deňligi $y^{-1} x a (y^{-1} x)^{-1} = a$ görmüşde ýazsak, onda $y^{-1} x \in C(a)$ bolýandygyny göreris.

Catyk klaslaryň 1^o häsiýetine görä $y^{-1} x C(a) = C(a)$

deňligi alarys. Bu deňligiň iki bölegini hem cepden y elemente köpeldip $x\mathcal{C}(a) = y\mathcal{C}(a)$ deňligi alarys. Bu bolsa ol catyk klaslaryň gabat gelyändigini görkezýär.

Şeýlelikde, a elemente catyrymlanan elementler bilen $\mathcal{C}(a)$ merkezleşdiriji boýunca alnan catyk klaslaryň arasynda özara birbelgili deňişiligi gurup bileris.

Mysallara garalyň.

Mysal 1. S_3 simmetrik toparyň

$$S_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

elementiniň merkezleşdirijisini tapmaly.

Cözülişi. Biz $\mathcal{C}(S_4)$ merkezleşdirijisini tapmak üçin

$$S_4 \cdot S_i = S_i \cdot S_4$$

deňligi kanagatlandyryan S_i ornunagoýmalary tapmalydyrys. Bu

ornunagoýmany $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ x & y & z \end{pmatrix}$ bilen belgiläp

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ x & y & z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ x & y & z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

deňligi kanagatlandyryan x, y, z näbellileriň hemme bahalaryny tapalyň. Bu deňligi

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ z & x & y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ x & y & z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

görnüşde ýazalyň we onuň iki bölegini hem cepden $\begin{pmatrix} x & y & z \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

ornunagoýma köpeldeliň. Onda

$$\begin{pmatrix} x & y & z \\ z & x & y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

deňligi alarys. Bu ýerden, 1) $x = 1, y = 2, z = 3$; 2) $x = 2, y = 3, z = 1$; 3) $x = 3, y = 1, z = 2$ bahalary taparys.

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ z & x & y \end{pmatrix}$ ornunagoýmada x, y, z näbellilerin tapylan bahalaryny ornuna goýup

$$C(S_4) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \right\}$$

$S_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ ornunagoýmanyň merkezleşdirijisini alarys.

Mysal 2. A_3 alamaty calyşýan toparyň merkezini tapmaly.

Cözülişi. Bu toparyň S_0 toždestwolaýyn ornunagoýmasynyň A_3 toparyň hemme elementleri bilen kommutativ boljakdygy düşnükli. Şonuň üçin $S_0 \in Z(A_3)$.

$S_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ ornunagoýma garalyň. Onuň üçin

$$S_0 \cdot S_2 = S_2 \cdot S_0; \quad S_2 \cdot S_2 = S_2 \cdot S_2; \quad S_2 \cdot S_4 = S_4 \cdot S_2 = S_0$$

Deňlikleriň dogrudygyny göz ýetirmek kyn däldir.

Bu ýerden, $S_2 \in Z(A_3)$ alarys.

Indi bolsa, S_4 elementni merkeze degişliligini görkezeliň. Aşakdaky deňliklerden

$$S_4 \cdot S_0 = S_0 \cdot S_4; \quad S_4 \cdot S_2 = S_2 \cdot S_4 = S_0; \quad S_4 \cdot S_4 = S_4 \cdot S_4$$

$S_4 \in Z(A_3)$ gelip cykýar.

Şeýlelikde, A_3 toparyň

$$Z(A_3) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \right\}$$

merkezini alarys. Bu ýerden A_3 toparyň öziň merkezi bilen gabat gelýändigini görüňär.

Mysal 3. S_3 simmetrik toparyň

$$S_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

elementi bilen catyrymly elementleriň klasyny tapmaly.

Cözülüşi. Birinji mysaldan bilşimiz ýaly bu elementin merkezleşdirijisi A_3 topardyr. Berlen S_3 toparyň $C(S_4)$ merkezleşdiriji boýunca dürli iki catyk klasy bardyr, täk we jübüt ornunagoýmalaryň catyk klaslary. Haýsy hem bolsa bir jübüt we bir täk, meselem, $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ we $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$, ornunagoýmalary alyp, bu ornunagoýmalar arkaly S_4 ornunagoýma catyrymlanan elementleri tapalýň:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \\ = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \\ = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Bu ýerden, $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ klasyny alarys.

Gönükmeler.

1. Ikinji tertipli kwadrat matrisalaryň multiplikatiw toparynyň

a) $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

b) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

elementiniň merkezleşdirijisini tapmaly.

2. S_3 simmetrik toparyň merkezini tapmaly.

3. S_4 simmetrik toparyň

a) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 3 & 1 \end{pmatrix}$

elementi bilen catyrymly elementleriň klasyny tapmaly.

46. Silow teoremasy.

Lemma. Eger G abel toparyň tertibi p ýönekeý sana bölünýän bolsa, onda bu toparda p tertipli element bardyr.

Subudy. Eger $|G| = p$ bolsa, onda G siklik topar bolup,

onuň birlik elementinden beýleki hemme elementleriniň tertibi p deň bolar.

Eger $|G|$ düzme san bolsa, onda onuň hususy bölek toparlary bolar. Goý A berlen G abel toparynyň hususy bölek toparlary bolsun, onda $|G| = |A||G/A|$ deňligi ýazyp bileris. Bu ýerde aşakdaky iki ýagdaýa seredeliň:

- 1) $|A|$ san p bölünýär;
- 2) $|G/A|$ san p bölünýär.

Eger A bölek toparyň tertibi p bölünýän bolsa, onda ýokardaky ýaly pikirýöretme bilen A bölek toparda ýa tertibi p deň bolanelement taparys, ýa-da häzirki seredýän iki ýagdaýmyza gaýdyp geleris.

Eger $|G/A| = p$ bolsa, onda G/A siklik topar bolup, onuň islendik xA elementi üçin $(xA)^p = A$ deňlik ýerine ýeter, ýagny onuň A -dan tapawutly islendik elementiniň tertibi p deň bolar. Indi G toparyň G/A faktor-topar bolan ψ tebigy gomomorfizmine seredeliň. Bu gomomorfizmde G toparyň elementiniň tertibi onuň obrazynyň tertibine bölünýändir. Hakykatdan-da, n tertipli g element üçin $A = \psi(e) = \psi(g^n) = [\psi(g)]^n$ ýazyp bileris.

Goý k $[\psi(g)]^k = A$ deňligi kangatlandyryň in kici položitel san diýeliň. Onda n san k sana bölünmelidir. Çünki tersine bolan ýagdaýynda, ýagny

$$n = KS + r, (r > K)$$

bolanda,

$$A = \psi(g)^{KS+r} = \psi(g)^{KS} \psi(g)^r$$

deňliklerden görnüşi ýaly, garşylyga duçar bolarys.

Diýmek, G toparyň y elementiniň tertibi G/A faktor-toparyň yA elementiniň tertibine bölünmelidir. Biziň seredýän ýagdaýymyzda yA elementiniň tertibi p deňdir, onda y elementiniň tertibi käbir pm sana deň bolar, ýagny

$$e = y^{pm} = (y^m)^p$$

Bu ýerden, G toparda tertibi p -e deň bolan γ^m elementniň bardygyny gelip çykýar.

Eger $G \triangleleft A$ faktor-toparyň tertibi p -e bölünýän bolsa, onda ýokardaky ýaly pikirýöretme bilen $G \triangleleft A$ faktor-toparda tertibi p -e deň bolan element taparys ýa-da öňki sereden iki ýagdaýymyza gaýdyp geleris. Bu ýagdaýlardaky G toparyň hususy bölektoparynyň we onuň ol bölektopar boýunça faktor-toparynyň tertipleri G toparyň tertibinden kiçi bolarlar.

Şeýlelikde, biz ýokardaky ýaly pikirýöretme prosessimizi dowam etdirip, G toparyň tükenikli bolany üçin ahyrda bu toparda tertibi p deň bolan element taparys.

Lemma subut edildi.

Silow teoremasy. Eger tükenikli toparyň tertibi p^k bölünýän bolsa, bu toparyň p^k tertipli bölektopary bardyr.

Subudy. Goý $Z(G)$ G toparyň merkezi bolsun. Bu merkeziň tertibiniň p ýönekeý sana bölünýän we bölünmeýän ýagdaýlaryna garalyň.

Eger $|Z(G)|$ p sana bölünýän bolsa, onda $Z(G)$ merkeziň abel topar bolany üçin lemma görä bu merkezde p tertipli element bolmalydyr. bu elementniň döreden siklik toparyny A bilen belgilesek, onda $|G| = |A| \cdot |G \triangleleft A|$ ýazyp bileris, bu ýerde $|G \triangleleft A|$ p sana bölünýändir. Biz ýokardaky ýaly pikirýöretmek prosessini dowam etdirip, A toparda tertibi p^{k-1} bolan bölektopar taparys. Eger biz $G \rightarrow G \triangleleft A$ tertibi gomomorfizimde obrazlary şol bölektopary berýän hemme elementleriň köplügi B bilen belgilesek, onda ol p^{k-1} tertipli bölektoparymyz $B \triangleleft A$ faktor-topar bilen gabat geler. Bu ýerde $|B| = |A| \cdot |B \triangleleft A|$ deňlikden $|B| = p^k$ alarys. Şeýlelikde, G toparda p^k tertipli B bölektopar taparys.

Indi $Z(G)$ merkeziň tertibiniň p sana bölünmeýän ýagdaýyna garalyň. Bu ýagdaýda G topary çatyrymlanan elementleriň klaslarynyň jemine dargadalyň:

$$G = Z(G) \cup K(a_1) \cup \dots \cup K(a_n)$$

Bu ýerde $K(a_i)$ klas a_i element bilen çatyrymlanan elementleriň köplügidir, $Z(G)$ merkez bolsa ýekeelementli klaslary emele getirýän elementleriň köplügi bilen gabat gelýändir. Bu dargatmadan

$$|G| = |Z(G)| + |K(a_1)| + \dots + |K(a_n)|$$

deňligi alarys.

$|G|$ bu ýerde p sana bölünip, $|Z(G)|$ bolsa oňa bölünýän däl. Şonuň üçin soňky deňlikden görnüşi ýaly tertibi p sana bölünmeýän käbir $K(a_i)$ klas bolmalydyr. Bu klasyň tertibi bolsa, $C(a_i)$ merkezleşdirijiniň G topardaky indeksine deňdir, ýagny $|G|=|C(a_i)| \cdot |K(a_i)|$. Bu deňlik $|C(a_i)|$ -niň p^k bölünmeýändigini görkezýär. $K(a_i)$ klasyň tertibiniň birden uludygyna görä $|C(a_i)| < |G|$ bolar.

Ýokardaky ýaly pikirýöretmäni $C(a_i)$ topara hem ulanallyň.

Şeýlelikde, şunuň ýaly pikirýöretme prosessimizi dowam etdirip, ahyrda G toparda p^k tertipli bölektopar taparys. Teorema subut edildi.

Netije ñKoşiniň teoremasyň. Eger tükenikli toparyň tertibi ýönekeý sana bölünýän bolsa, onda ol toparda p tertipli element bardyr.

47. TOPARLARYŇ GÖNI KÖPELTMESI.

DAŞKY GÖNI KÖPELTME. Goý bize iki sans G_1 we G_2 topar berlen bolsun. Bu toparlardaky kesgitlenen amalary deňşilikde \circ we \square bilen belgiläliň.

Berlen toparlar boýunça täze topar guralyň. Onuň üçin bize täze toparyň elementleriniň we onda kesgitlenen amaly görkezmek zerurdyr.

Elementleri (y_i, y_i) ($y_i \in G_1, y_i \in G_2$) görnüşdäki hemme jübütlerden ybarat köplüge seredeliň. Bu köplükde $*$ amaly

$$(y_k, y_s) * (y_m, y_n) = (y_k \circ y_m, y_s \square y_n)$$

görnüşde kesgitläliň. Täze düzülen köplügiň $*$ amala görä topar emele getirýändigini barlamak kyn däl. Bizniň guran bu toparymyza G_1 we G_2 toparlaryň daşky göni köpeltmesi diýilýär we $G_1 \dot{y} G_2$ görnüşde belgilenýär.

Ýazgynyň ýönekeýligi üçin geljekde biz \circ , \square , $*$ amalary nokat bilen aňlatjakdyrys. Abel toparlarynyň additiw ýazgylaryna seredenimizde bolsa, olaryň göni jemi $G_1 \oplus G_2$ hakynda gürrüň etjekdiris.

$G_1 \dot{y} G_2$ göni köpeltme deňşilikde G_1 we G_2 toparlara izomorfl bolan $G_1 \dot{y} e'$ we $e \dot{y} G_2$ ñbu ýerde $e \in G_2$ birlik elementlerdir.

bölektoparlary özünde saklaýandyr. Bize $\varphi((y,y))=(y,y)$ görmüşde berlen $\varphi:G_1 \dot{y} G_2 \rightarrow G_2 \dot{y} G_1$ öwürme $G_1 \dot{y} G_2$ we $G_2 \dot{y} G_1$ toparlaryň izomorflylygyny berýär. Eger bize üç G_1, G_2, G_3 topar berlen bolsa, onda olaryň $(G_1 \dot{y} G_2) \dot{y} G_3$ we $G_1 \dot{y} (G_2 \dot{y} G_3)$ göni köpeltmeleri barada gürrüň edip bileris. Bu ýerde $\psi((y,y),z)=(y,(y,z))$ öwürmäniň kömegi bilen $(G_1 \dot{y} G_2) \dot{y} G_3$ we $G_1 \dot{y} (G_2 \dot{y} G_3)$ göni köpeltmeleriň arasynda izomorflylyk gurup bileis. Göni köpeltmegiň kommutatiwlik we assosiatiwlik häsiýetleri tükenikli sany G_1, G_2, \dots, G_n toparlaryň göni köpeltmesi hakynda gürrüň etmäge we ony

$$G_1 \dot{y} G_2 \dot{y} \dots \dot{y} G_n = \prod_{i=1}^n G_i$$

görmüşde ýazmaga mümkinçilik berýär.

TOPARY GÖNI KÖPELTMÄ DAGATMAK.

Teorema. Goý A_1 we A_2 , $A_1 \cap A_2 = e$ şerti kanagatlandyrýan G toparyň normal bölektoparlary bolsun. Onda A_1 bölektoparyň elementleri A_2 bölektoparyň elementleri bilen kommutatiwidirler.

Subudy. Goý y we y deňşilikde A_1 we A_2 normal bölektoparlaryň erkin elementleri diýeliň we $z = yy^{-1}y^{-1}$ elemente garalyň. Bu elementniň $z = y(yy^{-1}y^{-1})$ ýazgysyndan $z \in A_1$ alarys. Sebäbi şert boýunça $y, y^{-1} \in A_1$ we A_1 normal bölektopar özüniň elementleri bilen çatrymlanan G toparyň hemme elementlerini özünde saklaýar, ýagny $yy^{-1}y^{-1} \in A_1$. Bu ýerden bolsa y we $yy^{-1}y^{-1}$ elementleriň köpeltmek hasylynyň A_1 bölektopara deňşlidigi gelip çykýar. Şunuň ýaly pikirýöretme bilen $z = (yyy^{-1})y^{-1}$ ýazgydan $z \in A_2$ alarys. Teoremanyň şertine görä A_1 we A_2 bölektoparlaryň diňe birlik e elemente deň bolan umumy elementi bardyr. Şonuň üçin $y \cdot y \cdot y^{-1} = e$. Bu ýerden, $yy = y$ gelip çykýar.

Teorema 2. Goý A_1 we A_2 käbir G toparyň normal bölektoparlary bolsun. Eger $A_1 \cap A_2$ we $A_1 \cdot A_2 = G$ bolsa, onda G topar $A_1 \dot{y} A_2$ göni köpeltmä izomorfdyr.

Subudy. Daşky $A_1 \dot{y} A_2$ göni köpeltmä garalyň we her bir $(y_1, y_1) \in A_1 \dot{y} A_2$ jübüte G toparyň $y_1 \cdot y_2$ elementini deňşli edeliň. Şeýle deňşililik bize gomomorf berer.

Hakykatdan-da, $(y_1, y_1) \cdot (y_2, y_2) = y_1 y_2, y_1 y_2$ elemente G toparyň $y_1 \cdot y_2 \cdot y_1 \cdot y_2$ elementi deňşli bolar. Birinji teorema görä $y_2 y_1 = y_1 y_2$. Bu

ýerden $\dot{y}_1 \dot{y}_2 y_1 y_2 = \dot{y}_1 y_1 \dot{y}_2 y_2 = (\dot{y}_1, y_1)(\dot{y}_2, y_2)$, ýagny jübütleriň köpeltmesine deňdigi gelip çykýar.

Indi bu gomomorf öwrülmeniň izomorf öwrülmedigini, ýagny G topar bilen $A_1 \dot{\cup} A_2$ göni köpeltmeniň arasyndaky deňşililigiň birbelgildigini görkezeliň. Goý $\dot{y}_1, \dot{y}_2 \in A_1$ we $y_1, y_2 \in A_2$ elementler üçin $\dot{y}_1 y_1 = \dot{y}_2 y_2$ diýeliň. Bu ýerden $y_1 \cdot y_2^{-1} = \dot{y}_1^{-1} \cdot \dot{y}_2$ alarys. Bu deňligiň çep bölegi A_1 bölektopara, sag bölegi bolsa A_2 bölektopara deňşlidir. Bu ýerden, teoremanyň $A_1 \cap A_2 = e$ şertinde görä, $y_1 = y_2$ we $\dot{y}_1 = \dot{y}_2$ gelip çykýar.

Teorema subut edildi.

Ikinji teoremanyň şertini kanagatlandyran G topara onuň A_1 we A_2 bölektoparlarynyň içki göni köpeltmesi diýilýär. G topar göni köpeldijiler görnüşinde özünde A_1 we A_2 bölektoparlary saklaýandyr.

Bu bolsa ony daşky göni köpeltmeden tapawutlandyýar.

Gönükmeler.

1. S_3 -toparyň özüniň hususy bölektoparlarynyň göni köpeltmesine dagamaýandygyny görkezmeli.
2. Tükenikli toparlaryň göni köpeltmesiniň tertibini kesgitläň.
3. Noldan tapawutly hakyky sanlaryň multiplikativ toparynyň 1 we -1 sanlardan ybarat bolan multiplikativ toparyň we položitel hakyky sanlaryň multiplikativ toparynyň göni kompleksi bolýandygyny görkezmeli.

48. ABEL TOPARLARYŇ GÖNI JEMI.

Abel toparlary üçin amaly additiw ýazgysy amatly we giňden ulanylýan ýazgydyr. Şonuň üçin biz abel toparlarynyň göni jemiňi öwrenenimizde bu ýazgydan peýdalanjakdyrys.

Teorema 1. Tükenikli tertipli A_1, A_2, \dots, A_k abel toparlarynyň A jemi tükenikli abel topardyr we onuň tertibi göni goşulyjylaryň tertipleriniň köpeltmek hasylyna deňdyr, ýagny

$$|A| = |A_1| \cdot |A_2| \cdot \dots \cdot |A_k|$$

Subudy. Göni A jemiň elementini

$$(a_1, a_2, \dots, a_k) \text{ ňlň}$$

görnüşde ýazalyň, bu ýerde $a_1 \in A_1$, $a_2 \in A_2, \dots$, $a_k \in A_k$,. ňlň sistemada a_1 element $|A_1|$ bahany, a_2 element $|A_2|$ bahany alyp bilýändiglerine görä, ňlň sistemanyň dürli bahalarynyň sany $|A_1| \cdot |A_2| \cdot \dots \cdot |A_k|$ deňdir. Teorema subut edildi.

Teorema2. Eger $\langle a \rangle$ siklik toparyň n tertibini iki sany s we t özara ýönekeý natural sanlaryň köpeltmek hasylyna, ýagny

$$n=s \cdot t, (s, t)=1$$

görnüşde ýazmak mümkin bolsa, oňa $\langle a \rangle$ topar tertipleri deňişlilikde s we t bolan iki siklik toparyň göni jemine dagaýandyr.

Subudy. Eger $b=ta$ diýsek, onda

$$s \cdot b = (s \cdot t) \cdot a = n \cdot a = 0$$

alarys. $0 < k < s$ deňsizlikleri kanagatlandyryan k san üçin

$$k \cdot b = k \cdot t \cdot a \neq 0$$

bolýandyr. Bu ýerden $\langle b \rangle$ bölek toparyň tertibiniň s -e deňdigi gelip çykýar. Edil şu usul bilen $c=sa$ elementiniň döreden $\langle c \rangle$ siklik bölektoparyň tertibiniň t deňdigi görkezmek bolýar.

Indi $\langle b \rangle$ we $\langle c \rangle$ toparlaryň diňe nula deň bolan umumy elementi saklaýandyklaryny görkezeliň. Eger bu toparlaryň nuldandan tapawutly umumy elementi bar bolsa, onda $k \cdot b = b \cdot c$ deňlik ýerine ýeter ýaly k we l sanlar ($0 < k < s$, $0 < l < t$) tapylar. Bu ýerden

$$k \cdot t \cdot a = l \cdot s \cdot a$$

deňligi alarys. Onda $k \cdot t$ we $l \cdot s$ sanlaryň n -den kiçi bolýandyklaryna görä $k \cdot t = l \cdot s$ bolar. Bu bolsa s we t sanlaryň özara ýönekeýlik şertine ters gelyär. Şeýlelikde, $\langle b \rangle \cap \langle c \rangle = 0$ alarys.

Indi bolsa, $\langle a \rangle$ toparyň islendik elementini $\langle b \rangle$ we $\langle c \rangle$ bölektoparyň elementleriniň jemi görnüşinde aňladyp bolýandygyny görkezeliň.

Hakykatdan-da, s we t sanlaryň özara ýönekeýlik şertinden

$$s \cdot u + t \cdot v = 1$$

deňligi kanagatlandyryan u we v bitin sanlary tapmak mümkindigi gelip çykýar. Bu ýerden

$$a = v(ta) + u(sa) = vb + us$$

bolar. Şeýlelikde,

$$\langle a \rangle = \langle b \rangle \oplus \langle c \rangle$$

göni jemi alarys, Teorema subut edildi.

Mysal 1. $\sqrt[6]{1}$ -iň bahalarynyň emele getirýän siklik toparyny abel toparlarynyň göni köpeltmesine dagytmaly.

Cözülüşi. Berlen topar emele getirijisi $\varepsilon_1 = \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}$ bolan 6-njy tertipli siklik topardyr. Onuň tertibini özara ýönekeý 2 we 3

sanlaryň köpeltmek hasyly görnüşinde ýazmak mümkindir. Şonuň üçin $\langle \varepsilon_1 \rangle$ topar emele getirijileri $\varepsilon_1^2 = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}$ we $\varepsilon_1^3 = \cos \pi + i \sin \pi$ bolan siklik toparlaryň göni köpeltmesine dagaýar, ýagny

$$\langle \varepsilon_1 \rangle = \langle \varepsilon_1^2 \rangle \langle \varepsilon_1^3 \rangle.$$

Hakykatdan-da,

$$\langle \varepsilon_1^2 \rangle = \{ \varepsilon_1^2, \varepsilon_1^4, \varepsilon_1^6, 1 \} = \{ \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}, \cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3}, 1 \}$$

we $\langle \varepsilon_1^3 \rangle = \{ \varepsilon_1^3, \varepsilon_1^6, 1 \} = \{ \cos \pi + i \sin \pi, 1 \}$
toparlaryň bire deň bolan umumy elementi bardyr, bardyr, ýagny $\langle \varepsilon_1^2 \rangle \cap \langle \varepsilon_1^3 \rangle = 1$. Olaryň köpeltmesi bolsa berlen $\langle \varepsilon_1 \rangle$ topary berýändir, ýagny

$$\langle \varepsilon_1^2 \rangle \cdot \langle \varepsilon_1^3 \rangle = \{ \varepsilon_1^5, \varepsilon_1^7 = \varepsilon_1, \varepsilon_1^3, \varepsilon_1^2, \varepsilon_1^4, 1 \} = \langle \varepsilon_1 \rangle$$

Kesgitleme 1. Tertibini ýönekeý p sanyň käbir derejesi görnüşinde aňladyp bolýan topara p -sana deňişli primar siklik topar diýilýär.

Subut eden 2-nji teoremamyzdan aşakdaky netije gelip çykýar.

Netije. tertibe düzme san bolan her bir tükenikli siklik topar dürli ýönekeý sanlara deňişli bolan primar siklik toparlaryň göni jemine dagaýandyr.

Subudy. Goý bize tertibi n -e deň bolan G siklik topar berlen bolsun. Bu san üçin käbir $p_1^{k_1}, p_2^{k_2}, \dots, p_s^{k_s}$ bolan siklik toparlaryň göni jemine dagytmasyňy alarys, bu bolsa netijäniň tassyklanmasyny subut edýär.

Mysal 2. Tertibi 84-e deň bolan $\langle a \rangle$ siklik topary primar siklik toparlaryň göni jemine dagytmaly.

Çözülişi. Berlen $\langle a \rangle$ siklik toparyň tertibini

$$84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$$

görnüşde ýazalyň. Bu ýerden, ýokardaky netijämize görä $\langle a \rangle$ siklik toparyň tertipleri 4, 3 we 7 bolan üç sany primar siklik toparlaryň göni jemine dagaýandygy gelip çykýar. Ol primar siklik toparlar

$$\langle 12a \rangle = \{0, 12a, 24a, 36a, 48a, 60a, 72a\},$$

$$\langle 21a \rangle = \{0, 21a, 42a, 63a\},$$

$$\langle 28a \rangle = \{0, 28a, 56a\}$$

görnüşde bolarlar. Şeýlelikde,

$$\langle a \rangle = \langle 12a \rangle \oplus \langle 21a \rangle \oplus \langle 28a \rangle$$

göni jemi ýazyp bileris.

Kesgitleme 2. Eger topary onuň iki ýa-da birnäçe hususy bölektoparlarynyň göni jemine dagydyp bolmasa, onda ol topara dagamaýan topar diýilýär.

Teorema3. Her bir primar siklik topar dagamaýan topardyr.

Subusy. Goý bize tertibi p^k bolan $\langle a \rangle$ primar siklik topar berlen bolsun. Bize öňden belli bolşy ýaly, dagaýan toparyň göni goşulýjylary bolan hususy bölektoparlaryň kesişmesi nula deň bolmalydyr. Teoremany subut etmek üçin bu şertiň ýerine ýetmeýändigini görkezeliň. Onuň üçin berlen toparyň islendik hususy bölektoparyň nuldandan tapawutly $p^{k-1}a$ elementi saklaýanlygyny görkezmek ýeterlikdir. Berlen $\langle a \rangle$ toparyň $p^{k-1}a$ elementi saklaýandygyny görkezeliň. Siklik $\langle a \rangle$ toparyň emele getirijisiniň a bolany üçin y elementi

$$y = s \cdot a, \quad 0 < s < p^k$$

görnüşde ýazmak bolar. Bu s sany

$$s = p^l \cdot s', \quad 0 \leq l < k$$

görnüşde ýazalyň. Bu ýerde p we s' özara ýönekeý sanlardyr. Ol p we s' sanlar üçin

$$p \cdot u + s' \cdot g = 1$$

deňligi kanagatlandyryýan u we g bitin sanlary tapmak mümkindir. Indi $\langle y \rangle$ sykyllyk toparyň $(p^{k-l-1}g)_x$ elementini alalyň we onuň $p^{k-l}a$ deňdigini görkezeliň:

$$\begin{aligned} (p^{k-l-1}g)_x &= (p^{k-l-1}g) \cdot s \cdot a = p^{k-l-1}g \cdot p^l \cdot s' \cdot a = \\ p^{k-l}g \cdot s' \cdot a &= p^{k-l}(1 - p \cdot u)a = p^{k-l}a - p^{k-l} \cdot u \cdot a = \\ p^{k-l} \cdot a - (p^k a) \cdot u &= p^{k-l} \cdot a - 0 \cdot u = p^{k-l} \cdot a \end{aligned}$$

Bu ýerden, $p^{k-l} \cdot a$ elementiň $\langle y \rangle$ sykyllyk bölek toparda saklanýandygy gelip çykýar. Teorema subut edildi.

Mysal 3. $\sqrt{1}$ bahalarynyň emele getirýän multiplikativ sykyllyk toparynyň dagamaýan topardygyny görkezmeli.

Çözülişi. Bu topar emele getirijisi

$$\varepsilon_1 = \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} (1 + i) \quad \text{bolan } 8\text{-nji tertipli sykyllyk}$$

topardyr. Onuň tertibini $8 = 2^3$ görnüşde ýazmak bolar. Bu ýerden, 3-nji teorema görä berlen topar dagamaýan topardyr.

Mysal 4. Bitin sanlaryň additiw Z toparynyň dagamaýan topardygyňy görkezmeli.

Çözülişi. Bu toparyň islendik iki hususy bölek toparynyň nuldandan tapawutly umumy elementi bardyr. Hakykatdan-da, erkin $n > 1, m, > 1 (n \neq m)$ sanlary döreden

$$\langle n \rangle = \{ \dots, -m \cdot n, \dots, -2n, -n, 0, n, 2n, \dots, mn, \dots \}$$

$$\langle m \rangle = \{ \dots, -n \cdot m, \dots, -2m, -m, 0, m, 2m, \dots, nm, \dots \}$$

hususy bölek toparlarynyň nuldandan tapawutly $-nm$ we nm umumy elementleri bardyr. Bu ýerden, Z toparyň dagamaýan topardygy gelip çykýar.

Tükenikli abel toparlary hakynda esasy teorema

Nula deň bolmadyk islendik abel topary primar sykyllyk toparlaryň göni jemine dagaýandyr.

Bu teorema subut etmekligi okyjylara hödürleýäris.

Gönükmeler.

1. Rasional sanlaryň alditiv toparynyň dagamaýan topardygyňy görkezmeli.

2. Tertibi n bolan sykyllyk $\langle a \rangle$ topary göni jeme dagatmaly:

a. $n=6$

b. $n=12$

ç. $N=15$

d. $n=60$

3. Tertibi 16 deň sykyllyk toparyň dagamaýan topardygyňy görkezmeli.

4. Kompleks sanlaryň additiw toparynyň hakyky we hyýaly sanlaryň bölek toparlarynyň göni jemi bolýandygyny görkezmeli.

49. Toparyň kommutanty we onuň häsiýetleri

Goý y we x käbir G toparyň elementleri bolsun. Bu elementleriň köpeltmek hasylyny aşakdaky görnüşde ýazalyň:

$$xy = xyx^{-1}y^{-1} \cdot y \cdot x = (xyx^{-1}y^{-1})yx$$

Bu ýerden $xyx^{-1}y^{-1}$ aňlatmanyň y we x elementleriniň ornuny çalşyrmak üçin zerur bolan aňlatmadygy görünýär. Ol aňlatma y we x elementleriň kommutatory diýilýär we äý, y göreňde belgilenýär, ýagny

$$[x, y] = xyx^{-1}y^{-1}$$

Eger y we x elementler komutativ bolsalar, onda äý, $yö=e$.

Kesgitleme. G toparyň elementleriniň hemme kommutatorlarynyň köplügin M bilen belgiläliň. Bu köplügiň döreden G' bölek toparyna G toparyň kommutanty (ýa-da önüm bölek topary) diýilýär, ýagny

$$G' = \langle [x, y] \mid x, y \in G \rangle$$

$[x, y]$ kommutatoryň ters kommutatoryny $[x, y]^{-1}$ bilen belgiläliň we onuň kommutator bolýandygyny görkezeliň.

Aşakdaky deňliklerden

$$[x, y]^{-1} = (xyx^{-1}y^{-1})^{-1} = yxy^{-1}x^{-1} = [y, x]$$

$$[x, y][y, x] = xyx^{-1}y^{-1}yxy^{-1}x^{-1} = e$$

$[x, y]^{-1}$ -niň y we x elementleriň kommutatory bolýandygy görünýär.

İki kommutatoryň köpeltmek hasylyna ýene-de komutator bolmagy hökman däl. Ýöne şeýle köpeltmeler toparyň kesgitlemesine görä G' onuň bölek toparda saklanmalydyr.

Mysal 1.

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ we } \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

matrisalaryň kommutatoryny tapmaly.

Çözülişi. Ilki bilen berlen matrisalaryň ters matrisalaryny tapalyň:

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Indi aşakdaky köpeltmäni hasaplalyň:

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Bu ýerden, berlen matrisalaryň kommutatorynyň birlik matrisalygy gelip çykýar, ýagny

$$\left[\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Mysal 2. S_3 simmetrik toparyň kommutantyny tapmaly.

Çözülişi: S_3 toparyň islendik iki elementiniň kommutatory jübüt ornogoýma bolýandyr. Sebäbi iki jübüt ýa-da iki tak ornogoýmalaryň köpeltmek hasyly jübüt ornogoýmadyr.

Kommutatora girýän tak ýa-da jübüt ornunagoýmalaryň sany bolsa jübütdir (noň, iki ýa-da dört). Şeýlelikde, S_3 toparyň kommutatorlarynyň köplügi jübüt ornunagoýmalardan ybaratdyr.

Aşakdaky kommutatorlaryň

$$\begin{aligned} \left[\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \right] &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \\ \left[\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \right] &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \\ \left[\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \right] &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Alamaty çalyşýan A_3 topary emele getirýändigine göz ýetirmek kyn däldir. Bu bolsa $S'_3 = A_3$ görkezýär.

Mysal 3. alamaty çalyşýan A_3 toparyň kommutantyny tapmaly.

Çözülişi. A_3 toparyň islendik iki elementiniň

kommutatorynyň toždestwolaýyn E ornunagoýma deňdir.

Şeýlelikde, $A_3 = E$ bolar.

Geljekde biz A bölek toparyň G toparyň normal bölek topary bolmaklygyny $A \triangleleft G$ ýazgy bilen aňladalyň.

Teorema I. G toparyň G' kommutantyny saklaýan islendik $K \leq G$ bölek topar G -niň normal bölektoparydyr.

Subudy: Goý $\forall x \in K, \forall g \in G$ we $G' \leq K$ bolsun.

Onda

$$g x g^{-1} = g x g^{-1} x^{-1} x = [g, x] x$$

bolar. $[g, x] \in G' \leq K$ we $x \in K$ bolýandygyna görä $[g, x] x \in K$. Bu ýerden K bölektoparyň özüniň islendik y elementi bilen birlikde oňa G toparda çatyrymlaýyn hemme elementleri özünde saklanýandygy gelip çykýar. Bu bolsa $K \triangleleft G$ bolýandygyny görkezýär. Teorema subut edildi.

$K = G'$ bolanda, bu teoremadan aşakdaky netije gelip çykýar.

Netije. G' kommutant G toparyň normal bölek toparydyr, ýagny $G' \triangleleft G$.

Teorema 2.

1. G/G' faktor-topar abel toparydyr.
2. Eger $G \nless K$ abel topary bolsa, onda G' her bir K normal bölektoparda saklanýandyr.

Subudy.

1. Goý a we $b \in G$ toparyň islendik elementleri bolsun. Teoremany subut etmek üçin $a \in G'$ we $b \in G'$ çatyk klaslaryň kommutatiwdiklerini görkezmek ýeterlikdir.

$G' \triangleleft G$ we çatyk klaslaryň I° -häsiýetinden aşakdaky deňlikleri alarys:

$$[aG', bG'] = aG' \cdot bG' \cdot a^{-1}G' \cdot b^{-1}G' = ab a^{-1} b^{-1} G' = [a, b]G' = G'$$

Bu ýerden $aG' \cdot bG' = bG' \cdot aG'$. Bu bolsa, G/G' faktor-toparyň abel toparydygyny görkezýär.

2. Indi, goý $G \nless K$ abel topary we $K \triangleleft G$ bolsun. Onda, G toparyň islendik a we b elementleri üçin

$[a, b] \cdot K = ab a^{-1} b^{-1} \cdot K = aK bK a^{-1} K b^{-1} K b^{-1} K = [aK, bK] = K$ dogrydyr. Bu ýerden, çatyk klaslaryň I° -häsiýetine görä

$[a, b] \in K$ alarys. Bu bolsa G' toparyň her bir elementiniň K normal bölektoparda saklanýandygyny görkezýär. Diýmek, $G' \leq K$. Teorema subut edildi.

50. Çözüliş we ýönekeý toparlar.

Geçen temanyň netijesine görä

$$G' \triangleleft G \quad (1)$$

G' toparyň $(G')' = G''$ kommutantyna seredeliň.

Bu kommutant G toparyň ikinji önüm topary, ýa-da ikinji kommutanty diýilýär we (1) esasynda $G'' \triangleleft G'$ ýazmak bolar. Şu prosesi dowam etdirip, $G^{(K)} = (G^{(K-1)})$ K -njy önüm topary kesgitlemek bolar, bu ýerde $G^{(K)} \triangleleft G^{(K-1)}$.

Şeýlelikde

$$G \triangleright G^{(1)} \triangleright G^{(2)} \triangleright \dots \triangleright G^{(K-1)} \triangleright \dots \quad (2)$$

kommutatlaryň hataryna alarys.

Kesgitleme. Eger (2) hatar birlik bölektoparda üzülyän bolsa, ýagny $G^{(m)} = e$ kanagatlandyryan m kiçi m indekse G toparyň çözüliş basgançagy diýilýär.

Çözülişli toparlaryň aşakdaky mysallaryna seredeliň.

Mysal 1. Islendik abel topary bir basgançakly çözülişli topardyr.

Çözülişi. Goý G abel topary bolsun, onda onuň hemme kommutatorlary birlik elementde deň bolarlar. Bu ýerden $G^{(1)} = e$ gelip çykýar.

Mysal 2. Hemme syklyk toparlar bir basgançakly çözülişli topardylar.

Çözülişi. Bu mysal öňki mysallarymyzyň hususy halydyr, sebäbi hemme syklyk toparlar abel toparlarydyr.

Mysal 3. m basgançakly çözülişli toparda birlik bölek topara deň bolmadyk normal abel topary bardyr.

Çözülişi. Şerte görä $G^{(m)} = e$, bu ýerden $G^{(m-1)}$ toparyň abel toparydygy gelip çykýar.

$G^{(m-1)}$ toparyň normal toparydygy bolsa bize öňden bellidir.

Mysal 4. üçünji derejeli simmetrik S_3 toparyň çözgüt başgançagyny kesgitlemeli.

Çözülişi. Geçen temamyzyň 2-nji mysalyndan S_3 toparyň kommutatynyň alamaty çalyşýan A_3 topar bolýandygy bize bellidir, ýagny $S' = A_3$

A_3 topary emele getirijisi $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ ornuna goýma bolan syklylyk topar görnüşinde ýazmak bolar.

$$A_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \right\} =$$

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}^2, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}^3 \right\} = \left\langle \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

Syklylyk toparyň çözgüt başgançagy bolsa bire deňdir. Bu ýerden, $A_3' = e$ alarys. Şeýlelikde,

$$S'_3 = A_3, \quad S''_3 = A'_3 = e$$

Berlen S_3 toparyň çözgüt başgançagy 2-ä deňdir.

Käbir toparlar öz kommutanty bilen gabat gelyärler we çözgütli bolmaýarlar. Mundan başga-da, hususy normal bölek topary bolmadyk toparlar hem bardyr. Şeýle toparlara ýönekeý toparlar diýilýär.

Teorema. Alamaty çalyşýan A_5 topar ýönekeý topardyr.

Bu teoremany subut etmekligi okyjylara hödürleýäris.

Mysal 1. Eger ρ ýönekeý san bolsa, onda aýyrmalaryň klaslarynyň additiw Z_ρ toparynyň ýönekeýdigini görkezmeli.

Çözülişi. Aýyrmalaryň her bir klasyny

$$\{r\}_\rho = r + \rho Z = \{r + \rho K / K \in Z\}$$

görnüşde ýazmak bolar. (Bu ýerde Z bitin sanlaryň additiw topary). Aşakdaky klaslaryň

$$\{0\}_\rho, \{1\}_\rho, \dots, \{\rho-1\}_\rho$$

köplüginin additiw topary emele getirýändigini barlamak kyn däldir. Hakykatdan-da, bu toparyň 0 elementi bolup $\{0\}_\rho$ klas, $\{m\}_\rho$ elementiniň garşylykly elementi bolup $\{\rho - m\}_\rho$ klas hyzmat edýändir. Şeýle additiw topar Z_ρ bilen belgilenýär. Bu toparyň tertibi ρ ýönekeý sana deňdir, şoňa görä onuň hususy bölektopary ýokdur. Bu ýerden bolsa Z_ρ toparyň ýönekeý topardygy gelip çykýar.

Gönükmeler

1.
$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{we} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

matrisalaryň kommutatoryny tapmaly.

2. A_4 toparyň kommutantyny we onuň ol kommutant boýunça faktor-toparynyň tertibini tapmaly.

3. S_4 toparyň çözügli topardygyň görkezmeli we onuň çözügli başgaçagyň kesgitlemeli.

4. Subut etmeli:

a. çözügli toparyň islendik bölek topary çözüglidir.

b. eger A we B toparlar çözügli bolsalar, onda olaryň kesgitlemesi hem çözügli topardyr.

ç. çözügli toparyň islendik faktor-topary hem çözüglidir.

Edebiýat

1. Кострикин А.И. Введение в алгебру. Учебник.—М.: Наука.—1977г. 495с.

2. Курош А.Г. Курс высшей алгебра. Учебник.—II-е изд. стереотип.—М.: Наука.—1975г.

3. Фадеев Д.К. Лекции по алгебре. Учебник.—М.: Наука.—1984г.

4. Каргаполов М.И., Мерзляков Ю.И. Основы теории групп.—М.: Наука.—1982г.

5. Сушкевич А.К. Основы высшей алгебры ОНТИ-НКТП-СССР.—1937.

6. Проскуряков И.В. Сборник задач по линейной алгебре. Учебное пособие.—М.: Наука.—1984.—336с.

Mazmuny

Giriş.....	11
1.Çyzykly deňlemeler sistemasyny çözmegin Gauss (näbellileri zygydiderli ýok etmek) usuly.....	12
2. 2-nji we 3-nji tertipli kesgitleýjiler olaryň çyzykly deňlemeleriniň kwadratik sistemasyny çözmäge ulanylşy (Kramer düzgüni).....	18
3. Çalşyrmalar we ornuna goýmalar.....	22
4.Islandik tertipli kesgitleýjiler olaryň ýönekeý häsiýetleri.....	26
5.Dürli tertipdäki minorlar. Algebraýik doldurgyçlar.....	33
6.Kesgitleýjileri hasaplamak (kesgitleýjini setiri boýunça dagytmak; Laplas teoremasy).....	37
7. Käbir hususy görnüşdäki kesgitleýjileri hasaplamaklygyň Düzgünleri.....	39
8.Islandik sandaky näbellileri bolan çyzykly deňlemeleriniň kwadrat sistemasyny çözmäge Kramer düzgüni.....	42
9. Halka we meýdan.....	46
10.Ters matrisa.....	47
11. Çyzykly deňlemeleriniň kwadrat ulgamyny çözmegin matrisa usuly.....	50
12. Köpçülenler halkasy.....	51
13. Galyndyly bölmegin algoritmi.....	53
14. Köpçülenleriň bölüjilik häsiýetleri.....	54
15. Iki köpçileniň iň uly umumy bölüjisini tapmagyň Ýewklid algoritmi.....	55
16. Köpçileni çyzykly iki çlene bölmegin Gerner usuly.....	56
17. Köpçileni çyzykly ikiçilenleriň köpeltmek hasylyna dagytmak.....	57
18. Köpçileniň kökleri.....	59
19. Hakyky koeffisientli köpçilenleriň kompleks kökleriniň çatyrymylygy.....	60
20. Wiýet formulalary.....	61
21. Kardano formulasy.....	62
22. n-ölçeqli wektorlar ginişligi.....	66
23.Wektorlaryň çyzykly baglansyklylygy.....	68
24.Matrisanyň rangy.....	72
25. Çyzykly deňlemeler ulgamyny derňemek.....	75
26. Birjynysly çyzykly deňlemeleriniň ulgamy.....	77

27. Çyzykly giňişlikler.....	81
28. Çyzykly giňişligin bazisi we ölçegi.....	82
29. Çyzykly giňişlikleriň izomorflygy.....	85
30. Çyzykly giňişlikleriň bölek giňişlikleri.....	85
31. Bölek giňişlikleriň jemi we kesişmesi.....	87
32. Hakyky Ewklid giňişlikleri.....	88
33. Koşi-Bunýakowskiň deňsizligi.....	88
34. Ortogonallaşdyрма.....	90
35. Kompleks Ýewklid giňişlikleri.....	92
36. Ortonormirlenen bazis.....	94
37. Ewklid giňişlikleriniň izomorflygy.....	95
38. Toparyň kesgitlemesi.....	96
39. Simmetrik we alamaty çalyşýan toparlar.....	99
40. Bölektoparlar.....	103
41. Siklik toparlar. Elementiň tertibi.....	106
42. Toparlaryň izomorflygy.....	109
43. BÖLEKTOPAR BOYUNÇA ÇATYK KLASLAR. LAGRANŽ TEOREMASY.....	115
44. Gomomorfizler.....	123
45. Çatyrymly elementleriň klaslary. Toparyň merkezi.....	130
46. Silow teoreması.....	135
47. TOPARLARYŇ GÖNI KÖPELTMESI.....	138
48. ABEL TOPARLARYŇ GÖNI JEMI.....	140
49. Toparyň kommutanty we onuň häsiýetleri.....	145
50. Çözügütli we ýönekeý toparlar.....	148
Edebiýat.....	150

**Baba Kömekow, Orazmämmet Annaorazow,
Hajymuhammet Geldiýew, Azatgeldi Öwezow**

ALGEBRA

Ýokary okuw mekdepleriň talypalary üçin okuw kitaby