

O. R. SOLTANOWA, O. A. KOKANOWA, I.G.GURBANOW

FITOTERAPIÝA

Türkmen döwlet lukmançylyk institutynyň dermançylyk
fakultetiniň talyplary üçin niýetlenen okuw kitaby

Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan hödürlenildi

Aşgabat - 2005

BBK 53. 525

B.14

**O. R. Soltanowa, O. A. Kokanowa, I.G.Gurbanow
Fitoterapiýa (TDLI-niň dermançylyk fakultetiniň
talyplary üçin niýetlenen okuw kitaby) – A.: Türkmen
döwlet neşirýat gullugy, 2005 ý.**

Bu okuw kitabynda keselleri bejermekde we olaryň önüni almakda derman ösümlükleriniň we olaryň serişdeleriniň ulanylyşy barada maglumatlar berilýär.

Okuw kitaby talyplar, lukmançylykdaky ylmy we amaly hünärmenler, şeýle-de giň okyjylar köpçüligi üçin uly gollanma bolar.

GIRIŞ

Beýik Saparmyrat Türkmenbaşynyň gurup beren Garaşsyz we Baky Bitarap ýurdynda geçen az sanly döwrüň içinde halk hojalygynyň hemme pudagynda boluşy ýaly saglygy goraýyş ulgamynda hem uly özgertmeler amala aşyryldy.

Beýik Serdarymyz Saparmyrat Türkmenbaşy Mukaddes Ruhnama kitaplarynda şeýle beýan edýär: „Bize atababalarymyzdan tebigi baýlyklary boýunça dünýäde iň baý ülke miras galypdyr“. Bitarap Türkmenistan ýerasty we ýerüsti baýlyklara diýseň baýdyr.

Güneşli ölkämiz diňe bir gazma baýlyklaryň mesgeni bolman, ýesem onuň gadymy we baý ösümlik dünýäsi bolup, bu toprak egsilmez bir hazynadyr.

Türkmen milli saglygy goraýyşynyň esaslary Beýik Serdaryň üç Mukaddesligi bolan “Mukaddes Ruhnamada”, “Türkmen ilim aman bolsun!” we “Türkmeniň baş eýýamynyň ruhy” atly ýol ýörelgelerinde giňden açylyp görkezilýändir. Olarda türkmen milli lukmançylyk mirasymyzyň geçmişini we geljegini öwrenilmeginiň ýollary hem beýan edilendir. Olara lukmançylyk mirasymyzyň görnükli şahsyýetleri bolan Abu Ali Ibn Sinanyň, Seýit Ysmaýyl Gürgenliniň, Muhammet Gaýmaz Türkmeniň ylmy işleriniň terjime edilmegi aýdyň şaýatdyr. Bu döwlet derejesindäki wajyp çäreler biziň ýurdumyzda fitoterapiýanyň ösmegine getirýär. Biziň ölkämizdäki dermanlyk ösümlikleriniň bejerijilik häsiýeti has-da ýokarydyr. Sebäbi tebigatyň baý eçilip duran güneşi ösümliklerde biologiki işjeň maddalarynyň örän köp mukdarda jemlenmegini üpjün edýär. Biziň döwletimiziň saglygy goraýyş pudagynda ösümlikler bilen bejermeginiň gelejegi örän uludyr. Sebäbi Türkmenistanyň şertlerinde ösýän dermanlyk ösümlikleri özüniň köpdürliligi bilen hem-de ylmy tarapdan doly öwrenilmedikligi bilen tapawutlanýar.

Häzirki döwürde ösümlikden alynýan dermanlara we olaryň kömegi bilen bejergileri amala aşyrmaga bolan ylmy

gyzyklanmalar has-da artyp başlady. Bu ýagdaýy birnäçe tarapdan düşündirmek mümkin. Soňky döwürlerde emeli derman serişdelerine uly üns berilmeklik bilen ösümliklerden ýasalan derman serişdeleriniň birnäçe artykmaçlygy ýüze çykaryldy. Olaryň ilkinjileriň biri hem ösümlik derman serişdeleriniň zäherlilik derejesiniň örän pesdigi ýa-da asla ýokdugydyr. Ikinji tarapdan hem ösen häzirkі zaman lukmançylyk ylmynyň wajyp meseleleri bolup duran düwnük, ýürek we gan-damar, örgünli hem-de wirusly keselleriniň doly bejeriş usullarynyň tapylmandygy bilen düşündirsen bolar.

Olara bolan ylmy gyzyklanmany adamlaryň örän irki döwürlerden bari ösümlikleriň keselleri bejeriş häsiýetlerine bolan çuňňur ynamlary bilen hem baglanyşyklydyr.

Mundan başga-da lukmançylyk ylmynda keselleri ir anyklamaklyga we önüni almaklyga köp üns berilýär. Ösümliklerden alynýan dermanlar hem keseliň irki döwründe peýdalanylanda has-da netijeli bolýar.

Häzirkі zaman lukmançylygyň wajyp meselesi bolup duran käbir keselleriň bejeriliş usulynyň derman ösümliklerinden tapylmak mümkinçiligi hem örän ýokarydyr. Olaryň gymmatynyň hem emeli ýol bilen alynan derman serişdelerinden arzan düşýändigini göz önünde tutsak, onda olar bilen gyzyklanmanyň ykdysady taraplarynyň bardygy hem aýdyň görünýär.

Bu okuw kitabyňyň ýazylmagynyň esasy maksady hem ýurdumyzyň lukmanlarynyň, talyplarynyň hem-de alymlarynyň şeýle dermanlara bolan isleglerini kanagatlandyrmak, şeýle ylmy ugryň ösüşine belli bir derejede goşant goşmakdyr.

Bu okuw kitaby dört sany bölümden ybaratdyr.

Birinji bölümi “Umumy bölüm” diýlip atlandyrmak bilen, onda esasan-da ösümlikler bilen bejermeklik barada düşünje, olaryň ösüş taryhy hem-de şeýle dermanlaryň düzümine girýän ösümlikler we olaryň ýygnaýyşy, guradylyşy,

saklanylyşy, şeýle-de taýýarlanyşy barada umumy maglumatlar berilendir.

Kitabyň ikinji “Esasy bolüminde” dürli keselleri bejermekde ulanylýan ösümlükler barada jikme-jik maglumatlar bardyr.

Soňky “Fitoterapiýada ulanylýan derman ösümlükleriniň häsiýetnamasy” bölümde dermanlyk ösümlükleriniň Türkmenistanda ýaýranlaryna aýratyn ünsi çekmeklik bilen sanawy berilendir.

Şeýlelik bilen okuw kitabyňyň esasy maksady bolup, Türkmen döwlet lukmançylyk institutynyň dermançylyk fakultetiniň talyplarynyň fitoterapiýa ugry boýunça bilim derejelerini häzirki döwrüň artdyrlan talabyna laýyk getirmekdir. Munuň üçin diňe bir köp sanly ylmy çeşmeleri ulanmak bilen çäklenmän, eýsem-de türkmen halk lukmançylygynyň maglumatlaryny giňden peýdalandyk. Bu okuw kitabyňyň neşir edilip, talyplar köpçüligine ýetirilmegi Beýik Serdarymyz Saparmyrat Türkmenbaşynyň “Saglyk” döwlet maksatnamasyna ujypsyzja bolsa-da öz goşandymyzy goşduk diýip hasaplamaga mümkinçilik berer.

FITOTERAPIÝA WE DERMAN ÖSÜMLIK ÇIG MALLARY BARADA

1.1. Fitoterapiýa hakynda

Häzirki zamanda adamzat saglygyny goramaklyk ýaşaýşyň iň zerur meseleleriň biri bolup durýar. Ol barasynda her bir ynsan, her döwlet çäksiz uly alada edýär. Onuň şeýledigini biz Beýik Saparmyrat Türkmenbaşynyň: „Döwletimiziň iň gymmatly baýlygy – watandaşlarymyzyň jan saglygydyr...“ ýa-da „Adamlaryň saglygyny gorap saklamak döwletimiziň iň derwaýys wezipesidir“ diýip aýdan sözlerini ýatlap doly düşünýäris.

Ynsan saglygyny goramakda köp usullar we serişdeler ulanylýar. Bu ugurda tebigatyň derman ösümliklerini we olardan alynýan serişdeleri ulanmaklyk gadymy döwürlerden bäri, asyrlar boýy dowam edip gelýändir. Keselleri tebigy serişdeleriň kömegi bilen bejermeklik usuly beýleki usullardan özünüň käbir artykmaçlygy bilen tapawutlanýandyr. Eger-de gadymy ylmy çeşmelere ser salsak onda lukmançylyk ylmynyň tebigata golaý durmak baradaky ylymdygyna doly göz ýetirýäris. Bu ýerde Beýik Serdaryň: „Adam tebigata näçe ýakyn boldugyça, şonça-da öz derdiniň emini aňsat tapar“, ýa-da „Ata-babalarymyz her hili ösümlikleri, otlary Allatagalanyň özleriniň saglygy üçin döreden dermanlary höküminde kabul edip, olardan peýdalanypdyrlar“ diýip aýdanlaryny hökmany suratda ýatlamalydyrys.

Keselleri tebigatdaky ösümlik serişdeleri bilen bejermekligi amala aşyrýan ugura „fitoterapiýa“ („fito“-ösümlik, „terapiýa“- bejergi) diýlip atlandyrylýar. Bu uguruň beýleki bejergi ugurlardan tapawutlanýan häsiýetnamalary bardyr. Ilki bilen olaryň adamzat tebigatyna golaý bolmaklygydyr, şonuň netijesinde hem olaryň täsirleri oňaly, ýumşak we uzak wagtlaýyndyr. Olarda goşmaça ýaramaz täsirleriň ýüze çykmagy selçen duş gelýär. Şonuň üçin-de olary iýmit

siňdiriş, dem alyş, ýürek, gan-damar ulgamlarynyň dowamly kesellerinde, bagyr we öt akar, peşew we jyns ýollarynyň, käbir endokrin mázleriniň, şonuň ýaly-da köp sanly deri, nerw, daýanç-hereket ulgamlarynyň kesellerinde ulanmaklygy doly maslahat berilýändir. Şol bir wagtyň özünde derman ösümlükleriniň örän güýçli serişdelerdigini unutmaly däl. Şonuň üçin-de aýry-aýry ýagdaýlarda olary ägä bolup ulanmaklyk zerurdyr. Bu ýagdaýlara mysal edip döme keselleriniň dürli görnüşleri, ýaralaryň iriňleme ýagdaýlaryny, ýokanç we ruhy kesellerini, inçekeseli, dowamly geçýän keselleriň ýitileşme döwürlerini (meselem, astmanyň dem gysma döwrüni), bäbeklik ýaşdaky keselleri görkezmek bolar.

Tebigy serişdeleri bilen bejergiler amala aşyrlanda olaryň birnäçe ýönekeýje kada-kanunlaryny göz önünde tutmak zerurdyr. Olar esasan-da şu aşakdakylardan ybaratdyr, ýagny:

1) bejergini “ýönekeý” – ýagny güýçli täsiri bolmadyk ösümlükleriň kömegi bilen başlamaklygy talap edilýär, ýagny mysal üçin, fitoterapiýa bilen bejermeli diýilip anyklanan aşgazan we ičege ýollarynyň kesellerini ilki bilen güýçli täsir edýän belladonadan däl-de, eýsem çopantelpекden başlamalydyr.

2) her bir ulanylýan ösümlükleri öz düzüminde bar bolan hemme maddalary toplumlaýyn ulanmaklygy maslahat berilýär. Şol bir wagtda bu kada ösümlüklerden arassalanyp ýa-da barlaghanalarda sintezlenip alynan maddalary ulanylmaga garşy gitmeýär.

3) çylşyrymly ösümlük düzümlerini ulanmaklyga ägä çemeleşmekdir. Köplenç ulanylýan ösümlükleriň sany iki-üçden, ýagny birinjisi - esasy ösümlük, ikinjisi bolsa (kadadan çykma hökmünde iki bolup hem biler) - deňagramlaşdyryjy (köplenç efir ýagyny saklaýjylar alynýar) we üçünji ösümlük - umumylaşdyryjy häsiýetli bolan dermanlar ulanylýar.

4) fitoterapiýanyň uzak wagtlap, azyndan 3-4 hepdeläp ulanylmaklygy ýerliklidir. Birnäçe lukmanlaryň pikirlerine görä, fitoterapiýanyň seýrek duş gelýän şowsuzlyklarynyň

esasy sebäpleriniň biri hem şu kadanyň ýerine ýetirilmezligi bolup durýandyr.

Fitoterapiýanyň kömegi bilen dowamly keselleriň uzak wagtlap bejerilmegi sebäpli, keselliniň gowulanmagynyň alamatlaryny ýüze çykarmakda belli bir kynçylyk döreýär. Wagtyň köp geçmegi sebäpli näsag özüni gowulanaýdym diýen pikire hem uýmagy mümkin ýa-da tiz gutulmagyna howlukmak hadysalary hem ýygý duş gelýär. Bu meseläniň çözgüdini hem fitoterapiýanyň öz toplan görkezijilerini ylmy esasyda işläp düzmek bilen hem-de olary geçirilen bejerginiň netijesini ýüze çykarmak üçin ulanyp bolar.

Fitoterapiýada ulanylýan serişdeler özleriniň alynýş tilsimatlary, arassaçylyk derejeleri we ulanyş usullary boýunça birnäçe toparlara şertleýin bölünendirler. Olar köplenç ýagdaýlarda şeýle serişdeleriň häsiýetnamalary bilen baglanşyklydyr.

Fitoterapiýanyň nukdaý nazary bilen ösümlüklerden alynan dermanlar alnyşy we arassaçylygy boýunça üç topara bölünýärler, ýagny:

1). Galen serişdeleri - bu topara tutuş ösümlük, ösümlügiň bölekleri (ýapragy, baldagy, güli, köki, miwesi we ş.m.), olaryň ter we guradylan görnüşleriniň garyndylary, dermanlyk ösümlükleriň şireleri we süýtleri, olardan alynan dürli görnüşli erginler (suwly, spirtli, spirt-suwly, spirt-efirli, ýagly, gliserinli we ş.m.), infuz, tinktur, ekstrakt, maserat, intrakt we ş.m. görnüşleri, häzirki zaman esasyda alynan görnüşler: dispergiler, noguljyklar, hamyrlar we ş.m. degişlidir. Ösümlükden alynýan derman serişdeleriniň bu görnüşleriniň umumy häsiýetnamasy bolup, olar köp dürli himiki gurluşly, şeýle-de biologiki täsirleriniň dürliligi bilen tapawutlanýan maddalary saklaýarlar. Bu maddalaryň mukdary we olaryň gatnaşygy erginde ulanylan gysyp çykaryjynyň (ekstraktyň) hasiýetine bagly bolýar. Bu görnüşli dermanlaryň düzüminde goşmaça maddalar bolan pektinler, pet, organiki turşular, nemler, boýaglar, saponinler, organiki däl duzlar, mikroelementler we ş.m. hem bolýar.

Galen serişdeleriniň birinji umumy hasiýetnamasyndan ikinji aýratynlyklary hem gelip çykýar: ýagny olar tebigaty boýunça iki täsirli maddalaryň garyndysyndan ybaratdyrlar, ýagny– birinjiden dürli biologiki täsirli işjeň maddalaryň we ikinjiden bolsa köp sanly goşmaça önümleriň garyndysyndan durýandyrlar. Bu serişdeleriň düzüminde goşmaça maddalaryň bolmaklygyna biofarmasewtiki nukdaý nazaryndan hem baha berip bolýar.

Galen serişdeleriniň ýene-de bir aýratynlyklarynyň biri bolup, olaryň köplenç içmek usuly bilen ulanylmagydyr. Bu bolsa olaryň täsirleriniň we bejeriji netijesiniň haýal ýüze çykmagyna getirýär.

Galen serişdeleriniň umumy häsiýetnamasyna olaryň düzümindäki biologiki işjeň maddalarynyň mukdary we hilleri, ösümlikleriň ýygnaýan wagtyna, ösüş dowürlrine, howa şertlerine we topragyň ýagdaýyna baglylykda üýtgäp durýandygy hem deňişlidir.

2). Nowogalen serişdeler. Bu serişdelere dermanlyk ösümliklerinden aýrylyp we gerekmejek goşmaça garyndylardan arassalanyp alynan biologiki işjeň maddalar deňişlidirler. Bu derman görnüşleriniň himiki gurluşlary (alkaloidler, glikozidler, flavonoidler we ş.m.) kesgitli bolýar. Şolaryň netijesinde bolsa olaryň himiki, fiziko-himiki we biologiki ölçegleri – standartlary anyklyan bolup, olar takyk möçberlere bölünendirler. Olary diňe peroral däl, eýsem-de parenteral görnüşde-de ulanyp bolýar.

3). Derman maddasy ösümliklerinden aýrylyp alynan aýratyn ýeke-täk maddadan ybarat bolan serişdelerdir. Bu maddanyň himiki gurluşy, fiziki-himiki häsiýetleri doly anyklyýar. Häzirki zaman biofarmasewtiki önümçiliginde şeýle derman serişdeleri alynanda ilki olary ösümlikden almak bilen, soňra bolsa onuň öndürilmegi himiki sintezlenme usuly bilen ýola goýulýar.

Lukmançylykda fitoterapewtiki serişdeleri özleriniň ulanylyşy boýunça hem üç topara bölünýärler, ýagny:

1). Olaryň arassa görnüşde ulanylşy. Bu ýagdaýda bejergi diňe fitoterapewtiki serişdeler bilen geçirilýär. Bejerginiň bu görnüşi fitotopreperatlar bilen bejerilmäge amatly diýlip hasap edilen näsaglarda geçirilýär.

2). Olaryň garyşyk görnüşinde ulanylşy. Fitoterapewtiki serişdeleriň bu usul bilen ulanylşy öz gezeginde hem üç görnüşde bolýar. Olaryň birinjisinde miksturalary taýýarlamagyň esasy hökmünde käbir galen serişdeleri ulanylýar. Köp sanly üsgülewüğe garşy, gakylyk gopduryjy, rahatlandyryjy miksturalaryň taýýarlanmagy fitoterapewtiki serişdeleriniň ulanylmagynyň şu görnüşine degişlidir.

Ikinji görnüşinde galen serişdeleri miksturalaryň düzüminde esasy ýa-da goşmaça häsiýetli serişde hökmünde ulanylýar.

Üçünji görnüşinde olar netijeli geçýän beýleki bejergi dermanlarynyň mukdarlaryny peseltmek üçin ýa-da himioterapewtiki serişdeleriniň zäherlilik derejelerini peseltmek maksady bilen “Orun tutma” terapiýa hökmünde ulanylýar. Meselem bronh dem gysmasynda kortikosteroidleriň, uzak wagtlap bejerilýän gipertoniكي keselinde, sintetiki antigipertenziw dermanlarynyň mukdaryny peseltmek üçin fitoterepewtiki serişdeleri ulanylyp biliner.

3). Fitoterapewtiki serişdeleriň goltgy beriji hökmünde ulanylmagy. Fitoterapewtiki serişdeleriň ulanylmagynyň bu görnüşi köp sanly ýurtlarda giňden ýaýrandyr. Şol sanda biziň ýurdumyzda hem soňky ýyllarda fitoterapiýanyň şu görnüşi çalt ösýändir. Bejerginiň bu görnüşini, haçanda, näsag keseliň agyr ýiti döwründen halas bolanyndan soňra (aşgazanyň baş keseli, bronh demgysmasy, sisto- pielit, gipertoniya keseli) goltgy beriji, gurplandyryjy çäre hökmünde ulanýarlar.

Häzirki zaman lukmançylygynda ulanylýan fitoterapiýanyň birnäçe artykmaçlyklary we olar bilen baglanyşykly töwekgelçilikleri hem bardyr.

Fitoterapiýanyň artykmaç taraplarynyň iň ilkinjisine olaryň zäherlilik derejesiniň seýrek bolýandygy we häsiýetleri

boýunça ýeňil ýa-da duýulman geçýändigi degişlidir. Ösümliklerden alynýan derman serişdeleriniň, sintetiki derman serişdelerinden zäherlilik derejesiniň pes bolmalydygynyň esasy sebäbi, olaryň ösümlik hem bolsa janly bedenlerden alynýandyklary bolup durýar.

Ikinjiden hem fitoterapewtiki serişdeler özüniň arzanlygy we olar bilen geçirilýän bejergileriň hem arzan düşýändigi bilen tapawutlanýarlar.

Fitoterapewtiki serişdeler bilen bejermeklik örän ýeňil ýola goýulýar, hat-da ony öý şertlerinde hem aňsatlyk bilen amala aşyryp bolar.

Häzirki zaman lukmançylygynda fitoterapiýanyň ähmiýetini dolulygynda görkezmeklik üçin onuň amaly lukmançylygynda ornaşdyrmak bilen baglylykdaky töwekgelçilikler barada hem durup geçmelidir. Şu nukdaý nazaryndan derman ösümliklerindäki we olardan alynýan derman serişdelerindäki işjeň maddalaryň köp dürli bolmagy olaryň bejeriş netijelerini berip bilmezlik töwekgelçiligini ýüze çykarýar.

Şonuň ýaly-da häzirki zaman lukmançylygynda zäherli ösümlikleriniň sanawynda 15-20 sany ösümlikden köp getirilenok. Olaryň bu mukdary indi köp ýyllaryň dowamynda üýtgeşsiz galýar. Bu bolsa sanawa girmedik ösümlikleriň zäherlilik derejesi barada ýalňyş düşüňjä getirmegi mümkin. Bu ýagdaý bolsa fitoterapewtiki ösümlikleriň zäherliligi baradaky hüşgärligiň peselmegine getirýär. Ylmy lukmançylykda ösümlikleriň zäherliligi az öwrenilen meseledir.

Iň soňunda hem fitoterapiýa bilen aşa gyzyklanyp keseliň bejerilýän döwrüniň duşdan geçirilmegi mümkin. Bu bolsa umumy terapewtiki bejerişin mümkinçiliginiň peselmegine ýa-da doly aýrylmagyna getirip biler.

Şulary göz önünde tutmak bilen fitoterapiýany üstünlikli amala aşyrmagyň birnäçe şertlerini bellemelidir.

Mälim boluşy ýaly fitoterapiýa özüniň häsiýeti boýunça birnäçe ylmy ugurlardan jemlenendir. Şonuň üçin hem ony

ulanýan lukmanyň şu aşakdaky ugurlar boýunça düşünjesi bolmalydyr, ýagny: dermanlyk otlarynyň botanikasy, olarýn düzüminde saklanylýan biologiki işjeň maddalaryň (alkoloidleriň, glikozidleriň, flawonoidleriň, kumarinleriň, efir ýaglarynyň we ş. m.) himiki, fiziko-himiki häsiýetlerini, fitoterapewtiki serişdeleriniň taýýarlanylş tilsimatlaryny, bu serişdeleriniň farmakologiki we terapewtiki täsirlerini, fitoterapiýa bilen bejerilýän keselleriň anyklanylşyny we klinikasyny, näsagyň keselleriň görnüşlerini bilmeklik zerurdyr.

Bu talaplary ýerine ýetirmeklik fitoterapiýany amala aşyrmaklyk üçin hökmany şertdir.

Häzirki zaman lukmanchylygynda fitoterapiýany we dermanlyk ösümliklerini gözlemeklik esasy çözülmeli ylmy meseleleriň biri bolup durýandyr.

Adamyň saglygyny saklamak we bejermeklik üçin derman ösümliklerini teklipl etmeklik fitoterapiýanyň ylmy esaslaryny tutmaklyk bilen hem-de fitoterapewtiki serişdeleriň bejeriş täsirlerini takyk ylmy tarapdan öwrenmek bilen baglydyr. Bu tarapdan dürli çeşmelerden, ýagny lukmanlardan, botaniklerden, tebiplerden, sosiolog-lardan, dini wekillerden, halk arasyndaky öwrenijilerden alynan maglumatlar ylmy tarapdan derňelmelidir. Köplenç bu alynan maglumatlarda nätakyklyk we garşylyklar duş gelinýär.

Bu maglumatlaryň ylmy tarapdan öwrenilmegi özüniň göwrümi boýunça uly, geçirilşi boýunça kyn, ykdysady tarapdan gymmat ylmy-barlag işleriň geçirilmegini talap edýär.

Derman ösümliklerinden alynýan serişdeleriň peýdaly täsiri bar bolsa, onda daşary ýurtdaky hünärmenleriň ylmy tejribelerinde boluşy ýaly, alynýan dermanlyk maddanyň her bir tapgyry farmakologiki barlaglar bilen seljerilýär.

1.2. Derman ösümlüklerinde saklanýan biologiki işjeň maddalar

Häzirki wagtda lukmançylyk amalyýetinde ulanylýan derman ösümlükleriniň köp görnüşleriniň bejeriş täsiri olaryň düzümindäki biologiki işjeň maddalaryň, adam bedenlerindäki haýsam bolsa bir biologiki täsiri boýunça anyklanýar. Bu täsir ediji biologiki işjeň maddalar dürli düzümlü bolup, himiki birleşmeleriň dürli toparlaryna degişlidir.

Alkaloidler – çylşyrymly azot saklaýan tebigy birleşmeler bolup, dürli himiki gurluşlara eýedir. Olar ösümlük çig mallarynda esas we duz görnüşinde bolup biler. Bu maddalaryň atlary aşgar alkali sözünden we grek sözünden eýdos (meñzeş) ýagny aşgara meñzeş diýmegi aňladýar.

Tirýek manyda ilkinji açylan alkaloide morfin diýilip atlandyryldy. Bu grek hudaýynyň ogly Morfeýiň hatyrasyna dakylady. Soňra dürli derman ösümlüklerde ýokary işjeň şuna meñzeş birleşmeler bölünip alyndy. Olardan strihnin, brusin, kofein, nikotin, hinin, atropin we ş.m. Bu alkaloidler häzirki wagtda lukmançylyk amalynda esasy dermançylyk bejeriş serişdeler hökmünde üstünlikli ulanyp gelinýär. Alkaloidleri saklaýan derman preparatlary bedenlerdäki fiziologiki hadysalary sazlaşdyrmakda we kesel bejermekde esasy orny tutýar.

Alkaloidleriň farmakologiki täsirliligi diýseň giň. Olaryň giň spektr täsiri bardyr. Meselem MNU-ny trankwilizirleýji we sazlaşdyryjy, gipertenziw we gipotenziw, ýürek damar ulgama, damar daraldyjy we giňeldiji täsirleri bardyr.

Mediator ulgamyna dürli täsir ýetirmegi, daýanç ulgamyny dolandyrmak işini we ş. m. degişlidir.

Ösümlük dünýäsiniň ummasyz topary alkaloid saklanýan ösümlüklerdir (belladonna, bir ýyllyk burç, sekurinega, borjak, çay, maňyrsak we ş. m.). Bu ösümlükler dürli bejeriş häsiýeti ýüze çykaryp derman serişdeleriniň alnyş senagatynda giňden ulanylýar. Bu maddalaryň ösümlüklerdäki mukdary

howa şertleri, ýygnaýan wagty we onuň ösdürlip ýetişdirilişiniň mahsuslygy bilen baglanşyklydyr. Köp halatlar ösümliklerdäki alkaloidleriň mukdary güllände we miwelände köp bolýar. Olar gaty az mukdarda saklanýar, ösümlik çig malynyň gury agramynyň 2-3% çenli bolýar.

Glikozidler- azotsyz tebigy birleşmeleriň uly topary bolup olaryň molekulalarynyň gantly bölegi-glikondan we gantsyz bölegi - aglikondan ybaratdyr. Glikozidler alkaloidlerden tapawutlylykda ösümlik enzimleriniň özara täsiriniň netijesinde we beýleki fiziki faktorlaryň täsirinde basym dargaýar. Şol sebäpli bu ösümlikler bejeriş täsirini ýitirýär.

Glikozidleri saklaýan derman ösümlikleri ýygnaýanda bu ýagdaý göz önünde tutulyp: çig maly tiz guratmaly we saklananda çyg çekmäge mümkinçilik bermeli däl. Şeýle edilende enzimleriň täsirliligi peselýär.

Lukmançylyk amalynda glikozidleriň şu toparlary ulanylýar: ýürek glikozidleri, antraglikozidler, saponinler, aý maddalar, flavonoid glikozidleri we ş.m. İçinde has uly ähmiýetlisi ýürek glikozidleri hasaplanýar. Häzirki wagta çenli ähli ulanyýan serişdeleriň arasynda ýürek damar kesellerinde ulanylýan ösümlik preparatlary uly topary emele getirýär. Düzümünde ýürek glikozidlerini saklaýan derman ösümliklerine digitalisniň dürli görnüşeri, landyş, ýaz adonizi, kendir we ş. m. degişlidir. Esasan hem bu ösümlikleriň ýürek damar kesellerini bejermekde uly ähmiýeti bar. Ýürek glikozidlerini saklaýan ösümlikleriň zäherli täsiriniň bolmagy sebäpli beden üçin howply hasaplanýar. Olar steroid gurluşly bolup, gormonlara has ýakyndyr.

Lukmançylyk amalynda has giň ulanylýan gowşsadyjy täsiri ýüze çykarýan glikozidlere antroglukozidler diýilýär. Olar gara tikende, ýşgynda, senaýmekgede, saburda we beýleki ösümliklerde saklanýar. Antroglukozidler az zäherlidir, saklananda bolsa durnuklydyr we köplenç olar gyzyly, mämşi reňkler bilen reňklenendir.

Käbir ösümlikler düzüminde aý glikozidleri saklaýar. Olar lukmançylyk amalynda işdä açyjy hökmünde ulanylýar.

Ajy glikozidler ajy ýowşanda, goreçawkada (yer bahasy), tozgada, altyn gülde we ş. m. saklanýar. Ajy maddalar aşgazanyň içegäniň tolkun şekilli ýygrylmasyna täsir edýär, aşgazan şiresiniň bölünip çykmagyny güýçlendirýär we ýymitiň gowy sindirilmegini üpjün edýär.

Glikozidleriň ýene-de bir görnüşleri saponinlerdir. Olar köp dürli ösümlüklerde saklanýar. Saponinler 70-e golaý ösümlük maşgalalarynda tapyldy. Olaryň arasynda, myhak ýada çüýtiken, gwozdikalylar we nowruzgülliler maşgalalary, birinji ýerde durýar. Saponin saklanýan ösümlükler lukmançylyk amalynda gakylyk gopduryjy (istodyň köki, sinýuha, perwoswet), peşew kowujy (böwrek çayy), öt kowujy (jerebaýyň oty) serişdeler hökmünde ulanylýarlar. Käbir saponinler gan basyşy peseldiji, gaýtardyjy we derlediji täsirleri ýüze çykarýar.

Soňky döwürde, flavonoid glikozidleriniň ähmiýeti uly boldy. Bu ösümlükleriň atlary sary reňki aňladýar diýmekdir. Olar fenol birleşmelerine degişlidir. Flavonoid glikozidleriň käbiri P-witamin täsirliligi, bakteriosid we öt kowujy täsirleri ýüze çykarýar. Mundan başga-da, bedenden radioişjeň maddalaryň çykarylmagyny üpjün edýär.

Kumarinler we furokumarinler. Bu maddalar ösümlüklerde arassa görnüşde ýada gant bilen-glikozid görnüşinde bolup biler. Bu birleşmeler suwda erbet ereýarlar we ýagtylyga durnuksyzdyrlar. Kumarinler köplenç ösümlükleriň saýawanlylar, kösükliler, rutalar maşgalalarynda duş gelýär. Şeýle hem olar kökde we miwesinde ýygnanýarlar. Ösümlük dünýäsinde 150-den köprägi kumarin saklanýan derman ösümlükleri bolup, olaryň lukmançylyk amaly üçin has amatlysy furokumarinler hasaplanýar. Olaryň köpüsi dürli farmakologiki täsirleri ýüze çykarýarlar. Meselem, kabirleri: damar giňeldiji, spazmolitiki, beýlekileri estrogenler ýaly çiş keseline garşy, fotosensibilizirleýji täsiri ýüze çykarýarlar.

Efir ýaglary – hoşboý (özboluşly) ysly, ýeňil uçýan maddalar bolup, ösümlükleriň dürli böleklerinde tapylandyr.

Esasan hem ol ösümlikleriň güllerinde, ýapragynda we miwesinde köp duş gelýär. Efir ýaglary ösümlük çig malyndan gyzgyn suw ýa-da bug bilen aňsat kowulýar. Bu maddalar daşky görnüşi boýunça ýaglara meňzeş bolsa-da, olar himiki gurluşy boýunça ýaglaryň toparyna degişli däldir. Olar terpenoidleriň dürli garyndylary we terpenlere meňzeş maddalar hasaplanýarlar.

Häzirki wagtyda 2000 golaý efir ýaglaryny saklanýan derman ösümlikleri bar. Meselem narpyz, pişik oty, ýakymlyja, melissa, aýy ýowşan, bidenek, şibit, we ş. m. degişlidir. Ösümliklerde efir ýaglaryň mukdary käbir sebäplere baglydyr: ösümlük görnüşiniň biologiki ösüşiniň aýratynlygyna, howa şertlerine bagly bolup, ol ösümlük çig malyň gury agramynyň 18-20% gabat gelýär (2-3%) .

Efir ýaglarynyň farmakologiki häsiýetleriniň has mahsuslary alawlama, mikroba, wirusa, gurçuga garşy täsiri ýüze çykarmagydyr. Mundan başga-da käbir efir ýaglary ýürek-damar ulgamynyň, merkezi nerwi ulgamyň (MNU) işine täsir edip: sazlaşdyryjy, trankwilizirleýji we agyry aýryjy täsiri, gan basyşy peseldiji, kelle beýniniň damarlaryny giňeldiji, ýüregiň damarlaryny giňeldiji täsiri ýüze çykarýarlar.

Mundan başga-da ösümlük efir ýaglarynyň gakylyk gopduryjy, üsgülewigi rahatlandyryjy häsiýetleri bellidir. Olaryň dem alyşy gyjyndyrmagy, aşgazan içegäniň işini sazlaşdyryjy häsiýetleri bar.

Ösümlük efir ýaglary himiko-dermançylyk senagatynda dermanlaryň tagamyny, ysyny üýtgetmekde we gowulandyrmakda (bägül, narpyz, kinsa ýagy we beýlekiler) iýmit, likýor-çakyr önümçiliginde içgileri taýýarlamakda ulanylýar.

Efir ýaglarynyň düzümi kislorodyň we çyglylygyň täsirinde üýtgemegi mümkin. Olaryň käbir düzüm bölekleri okislenýär we şol ýagdaýda olar ysyny ýitirýär. Ýagtylyk olaryň reňkini we ysny üýtgedýär. Şol sebäpli olar saklananda, gaplananda, ýygnalanda, işlenende we olardan

derman serişdeleri taýýarlananda görkezilen düzgünleri berjaý etmeli.

Sakyzlar – bular himiki gurluşy boýunça efir ýaglaryna meňzeş bolup, olar efir ýaglary bilen bilelikde ösümliklerde duş gelýärler. Olar hoşboý ysly eline ýelmeşegen goýy erginlerdir. Uzak wagtlap guramaýan sakyzlara balzamlar diýilýär. Köp sakyzlar pürli agaçlarda, berýozanyň pyntygynda, ýşgynyň kökünde we ş. m. saklanýar. Köp ösümlikleriň sakyzlary bejeriş häsiýeti ýüze çykarýar. Esasan bakterisid, gurçuga garşy täsiri ýüze çykarýar. Lukmançylyk amalynda sakyzlar ýelimleri, tinkturalary taýýarlamakda ulanylýar. Kähalatda olar gowşadyjy serişde hökmünde ulanylýar. Sosnanyň sakzyzy ýara bitiriji ýelim kleolyň düzümine girýär.

Eý maddalary. Bu maddalar tanidleriň toparyna degişli bolup, olar öz adyny deri eýlemekden, ýagny olary suw geçirmez ýaly etmekden alyp gaýdýar. Bu maksat üçin dub agajynyň gabygy ulanylypdyr. Şol sebäpli derini işlemek - eýlemek diýlipdir, gabykdaky madda bolsa eý maddalary diýlipdir.

Eý maddalar köp atomly fenollaryň önümleri bolup, ösümliklerde duş gelýär. Bu maddalar ösümligiň dürli agzalarynda, meselem agaçlaryň we gyrymsy agaçlaryň agaçlaşan böleginde we gabygynda, otjumak ösümlikleriň kökünde we porrugynda (dub, berýoza, çeremuha, jerebaý, ajy ýowşan, ýşgyn, çernika, piňma) ýygnanýar.

Eý maddalary az zäherlidir. Käbir ösümlikler köp tanidleri saklaýanlar. Olar örtüji, bakteriosid serişde hökmünde aşgazan içege kesellerinde, bokurdak çaykamakda we ş.m. ulanylýar.

Eý maddalaryň alawlama garşy täsiri, tanidleriň protein maddalary bilen birleşip nemli bardada goraýjy bardanyň emele getirmegine we alawlama hadysasynyň togtadylmagyna esaslanandyr. Ýanyklarda, kesilen ýere, ýara tanidler çalynsa protein lagtalanyp goraýjy barda emele gelýär. Şol sebäpli olar ýerli gan saklaýjy, alawlama garşy serişdeler hökmünde

ulanylýar. Mundan başga-da tanidler agyr metallar we alkaolidler bilen zäherlenmede-de ulanylýar.

Eý maddalary kislorod bilen galtaşanda okislenip, gara goňur, gyzyň goňur reňke öwrülip, suwda eremeýän birleşmeleri emele getirýär. Kesilen almanyň, kartoşkanyň, behiniň, rediskanyň garalmagy olaryň düzüminde ey maddalaryň barlygyny aňladýar.

Witaminler - gurluşy we farmakologiki täsirliligi boýunça çylşyrymly organiki birleşmeler bolup, ujypsyz mukdarda bedeniň kadaly ösmegi we dolandyrylmagy üçin zerur maddalar hasaplanýar. Witaminleriň madda çalşygy hadysasynda aýratyn orny bolup, iýmitiň siňdirilmegine we esasy iýmit maddalaryň - proteiniň, ýaglaryň, uglewodlaryň ulanylmagyny sazlaşdyrýar. Witamin ýetmezçiliginde madda çalşygy bozulýar, beden agzalarynyň we ulgamlaryň dolandyrylyş işi we işjeňligi peselýär. Häzirki wagtda 30-a golaý tebigy vitaminler bellidir. Olaryň köpüsi derman ösümlüklerde saklanýar.

Haýwan bedenine daşarky iýmit bilen 20-ä golaý vitaminiň barmagyna mätäçdir, beýlekileri bolsa bedende sintezlenýär.

Witaminler fiziki-himiki we farmakologiki häsiýetleri boýunça tapawutlanýarlar.

Adamyň vitaminlere mätäçligi onuň ýaşayyş durmuşy, işi, saglyk ýagdaýy we ýylyň möwsümi we beýleki köp sanly sebäpler bilen baglanşyklydyr.

Dürli kesellerde, esasan hem ýokanç kesellerde bedeniň vitaminlere mätäçligi ýokarlanýar. Meselem ýürek-damar kesellerinde askorbin turşusyna (C vitamin) mätäçlik ýokarlanýar.

Witaminler iki topara: ýagny suwda ereýänlere - B, C, P, PP we ş. m., şeýlede ýagda ereýänlere - A, D, E we ş. m. bölünýärler.

A vitamin topary karotiniň önümleri bolup, bedende ýetmezçilik edende gözüň görüşi peselýär (kseroftalmiýa), ösüş peselýär, şeýle-de ýanygy we sowuk uranda bejerilýär.

Bu witaminiň tebigy çeşmeleri, ysmanak, sogan, kăşir, kădi, dyrnakgöl, rýabina, çasaran, kesegöl we başgalar bolup bilýär.

D witamin topary diňe janly bedenlerde duşýar. Ösümlüklerde olar sterollar görnüşinde bolup, (ergosterin we sitosterin) ultra melewşe şöhleleriň täsirinde D witamine öwürülýärler. D witaminiň ýetmezçiliginde bedeniň süňkleri maýyşgak bolup, rahat keseli döredýär. Şeýle-de D witamin deri kesellerinde-de ulanylýar.

E witamin topary (*tokoferollar*). Bu witaminiň ýetmezçiliginde ownuk gan damarlaryň gurluşy bozulyp, olaryň geçirijiligi ýokarlanyp, portlaşýar we döwürlýär.

E witamini bedende okislenme-gaýtarylma hadysalara gatnaşyp, ganda gemoglobiniň we eritrositleriň mukdaryny ýokarlandyrýar. Şeýlelikde ol göwreliligiň kadaly geçmegini üpjün edýar, we beden etiniň trofiki bozulmasyny bejermekde amatly täsir edýär. Vitaminleriň E topary kösüklilerde, itburunyň we çasaryň miwesinde, suw kyrk bogunynda bardyr.

K witamin topary hataryna antigemorragiki, ýagny gany lagtalandyryjy sebäpler degişlidir. Gan saklaýjy serişdeler bolan K witamin - topary ýorunjanyň ýapraklarynda, ysmanakda, kelemde, çit-çitide, çopan torbada, towşan dodakda, boýbodranda, suw kyrk bogunynda we mekgejöweniň gulgagynda bardyr.

B witamin topary, esasanam çit-çitide, malinanyň, itburunyň, çasaryň miwesinde, greçkada, soganda, mekgejöweniň gulgagynda we ş.m. bardyr.

B₁ witamini (anewrin, tiamin) bedende uglewodlaryň öwürüşigini sazlaşdyrýar. Bu witamin ýetmezçiliginde nerw ulgamynyň işjeňligi bozulýar. Onuň has köp çeşmeleri tüwi we kösükliler hasaplanýar.

B₂ witamini (*ribo-laktoflawin*), ol okislenme-gaýtarma hadysalara gatnaşýar, uglewodlaryň çalşygyny sazlaşdyrýar. Onuň ýetmezçiliginde işdä peselýar we gowşaklyk duýulýar, saç düşýär. Onuň esasy çeşmeleri gök önümler.

B₆ vitamini (piridoksin) madda çalşygyna gatnaşýar. Onuň fosforturşy efiri aminoturşylary (dekarboksilirleýji we pereaminirleýji) öwrülşigini katalizirleýji vitaminleriň düzümine girýär.

B₆ vitamini ýetmezçiliginde aminoturşy triptofanyň sintezi we çalşygy bozulýar. Onuň çeşmeleri - tüwi we bugdaý hasaplanýar.

PP vitamini (nikotin turşusy) onuň ýetmezçiliginde pellagra keseli ýüze çykýar. Has köp PP vitamini hamyrmaýa, bugdaýda we haýwanlaryň içki agzalarynda saklanýar.

PP vitamini periferiki damarlaryň tonusyny ýokarlandyrýar we damargiňeldiji täsiri ýüze çykarýar.

P vitamini – toparyna çylşyrymly organiki (bioflawonoidler) birleşmeler – rutin, kwersetin we ş.m. girýär. P vitamini itburunyň, alyjyň, rýabinanyň, gara smarodinanyň, greçkanyň miwelerinde, benewşäniň otunda we gurtgyranyň, çopantelpeginiň güllerinde bardyr.

P vitamini askorbin turşysy bilen bir hatarda okislenme – gaýtarma hadysalara gatnaşyp, ownuk gan damarjyklary berkidiji, gan saklayjy täsiri ýüze çykarýar.

C vitamini – askorbin turşysy, ösümlik dünýesinde giňden ýaýrandyr. Onuň ýetmezçiliginde bedeniň ýokanç kesellere durnuklylygy peselýar, kapillýarlar portlaşýar, we “singa” keseliň ýüze çykmagyna alyp barýar.

C witamine – itburunyň miwesi baýdyr. Şeýle-de bişme-dik grek hozy, kelem, gara smarodina, kartoşka, sosna pürleri, sogan, sitrus ösümlikleri, alma, ýakymlyjanyň oty, altynsow müň, jerebaý, bir ýyllyk burç, atgulak we ş.m. ösümlikler askorbin turşusynyň çeşmeleridir.

Bedende C vitaminiň gatnaşmaýan hadysasy ýokdur. Ol proteiniň sintezine gatnaşýar. Eger kollagen emele gelmese onda beýni proteini hem sintezlenmeýär. Askorbin turşusy damarlary berkidýär we maýyşgaklygyny artdyrýar. Arteriýa damaryň diwarlaryndakyolestirini we beýleki proteiniň önümleri aýyrýar. Şeýlelikde aterosklerozyň öňi alynýar.

Witaminleriň toparyna pantoten turşusy, inozit, biotin, fol turşusy, hem girýär, olaryň hem bedene edýän täsiri we ähmiýeti uludyr.

Witaminler dürli kesellerde ýagny böwrek kesellerinde, dem alyş agzalaryň, içki bölüp çykaryş mázleriň kesellerinde, ýokanç we ýürek kesellerinde, şöhle keselinde, hirurgiýada, akuşer-ginekologiki kesellerde we nerw kesellerini bejermekde we önüni almakda giňden peýdalanylýar.

Uglewodlar. Bular uly toparly organiki birleşmeler bolup, olara monosaharidler, disaharidler, polisaharidler, pektin maddalary, şepbikler, nemler we ş.m degişlidir.

Polisaharidler-gant bolmadyk çylşyrymly uglewodlar bolup, olar madda çalyşygynyň netijesinde bedeni energiýa çeşmesi bilen üpjün edýärler.

Ösümlik polisaharidleriniň biologiki işjeňligi dürlidir: olar antibiotik, wirusa garşy, domme çişlere garşy, antidot häsiýetleri ýüze çykarýarlar.

Polisaharidler tebigaty we ýerine ýetirýän işi boýunça tapawutlanýarlar:

Kletçatka ýa-da sellýuloza öýjük bardasynyň esasy bolup, içegäniň nerw myşsa aparatyna mehaniki täsir edip, iýmit siňdiriş agzalaryň motor funksiýasyny sazlaşdyrýar, şireleriň işlenip çykmasy, madda çalyşygyny ýokarlandyrýar. Mundan başga-da ol holesteriniň we beýleki dargan önümleriň bedenden çykarylmagyny üpjün edýär. Bu bolsa ateroskleroz, gipertoniki we beýleki içki agzalaryň keselleriniň önüni almakda ähmiýetlidir.

Pet ösümlikleriň miwesinde, kökünde, gabygynda, ýer asty miwesinde ätiýaç madda hökmünde ýygnanýar. Senagat möçberinde ýurdumyzda kartoşkanyň, tüwiniň, mekgejöweniň we bugdaýyň peti öndürilýär. Pet diňe bir iýmit hökmünde ulanylman eýsem lukmançylyk, dermançylyk we gözellig amallarynda giňden ulanylýar. Pet bedende içege bakteriýalaryň riboflawini sintezlemegini ýokarlandyrýar. Riboflawin bolsa holesteriniň öt turşylaryna öwrülmegini we bedenden çykarylmagyny üpjün edýär. Inulin guzygulagyň,

syçratgynyň we dermanlyk tozganyň düzüminde we kök miwesinde saklanýar. Ol süýji keselini bejermekde ulanylýar.

Pektin maddalary polisaharid tebigatly bolup, köp mukdarda ösümlükleriň miwelerinde kök miwesinde we baldaklarynda ýygnanýar. Esasan hem tokaý ýertudanasynda, itburunyň, klýükwanyň, gara smarodinanyň miwesinde, almada, limonda, apelsinde we kalinanyň miwesinde, deňiz keleminde we ş. m. bardyr. Pektin maddalary adsorbirleýji, alawlama garşy täsiri ýüze çykarýar. Onuň adsorbirleýji, täsiri stronsiý, kobalt, radioişjeň izotoplary birleşdirip, bedenden özleşdirilmedik ýagdaýda çykaryp bilmegidir. Şeýle-de pektin simap we gurşun bilen zäherlenmä garşy serişde-antidot hökmünde ulanylýar. Pektinler bedende peýdaly bakteriýalaryň ýaşaýşyny we ösüşini üpjün edip, holesterini we zäherli maddalary bedenden çykarmaga ukyplydyr.

Nemler we şepbikler. Bu topar kolloid polisaharidleri-niň mahsus häsiýetleri olaryň suwda eräp goýy, şepbik erginleri emele getirmegidir. Şepbikler miweli agaçlaryň ýagny üljäniň, garalynyň, badamyň, akasiýanyň, erigň şahalarynda emele gelyär. Şepbikleriň düzümini kalsiniň, magniniň, kaliniň duzlary, gant, şepbik turşulary bilen polisaharidleri emele getirýär.

Nemler. Esasan zygyryň çigidine (5-12%) çerbiýanyň, çopan telpegiň, üç bölek goşa dişiň kökünde we atgulagyň, lipanyň, eje-ejeligiň ýapraklarynda köpdür.

Şepbikler we nemler ösümlükler üçin ballas maddalar hasaplanýar, ýöne olaryň örtüji we kolloid erginleri emele getirmegi, ýumşadyjy, örtüji serişde hökmünde bronhit, aşgazan, içege kesellerinde we bokurdagyň nemli bardasyndaky nerw uçlarynyň örtüp goramak üçin giňden ulanylýar. Şol sebäpli nemler we şepbikler kolitli, enterokolidli, gastritli, aşgazan-içege ulgamyň baş we bronhit keselli näsaglary bejermekde ulanylýar.

Dermançylyk ulgamynda şepbikler, emulgator hökmünde, örtüji we ýelim maddalary hökmünde gerdejikler, pilýula taýýarlamakda ulanylýar.

Ýaglar, mumlar. Ýaglar gliserinden we ýokary karbon turşylaryndan emele gelen efirlerdir. Esasan hem ýaglar badamda, zygyrda, günebakarda, mekgejowende, gowaçada, zeýtunda, künjüde, çasaranda we beýleki ösümliklerde ýygnanýar.

Ýaglar otag gyzgynlyk görkezijisinde ergin halda, gaty ýaglar-gaty ýa-da goýy halda bolýarlar, şeýlede mumlar gaty maddalar hasaplanyp, bal arysynyc we kitic mummy bellidir.

Ýaglaryc, gaty ýaglaryc, mumlaryc terapewtiki täsiriligi olaryc deriden sorulma häsiýetine esaslanandyr. Olarda eredilen derman serişdeleri deriden sorulyp ýumşadyjy serişdeler hökmünde çalgy, krem, sabyn we ş.m. görnüşinde we ýelimleri taýýarlamakda ulanylýar. Şeýle-de erediji hökmünde (meselem, kamforanyc we beýleki serişdeleric sanjym üçin ýagly erginleri) ulanylýar.

Käbir ýaglar (ak kemençäniň, narpyzyc, tminic) içege taýýajygyna we kesel dörediji mikroblara garşy bakterisid täsiri ýüze çykarýar: güýçli täsir edijilere kastor ýagy degişlidir. Düzümünde doýmadyk ýag turşylaryny saklaýan ösümlük ýaglaryny iýmit hökmünde ulanmak ateroskleroz keseliniç öcünü alýar.

Fitonsitler - biologiki işjec çylşyrymly uçujy organiki maddalardyr. Olar ösümlükler tarapyndan goraýjy maddalar hökmünde emele gelýär we madda çalşygyna gatnaşýarlar. Ösümlükleric dürli görnüşleri, we şol bir ösümligic dürli agzalary dürli görnüşli fitonsitleri öndürüp bilýärler. Bir ösümligic fitonsitleri bakterisid täsiri beýleki birinicki bolsa bakteriostatiki täsirlidir.

Fitonsit häsiýetli ýüz müclerçe ösümlükler bardyr. Has köp fitonsit häsiýeti ýüze çykarýanlaryna sogan, sarymsak, ewkalipt, ak kemençe, jerebaý, altynsow müň, piňma, benewşe, boýbodran, arça we ş.m. degişlidir. Bu ösümlükleric fitonsit häsiýetleri ylmy lukmançylykda öwrenildi. Fitonsitler güýçli antibiotikler bolup, grippic öcünü almakda, ýokary dem alyş ýollarynyc kesellerinde, basykda, agyz boşlugynyc kesellerinde, gingwitde, stomatitde, aşgazan-içege ulgamynyc

kesellerinde we ginekologiki kesellerde ulanylýar. Sarymsagyc, soganyc fitonsitleri aferoskleroz, gipertoniýa keselinde, jerebaýyc dermanlary imanin, nowoiman hirurgiýada gicden ulanylýar. Fitonsitleric täsirinde howadaky mikrobedenjikleriň mukdary azalýyr.

Mineral maddalary (himiki elementler)-bedeniň hökmany düzüm bölekleri bolup, onuň işjeňligi üçin zerurdyr. Olar ösümlikleriň öýjük şiresinde az mukdarda bardyr. Bedende her bir himiki element belli bir işi dolandyrýar. Olar biri-biriniň ýerini tutup bilmeýärler. Olar witaminleriň, gormonlaryň şeýlede biohimiki hadysalary dolandyrýan ähli biologiki işjeň maddalaryň düzümine girýärler ýa-da olaryň sintezine gatnaşýarlar.

Ösümliklerde saklanýan himiki elementler iki topara bölünýär: makro we mikroelementler. Makroelementleriň toparyna janly bedeniň 99%-ni düzýän ýaşayyş üçin wajyp elementler girýär: olara kaliý, natriý, kalsiý, magniý, marganes, kremniý, fosfor, ftor, hlor we ş.m. degişli bolup, olar ösümlik dünýäsinde giň ýaýrandyr.

Mikroelementleriň hataryna bolsa mis, marganes, nikel, myşýak, kobalt, molibden sink we başgalar degişli bolup olar ösümliklerde ujypsyz mukdarda bolýarlar. Mineral maddalar bedeniň çalyşma hadysasyna gatnaşyp, öýjük protoplazmasynyň düzümine girýär, şeýle-de öýjüğe we dokuma ara erginlerde bolýarlar. Olar ganda gemoglobiniň (demir), gemosianiniň (mis), galkan görnüşli mäziň (ýod), aşgazan asty we jyns mázleriniň (sink) düzümine girýärler. Olar enzimatiki hadysalary dolandymaga gatnaşýarlar. Mineral maddalar daýanç dokumanyň emele gelmegi üçin esasy bolup hyzmat edýärler. Olar suwuň çalyşygyna gatnaşyp turşy - esas deňagramlygy düzleýärler.

Lukmançylyk amalynda makro we mikro elementler derman serişdeleri hökmünde, şeýle-de demire baý bolan ösümlik preparatlary azganlylykda (anemiýa), ýoda baý bolan-galkan görnüşli mäziň kesellerinde ulanylýar. Fosfor - - fosfor turşysy görnüşinde adenozin trifosfor turşusynyň

(ATF) düzümine girýär. ATF öz gezeginde bedeniň dokumalarynyň düzümi bölegidir. Demir, mis, molibden we beýleki elementler enzimleriň sintezine gatnaşýar. Magniý uglewodlaryň çalşygyny dolandyryan enzimiň işjeňligini sazlaşdyrýar. Kalsiý öýjük bardasynyň gurluş elementidir.

Mikro elementler häzirki wagtda gan emele geliş ulgamyň kesellerini, döme çişleri bejermekde ulanylýar. Şol sebäpli fitopreparatlary mikro elementler bilen utgaşdyryp ulanmak has amatly hasaplanýar.

Derman ösümlikleriň düzümine ady agzalan biologiki işjeň maddalardan başgada beýleki himiki birleşmeler (organiki turşular, pigmentler, enzimler we ş. m.) girýärler.

Köp ýagdaýlarda derman ösümlikleriň bejeriş täsiri olaryň düzümindäki haýsy hem bolsa bir madda bilen baglanyşykly bolman, eýsem onuň düzümindäki toplum birleşmeleriň täsiri bilen baglanyşyklydyr. Meselem: bu ýagdaýda çäýiň, itburunyň, digitalisiň, pişik otynyň düzümindäki arassa täsir ediji maddalaryň (meselem kofeiniň, askorbin turşusynyň, rutin, digitoksiniň, izowalerian turşusynyň), terapewtiki täsirliligi ösümligiň özünden taýýarlanan derman görnüşiniň (ekstrakty, demlemesiniň, gaýnatmasynyň, tinkturasynyň) ýüze çykan terapewtik täsirliliginden has pesdir.

1. 3. Derman ösümlikleriň ýygnaýyşy we guradylyşy

Biziň güneşli Türkmenistanymyza ösümlikleriň 2850 görnüşi ösýär. Olaryň 1700 görnüşi ýabany ösýän ösümlüklere degişli. 1000-e golaý ösümlük geljekde dermanlyk çig mal bolmaga mümkinçiligi bar. Ol ösümlikleriň 400-e golaýy adam bedeni üçin wajyp bolan biologiki işjeň maddalardan witaminleri, alkaloidleri, glikozidleri we mikroelementleri saklaýar. Ülkämizde ösýän ösümlikleriň 332 görnüşi başga hiç ýerde duş gelmeýän- endemiki ösümlüklere degişli. Biziň ölkämiziň howa şertleri ösümlüklerde biologiki işjeň

maddalaryň ýygnaýmagy üçin has amatly hasaplanylýar. Biologiki işjeň maddalar ösümlik bedeniniň dürli agzalarynda we onuň ösüşiniň belli bir döwründe ýygnaýar. Derman maddasy bir ösümligiň pyntygynda, ýapragynda we baldagynda ýygnansa, ikinji biriniň güllerinde ýa-da miwesinde, beýleki bir ösümligiň bolsa kökünde ýa-da gabygynda ýygnaýar. Şeýle-de derman maddanyň mukdary ösümligiň dürli ösüş döwründe birmeňzeş bolmaýar, hat-da olaryň mukdary günüň dowamynda-da üýtgäp durýar. Şol sebäpli hem ösümligiň haýsy böleginde biologiki işjeň maddalar köp bolsa şol bölegi hem dermanlyk çig maly üçin ýygnaýar. Ýygym öz wagtynda geçirilmedik halatynda ýygnaýan derman ösümlikleri biologiki işjeň maddalary özünde saklamaýar, şol sebäpli olaryň bejeriş täsirliligi pes bolýar. Derman ösümliklerde biologiki işjeň maddanyň mukdary onuň ýygnaýan bölegi we onuň wagty bilen baglanyşyklydyr.

1- nji görkezijide käbir derman ösümlikleriň çig mallarynyň ýygnaýş möwsümleri görkezilendir.

Pyntyklar - Derman çig maly hökmünde berýozanyň we sosnanyň pyntyklary ulanylýar. Olary ýazyň başynda, haçan-da çişende ýöne, açylmadyk wagty ýygnamaly. Bu ýagdaý adatça Nowruz we Gurbansoltan aýlarynda bolýar. Iri pyntyklary (sosnanyň) pyçak bilen kesilýär, ownuklary (berýozanyň) bolsa şahasy gurandan soň döwüp aýyrýarlar. Pyntyklary guratmak örän usully yerine ýetirmeli. Olary uzak wagtlaý ýelejiredilen, salkyn ýerde guratmaly, sebäbi yssy ýerde olar açylýarlar.

Gabyk. Agaçlaryň we gyrymsy agaçlaryň gabyklaryny dubyň, kalinanyň, gara tikenin gabyklaryny ýazyň başynda şire goýberip başlanda ýygnamaly. Bu wagt olar agaçlaşan ýerinden aňsat aýrylýar. Soňrak ýazyň ahyrynda tomsuň başynda ösüş togtanda gabyk aýrylmaýar. Gabyk almak üçin, ýaş şahalardan ötgür pyçak bilen halka şekilli 25-50 sm biri-birinden uzaklykda kesmeli. Soňra olary kese kesikler bilen birleşdirmeli we turba görnüşinde aýyrmaly. Eger-de gabyk lişainik ösüntgileri bilen örtülen bolsa, ilki olary pyçak bilen arassalamaly. Şeýle edilmedik ýagdaýda çig mal ýokary hilli diýip hasaplanylmaýar.

Ýapraklar. Ýapraklary ýygnamak ösümliginiň mugjalaýan we gülleýän etabynda amala aşyrylýar. Ýapraklar gurak howada el bilen ýygnalýar. Adat boýunça kök üsti, aşaky we ortaky baldakdaky ýapraklar ýygnalýar. Saralan, mör-möjekleriniň gemiren, kömelekler bilen zaýаланан ýapraklaryny ýygnamaly däl.

Otlar. Ösümliginiň oty adat boýunça gülläp başlanda, käbir görnüşlerde bolsa doly gülläp bolandan soň ýygnalýar. Oty ýygnamak çalgý bilen ormak arkaly, orak, pyçak ýa-da beýleki orujy enjamlary ulanmak arkaly ýygnaýarlar. Soňra ösümliginiň ýer üsti iri baldaklaryny saýlap aýyrmaly.

Güller we gül çogdamlary. Olary ýygnamak gülläp başlanynda ýerine ýetirmeli. Şol döwürde olar täsir ediji maddalary köp saklaýar we saklananda pytramaýar hem-de guratmaga dözümlü bolýar, şeýle-de öz reňkini ýitirmeýär. Güller el bilen sypyryp ýa-da baldakdan üzüp ýygnaýar. Kähalatlarda gül çogdamlaryny ýygnamak üçin ýörite gurallar- kesgiç-gaýçylar ulanylýar. Meselem dermanlyk çopan telpegiň gülleri şol gurallar bilen ýygnaýar.

Miwesi we tohumy. Ösümligiň miwesi we tohumy derman maddalara has baý. Şol sebäpli olary ýetişýän wagtyna laýyklykda möwsümleýin el bilen ýygnaýarlar. Rýabinany, tmini, zirki we beýleki ösümlikleriň miwesi saýawan görnüşinde ýerleşenligi sebäpli olary ilki el bilen üzüp alýarlar. Guradylandan soňra sapajyklaryny saýlaýarlar. Itburunyň miwesi onuň okarajygy bilen bile ýygnaýar sebäbi ol miwäniň ýokarsynda ýerleşen. Miwesi guradylyp el bilen owkalananda okarajyk aýrylýar. Aýratyn hem çernikanyň, malinanyň, ýertudananyň şireli miwelerini ýygnamak kyn hasaplanýar. Olary sebede ýygnap ýenilmez we ezilmez ýaly her gatlagyna ösümlük şahajyklaryny goýmaly.

Köki, porrugy we ýer asty miwesi. Ösümligiň bu agzalary onuň ýer üsti bölekleri öz ýaşaýyş möwsümini tamamlandan soň, tomsuň ahyrynda ýa-da güýzde ýygnaýar. Olary ir ýazda ýer asty bölekleriniň ösmegi başlanmanka (wegetasiýa) hem ýygnamak bolýar. Üöne bu taýýarlanylş möwsümi gaty gysga bolýar. Olary pil bilen gazyp ýygnaýarlar ýa-da ýörite traktorlaryň kömegi bilen gazylyp alynýar. Soňra olar sowuk suwda ýuwulyp toprakdan arassalanýar we açyk howada guradylyp mehaniki galyndylardan, baldak

böleklerinden, zaýalanan agzalaryndan arassalanýar hem-de guratmaga ugradylýar. Ösümligiň ýer asty bölekleri ýagynly we çygly howada ýygналman diňe gury howada ýygналýar.

Zaýalanan, çaň siňen, ýoluň gyralarynda hapalanan ösümliklerden derman çig mallaryny taýýarlamak bolmaýar. Ösümlük gemrijiler tarapyndan zaýalanan bolsa olardan derman çig malyny taýýarlamak bolmaýar. Çig maly gaplara ýygnamaly. Güller, miweleri üçin uly bolmadyk sebetler ýa-da çelekler ulanylýar. Gury miweler, tohumy, çigidi, ýer asty bölekleri bolsa haltalara we beýleki gaplara salyp gaplamaly.

Derman ösümlikleri ýygналandan soňra ýüz ugruna diýen ýaly ony saklamaklyk üçin, ýagny düzüminde önümçilige, dermanhanalara ýetýänçä üýtgeşmeleriň bolup geçmezligi üçin işlenilýärler. Diňe käbir çig mallaryň üstünde hiç-hili işlenilmeýär. Sebäbi olaryň düzüm bölekleri saklanma döwründe dargaýarlar. Bu hili çig mallary farmasewtiki serişdelerini taýýarlamak üçin terligine ulanylýar. Köp sanly ýygналynan çig mallary ösümligiň biologiki işjeň maddalarynyň dargamagyny üpjün etmäge ukyply enzimleri inaktiwirmek (işjeňligini aýyrmak) maksady bilen guradylýp saklanylýar.

Derman ösümliklerinde ýygналynanyndan soň hem madda çalşygynyň doly üýtgändigine seretmezden ýaşayyş dowam edýär. Ösümlük dokumalarynda çuň üýtgeşmeler ondaky suwuklyklaryň bugaryp doly guratmaklygy dokumalaryň ölümüne hem-de madda çalşygynyň durmagyna getirýär. Dokumalardaky enzimler biohimiki hadysalara gatnaşyp bilmeýändigini üçin öýjükdäki durnuksyz (labil) maddalary dargadýarlar. Şu ýerden ösümlikleriň guradylmagynyň, olaryň dermanlyk çig mallaryna öwürilmegindäki ähmiýetiniň uludygyny görkezýär.

Enzimleriň işjeňligi köp tarapdan öýjügiň düzümindäki wodorod ionlarynyň mukdaryna bagly.

Adatça olar gurşawyň pH derejesi 7 we 10 deň bolanda ýeterlik derejede işjeň bolýarlar.

Kä halatlarda ter ösümliklerdäki enzimleriň täsiri olaryň farmakologiki häsiýetini ýüze çykarmaklygy üçin ýaramly täsir edýärler, kä halatlarda bolsa, olaryň täsiri bilen ýüze çykýan üýtgeşmeler maksada ters gelýär. Birinji ýagdaýda enzimleriň täsirini enzimleme ýoly bilen ýokarlandyryp bolýar, ikinji ýagdaýda enzimleriň islenilmeýän täsirini aýyrmak üçin derman ösümliklerini çalt guratmaly. Meselem, kumarinleriň oşümlikdäki enzimatiki täsirler bilen emele gelmegi, okislendiriji enzimleriň täsiri bilen redusirlenen antrahinonlaryň antrohinonlara öwrülmeşi, glikozid sinigriniň gidroliz dargamagy – bularyň hemmesi islenilýän enzimatiw üýtgeşmeler bolup, dermanlyk çig malynyň bejeriji täsirini döredýärler. Beýleki ýagdaýlarda bolup geýýän enzimatiki hadysalary biologiki işjeň maddalaryň dargamagyna getirip, olaryň bejeriji täsiriniň çäklenmegine ýa-da ýitmegine getirýär. Enzimleriň täsiri durnuksyz (labil) glikozidlere, giossiýam derman maddalarynyň alkaloidlerine zaýalaýjy täsir edýär. Şu görnüşli dargamalary enzimleri inaktiwirmek bilen öňi alynýar we durnuklanan derman serişdesi döredilýär. Derman çig mallarynyň durnuklaşmagyny üpjün edýän şu aşakdaky usullar ulanylýar: ter dermanlyk ösümliklerini gaba salmak bilen alkogolyň ýa-da hloroformyň buglary bilen täsir etmek, soňra olar guradylýar, eger-de suw buglary düzümini üýtgetmek mümkinçiligi bolmasa, suw buglary hem ulanylýar.

Durnuklanan çig malynyň enzimleri inaktiwirlenen soňra reaktiwlenip (täzeden işjeňlenip) bilmeýär. Ýokardaky agzalan usullar çig mallary konserwirlemegiň doly we dogry usuly bolmak bilen, özüniň gymmatlygy bilen tapawutlanýar. Şonuň üçin hem ösümlikler guradylmak bilen konserwirlenýär. Guradylanda suw doly

bugarmak bilen enzimleriň täsiri doly aýrylmaýar we diňe saklanylýar.

Ösümlük täzedan ulylyan şertlerinde enzimler işjeňleşýärler we dargama hadysalaryny amala aşyrmaklyga mümkinçilik döredýär.

Dogrusy aýdylanda ter önümleriň düzümini, biologiki täsirini onuň çig malynda üýtgedilmedik görnüşinde saklamak mümkin däl. Esasy zat ösümlük guradylanda we konserwirlenende onuň düzümi böleklerini, bejeriji täsirini ýitirmezlige çalyşmaly.

Ösümlügiň ter bölegini guradylmazdan ön gowy edip ýuwmaly. Ösümlügiň yer asty böleginiň goşmaça garyndylary biraz wagtlaý suwda saklaý, güýçli silmek bilen arassalanylýar. Eger-de kökler we poruklar şu usul bilen arassalanmasalar, olaryň düzüminde köp mukdarda mikroelementleriň bolmagyna getirýär we bu usul onuň bejeriji täsiriniň peselmegine getirýär.

Käbir köklerden farmakopeýanyň görkezmesine görä gabygy aýrylmalydyr. Köp sanly ösümlük kökleriniň gabygy täze köwlenip çykarylan badyna gowy aýrylýar. Kökleriň gabyklarynyň aradylmagy olaryň külkä öwürilmegini ýeňilleşdirýär, sebäbi olar gabyk süýümlerinden arassalanýarlar.

Ösümlükleriň yer üsti bölekleri guradylmazdan ozal del maddalardan, hapalardan, özge ösümlüklerden arassalanmalydyr.

Arassalanan çig mallary guradylýar. Çig malyň işjeň bölekleriniň himiýasyny göz önünde tutup guradylmalydyr. Uzak ýatan ýa-da çüýrän, guran, zaýаланан ösümlükleri guradylmaýar. Derman çig malyň guradylmagy onuň düzümine baglylykdaky gyzgynlygy ulanmak bilen tiz amala aşyrylmalydyr. Tejribeleriň netijeleriniň görkezmesi ýaly çig mallarynyň guradylmagy üçin ýaramly gyzgynlygyň derejesi 50⁰S deňdir. Şu derejeli gyzgynlykda enzimleriň täsiri gowşaýar ýa-da doly bes edilýär. Käbir halatlarda

guradylmagyny ilki başda ýokary derejede ýerine ýetirip, soňra 50 °S ulanmaklyk hem maslahat berilýär.

Tiz guradylmagy ýöriteleşdirilen abzal bolan gyzgynlygy sazlanyp durulýan guradyjy kameralarda amala aşyrylýar. Witaminleri köp saklaýan ter miweleri has-da tiz guradylýar. Bu ýagdaýlarda gyzgynlygyň derejesi 70-90°S ýetirilýär, bu bolsa köp mukdardaky witaminleriň saklanyp galmagyny üpjün edýär. Şolar ýaly, ýürek glikozidlerini, alkaloidleri saklaýan çig mallary hem tiz guradylýar. 50°S gyzgynlykda oňat ýelejiredilýän ýerde çig mal bejeriş düzümi üýtgemezden guraýar. Biziň güneşli diýarymyzda tomusyň gyzgyn aýlarynda jaýlaryň üçeklerinde hem derman ösümliklerini guratmak üçin amatly şertler bardyr.

Guramagyň häsiýeti derman çig malyň görnüşine, we ondaky täsir ediji maddanyň häsiýetine bagly. Efir ýaglaryny saklaýan derman ösümlük çig mallaryny (käkilik oty, ýakymlyja we ş. m.) 30-35°S gyzgyn görkezijilerde haýal guratmaly. Ýokary gyzgynlykda efir ýaglary uçýarlar. Kä halatlarda tersine, ýürek glikozitlerini saklaýan derman ösümlük çig mallary (ýaz adonisi, landyş, göwen, kendir we ş.m.) 50°S – 68 °S gyzgyn görkezijilerde enzimleriň täsirini togtatmak maksady bilen tiz wagtda gutarmaly.

Askorbin turşusyny saklaýan derman ösümlük çig malynyň (itburunyň gülleri, nowruzgülüň gülleri) okislenmezligi üçin 80° – 90 °S gyzgyn görkezijilerde guratmaly.

Göni gün şöhleleriniň täsiri astynda ösümligiň ýaşyl ýapraklary we gülleri öz reňklerini ýitirýär, reňksizlenýär, saralýar ýa-da garamtyl bolýar. Bular ýaly özüniň tebigy reňkini ýitiren çig mallary ulanmaklyga ýaramsyzdyr. Göni gün şöhleleriniň aşagynda reňkleýji maddalary saklamaýan ösümlük

böleklerini – tohumyny, köküni, gabygyny guradyp bolýar. Türkmenistanyň tomus aýlarynda gün şöhleleriniň derejesi örän ýokary bolýandygy sebäpli bu ösümlik bölekleriniň hem guradylmagy maslahat berilmeýär. Ösümlikleriň dürli bölekleriniň guradylyşy birmeňzeş däldir.

Dermanlyk çig mallarynyň guradylmagynyň täze usullary hem ornaşdyryldy. Şeýle usullaryň biri hem infragyzył ýagtylygy ulanmakdyr. Bu usulda infragyzył şöhleleri dermanlyk serişdeleriniň içine girýärler we netijede guramak hadysasy tiz amala aşýar. Şol bir wagtda köp mukdardaky çig mallary guratmakda bu usuly ulanmak kynçylyklar döredýär.

Dermanlyk çig mallaryny liofilizirmek ýoly bilen hem guradyp bolýar. Bu usul haçan-da dermanlyk çig mallarynyň düzümindäki işjeň maddalarynyň ýeňil dargamak howpy bar bolan ýagdaýlarynda ulanylýar. Liofilizasiýany örän pes ýylylykda (20°S) ýerine ýetirýärler. Şeýdip guradylan serişdäniň çyglylygy 2 – 4,5% köp bolmaýar. Bu usulda guradylan serişde-de tropan alkaloidleriň saklanyşy, 50°S gyzgynlykdaky guradylan serişdelerinden göz-görtele ýokary bolýar.

Guradylmak bilen bir hatarda çig malynyň konserwirlenmegi amala aşyrylýar. Emma olaryň doly durnuklaşmagynyň bolup geçmegine kepillik ýokdur. Şonuň üçin käbir barlagçylar galen serişdeleriniň täze görnüşleriniň (tinkturalar, ekstraktlar) gowdydygy barada belleýärler, sebäbi bularyň düzümindäki bejeriji täsirler durnukly saklanýarlar diýilip hem pikir aýdýarlar. Häzirki dowürde ýokary derejede arassalanan galeniňkiden hem durnukly serişdeleri ulanýarlar.

Derman ösümlikleriň çig malyndan alynýan arassa maddalaryň galen serişdeleri bilen deňeşdireniňde birnäçe artykmaçlyklary bar, sebäbi serişdeleriň bejeriji täsiri diňe şu görnüşde saklanyp we gözegçilik edilip bolýar. Emma olaryň täsiri derman çig malynyň farmakologiki

täsiri bilen mydama gabat gelip duranok. Şonuň üçin hem iň gowy farmakologiki täsirli derman görnüşleri girizilýär. Bu görnüşler köp sanly tejribeleri geçirmeklik bilen alynýar. Kā halatda çig malynyň düzümi biologiki täsirlerden başga sebäpleriniň täsirleri bilen hem üýtgäp biler. Meselem guradylma döwründe turşy häsiýetli maddalar, ter ösümlükleriniň düzüminde bolýan işjeň optiki maddalaryň rasemizasiýasyny ýuze çykaryp bilerler.

Çig maly guradylanyndan soňra täzedden arassalanylýar, seljerilýär, ýene-de guradylýar, böleklenilýär we gaplanylýar. Soňky arassalanmanyň esasy maksady – çig malynda tötänleýin düşen ösümligiň del böleklerinden hem-de guradylan döwründe öz tebigy görnüşini ýitiriji böleklerinden arassalanmakdyr. Çig mal iň soňky gezek, onuň düzümindäki çyglylygyň farmakopeýanyň kadalarynyň we ölçeg (standart) talaplaryna gabat gelen derejede guradylýar. Aşa guradylmakdan hem gaça durmaly. Sebäbi beýle çig mallary ýeňil döwülýär, gaplanylanda hem-de daşalanda külkä öwrülýärler.

Çig maly gaplanylanda, oňa salynýan gabyň nämeden ýasalandygynyň hem ähmiýeti bardyr. Dermanhanalarda satmak üçin, ownudylan we owradylan çig mallary olaryň tebigatyna baglylykda adaty we iki gatly haltalara ýa-da gutulara salynýar. Täzedden işlenilmegi göz önüne tutulýan çig mallary haltalara, kagyz haltalara, özbaşdak bogdaklar edilip gaplanylýar.

Dermanhanalardaky dermanlyk çig mallary belli wagt aralygynda hiç hili üýtgeşmeler bolmaz yaly şertlerde saklanmalydyr. Munuň üçin ösümlükler saklanylýan jaýlara bolan wajyp talaplary – jaýyň howasy gurak bolmaly, gowy ýelejiretmeli, arassa, berk poly bolmagyny berjaý etmeli. Toplanan derman serişdelerini biri-biriniň üstüne goýmak bolmaýar, olar tekjelerde aýratyn edilip goýulmalydyr. Kābir çyglylygy köp çekýän ýa-da efir ýaglaryny saklaýan serişdeleri agzy ýapyk gaplarda goýulmalydyr. Farmakopeýanyň talaplaryna görä zäherli

we güýçli täsirli serişdeleri beýlekilerden aýratynlykda, gulplanylýan şkaflarda saklanylýar.

Nädogry saklanylanda, esasanda çygly, ýelejiremeýän, hapa diwarlary, poly zaýаланan bolsa, derman serişdeleri çig çekýär, çüýräp başlaýar, köp sanly zaýalaýjylar düşýär.

Deman ösümlük çig mallary gury garaňky, arassa ýerde saklanýar. Gülleriniň ýapraklaryniň otlarynyň saklanyş möhleti 1-2 ýyldan aşmaly däl. Köki, porrugy, gabygy – 2-3 ýyl möhletde saklanýar.

1. 4. Derman ösümlük çig malyndan derman görnüşleriniň taýýarlanylşy

Derman ösümlikleri lukmançylykda öz tebigy durkunda örän seýrek ulanylýar. Adatça olardan dürli derman görnüşlerini we preparatlaryny ýasaýarlar.

Iň ýönekeý derman görnüşleriň biri ürgünler bolup durýar. Olar ösümlikleriň bölekleriniň (ýapragy, miwesi, köki, porrugy) owradylan görnüşidir. Ösümlikleriň guradylan böleklerini sokyda ýa-da kofe owradyjy enjamda owradyrlar. Alynan massany ýaralara sepmeklik üçin ulanýarlar ýa-da bolmasa içýärler. Umuman lukmançylyk amalynda derman ösümlüklerden alynan ürgünler seýrek ulanylýar.

Dermanlyk ösümlük çig maly esasan hem demleme we gaýnatma görnüşlerinde ýygy ulanylýar. Demlemeler we gaýnatmalar bolsa ösümlük çig malyndan suwly çykyndy görnüşinde alynýar. Demlemeleri ýapraklardan, güllerden, baldaklardan taýýarlaýarlar. Gaýnatmalary bolsa kökünden, gabykdan, porruklardan taýýarlaýarlar. Her ösümlük çig malyňy belli derejä çenli owratmaly. Ýagny ýapraklary, gülleri 5 mm çenli; baldagy, gabygy, köki, porruklary-3 mm çenli; miweleri, tohumlary- 0,5 mm uly bolmadyk göwrüme çenli owradylýar. Owradylan çig maly farfor ýa-da syrça bilen örtülen gaba salyp, üstüne suw guýup, gapagyny ýapmaly we gaýnap duran suwly hammamjyga oturtmaly. Demlemeleri 15⁰S çenli, gaýnatmalary 30⁰S çenli gyzdyrmaly, yzygider bulap durmak gerek. Gyzdyrylandan soň gaby otag temperaturada sowatmaly we süzmeli, galan çig maly sykmaly. Taýýar bolan çykyndyny gerek bolan göwrüme çenli suw bilen garmaly.

Demlemeler we gaýnatmalar köplenç 1:10 we 1:20 gatnaşykda taýýarlanylýar, ýagny, owradylan çig malyň bir böleginden demlemäniň, gaýnatmanyň 10,20 bölegi taýýarlanýar.

Içmek üçin ulanylýan demlemeleriň doýgunlygyny pes etmeli bolýar, şonuň üçin olary 1:30, 1:40 gatnaşygynda ýasaýarlar. Onuň tersine daşky hajatlar üçin ulanylýan demlemeleriň doýgunlygy has ýokary etmeli.

Öý şertlerinde demlemeleri we gaýnatmalary gaýnatman taýýarlaýarlar. Onuň üçin dermanlyk çig malynyň üstüne gaýnag suw guýup, gabyň gapagyny ýapyp, üstüni mata bilen ýapmaly. 4-6 sagat durandan soň süzmeli we sykmaly. Demlemeler we gaýnatmalar tiz zaýalanýarlar esasan hem yssy howada. Şony göz önünde tutup olary her gün täze ýasamaly.

Eger-de her gün täze ýasamak mümkin bolmasa, onda salkyn ýerde ýa-da sowadyjyda saklamaly, ýöne 2 gije-günizden artyk saklamaly däl.

Kärhanalarda ýörite enjamlaşdyrylan tejribe geçirilýän otaglarda, derman ösümlüklerden galen preparatlaryna degişli tinkturalary taýýarlaýarlar. Olary 70% ýa-da 40% spirtde taýýarlaýarlar. Owradylan ösümlükleri gaba salyp, üstüne spirt guýmaly, agzyny berk ýapyp 7 gün goýmaly. Bir hepdeden soň tinkturany aýyrmaly, galyndyny gowy sykyp, süzmeli. Tinkturalary köplenç 1:10 gatnaşykda ýasaýarlar. Spirtli tinkturalar köp wagtlaýyn saklamak üçin niýetlenendir. Olary köp bolmadyk mukdarda, ýagny, damjalap ulanýarlar (10-30 damja käwagt ondan hem az).

Kärhana şertlerinde ösümlüklerden nowogalen preparatlary hem taýýarlanylýar. Olar öz gezeginde ballanst maddalardan ýokary derejede arassalanan suwly ýa-da seýrek ýagdaýlarda spirtli çykyndysy bolup durýar.

Nowogalen preparatlary diňe içmek üçin däl-de sanjym üçin hem ulanmak bolýar.

Sanjym üçin preparatlary ampulada, içmek üçin preparatlary bolsa çüýşede goýberýärler.

Lukmançylyk amalynda derman ösümlükleriniň guradylan bölekleri toplumlar we çay görnüşinde ulanylýar. Toplumlardan demlemeleri, gaýnatmalary we gyzgyn ýapgyllary taýýarlaýarlar.

Derman ösümlükleriň köklerinden çalgylary taýýarlaýarlar. Esas hökmünde wazelin, duzlanmadyk doňuz ýagy, mesge, ösümlük ýagy ulanylýar. Doňuz ýagyndan we ösümlük ýagyndan taýýarlanan çalgylar wazelin esasly çalgylardan gowy täsir edýär.

Bejeriş maksatlary üçin köplenç ösümlükleriň şiresi ulanylýar.

Ingalyásiýa üçin niýetlenen garyndylar, gaýnatmalardan ýa-da demlemelerden taýýarlanýar. Olara ingalyásiýa garyndysynyň bejeriş doýgunlygyna çenli suw bilen garylýar (adatça 1:2 we 1:3). Ýuwmak üçin, pürkmek üçin we başgalar üçin edil şular ýaly taýýarlanýar. Has doýgunlandyrylan suwly çykyngylar almak üçin bolsa demlemeleri we gaýnatmalary 1:5 gatnaşykda taýýarlap, olary şol durşuna daşky bejeriş maksatlary üçin ulanmaly.

Bejeriş hammamçalar taýýarlananda her hammam üçin 1-21 demleme we gaýnatma ulanylýar.

II. KÖP ÝAÝRAN KESELLERIŇ DERMAN ÖSÜMLÜKLERI WE FITOSERIŞDELERI BILEN BEJERILIŞI

2.1. Ýürek-damar keselleriniň fitoterapiýasy

Ýürek gan-damar ulgamy. Ýürek gan-damar newrozlary. Ýürek patologiýasynda ýürek gan-damar newrozlary esasy orny tutýar. Olara ýüregiň işleýşini sazlaýan ulgamyň näsazlyklaryna getiren umumy newrozlar hökümünde seretmeli. Olara newrosteniýa, psihaasteniýa ýa-da isteriýa sebäpli döreýän psihogen (ruhy) alamatlaryň toplumlary degişlidirler.

Ruhy newrozlaryň ýüze çykmagyna görä:was-waslyk netijesinde döreýän hem-de ruhyýeti gowşaklygy sebäpli döreýän somatogen görnüşleri tapawutlandyrylýar.

Newrozlara mahsus alamatlar bolup merkezi hem-de wegatatiw nerwi ulgamlarynyň işleriniň bozulmaklygy (gaharjaňlyk, gykylykçylyk, oňsuksyzlyk, gowşaklyk, tiz ýadamaklyk, ukysyzlyk, ýüregiň çalt urmagy, ýüregiň urşynyň durma duýgusy, üýtgemegi, ýürek agyrsy, dem gysma, kelle agyry, subfebril gyzgynlyk, huşyň peselmegi we ş.m.) degişlidir.

Bejerilişi: kesele getiren sebäpleri aýyrmaly, ruhy bejeriş çärelerini geçirmeli, bejeriş maşklaryny ulanmaly, şypahana bejergisi hem-de merkezi nerwi ulgamyny rahatlandyryjy derman we fito serişdelerini ulanmaly.

Tiz gahary gelýän kardiofobiýaly näsaglara bromyň walerianaly serişdelerini (waleriananyň kökünüň demlemesi 12.0:200.0; natriniň bromidi 8.0 nahar çemçesi göwrümünde günde 3-4 gezekden) hem-de waleriananyň, landyşyň we alyjyň tinkurasynyň hersinden 10.0 we alyjyň ergin ekstraktynyň 5.0 günde 25 damjadan 2-3 gezek berilýär. Bu serişdeler, aýratyn hem, ýürek çalt uranda berilýär.

Näsagyň ukusynyň kadalaşmagyny hem gazanmaly. Muny ukysyzlygyň tebigatyny düşündirmek bilen, autogen taplanmany öwredip hem gazansa bolar. Eger-de näsagyň kadaly ukusy bolmasa, onuň doly sagalyp bilmejekdigini ýatdan çykarmaly däldir. Ukladyjy serişdeleri gysga wagtlaýyn bellemek bilen, soňunda ukyny ýüze çykarýan şertli-reflektor usullara geçmeli.

Ukysyzlyk bilen bileleikde duş gelýän ýürek newrozlarynda şu aşakdaky derman ösümlikleriň ýygyndysy bellenilýär.

Rp.	Flor.	Chamomillae	10.0	(Çopantelpegiň gülleri)
	Flor.	Conwallariae	10.0	(Landyşyň gülleri)
	Fruct.	Foeniculi	20.0	(Arpabadyýanyň miwesi)
	Fol.	Menthae piperitae	30.0	(Narpyzyň ýapragy)
	Rad.	Valerianae	40.0	(Waleriananyň köki)
M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly we bir bulguryň günün dowamynda birnäçe gezekde içilýär. Bejerginiň dowamlylygy 12-14 güne deň bolýar.				

Ruhy dartgynlygy aýyrmak hem-de ukyny gowulandyrmak üçin ýene-de bir derman toplумы ulanylýar:

Rp.	Rad.	Valerianae	15.0	(Waleriananyň köki)
	Strobuli	Lupuli	15.0	(Hmeliň miwesi)
	Fol.	Menthae piperitae	30.0	(Narpyzyň ýapragy)
	Herb.	Leonuri	30.0	(Şirguýrugyň oty)
M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly we bir bulguryň günün dowamynda owurtlap içip gutarylýar ýa-da ertir we agşam günde iki gezek ýarty bulgurdan içilýär. Bejerginiň dowamlylygy 12-14 gün.				

Ýüregiň üstünde newrotiki agyry duýulyp, bradikardiýa ýagdaýlarynda landyşyň, waleriananyň tinkturasy her birinden 10,0 belladanyň tinkturasy 5,0 Mentol 0,1 ulanylýar. Bu serişde ýurek agyry peýda bolanynda 25 damjadan günün dowamynda 2-3 gezek içilýär.

Waleriananyň hem-de landyşyň tinkturasy - 10 ml., belladonnanyň tinkturasy -5 ml. natriniň bromidi - 4 g., mentol- 0.25g. arassalanan suw - 30 ml çenli. Serişde esasan hem ukysyzlykdan ejir çekilende 20 damjadan 2-3 gezek bellenilýär. Bejerginiň dowamlylygy 2-3 hepde.

Kardialgiýada we tahikardiýada düzüminde bromizowalerian turşusynyň etil efirini, fenobarbital natriý, narpyz ýapragynyň ýagyny saklaýan korwalol ýa-da walokordin bellenilmek görkezilendir. Bu serişdeler sedatiw, damarlary giňeldiji, spazmolitiki täsirlidir. 25-30 damjadan günde 2-3 gezek içmeli, tahikardiýada bolsa 40-60 damja

çenli köpeldilýär. Newrotiki agyrylary bir bölek süýjiniň üstüne 5-10 damja walidol damdyryp içilende aýrylýar.

Bulardan başga hem şu aşakdaky derman ösümlükleriniň ýygnyndylary ulanylýar:

Rp.	Fol	Menthae piperitae	20.0	(Narpyzyň ýapragy)
	Rad.	Valerianae	10.0	(Waleriananyň köki)
	Fol.	Trifolii	20.0	(Üç ýaprakly wahtanyň ýapragy)
	Strobuli	Lupuli	10.0	(Hmeliň miwesi)

M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly we bir bulgur demlemäni günüň dowamynda içmeli. Bejerginiň dowamlylygy 2-3 hepde.

Rp.	Fol	Menthae piperitae	30.0	(Narpyzyň ýapragy)
	Rad.	Valerianae	40.0	(Waleriananyň köki)
	Flor.	Convallariae	10.0	(Landyşyň gülleri)
	Fruct.	Foeniculi	20.0	(Arpabadyýanyň miwesi)

M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly we j bulgurdan günde 1-2 gezek içmeli. Bejerginiň dowamlylygy 2-4 hepde.

Rp.	Fol.	Menthae piperitae	30,0	(Narpyzyň ýapragy)
	Herb.	Leonuri	30,0	(Şirguýrugyň oty)
	Rad.	Valerianae	20,0	(Waleriananyň köki)
M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly we S bulgurdan günde 3 gezek nerwi dartgynlygynda, gyjyndyryjlykda, ukysyzlykda içmeli.				

Rp.	Rad.	Valerianae	20,0	(Waleriananyň köki)
	Herb.	Leonuri	25,0	(Şirguýrugyň oty)
	Fruct.	Carvi	25,0	(Tminiň miwesi)
	Fruct	Foeniculi	25,0	(Arpabadyýanyň miwesi)
M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly we S bulgurdan günde 3 gezek nerw dartgynlygynda, howsalada, ýürek çalt uranda içmeli				

Rp.	Rad.	Valerianae	30,0	(Waleriananyň köki)
	Fol.	Menthae piperitae	30,0	(Narpyzyň ýapragy)
	Flor.	Chamomillae	30,0	(Çopantelpеgiň gülleri)

M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly we S bulgurdan günde 2 gezek nerw dartgynlygynda, howsalada içmeli.

Rp.	Herb.	Equiseti	20,0	(Meýdan kyrkbogunynyň oty)
	Herb.	Polygoni avicularis	30,0	(Kyrk bogunyň oty)
	Flor.	Crataegi	50,0	(Alyjyň gülleri)

M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly we 1/3 – j bulgurdan günde 3-4 gezek ýürek çalt uranda, gyjyndyrmada we ukysyzlykda içmeli.

Rp.	Rad.	Valerianae	30,0	(Waleriananyň köki)
	Herb.	Leonuri	30,0	(Şirguýrugyň oty)
	Herb.	Millefoli	20,0	(Boýbodраныň oty)
	Fruct.	Anisi	20,0	(Anisiň miwesi)

M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly we 1/3 – j bulgurdan günde 2-3 gezek ýürek ulgamynda agyry peýda bolanda içmeli.

Gipo we gipertoniýa görnüşli neýrosirkulýator distoniýalar. Gan damarlarynyň tonusynyň üýtgemekligi sebäpli ýüze çykýan gipotoniýa ýa-da tiz geçýän, ýokary bolmadyk, esasan hem sistoliki gipertoniýa köplenç ýüregiň newrozy bilen gabat gelýär ýa-da gan-damar distoniýa we neýrosirkulýator sindrom diýilip özbaşdak ähmiýete eýe bolýar.

Gipotoniýa görnüşli neýrosirkulýator distoniýa köplenç ýaş adamlarda duş gelýär. Birlenji hem-de ikilenji neýrosirkulýator distoniýanyň görnüşleri tapawutlandyrylýar.

Bejerilişi: toplumlaýyn bolmalydyr. Ýüregiň newroz-ynda bellenilýän serişdelerinden başga ösümlik neýrostimulýatorlar bolan henşen köki, lewzei ekstrakty, zamanihanyň tinkturasy, araliniň, eleuterokokk ekstrakty, saparal ulanmaklyk hem göz önünde tutulýar.

Henşen köki nahardan öň spirtli tinkturasynyň 15-25 damjasyny, günde 3 gezekden ýa-da 0,15-0,3 g günde 3 gezekden bellemeli. Bejerginiň dowamlylygy 2-4 hepde.

Leweyiň ergin ekstrakty 20-30 damjadan, günde 2-3 gezek bellenilýär

Eleuterokokkanyň ergin ekstrakty gurplandyryjy serişde hökmünde nahardan ýarym sagat öň 2 ml. 2-4 hepdeläp kabul edilýär.

Zamanihanyň tinkturasy - täsiri henşeniňki bilen meňzeş bolanlygy sebäpli merkezi nerw ulgamyny sazlaşdyryjy serişde hökmünde, gipotoniýada 30-40 damjadan, günde 2-3 gezek nahardan öň bellenilýär.

Araliniň tinkturasy gipotoniýada bellenilýär. Nerw oýanyjylygynyň ýokarlanmagynda, ukysyzlykda ulanmaklyk bolmaýar.

Sapara - newrozlarda, gipotoniýada gurplandyryjy serişde hökmünde ulanylýar. Nahardan soň 0.05 g, ertirine we agşamyna bellenilýär. Ukysy bozulan adamlara agşamyna bellenilmeli däl. ýokarlanan gyjynyjylykda, giperkinezlerde, garaguşagyryda bu serişde ulanylmaly dädir.

Rp. Rad. Rhodiola roseae 20,0 (Gülün rodilanyň köki)

Rad. Echinopanax 20,0 (Zamanihanyň köki)

Fruct. Rosae 20,0 (Itburunyň miwesi)

Fol. Urticae dioicae 15,0 (Çit-çitiniň ýapragy)

Fruct. Grataegi 15,0 (Alyjyň miwesi)

Herb. Hyperici 10,0 (Jerebaýyň oty)

M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly we 1/3 – S bulgurdan günde 2-3 gezek içmeli. Gurplandyryjy we immun ulgamy ýokarlandyryjy serişde

Rp. Rad. Araliae mandshuricae 15,0 (Araliniň köki)

Rad. Leuzeae 15,0 (Lewzeiniň köki)

Fruct. Grataegi 15,0 (Alyjyň miwesi)

Fruct. Rosae 15,0 (Itburunyň miwesi)

Flor. Galendulae 10,0 (Dyrnaklyjanyň gülleri)

Herb. Bidentis 10,0 (Üç bölek goşa dişiň oty)

Fruct. Aroniae melanocarpae 10,0 (Rýabinanyň miwesi)

recens

Fol. Plantaginis 10,0 (Atgulagyň ýapragy)

M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly we 1/3 – 1/4 bulgurdan günde 3 gezek içmeli. Gurplandyryjy we immun ulgamy ýokarlandyryjy serişde.

Gipertoniýa görnüşli neýrosirkulýator distoniýa.

Köplenç emosiýasy durnuksyz ýaş adamlarda duş gelýär. ýüregiň çalt urmagy, kelläniň ýeňsesiniň we çekge böleginiň lorsuldap agyrmagy bulara mahsus alamatdyr. Gan basyşynyň derejesi 165/90 mm. sim. st. çenli ýokarlanýar. Näsaglarda rahatsyzlyk, dartgynlyk hemişelik gorky we howp duýgulary bolýar.

Bejergi esasan hem başlangyç mehanizmi aradan aýyrýan sedatiw terapiýany geçirmekden ybarat bolup durýar. Ilkinji bilen näsaglara waleriananyň kökünden demleme çaýyny bermeli. Sebäbi ony uzak wagtlap içip bolyar hem-de onuň ýakymсыз täsiri ýok. Waleriananyň kökünüň çaýy kelle beýniniň gabygynyň oýanyjylygyny peseldýär, wegatatiw nerw ulgamynyň işini sazlaýar. Waleriananyň kökünüň çaýyny onuň 10-15 g. ownadylan kökünü we porrugyny 200 ml. doly gaýnan suw bilen, agzy yapyk gapda demlenilýär. Indiki gün süzüp almaly we 30 ml. günde 3 gezekden nahardan öň içmeli. Näsaglaryň özüni duýuşlaryna görä serişdäniň mukdary köpeldilip ýa-da azaldylýp biliner.

Waleriananyň täsirine meňzeş täsiri sirguýrugyň oty hem ýüze çykarýar. 15 g. 1 bulgur suwa salynyp demleme taýýarlanylýar. Bulguryň j bölegini günde 3-4 gezekden nahardan 30-60 min öň içilýär. Arterial basyşy peseldiji, rahatlandyryjy, kelle agyryny, ýüregiň çalt urmasyny aýryjy häsiýeti şu aşakdaky ösümlik ýygyndysy ýüze çykarýar.

Rp.	Herb.	Gnaphalii uliginosi	15,0	(Keçegüliň oty)
	Herb.	Astragali	20,0	(Göweniň oty)
	Herb.	Melilotus	20,0	(Eşek ýorunjanyň oty)
	Herb.	Equiseti	20,0	(Meýdan kyrkboguny)

M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly we 1-2 nahar çemçesi mukdarda, günde nahardan soň 2-3 gezek içmeli.

Rp.	Rad.	Valerianae	25,0	(Waleriananyň köki)
	Herb.	Leonuri	25,0	(Şirguýrugyň oty)
	Fruct.	Carvi	25,0	(Tminiň miwesi)
	Fruct.	Foeniculi	25,0	(Arpabadyýanyň miwesi)

M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly we S bulgurdan günde 2 gezek nerw dartgynlygynda we howsalaly ýagdaýda ýürek çalt uranda içmeli.

Rp.	Flor.	Convallariae	10,0	(Landyşyň gülleri)
	Fruct.	Foeniculi	20,0	(Arpabadyýanyň miwesi)
	Fol.	Menthae piperitae	30,0	(Narpyzyň ýapragy)
	Rad.	Valerianae	40,0	(Waleriananyň köki)

M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly we 1/3 – j bulgurdan 3 gezekde günün dowamynda miokarditde içmeli.

Rp.	Rad.	Valerianae	20,0	(Waleriananyň köki)
	Flor.	Chamomillae	30,0	(Çopan telpegiň gülleri)
	Fruct.	Carvi	50,0	(Tminiň miwesi)

M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly we S bulgurdan günde 2 gezek, nerwi dartgynlygynda, howsalaly ýagdaýda, ukysyzlykda içmeli.

Rp.	Flor.	Chamomillae	20,0	(Çopan telpegiň gülleri)
	Fol.	Menthae piperitae	20,0	(Narpyzyň ýapragy)
	Rad.	Valerianae	20,0	(Waleriananyň köki)
	Fruct.	Foeniculi	20,0	(Arpabadyýanyň miwesi)
	Fruct.	Carvi	20,0	(Tminiň miwesi)

M.F.spec. D.S. 1 nahar çemçe 1 bulgur suwda 10 min gaýnatmaly we 1-2 bulgurdan ertirine, 1 bulgurdan agşamyna ukysyzlykda içmeli.

Rp.	Fruct.	Carvi	20,0	(Tminiň miwesi)
	Fol.	Vincae minoris	10,0	(Kiçi barwinogyň gülleri)
	Rad.	Valerianae	20,0	(Waleriananyň köki)
	Flor.	Crataegi	20,0	(Alyjyň gülleri)
	Herb.	Visci albi	30,0	(Ak omelanyň oty)

M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly we 1/3 – j bulgurdan günün dowamynda birnäçe gezekde içmeli.

Rezerpiniň hem sedatiw täsiri bardyr. Bu maksatlar üçin ony 0.1 g. günde 1-2 gezek ýa-da 0.25 g. ýatmazdan öň belleýärler.

Ateroskleroz

Ateroskleroz - arteriýa gan damarlarynyc diwarlarynda ýag ýygnanmaklygy netijesinde birleşdiriji dokumalaryc ösüp, onun galcamagy, zaýalanmagy sebäpli bolup geçýän dowamly

keseldir. Şeýlelikde lipidleriň çalşygy bozulyp, gan damarlary dykynlanyp daralýar.

Aterosklerozy fitoserişdeler bilen bejermegic kliniki farmokologiýasy ýeterlik öwrenilmedik. Holesteric gana soruluşyny peseltmek üçin hem-de onuc endoteliýalara geçmekligine päsgel bermeklik üçin şu aşakdaky ösümlik ýygnyndylaryny bellemek bolýar:

Rp. Flor.	Crataegi	15,0	(Alyjyň gülleri)
Herb.	Equiseti	15,0	(Meýdan kyrk bogunynyň oty)
Herb.	Visci albi	15,0	(Ak omelanyň oty)
Fol.	Vincae minor	15,0	(Barwinogyň ýapragy)
Herb.	Millefolii	30,0	(Boýbodranyň oty)

M.F. spec.D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly.
Bir bulgury owurtlap günüc dowamynda içilýär. 1,5-2 aýlap bejergi bellenilýär. Arakesmänic dowamlylygy hem 1-2 aýa dec.

Rp. Flor.	Arnicae	5,0	(Arnikanyc gülleri)
Herb.	Millefolii	20,0	(Boýbodron oty)
Herb.	Hyperici	25,0	(Jerebaýyň oty)

M.F. spec.D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly.
Ösümlik ýygnyndysynyc demlemesi holesterinic mukdaryny sazlaýar. Bir bulgur demlemäni owurtlap günüc dowamynda içýärler.

Gipertenziýlarda we angiospazmalarda, gan-damar geçirijiligini sazlamak maksady bilen şu ýygnyndy ulanylýar.

Rp. Fruct.	Carvi	10,0	(Tminic miwesi)
Fol.	Vincae minoris	10,0	(Kiçi barwinkanyc ýapraklary)
Flor.	Crataegi	20,0	(Alyjyc güli)
Herb.	Visci albi	30,0	(Ak omelanyň oty)

M.F. spec.D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly. Günde iki bulgur demleme içilýär.

Dislipidproteidemiýa hem-de gan damarlarynyc geçirijiligine şu aşakdaky ýygnyndylar täsir edýär:

Rp. Fruct.	Fragaria vesca	5,0	(Ýer tudanasynyň miwesi)
------------	----------------	-----	--------------------------

Herb.	Eduiseti	10,0	(Meýdan kyrkbogunynyň oty)
Herb.	Hyperici perfor	10,0	(Jerebaýyň oty)
Fol.	Farfarae	10,0	(Eje we ejeligiç ýapraklary)
Sem.	Anethi	20,0	(Şebitic tohumy)
Herb.	Gnaphalii	30,0	(Batgaly keçeýülün oty)
Herb.	Leonuri	30,0	(Şirguýrugyc oty)

M.F. spec.D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly. Demlemäniň 2/3 bulgur mukdaryny günde 3 gezek nahardan ön kabul edilýär. Bejerginici dowamlylygy

1 S -2 aý.

Gipoholesterinemiki serişde hökmünde polisponin dioskoreýanyň porrugundan we köklerinden edilen gury ekstrakty ulanylýar. Gerdejik görnüşinde 0,1-0,2 g. nahardan soc, günde 2-3 gezekden içilýär. Dowamlylygy 20-30 gün bolup 7-10 günläp arakesme etmeli. Şeýle bejergini 3-4 aýlap geçirmeli.

Aterosklerozda sarymsagyc tinkturasy hem ulanylýar. 250 g sarymsagy arassalap 1 litr 40% etil spirtinde 30°C gyzgyn görkezijili, garaňky otagda 14 gün goýmaly. Soňra süzüp, onuň 20 damjasyny 1 bulgur süýde damdyryp, günde 2-3 gezekden içilýär.

Düýp soganyç spirtde ýatyrylan çykyndysy – allilçep hem 20-30 damjadan, günde 3 gezekden, 3-4 hepdeläp içilýär.

Dowamly karonar damar ýetmezçiligi. Karonar damarlaryç aterosklerozy sebäpli döreyän, esasy kliniki ýüze çykmalary stenokardiýa bolup durýan ýüregic karonar damarlarynyc ýetmezçiligi, ýüregic işemiki keselinic (ÝIK) ic köp ýaýran görnüşi bolup durýar.

Dowamly karonar damar etiniň kemçiligini bejermegic toplumlaýyn çäreleriniç düzüminde aterosklerozyc betereleşmeginic öcünü alyjy, ony bejeriji, hem-de kislorod decagramlygyny sazlaýjy ýa-da karonar damar gan aýlanyşygyny köpeldiji serişdeler bolmalydyr. Köp sanly dermanlar toplumlaýyn täsir edýär.

Her bir näsagyc bejergisinde onuc umumy ýagdaýy, karonar damar ýetmezçiliginiç derejesi, ýürek ýetmezçili-

ginic alamatlary, serişdeleric täsirinic mehanizmleri göz öcünde tutulmalydyr.

Stenokardiýanyç tutgaýynyc öcünü almak üçin, karonar damarlarynyc newrozlardaky spazmalarynda pasternagyc tohumyndan alynýan serişde bolan pastinasin ulanylýar. Ol 0,02 g günde 2-3 gezekden nahardan öc bellenilýär. Terapewtiki netije 2-5 günden socra ýüze çykýar. Bejerginic dowamlylygy 2-4 hepde.

Alyjyc güllerinden we miwesinden, hem-de ak omelanyň otyndan taýýarlanan serişdeleri hem gicden ulanylýar. Alyjyc güllerinden taýýarlanan demlemänic S bulguryny günde 2 gezekden içilýär. Bejerginic dowamlylygy 3-4 hepde.

Stenokardiýanyç ýecil görnüşlerinde karonar damarlarynyc spazmasynyc öcünü almak üçin dag innewinden alynan preparat orangelin ulanylýar. Nahardan 30 min öc, 0,1-0,4g, günde 2-4 gezek bellenilýär. Bejerginiň dowamlylygy 2-3 aý.

Ýürek urgysynyc yzygiderliginic (ritminic) bozulmagy. Ýürek urgysynyc yzygiderliginic bozulmagy- kardiologiýanyç özbaşdak we wajyp bölegi bolup durýar. Aritmiýalar ýürek, gan-damar kesellerinic dürli görnüşlerinde (ÝIK, miokardit, miokardiodistrofiýa, miokardiopatiýa) duş gelmek bilen köplenç ýüregic, gan aýlanşygynyc ýetmezçiligini ýüze çykarmak bilen zähmet, durmuş meselelerinic çylşyrymlaşmagyna getirýär.

Mersatel aritmiýany we paroksizmal tahikardiýany bejermekde goşmaça fitoterapewtiki serişde hökmünde alyjyc miwesi ulanylýar. Onuc suwuk ekstrakty 20-30 damjadan, nahardan öc, günde 3-4 gezekden ýa-da tinkurasy 20 damjadan, günde 3 gezek bellenilýär.

Funksional newrotiki ýagdaýlar bilen baglanşykly ekstrasistoliki aritmiýalarda mikstura hem görkezilendir: Waleriananyň we landyşyň tinkurasynyň her birinden 10,0 we alyjyň ergin ekstraktynyň 5,0; Mentol 0,05. Bu serişdäniň 20-25 damjasyny 2-3 gezekden içilýär. Ukynyc sazlanylmagy, onuc çuclygyny we dowamlylygyny sazlamagyc hem

ähmiýeti örän ulydyr. Bu maksatlar üçin şu aşakdaky ösümlük ýygýndylary ulanylýar:

Rp. Fol. Trifolii fibrini 30,0 (Wahtanyc ýapraklary)
 Fol. Menthae piperitae 30,0 (Narpyzyň ýapraklary)
 Rad. Valerianae 30,0 (Waleriananyň köki)
 M.F. spec.D.S. 1 nahar çemçe ýygýndyny 1 bulgur gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly. Demleme ukydan 1 sagat öc, 1 bulgyr içilýär

Rp. Cort. Frangulae 40,0 (Garatikenin gabygy)
 Flor. Chamomillae 40,0 (Çopantelpeginiň gülleri)
 M.F. spec.D.S. 1 nahar çemçe ýygýndyny 1 bulgur gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly. Agşam 1-2 bulgur demleme içilýär.

Rp. Fol. Trifolii fibrini 20,0 (Wahtanyc ýapraklary)
 Fol. Menthae piperitae 20,0 (Narpyzyc ýapraklary)
 Rad. Archange 30,0 (Dýagelic köki)
 Rad. Valerianae 30,0 (Waleriananyň köki)
 M.F. spec.D.S. 1 nahar çemçe ýygýndyny 1 bulgur gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly. Demlemäni bulguryc 1/3 bölegini günde 3 gezekden içilýär

Rp. Flor. Chamomillae 25,0 (Çopantelpeginiň gülleri)
 Fol. Menthae piperitae 25,0 (Narpyzyň ýapraklary)
 Fruct. Foeniculi 25,0 (Arpabadyýanyň miweleri)
 Rad. Valerianae 25,0 (Waleriananyň köki)
 Fruct. Carwi 25,0 (Tminiň miwesi)
 M.F. spec.D.S. 1 nahar çemçe ýygýndyny 1 bulgur gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly. Bir bulgur demlemäni agşamyna içmeli.

Dowamly ýürek ýetmezçiligi. Gan aýlanyşygynyň ýetmezçiligi – bu ýürek, gan – damar ulgamynyň bedeniň agzalaryny we dokumalaryny ýeterlik derejede gan mukdary bilen üpjün edip bilmezligidir. Gan aýlanyşygynyň ýetmezçiligi şu aşakdaky alamatlar toplumy bilen häsiýetlendirilýär: dem gysmagy, tiz ýadamaklyk, çiş ýöremekligi, esasanda aýaklaryň çişmegi, gögermeklik, ýürek urgysynyň güýçlenmegi.

Ýürek ýetmezçiliginiň bejergisi etiologiki we patogenetiki bejeriş çärelerini göz önünde tutýar. Berhiz tutmaklyk, suw

içmekligi, duzuň mukdarynyň kemelmegi, dümew we beýleki keselleriň önüniň alynmagy hem wajypdyr.

Etiologiki we patogenetiki bejergilerine seretmezden gan aýlanyşygynyň ýetmezçiligine täsir edýän, onuň beterleşmegine päsgel berýän serişdeler ulanylýar. Bu serişdelere ýürek glikozidleri, strofantiň glikozidi we deniz soganynyň glikozidi degişlidir.

Ýürek glikozidleri ýürek ýetmezçiligini bejeriji esasy patogeniki serişdedir. Bu serişdeler ýüregiň dekompensasiýa döwründe işjenlik ýagdaýlaryny gowylandyryrlar. Olaryň täsiri bilen miokard öňki işinden köp işi ýerine ýetirmäge ukyply bolýar we gan aýlanyşygynyň ýetmezçiliginiň alamatlaryny aýyrýar.

Ýürek glikozidleriniň täsiriniň mehanizmleri we bejergi ýollary. Ýürek glikozidleri örän köp mukdarda digitalisň ýapraklarynda, strofantiň tohumlarynda, deňiz soganynda, landyşyň otynda, adoniziň güllerinde we oleandranyň ýapraklarynda saklanylýar.

Bejergi mukdarynda ýürek glikozidleri miokardyň hemme ýerine ýetirýän işini ýygrylyjylygyny, oýanyjylygyny güýçlendirmek bilen we sinus awtomatizmini we geçirijiligini peseldýär.

Ýürek glikozidleriniň terapewtiki mukdary ýürek öňüniň etiniň antrowentrikulýar düwüniň, garynjygyň geçiriji ulgamynyň awtomatizm ukybyny peseldýär, a zäherli mukdarda ýokarlandyryr. Bu bolsa ýürek glikozidleri köp mukdarda ulanylanda ýürek urgysynyň köp görnüşli bozulmalaryna getirmegi mümkin.

Ýürek glikozidleriniň uly toksiki mukdarda oýanyjy-lygyny ýokarlandyrmak ükyby miokarda erbet täsir edýär, bu bolsa ýekeleýin ýa-da toparlaýyn ekstrosistoliýalaryň peýda bolmagyna getirip biler. Jedelli we şol bir wagtda wajyp soraglaryň biri hem digitalis serişdeleriniň YSK näsaglarda ulanmak mümkinçilikleridir. Häzirki döwürde glikozidleriň terapewtiki mukdarynyň karonar damar arteriýalaryny daraldyjy täsir etmeýändigini subut edildi. Bu netijäniň uly

amaly ähmiýeti bar, sebabi gan aýlanyş ýetmezçiligi, YSK döredýän kardioskleroz bilen esaslanandyr.

Ýürek glikozidleri ulanylanda diurezin ýokarlanmagy onuň kardiotoniki täsiri we gemodinamikanyň gowylanmagy bilen baglanşyklygydyr, sebäbi olar böwrek akabajyklaryna göni täsir etmeýärler.

Arterial we wena basyşlaryna hem ýürek glikozidleri göni täsir etmeýärler. Basyşyň üýtgemegi hem olaryň kardiotoniki täsiri bilen baglanyşykly.

Glikozidleriň täsiri bilen öýken arteriýalarynda basyş peselýär, gan aýlanyş mukdary bolsa artýar.

Glikozidler bilen bejermeklik garyn boşlugyndaky damarlaryň daralmagyna we bagyrda, portal ulgamynda ganyň göwrüminiň azalmagyna getirýär.

Lantozid – nowogalen serişdesi, digitalisiň ýapraklary-ny spirtde ýatyrylyp alynan, glikozidleriň toplumyny öz düzüminde saklaýar. Ol 15-20 damjadan günde 2-3 gezekden içilýär. Bejeriji täsiri 5-6 günden ýüze çykýar, soňundan goltgy mukdaryna geçilýär. Dispeptiki hadysalar ýüze çykanynda lantozidi mikrokliзма görnüşinde (20 ml natriniň hloridiniň izotoniki erginine 20-30 damjadan goşmaly) hem bellenilýär. Selanid wenanyň içine goýberilende edil strofantin ýaly tizlikde täsir edýär, emma bradikardial täsiri ondan hem güýçlidir. Tiz bejeriji netije almaklyk üçin wenanyň içine 0,2-0,4 mg (0,02% - erginiň 1-2 ml) günde 1-2 gezekden goýberilýär. Asetildigitoksin 0,02 mg gerdejik görnüşinde, 0,01% ergin (0,1 mg 1 ml-de) görnüşinde göýberilýär. İçmek üçin ilkinji 3-5 güni 0,4-0,8 mg/gg (2-4 gerdejik 0,2 mg) bellenilýär, soňundan goltgy mukdaryna geçirilýär (1-2 gerdejikden). Wenanyň içine 0,01% ergini 2-4 ml-den haýaldan ýa-da 5% glýukozanyň ergininde damjalap göýberilýär. Bejeriş netijesi alynandan soňra, içmeklige geçilýär. Digoksin güýçli sistoliki täsir edip, ýürek urgusyny haýalladýar. İçilende ocat sorulýar. Kardiotoniki netije 1-2 sagatdan soňra ýüze çykýar we 8 sagadanyň içinde özünic

ýokary derejesine ýetýär. Wena göýberilende täsiri 20-30 minutdan ýüze çykyp, ýokary derejä 3 sagatdan ýetýär.

Içmeklik üçin digoksin ilkinji güni 0,25 mg (1 gerdejik) 4-5 gezekden belleniýär. Socky günleri 0,25 mg. dan günde 1-3 gezek belleniýär. Mukdaryny her günde gan basyşyna pulsyc ýygylgyna, peşewiň bölünip çykyşyna, dem alyşyc ýygylgyna baglylykda täzeden kesgitlemeli. Goltgy mykdary doly digitalizirmek üpjün edileninden socra her günde ýa-da gün bökdürüp 0,25 mg barabardyr.

Sanjym üçin digoksiniň 1-2 ml 0,025% ergini ulanylýar; 10 ml 5% glýukozanyc ergininde ýuwaşdan göýberilýär. Damjalap göýbermeklik üçin 1-2 ml 0,025% ergini 5% glýukozanyc 100 ml erginine garyp, her minutda 20-40 damjadan göýberilýär.

Digitoksin – gyrmyzy digitalisiň ic işjec glikozidi. Göýberiliş görnüşleri: gerdejik 0,0001 g (0,1mg) we şem 0,00015 g (0,15 mg).

Adatça günde 5-6 gerdejikden başlap, bejeriş netije gazanylanyndan socra olaryň sanyny 1-2 gerdejige çenli peseldilýär, socra goltgy mukdaryna geçilýär (1-1/2 gerdejikden günde 2-1 gezekden ýa-da 1-2-3 günleri bökdürilip) belleniýär.

Kordigit – digitoksin bilen deçeşdirilende az ýygnanma häsiýetli. Göýberiliş görnüşleri: gerdejik 0,8 mg-dan, we şem 0,8 mg we 1,2 mg kordigit saklaýar.

Deciz soganynyc ýürek glikozidi bolup prossillaridin A (talusin) durýar. Digitalizasiýa maksatlary üçin günic dowamynda 0,5 mg günde 3 gezekden belleniär. Günde 4 gezekden 0,2 mg içilende terapewtiki netije 4-5-nji günleri ýüze çykýar. Goltgy mukdary bolup günde 3 gezekden 0,25 mg bolup durýar.

Strofantin K – ösümlüklerden alynýan çig mal bolup durýar (kendirleric dürli görnüşli).

Strofantin serişdeleri örän az mukdarda garyn-ıçege ýollarynda sorulýar, şonuc üçin onuc esasy ulanyş ýoly wenanyc içine göýbermekdir. Wena göýberiş doly mukdary

bolup 0,8-0,9 mg durýar, şonda gündeki eleminasiýasy bolup – 50% - tutup durýar.

Wenanyc içine göýberilende strofantin 5-10 min soň täsir edip başlaýar, 2-3 sagatdan özüniç ýokary derejesine ýetýär, polojitel inotrop täsiri 6-8 sagatlap saklanýar.

Strofantini ulanmagyç görkezmesi gan aýlanyşygynyc ýiti ýetmezçiligi bolup durýar, esasanda digitalisiň serişdelerini kabul edilip bilinmeýän ýagdaýlary bolýar. Wenanyc içine göýberilýän adaty mukdary 0,05% ergini 0,25-0,5 ml bolup durýar, garrylarda 0,125 ml dec. Strofantin sanjymdan öc hökmany suratda 5%-20%-40%- glýukozanyc ergininic 10-20 ml garylýar. Bolmasa-da natriý hloridinic izotoniki ergininde garylýar we örän haýal göýberilýär (5-6 min dowamynda). Bir sanjymdan, seýrek hem günde 2 sanjymdan belleniýär. Digialisiň serişdeleri bilen bejergi alynandan socra strofantini 24-42 sagat geçirilip belleniilmelidir.

Strofantyny tinkturasy – uly adamlara gan aýlanyşy-gynyc ýetmezçiliginiç başlangyç döwürlerinde 5-8 damjadan günde 2-3 gezekden belleniýär. Dilic daş-töweregine damdyrylýan miksturanyň güýçli derejede täsiri bardyr. Onuň düzümine strofantyc tinkurasynyň 6,0 , Nitroglyseriniň 0,5% ergini we Menthol 0,4 girýär. Bu mikstura 7 damjadan süýjä damdyrlyp, günde 6-7 gezekden peýdalanylýar. Strofantinic täsirine örän golaý häsiýetli bolup maý landyşynyc glikozidi bolup durýar.

Korglikon täsir ediş tizligi boýunça strofantinden kem durmaýar, emma netijeliligi pes. Korglikonyc 1 ampulasy (1 ml, 0,06% ergin), strofantinic 0,2 mg (0,4 ml, 0,05% ergin) dec bolup durýar. Terapewtiki derejesini saklamaklyk üçin, günde 2 gezek sanjym edilýär.

Korglikon 0,5-1 ml günde 2 gezekden 10-20 ml 20% ýa-da 40% glýukoza ergininde hem-de natriý hloridic ergininde wenanyc içine göýberilýär.

Landyşyny tinkturasy – taýyn derman görnüşleric düzümine girýär we köplenç ýürek işjecliginic işiniň bozulmalarynda ulanylýar.

Konwallýatoksin – wenanyc içine goýberlende örän tiz we güýçli täsiri ýürek, gan-damar ulgamyna ýetirýär. Täsiric netijesi eýýäm 5-10 minutdan soň ýüze çykýar we 1-2 sagatdan ýokary derejä ýetip, 20-22 sagatlap dowam edýär. Ic ýokary mukdary wenanyc içine goýberilende 0,45 mg, gaty agyr ýagdaýlarda – 0,6 mg çenli bolup durýar. Ony 10-20 ml 20% glýukozanyc ergininde ýa-da natriý hloridiniň izotoniki ergininde 5-6 min dowamynda goýberilýär.

Gan aýlanyşygynyc ýetmezçiligini başlangyç döwründe, esasanda dowamly öýken keselleri sebäpli ýürek kesellerinde ýaz adoniziniň otynyc serişdeleri hem ulanylýar. Bu ösümligic ýapraklaryndan hem-de güllerinden adonitoksin we simarin atly ýürek glikozidleri alynýar.

Ýaz adoniziniň otynyc demlemesi: 4-6 g– 200 ml suw bilen taýýarlanylýar, digitalise meczeş täsir edýär, böwregic gan aýlanyşygyny, kiçi gan aýlanyşygy gowulandyrýar. Bir nahar çemçesi mukdarda günde 3-6 gezek bellenilýär.

Adonizid - ýaz adoniziniň glikozidlerini suwdaky ergini: Gan aýlanyşygynyc ýetmezçiligini başlangyç döwürlerinde we wegatodamar newrozlarda 20-40 damjadan 2-3 gezek bellenilýär.

Ýürek ýetmezçiligini bejermeginic ikinji ugry hem peşew kowyjylaryň ulanylmagydyr.

Diuretikler bellenende olaryc täsirini mehanizmini, dowamly gan aýlanyşygynyc kliniki geçişini, suw – elektrolit çalşygynyc bozulma derejelerini göz öcünde tutmaly.

Köp sanly sintetiki (etakrin turşusy, diakarb) peşew çykaryjy serişdelerini bardygyna seretmezden gan aýlanyşygynyc ýetmezçiligini bejermekde ösümlük peşew çykaryjy serişdeleri hem öz ähmiýetlerini ýitirenok.

Peşew çykaryjy täsiri köp sanly ösümlüklerde bardyr. Ic ýokary derejeli täsirli lere berýozanyc ýapraklary, meýdan kyrkbogunynyň oty, badyýanyň köki degişlidir.

Ösümlük peşew çykaryjy serişdeleric esasy ýetmezçiliklerini biri hem olaryc demleme görnşinde içilip köp mukdarda suwuklyk içmeli bolýanlygydyr.

Berýozanyc ýapraklaryndan taýýarlanan demlemäni günde 2 bulgurdan içilýär. Meýdan kyrkbogunynyň otynyc demlemesi günde 1 bulgurdan içilýär. Badyýanyň kökünden taýýarlanan demlemäni gyzgyn wagtynda günde 125 ml içilýär. Peşew çykaryjy ösümlük ýygýndylaryndan şu aşakdakylary uzak wagtlap ulanmaklyga hödürlenýär:

Rp. Fruct. Juniperi 10,0 (Arçanyc miwesi)
 Fol. Betulae 10,0 (Berýozanyc ýapraklary)
 Rad. Taraxaci 10,0 (Tozganyc köki)
 M.F. spec.D.S. 1 nahar çemçe ýygýndy 1 bulgur gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly. Demlemäni 1 bulgury günic dowamynda içilýär.

Rp. Fol. Betulae 10,0 (Berýozanyc ýapraklary)
 Herb. Equiseti 10,0 (Meýdan kyrkbogunynyň oty)
 M.F. spec.D.S. 1 nahar çemçe ýygýndy 1 bulgur gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly. Bulgury 1/3 bölegi mukdardaky demlemäni günic dowamynda içmeli.

Çiş döräninde we assitlerde şu aşakdaky ýygýndylar bellenilýär

Rp. Fol. Betulae 50,0 (Berýozanyc ýapraklary)
 Fruct. Rosae 25,0 (Itburunyc miwesi)
 Rad. Ononidis 25,0 (Meýdan polatlynyc köki)
 M.F. spec.D.S. 1 nahar çemçe ýygýndy 1 bulgur gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly. Demlemäni 1 bulgury günic dowamynda içilýär. Bu demleme göwrelilik, böwregic ýiti gaýnaglamasy, peşew çykaryjy ýollaryc gaýnaglamasy kesellerinde bellenilmeli dälär.

Şonuc ýaly-da peşew çykarmany kryjownigic miwesi, ýer tudanasy, zirk, kädinç çigidi, şebit, gawun, armyt, limon, mekge gupagy, garpyz, turp we onuc bal bilen garyndysy ýokarlandyrýarlar.

Guryagyry

Guryagyry - bu genetiki ýygynçylygy bolan adamlaryc A topara degişli β gemolitiki streptokokklaryc ýokuşmagy we sensebilizasiýasy netijesinde döreyän birleşdiriji dokumalarynyc ulgamlayyn gaýnaglama keselidir. Häzirki lukmançylyk ylmy tarapyndan ýiti, ýitileşýän, uzaga çekýän, üznüksiz gaýtalanýan we latent guryagyrylaryň patogenetiki aýratynlyklary öwrenildi. Guryagyryly näsaglaryc garyndaşlarynda ýa-da ekiz taýlarda köp duşmagy bu keselic döremeginde genetiki täsirleric ähmiýetini bardygyny görkezýär. β gemolitiki streptokokk bilen ýokuşmaklyk, onuc bilen sensebilizirlen-meklik keselic ilkinji döwürlerinde has-da aýdyc görünýar. Guryagyry köplenç miokardit, endokardit, seýrek erikardit ýaly ýüregic keselleri bilen gabat gelýär.

Karditden başga-da guryagyrynyň esasy kliniki ýüze çykması bolup poliartritiki sindromlar (alamat toplumlary) hyzmat edýär.

Guryagyryly endomiokardit: Ähli guryagyryly näsaglarda diýen ýaly miokardit bolýar. Ol ojaklaýyn ýa-da ýaýrac (eksudatiw ýa-da produktiw häsiýetli) gaýnaglamanyc görnüşlerinde bolup bilýär. Ojaklaýyn hadysalar görnüp duran eksudatiw hadysalaryc ýok bolmagynda geçýär. Miokarditic ýiti döwründe kliniki ýüze çýkmagy onuc görnüşlerine baglydyr. Ýecil görnüşlerinde näsaglarda tiz ýadamaklyk, işjecligic peselmegi, ýüregic üstünde ýakymysz duýgynyc döremegi, ýüregic çalt urmagy ýüze çýkýar. Guryagyryly endokarditic kliniki alamatlary rewmatizmiň ýiti döwründe bildirilgisiz bolmagy hem mümkin. Emma muca seretmezden rewmatiki endokarditler gazanylan ýürek gabsalarynyc ýitmezçiligini döremeginic çaklanys görkezijilerini kesgitleýji bolup durýarlar. Endokarditic irki alamatlarync birine hem 3-4 hepdeden sonra, haçanda miokarditic alamatlary peselip başlandan ýürek diclenilende eşidilýän goşmaça şyggyldylar degişlidir.

Guryagyryly poliartriti. Bu kesel guryagyry bilen kesellän-leric 55%-de duş gelýär. Onuc esasy alamatlary bolup uly bogunlarda ýiti agyrynyc döremegi, bogunlaryc çişmegi, bogundan-boguna “göçüp” duran agyrylaryc bolmagy hyzmat edýär. Guryagyryly poliartridic esasy bolup periartikulýar dokumalaryc eksudatiw gaýnaglamasy bilen gabat gelýän sinowit tutup durýar. Onuc patomorfologiki alamatlary bolup, bogun boşluklarynda dürli maňyzly leýkositleri köp saklaýan, arassa, seroz-fibrinoz suwuklygyc bolmagy, periartikulýar dokumalaryc çişmegi we bogun suwuklyklarynda bolsa fibroz hadysalaryn kliniki ýüze çykmagy, olarda düwünjikeric emele gelmegi bolup hyzmat edýär.

Artralgiýa - guryagyrynyň esasy kliniki alamatydy-gyna garamazdan, näsaglaryc 1/3 böleginde duş gelýär. Artritlerden tapawutlykda artralgiýada bogunlardaky hereketleric çäklenilmegi, el bilen basyp görülende agyrmaklyk we ş. m. alamatlar bolmaýar.

Bejergisi: guryagyry endomiokarditleric bejergisi hem rewmatizmic bejergisi bilen birmenzeşdir. Ýiti döwründe adaty guragyra garşy bejergini geçirýärler. (penisillin, glukokortikosteroidler, salisilatlar). Strepto-kokklary aýyrmak üçin ösümlikden alynan derman serişdesi bolan romazulony hem-de bidenegiň ýapraklaryndan taýýarlanan demlemäni agyz çäýkamaklyk üçin ulanylýar. 1,5 çäý çemçesi ramazulony 1 litr suwda eredilýär we agyz çäýkalýar. Bidenegiň ýapraklaryň demlemesini (1 nahar çemçesi ýapraklary 200 ml. gaýnag suwda taýýarlanylýar) agyz çäýkamaklygy 7-10 günüc dowamynda her 3-4 sagatdan maslahat berilýär.

Keseliň ýiti döwründe öz düzüminde salisil birleşmelerini saklaýan we derlediji täsirli derman serişdeleriniň demlemeleri ulanylýar. Olara şular degişlidir:

Rp. Cort.	Frangulae	10,0	(Garatikenin gabygy)
Cort.	Betulae	40,0	(Berýozanyc gabygy)
Cort.	Salicis	50,0	(Serwi agajyn gabygy)

M.F. spec.D.S. 1 nahar çemçe ýgyndy 1 bulgur gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly. Onuc günde 2 bulguruny içmeli.

Rp. Flor.	Sambuci	30,0	(Gara buzinanyc gülleri)
Fol.	Urticae	30,0	(Iki öýli çit-çitinic ýapraklary)
Rad.	Petroselini	30,0	(Badyýanyc köki)
Cort.	Salicis	30,0	(Serwi agajyn gabygy)

M.F. spec.D.S. 1 nahar çemçe ýgyndy 1 bulgur gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly. Ony ýyly görnüşinde 2 bulgurdan günde 4-6 hepďäniň dowamynda içmeli.

Bogun görnüşli guryagyry hüjümlerde şu aşakdaky ösümlük ýygynyň belleniýär

Rp. Cort.	Salicis	20,0	(Serwinic gabygy)
Herb.	Eguiseti	20,0	(Meýdan kyrkbogunynyň oty)
Fol.	Betulae	20,0	(Berýozanyc ýapragy)
Flor.	Gentaurae cyani	5,0	(Gök daş kekräniň gülleri)
Flor.	Calendulae	5,0	(Dermanlyk dyrnaklyjanyc gülleri)
Fruct.	Juniperi	5,0	(Arçanyc miwesi)
Cort.	Frangulae	5,0	(Garatikenin gabygy)
Flor.	Sambuci	10,0	(Gara buzinanyc gülleri)
Fol.	Urticae dioicae	10,0	(Iki öýli çit-çitinin ýapraklary)

M.F. spec.D.S. 1 nahar çemçe ýgyndy 1 bulgur gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly. Demlemäni her 2 sagatdan 1 bulgurdan gyzygyn döwründe içmeli. Bu demlemäniň rahatlandyryjy, gyzygyny düşüriji, agyryny aýryjy, çişmä garşy täsirleri bardyr. Bejerginik dowamlylygy keselc geçişine bagly.

Bakteriýaly endokarditde fitoterapiýa goşmaça häsiýete eýedir hem-de içďäni açmaklyga, dezintoksikasiýa, witaminterapiýa, bedeni mikroelementler, demir bilen üpjün edilmeklige gönükdirilendir.

Içdäni açýjy hasiýete ýowşanyc 10,0 we narpyzyc 10,0 tinkturalary hem eýedir. 15-20 damjany suwa damdyrmak bilen, nahardan öc içilýär.

Düzüminde itburunc miwesini we gara smorodinanyň miwesini 1:1 gatnaşykda saklaýan hem-de itburunc miwesi bilen rýabinanyň miwesini 1:1 gatnaşykda çäýlary ulanylýar. Itburunc miwesi öz düzüminde askorbin turşysyny, K, P, B₂ vitaminlerini, A prowitaminlerini (karotin), süýjini, pektinleri, limon turşusyny, köp mukdarda kaliý, demir, margenes, fosfor, kalsiý duzlaryny saklaýar. Itburunc miwesindäki askorbin turşysynyc mukdary limon bilen deçeşdirenicde 50 esse köpdür. Gara smorodinanyň düzüminde askorbin turşusy, P, B, vitaminlerini we karotin bar. Rýabinanyň ýetişen miweleri köp mukdarda askorbin turşysyny hem-de organiki turşylary saklaýar. Vitaminli çäýiň taýýarlanylş usuly: miweleric 2 çäý çemçesini 2 bulgur gaýnaga goşmaly we 1 sagadyn dowamynda demini aldyrmaly, süzmeli we tagamyna baglylykda süýji goşmaly. Ýarym bulgurdan günüc dowamynda 3-4 gezek içmeli.

Ýolugan ýürek nogsanlary. Ýüregic şikesi diýilip sözügic manysynda ýüregic gabsajyklarynyc, myşsalarýnyn we onuc diwarlarynyc gurluşyndaky düri üýtgeşmelere we onuc netijesinde ýürek, içki gemodinamikanyc, gan aýlanylş ulgamynyc işiniň bozulmagyna aýdylýar. Dogabitdi hem-de ýolugan ýürek nogsanlary tapawutlandyrylýar. Dogylanyndan soc döreýän, ýagny ýolugan ýürek nogsanlary gabsajyklaryc gurluş üýtgemeleri degişlidir. Olaryc ýgy sebäplerinici biri bolup guryagyry, bakteriýaly endokardit, mergi we ateroskleroz bolup durýar.

Ýürek nogsanlarynyň bejergisi, etiologiki täsirleric, gan aýlanylşygynyc ýetmezçiligini, ýürek urgysynyc bozulmalaryny düzeltmeklikden ybarat bolup durýar.

Gipertoniki kesel we arterial gipertenziýalar. Arterial gipertenziýa- köp ýaşran keseldir. Köp sanly ilatyn gan basyşy ölçenilip görülende - barlananlaryc 20-30% gan basyşynyc derejesi ýokarydygy anyklanylýar. Arteriýal

gipertenziýaly adamlary tapgyrlaýyn barlanylyp görülmeginic netijesinde 65% gipertoniki keselli 35% simptomatiki gönüslileri anyklanydyr.

Arteriýal gipertenziýalaryn simptomatiki görnüşini anyklamagyc uly ähmiýeti bardyr. Böwrek arteriýalaryc zaýalanmagy, feohromositoma, konnanyc sindromy, aortanyň koarktasiýasy sebapli döreyän arteriýal gipertenziýalary hirurgiki usul bilen bejerilýär.

Gipertoniki keselinic sebäplerine ruhy dartgynlylyk, ruhy sarsgynlylyk bilen baglanyşykly arteial gan damarlarynyň tonusynyň bozulmagy degişlidir. Goşmaça sebäpler bolup maşgala-nesil täsirleri hyzmat edýär. Keselic esasy alamaty - arterial basyşyc ýokary galmagydyr. Häzirki dömirde 20-50 ýaş aralygyndaky adam üçin kadaly basyş diýilip 18,7/12,0 kPa (140/90 mm. sim. st.) hasap edilýär. Halkara saglygy goraýyş guramasynyc maglumatlaryna görä uly adamlar üçin aralyk gipertenziýanyc derejesi hökmünde 18,7/12,0 - 21,2/12,5 kPa (140/90-159/94 mm. sim. st.) hasap edilýär.

Gipertoniki keselinic geçişiniň şertli üç tapgyra bölünýär: I tapgyrda A/B derejesi 21,3/12,7 kPa (160/95 mm. sim. st.) dec bolýar we bu döwürde ýürek, gan-damar ulgamynda organiki üýtgemeler bolmaýar. II tapgyrda arteriýal basyşynyc derejesi örän ýokary bolup, çep garynjygyc gipertrofiýasynyc alamatlary ýüze çykýar. Emma beýleki agzalaryc işinic bozulma alamatlary bolmaýar. III tapgyrda gan basyşyc derejesi örän ýokary bolup ýüregic we beýleki beden agzalarynyc (kelle beýni, gözün torly gatlagy, böwregic uly gan damarlary) işinic bozulmagy bolýar.

Şonuc ýaly-da haýal hem-de tiz ösüji (çylşyrymly hilli) geçişli gipertoniki keseli bolýar. Bet hilli geçişde arteriýal basyşyc derejesi gaty ýokary bolýar (29,3/17,3 - 32,0/18,7 kPa ýa-da 220/130 - 240/140 mm. sim. st.), esasanda diastoliki basyşyc durnukly göterilmegi bolýar. Göz düýbinic torly gatlagynyc çişmegi netijesinde zaýalanmagy, görüş nerwlerinic zeperlenmegi, gemorragiki, plazmorragii,

anewrizmler hem-de böwregin damarlarynyc organiki üýtgemeleri duş gelýär.

Gipertoniki keselin ýüze çykmagynyc mehanizmleri barada durup geçmek bilen keselli hem-de sagdyn adamlarda gan basyşynyc sazlanýş mehanizmleric birmeczeşdigini aýtmalydyr. Gipertoniki keselde damarlaryc tonusunyc sazlanýşynyc wajyp neýrogumoral halkasynyc bozulýandygyny bellemelidir. Arteriýal basyşyc derejesini gomeostatiki görkeziji hökmünde bedenic talaplaryna bagly bolup, pressor we depressor tebigatly neýrogumoral ulgamlaryc işleýşine bagly bolup durýar. Gipertoniki keselic emele gelmeginic, onuc geçişinic umumy kanunalaýyklygynyc bardygyna garamazdan, her bir näsagda sazlaýyş mehanizmleric gatnaşyk derejeleri dürli bolup durýar. Läbil, ýagny durnuksyz gipertoniýada renin-angiotenzin ulgamynyc ýagdaýy köp tarapdan simpato-adrenal ulgamynyc täsirine bagly bölýar. Stabil, ýagny durnukly tapgyrynda damarlaryc wazokonstruktor täsirleşmeleri, plazmanyc renininic işjenliginic artmagy, suw-duz hemişeliginiň sazlanýşynyc bozulmagynyc ähmiýeti ulydyr.

Gipotenziw serişdäni bellemek bilen, onuc her bir näsagdaky patogenetiki mehanizmleric esasy halkasyna täsir etmekligini gazanmalydyr. Bu ýörelgänic dogrydygyna häzirki döwürdäki dürli täsirli derman serişdelerinic bardygy hem güwä geçýär.

Bejerilişi: Gipertoniýa keselinic başynda arterial basyşy hemişelik galmaýar hem-de zahmeti we dynç almany kadalaşdyrmak bilen, berhiz tutmaklyk bilen hem-de ýenil derman serişdelerini bellemek bilen bejerilýär.

Arterial gipertenziýanyc durnukly tapgyrynda duzsuz naharlanmany, az mukdarda suwuklyk içmekligi (800-1000 ml/gije-gündiz) bellemek bilen güýçli depginde derman terapiýany geçirmeli. Bu bejergini esasan hem gaýraüzülmeleric öcünü almaklyk üçin geçirmelidir.

Gipertoniki keselde rahatlandyryjy terapiýany ulanmak hem-de dokuma madda çalşygyna täsir edýän we mahsus gipotenziw serişdeleri ulanylýar.

Fitoserişdeler arterial gipertoniýany labil (durnuksyz) we aralyk görnüşlerinde ulanylýar. Olar damarlaryc aterosklerozlarynda, serobroişemiki gelip çykyşly simptomatiki gipertenziýalarda peýdaly bolup durýarlar.

Bu serişdeleric arasynda kesgitli orny kiçi barwinkanyc alkaloidleri tutýar. Oca dewinkan winkapan degişlidir. Dewinkan sedatiw, gan damarlary giceldiji we gipotenziw hasiýetine eýedir. Täsir ediji mehanizmi boýunça rezerpine meczeş bolup gipotenziw täsiri ondan pesdir. Şol bir wagtda merkezi nerw ulgamyna edýän täsiri rezepin bilen deçeşdirenicde örän ýokary bolýar. Gipotenziw täsiri bejerginic 6-10-njy günlerinde aýdyň ýüze çykýar. Şonuc üçin hem dewinkan labil we stabil gipertoniýalaryc I-II tapgyrlarynda, esasanda başaylanma we newrogen tahikardiýada peýdalydyr. Serişdäni 5-10 mg.-dan günde 2-3 sapar kabul edip başlamaly, socundan günde 3-4 gezege çenli köpeltmeli. Terapewtiki netije gazanylandan socra mukdaryny kem-kemden azaltma-ly. Bejerginic dowamlylygy birnäçe hepdeden ybarat bolup durýar.

Winkapan öz täsiri boýunça dewinkana golaý bolup durýar. Bejergini S gerdejikde (0,005 g) günde 2-3 gezekden başlap, bir hepde geçeninden socra 1 gerdejikden günde 2-3 gezekden içirmeli. Terapewtiki netije gazanylandan soňra dermany mukdaryny azaltmaly, bejergini uzak wagtlap dowam etdirmeli. Bu serişdeleric ulanmagyna garşy görkezmeler entek anyklanmadyk. Gipertoniki keselde goşmaça bejergi hökmünde, esasanda kelle beýnini gan damarlarync spazmalarynda sporynyýa-nyc digidririlenen alkaloidleri (digidroergotamin, digidroergotoksin) ulanylýar. Olaryc güýçli α -adreno baglaýjy täsiri we damarhereketlendiriji merkezine rahatlandyryjy täsiri bardyr. Şeýle-de ol gan basyşyc derejesini peseldýär, damarlary giceldýär, ýürek

urşyny biraz seýrekleşdirýär. Bu serişdelerde ýatgynyc etine gyjyndyryjy täsiri pes derejededir.

Ak omelanyň oty gipotenziv serişde hökmünde täsir edýär. Ateroskleroz sebäpli arterial gipertenziýalarda we onuc bilen baglanyşykly (başaýlanma, kelle agyry) hadysalarda ulanylýar. Bir bulgur demlemäni günüc dowamynda içmeli. Bejerginic dowamlylygy 3-4 hepde. Gerek bolsa bejerginic dowamlylygyny uzaldyp bolýar. Goltgy bejergi hökmünde demlemänic 1 nahar çemçesi mukdaryny günde 2-3 gezek içilýär. Işdänic peselmegi, başaýlanma ýaly ýakymсыz hadysalar seýrek bolýar.

Alyjyc güllerinic serişdeleri, gipotenziv täsirden başga-da kardiotoniki täsiri bardyr. Şonuc üçin ol gipertoniki keselic toplumlaýyn bejergisinde ulanylýar.

Alyjyc güllerinden taýýarlanan demlemesi S bulgurdan, günde 2 gezekden içilýär. Alyjyc tinkturasy 20-40 damjadan, nahardan öc, günic dowamynda birnäçe gezekden içilýär. Ol esasanda paroksizmal tahikardiýada belleniär. Alyjyň demlemesiniň 100 damjadan hem köp mukdary içilende ýüregic urgysynyc seýrekleşmesi ýaly täsiri ýüze çykýar.

Şirguýrugyň otunyň demlemesiniň 1 nahar çemçesi günde 3-4 gezekden içilýär. Şirguýrugyc tinkturasynyň 30-50 damjasyny suwa goşup, günde 3-4 gezekden içmeli.

Aralyk we labil gipertoniýada galen serişdeleri hem ulanylýar. Olara ewkomminic gabygynyc gaýnatmasy, suwly ekstrakty we tinkturasy degişlidir. Ewkomminic tinkturasy 15-30 damjadan, nahardan öc, günde 2-3 gezekden içilýär. Ewkomminic gaýnatmasy (10,0:200,0) 1 nahar çemçeden, günde 3 gezek içilýär. Baýkal balyk gözünüň tinkturasy - 20-30 damjadan, günde 2-3 gezek içilýär. Mundan başga-da şu aşakdaky dermanlyk ýygýndysy ulanylýar:

Rp.	Herb.	Gnaphalii	15,0	(Palçykly keçegüliň oty)
	Herb.	Melilotus	20,0	(Eşek ýorunjanyc oty)
	Herb.	Equiseti	20,0	(Meýdan kyrkbogunynyň oty)
	Herb.	Astragali	20,0	(Ýücgülli göwenic oty)

M.F. spec.D.S. 1 nahar çemçe ýgyndyny 1 bulgur gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly. Demlemäni 1 nahar çemçesi göwrümünde, günde 2-3 gezekden içilýär.

Örän netijeli dermanlyk otlarynyc ýgyndysyna ýene-de mysal getirýäris:

Rp.	Herb.	Gnaphalii	60,0	(Palçykly keçeğülic oty)
	Fruct.	Crataegi	50,0	(Alyjýc miwesi)
	Flor.	Helichrysi arenarii	50,0	(Gurtgyranyň güli)
	Herb.	Melilotus	10,0	(Eşek ýorunjanyc oty)
	Fol.	Betulae	10,0	(Berýozanyc ýapraklary)
	Rad.	Glycyrrhizae	20,0	(Buýan kökünüc)
	Fol.	Farfarae	20,0	(Eje we ejeligic ýapragy)
	Herb.	Equiseti	30,0	(Meýdan kyrkbogunynyň oty)
	Herb.	Anethi graweolens	30,0	(Şebitiň oty)

M.F. spec.D.S. 1 nahar çemçe ýgyndyny 1 bulgur gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly. Demlemäni bulguryc 2/3 bölegini 3 gezekden nahardan öc içmeli. Bejerginic dowamlylygy birnäçe aý.

Käbir fitoterapewtler şu aşakdaky ýgyndyny hödürleýärler:

Rp.	Flor.	Crataegi	15,0	(Alyjýc gülleri)
	Herb.	Equiseti	15,0	(Meýdan kyrk bogunynyň oty)
	Herb.	Visci albi	15,0	(Ak omelanyň oty)
	Fol.	Vincae minoris	15,0	(Kiçi barwinkanyc ýapraklary)
	Herb.	Millefolii	30,0	(Boýbodronyc oty)

M.F. spec.D.S. 1 nahar çemçe 1 bulgur gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly. Demlemänic bir bulguryny, owurtlap günic dowamynda içmeli

Gipertoniki keselinde, goşmaça serişdeler hökmünde ösümlüklerden alynan derman serişdeleri bolan teobromin, teofillin, papawerin, hem-de olaryc önümi bolan teofillin-aminofillin ulanylýar. Olaryc hemmesi çylşyrymly külkänic düzüminde bolýarlar. Gipertoniki keselleric I-II tapgyrlarynda keselic öcünü alyş maksatlary bilen gara miweli aroniýanyň ýa-da rýabinanyc şiresi ulanylýar. Onuc ýetişen miwesi witamin toplumlaryny, askorbin turşysyny, ýod we beýleki mikroelementleri, flavonoidleri saklaýar. Gara miweli aroniýanyň - rýabinanyc şiresi gipotenziv we spazmolitiki täsir edýär. Şiränic 50 ml., günde 3 gezek, nahardan 0,5 sagat öc içmeli. Bejerginic dowamlylygy 2-4 hepde. Miwelerini 100 g., günde 3 gezek, nahardan 30 min. öc bellenilýär.

Guryagyryly kesellerde ulanylýan dermannamalar

Rp. Cort Salicis (Serwi agajyň gabygy)
 Flor. Ulmariae (Labaznigiň güli)
 Flor. Tiliae aa 5,0 (Lipanyň güli)
 M.F.spec. D.S. 1 nahar çemçe ýgyndydan 200 ml demleme taýýarlamaly
 we günde 50 ml 3 gezek ýiti guryagyryda içmeli.

Rp. Fruct Sorbi (Rýabinanyň miwesi)
 Herb. Violae tricoloris aā 40,0 (Benewşäniň oty)
 Cort. Hippocastani (At kaştanyň gabygy)
 Flor. Hippocastani aa 25,0 (At kaştanyň güli)
 Fol. Urticae dioecae 30,0 (Çit-çitiniň ýapragy)
 M.F.spec.D.S. 1 nahar çemçe ýgyndydan bir bulgur suw bilen gaýnatma
 taýýarlamaly. Günde 1 nahar çemçeden 3 gezek iýmit arasynda artroz
 keselinde içmeli.

Rp. Tinct Capsici 10,0 (Bir ýyllyk burçuň tinkurasy)
 Spiritus sap camph ad 50,0 (Kamforly spirt)
 M.D.S. Sürtmek üçin

Rp. Flor. Ulmariae (Labaznigiň guli)
 Flor. Ribus nigri aā 40,0 (Gara smarodinanyň güli)
 Cort. Salicis 30,0 (Serwi agajyň gabygy)
 Flor. Sambuci (Gara buzynanyň güli)
 Flor. Tiliae (Lipanyň güli)
 Fruct Rubi idae aā 20,0 (Malinanyň miwesi)

M.F.spec.D.S. 1 nahar çemçe ýgyndydan bir bulgur demleme
 taýýarlamaly. Günde 1 nahar çemçeden 3 gezek içmeli.

Rp. Fruct. Juniperi 10,0 (Arçanyň miwesi)
 Fol. Betulae (Berýozanyň ýapragy)
 Herb. Millefolii (Boýbodranýň oty)
 Herb. Fumariae aa 30,0 (Şaternäniň oty)
 M.F.spec. 1 nahar çemçe ýgyndyny 1 bulgur gaýnag suw bilen 15 min
 bassyryp demläp goýmaly. Günde üç bulgur guryagyryda we podagra
 keselinde içmeli.

Rp.	Fol.	Betulae	50,0	(Berýozanyň ýapragy)
Herb.		Urticae dioicae		(Çit-çitiniň oty)
Rad.		Urticae dioicae aā	35,0	(Çit-çitiniň köki)

M.F.spec. 1 nahar çemçe ýygynyndy 1 bulgur gaýnag suw bilen 15 min demläp goýmaly we günde 2-3 gezekde içmeli.

Rp.	Rad.	Ononidis		(Polatlynyň köki)
	Rad.	Sapo nariae		(Sabyn otyň köki)
	Stipites	Dulcamarae		(Süýjümtik it üzümiň balda- gynyň ýokarsy)
	Cort.	Salicis aā	25,0	(Serwi agajyň gabygy)

M.F.spec. D.S. 3 nahar çemçe ýygynyndy 0,5 l gaýnag suw bilen demläp, 10 min gaýnatmaly. Süzmeli we günde 2-3 bulgur içmeli

Rp.	Fol.	Ribis nigri	100,0	(Gara smarodinanyň güli)
	Cort.	Fraxini		(Dardarynyň gabygy)
	Herb.	Ulmariae aā	50,0	(Labaznigiň oty)

M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe ýygynyndy 300 ml suwda 3 min gaýnadyp, 5 min goýmaly, süzmeli. Günde 2 gezekde ajöze içmeli.

2. 2. Nerw ulgamynyň keselleriniň fitoterapiýasy

Häzirki döwürde bu keselleri nerw ulgamynyň haýsy bölümüne zeper ýetirýändigine baglylykda baş sany uly toparlara bölýärler:

1. Töwerekdäki (periferiki) nerw ulgamynyň keselleri: newralgiýa we newritler;
2. Öňurga ýiliginiň keselleri: polimiýelitler, oňurga ýiliginiň gaýnaglamasy, dagynyk ýa-da köpçülikleýin huşsyzlyk we ş.m.
3. Kelle beýnisiniň keselleri: ensefalitler, meningitler, çişler, döwür-ýenjikler, beýniniň gan aýlaşynyň bozulmalary we ş.m.;
4. Wegatatiw nerw ulgamynyň keselleri: çakyza we ş.m.;
5. Newrozlar: akyl çaşmasy we samrama, kem akylllyk, hyýala getirmäniň bozulmasy, was-waslyk we ş.m.;

Nerw keselleriniň ýüze çykamagyna dürli hili sebäpleri bardyr. Olaryň köp bölegini ýokanç keselleriň esasynda döreýän keseller tutýar (ensefalitler, meningitler, polimiýelitler, polinewritleriň käbir görnüşleri we ş.m.). Şeýle-de olaryň ýüze çykmalarynyň esasy sebäpleri kelle beýniniň gan aýlanmasynyň näsazlyklary, oňurga ýiligiň hem-de kelle beýnisiniň töweregindäki nerwleriň zaýalanmalary, seýrek hallarda ehinokokklaryň döremegi bolup biler. Bu ýagdaýlar beden zäherlenmelerinde (şeraplar içilende, bedene gurşun, myşýak düşende) hem ýüze çykýarlar. Olardan başga-da bu keselleri bedendäki madda çalşygynyň näsazlyklary, durmuşdaky gündelik duş gelýän gaýgy-aladalar we ş.m. hem ýüze çykaryp bilerler.

Periferiki nerw ulgamynyň keselleri

Newralgiýalar. Bu kesellere ol ýa-da beýleki nerwiň ugrunda ýaýrap gidýän häsiýetli agyrylar degişlidir. Newralgiýanyň dürlüligi nerwiň haýsysyna zeper ýetenligine baglydyr. Mysal üçin otyrýer nerwiniň newralgiýasy, üçşahaly nerwiň newralgiýasy, oňurga nerwiň newralgiýasy we ş.m.

Otyrýer nerwiniň newralgiýasy (işias) – bu kesel otyrýer nerwiniň özünden ýa-da onuň gapdalyndan gidýän gowşak ýa-da güýçli ýiti agyrynyň bolmagy bilen häsiýetlendirilýär. İşias ýiti agyryly bolup, kä halatlarda onuň ýüze çykmaklygyndan oň näsagyň bilinde we aýagynda ýakymсыz duýgular bolup, ýarawsyz adam aýagynda agyrlyk düýup, çalt ýadaýandygy barasynda arz edýär. Otyrýer nerwiniň üstünden basylanda ýiti agyry ýüze çykýar. Kä halatlarda işiasda oňurganyň gapdala egrilmesi ýüze çykyp, onuň şekli üýtgeýärde nerw köklerine zeper ýetýär. Üçşahaly nerwiň newralgiýasy - güýçli, ýiti agyrylar bilen häsiýetlendirilýär. Köplenç agyrylar birden ýüze çykyp birnäçe wagtlaп dowam edýär. Üçşahaly nerwiň haýsy şahasyna zeper ýetenligine baglylykda agyry duýgulary adamyň ýüzüniň we kellesiniň

dürli böleklerinde ýüze çykyp bilýär. Şol agyry gulaga, göze, boýuna, ýeňsä geçýär we olaryň netijesinde ýüzüň derisiniň ýygrylmasy, derleme, ýaşyň çykması, sülekeyiň artmagy hem-de burundan nemiň çykmagy bolup geçýär.

Oňurga nerwiň newralgiýasy - bu keselde ilki oňurgada agyry döräp, ol soňra boýuna we arka geçýär. Mundan başga-da kelläniň ýeňse tarapyňyň hemme ýerinde ýiti bolmadyk agyry döreýär. Agyryny duýmazlyk üçin näsag öz kellesini hereketlendirmän, kesgitli belli bir ýagdaýda saklamaga çalyşýar.

Newritler - diýilip nerwleriň gaýnaglamasyna aýdylýar. Bu gaýnaglama ýokanç kesellerinden soňra gaýraüzülme görnüşde ýüze çykýar. Ol köplenç ýagdaýlarda garyn garahassalygy we hörezek kesellerinden soň ýüze çykýar. Bu keselde nerwiň biriniň zeper ýetmesine – mononewrit, nerwleriň köpçülikleýin zeper ýetmesine bolsa – polinewritler diýilýär. Bu keseller ýaňy dörände nerwiň gapdaly bilen agyry ýüze çykýar, hereketini we duýujylygyny ýitirýär, netijede bolsa ýarym ysmazlyk ýüze çykýar. Mundan başga-da deride birnäçe üýtgeşmeler, ýagny onuň inçelmesi, guraklygy, saçyň düşmekligi, deriniň reňkiniň üýtgemekligi, dyrnaklaryň owranmaklygy bolup biler.

Oňurga ýiliginiň keselleri

Polimiýelitler - bu kesel esasan-da kiçi ýaşly çagalarda (birnäçe aýlykdan 4-5 ýaşa çenli döwürde) ýüze çykýar, şonuň üçin-de oňa çaga ysmazy hem diýilýär. Barlaglaryň esasynda bu kesel dörände kelle we oňurga beýnisiniň dürli bölümlerine zeper ýetýändigini anyklanyldy. Olar ýüze çykanda bedende üşütme we aşgazan-ıçege bozulmalary (iç geçme, iç gatama, gusmaklyk) bolup geçýär.

Oňurga ýiliginiň gaýnaglamasy - adaty bolşy ýaly dürli ýokanç kesellerden (dümew, garahassalyk, hörezek we ş.m.) soň gaýraüzülmesi netijesinde bolup bilýär. Ol gaýnaglama merkezi oňurga ýiliginiň hemme ýerini (çal we ak maddalaryny) eýeleýär. Gaýnaglama merkeziniň niredede

ýerleşendigine baglylykda aýaklaryň ýa-da el-aýaklaryň ysmazy ýüze çykýar (mysal üçin, gaýnaglama merkezi bedeniň boýun böleginde bolsa, onda el-aýaklaryň ysmazy döreýär).

Dagynak ýa-da köpçülikleýin huşsyzlygyň - esasy hökmünde kelle we oňurga beýnisiniň köpçülikleýin, maýda ojaklaýyn zeper ýetmesi bolup durýar. Keseliň başynda näsagyň aşaky ahýrlarynda näsazlyklar, ýagny çalt ýadamaklyk, duýujylygyny ýitirmeklik, güýçli agyrylaryň ýüze çykmagy bolup biler, kä halatlarda bolsa näsagyň elinde titreme hem peýda bolýar. Şunuň bilen baglylykda näsagyň nahar iýmekligi (esasan hem suwuk iýmitleri), ýatmaklygy kynlaşýar, sözlemegi, pikiriň yzygiderliligi ýitýär. Bu bolsa beýni ulgamynda näsazlyklaryň barlygyny aňladýar.

Kelle beýnisiniň keselleri

Ensefalit – kelle beýnisiniň gaýnaglamasy. Munuň ýüze çykmagyna dürli hili ýokanç keseller sebäp bolup bilerler. Ähli ensefalitler iki sany uly topara bölünýärler, ýagny ilkinji we ikilenji ensefalitler. Olaryň birinjisine endemiki ensefalitler, sakyrta ensefalitleri we ş.m. degişlidirler. Ikilenji ensefalitler bolsa ýokanç keselleriniň dowamynda (garamykda, öýken kesellerinde we ş.m.) bolýan kelle beýnisiniň gaýnaglamasy esasynda ýüze çykýandyrlar.

Epidemiki ensefalitiň şeýle atlandyrylmagy 1917-1928 ýyllarda onuň dünýäniň hemme ýerlerine giňden ýaýrandygy bilen baglanşyklydyr. Keseliň dowamynda ol iki hili yzygiderlilikde, ýagny ýiti we dowamly bolup bilýärler. Olaryň ýiti görnüşde bedeniň temperaturasy 38° S çenli galýar. Kä halatlarda ol kadaly hem bolup biler. Ýokary galan temperatura 15-20 günün dowamynda saklanyp biler. Näsagyň ukusy bozulyp, ol uzak günün dowamynda hem ukyda ýatyp bilýär. Derman ýa-da iýmit bermeklik üçin oýarylan näsag şol bada ýene-de uklaýar. Soňra bolsa bu ýagdaý tersine bolup ukysyzlyga öwrülýär.

Bu keseliň ýiti görnüşi soňra dowamly görnüşe geçip, näsagy haýal we az hereketjeňlige getirýär. Ýüzüniň derisiniň reňki polat kysmy reňkde bolup, üýtgemän durýar.

Meningit - bu beýni gabygynyň gaýnaglamasydyr. Häzirki wagtda olaryň dürli görnüşleri, ýagny ilkinji (epidemiki) we ikilenji (inçekesel we iriňli) meningitler duş gelýändirler. Kelle agyrsynyň ýüze çykmagy, ýürek bulanmasy, gaýtarma we boýnuň yzky beden etiniň dartylmasy bu keseliň esasy alamatlaryna digişlidirler.

Wegetatiw nerw ulgamynyň keselleri

Wegetatiw nerw ulgamy adamyň bedeniniň hemme nerw ulgamy bilen berk arabaglanşyklydyr. Şonuň üçin-de bedende dürli keseller döwründe belli bir derejede vegetatiw nerw ulgamynda-da näsazlyklar ýüze çykýandyr. Mysal üçin, kelle beýnisiniň bozulmalarynda, bedeniň ýürek-damar işjeňligi we dem alyş häsiýetleri hem bozulýandyr. Nerw ulgamynyň vegetatiw bölümüniň zeper ýetmesine çakyza degişlidir.

Çakyza - bu kesel kelläniň bir gapdalynda yzygiderli bolýan agyrylar bilen häsiýetlendirilýär. Agyrylar hiç hili sebäpsiz ýüze çykyp bilýärler we birnäçe sagatlap dowam edýärler. Köplenç kelle agyrylar ýokary derejä ýetende ýürek bulanma we gusma ýüze çykýar. Agyry döwründe dürli töwerekdäki gyjyndyryjylar (ýagtylyk, galmagal we ş.m.) kelle agyryny güýçlendirýärler. Agyry köplenç näsag ukysyny alanyndan soň aýrylýar. Bu keseliň ýüze çykmagynyň sebäpleri doly anyklyk bilen däl.

Newrozlar. Bu kesellere akyl çaşmasy, samrama, kem akylllyk, hyýala getirmäniň bozulmasy, was-waslyk, terkidünýälik, göwnüçökgünlik ýaly nerw ulgamynyň bozulmalary bilen baglanşykly hadysalar mysal bolup bilerler. Olaryň hemmesinde-de akyla zeper ýetýär. Olaryň döremegine gündelik duş gelýän gaýgy-aladalar, iýmitler, uky bilen baglanşykly hadysalar, keselçilikler we ş.m. sebäp bolup bilerler. Akyl çaşmasynyň we samramanyň esasy sebäpleri

kelle beýnisinde bolup, onuň döremegine dowamly ukysyzlyk, köp pikir-gaýgy etmeklik, ýýmit siňdiriş ulgamynyň kemçilikleri, ýatgy keselleri we ş.m. sebäp bolýarlar.

Akyl çaşmasynda beýniniň pikir etmek ukybynyň bozulmagy bolup geçýär, kemakyllykda ýa-da akmaklykda ol ukybyň zaýalanmagy netijesinde beýni doly özgerýär, ýa-da özüniň bu babatdaky işjeňligini doly ýitirýär. Şonuň üçin-de kemakyl ýa-da akmak syrkawlaryň ýagdaýy garrylyga ýa-da çagalyga meňzeş bolýar. Ýatkeşligiň bozulmasynda zeper ýetme beýniniň ýeňse tarapynda bolýar, çünki ol beýniniň ýeňse böleginiň ýetmezçiliginden ýa-da onuň hemme ukybynyň ýok bolmagyndan döreýär. Ol sowuklama esasynda-da döräp biler. Hyýala getirmäniň bozulmagy keselinde bolsa beýniniň öňki bölegi zeper tapýar. Munda adam ýok zatlary hyýalyna getirýär we töwerekde bolmadyk zatlary görýär, bu bolsa beýniniň öňki böleginiň näsazlyklary bilen baglanşyklydyr. Was-waslyk terkidünýälik ýaly zatdyr. Beýniniň gyzgyn bolmagy bilen bolýan basyklar, aýagyň gapdalynyň gan bilen dolup gyzarmagy ýa-da aýalyň göwsünde gan gatamagy was-wasylykdan nyşan beriji alamatlardyr, ganyň gatamagy gany bozýan hereketleriň bolandygyny bildirýän nyşandyr. Göwniçökgünlik – pikiri we aklyly tebigy ýolundan bozuklyga, gorkmaga we ýamanlyga tarap özgertmekden ybaratdyr. Göwniçökgünlik, gaharjaňlyk, adamlara topulmak we ýamanlyk bilen goşulup gelse, oňa was-wasy hem diýilýär. Terkidünýäligiň başlaýandygyny görkezýän belgileri erbet pikirler, sebäpsiz gormak, çalt gazaplanmak, ýalňyzlygy gowy görmek, bedeniň gyzmagy, kelläň aýlanmagy we gulagyň şaňlamagy bolýar.

Häzirki döwürde nerw kesellerini derman otlarynyň kömegi bilen bejermeklik giňden ýaýrandyr.

**Nerw kesellerinde ulanylýan bejeriji häsiýetli
ösümlikleriň dermannamalary**

Häzirki döwürde nerw kesellerini bejermekligiň köp sanly usullarynyň biri hem olary dermanlyk ot-çöpleriň kömegi bilen bejermeklik bolup durýar. Bu kesellerde köplenç ýagdaýlarda derman otlaryny toplumlaýyn (şol sanda beýleki derman serişdeleri bilen bilelikde hem) ulanmak bilen peýdalanýarlar. Şonuň üçin-de olaryň köp ulanylýan görnüşleriniň käbirleri şu aşakdaky dermannamalarda görkezilendir:

- | | | | | |
|-----|---|----------------|--------------|----------------------------------|
| Rp. | Infusi | Valerianae | 10,0 / 190,0 | (Waleriananyň köküniň demlemesi) |
| | Rad. | Natrii bromidi | 10,0 | (Natriniň bromidi) |
| | M.D.S. 1 nahar çemçeden günde 3 gezek içmeli. | | | |
-
- | | | | | |
|-----|--|------------|------|---------------------------|
| Rp. | Tinct. | Valerianae | 20,0 | (Waleriananyň tinkturasy) |
| | Tinct. | Grataegi | 10,0 | (Alyjyň tinktursy) |
| | M.D.S. Günde 25 damjadan birnäçe gezek içmeli. | | | |
-
- | | | | | |
|-----|--|-----------------|------|----------------------|
| Rp. | Rad. | Valerianae | | (Waleriananyň köki) |
| | Fol. | Menthae pip. āā | 30,0 | (Narpyzyň ýapragy) |
| | Fol. | Chamomillae | 40,0 | (Çopantelpegiň güli) |
| | M.F.spec. D.S. 1 nahar çemçe 500 ml suwda 10 min gaýnatmaly. 50 ml günde birnäçe gezek içmeli. | | | |
-
- | | | | | |
|-----|--|---------------|------|----------------------|
| Rp. | Fol. | Melissae | | (Melissanyň ýapragy) |
| | Flor. | Grataegi āā | 20,0 | (Alyjyň güli) |
| | Herb. | Leonuri | | (Şirguýrugyň oty) |
| | Rad. | Valerianae āā | 30,0 | (Waleriananyň köki) |
| | M.F. spec. D.S. 1 nahar çemçe garyndyny 300 ml. gaýnag bilen garmaly. Demlemäni 50 ml-den günde 3 gezek nahardan öň içmeli | | | |
-
- | | | | | |
|-----|-------|-----------------------|------|-----------------------|
| Rp. | Rad. | Valerianae | | (Waleriananyň köki) |
| | Herb. | Meliloti āā | 40,0 | (Eşek ýorunjanyň oty) |
| | Herb. | Thymi | | (Käkilik oty) |
| | Herb. | Origani | | (Ýarymlyjanyň oty) |
| | Herb. | Leonuri cardiaceae āā | 50,0 | (Şirguýrugyň oty) |

Bronh geçirijiliginiň bozulmagynyň potalogiki
alamatlary:bronhlaryň gysylmagy, bronhlaryň nemli

bardalarynyň çişmegi, gakylygyň mukdarynyň köpelmegi we onuň bronhlarda saklanmagy.

Ýiti bronhit: bronhlaryň nemli bardalarynyň diffuz alawlamasy, özem virus ýa-da bakterial etiýalogiýaly bolýar. Etiologiki ýagdaý hökmünde allergiýa hem täsir edip biler, şeýlede dem gysmaly bronhidi, himiki we tozanly gyjyndyryjylar döredip biler.

Ilkinji ýiti bronhitde bronhlar alawlamanyň esasy ýeketäk orun tutýan ýeridir, ýöne köplenç alawlama hadysalary buruna, burun-bokurdak boşlugyna, damaga we traheýalara hem ýaýraýandyr. Keseliň kliniki alamatlary-üsgülöwük, gakylygyň bölünip çykmagy, döşde ýakymсыз agyry we özüňi erbet duýmaklyk we ş.m. bolup biler.

Bejerilişi. Keseliň sebäbini, patogenezi we kliniki alamatlaryny göz önüne tutmak bilen geçirilýär. Klinikasynyň agyrylygyna baglylykda dynçlyk (pes we ýokary derejede) bellenilýär, bedeniň gyzgyn görkezijisi ýokary bolanda düşekde ýatmaly. Çilim çekmeklik gadagan, otagy arassa howa bilen ýelejiretmeli, iýmit witaminlere baý, ýeňil siňýän bolmaly. Derman bilen bejermek-alamat-lara baglylykda gyzgyn düşüriji, agyry aýryjy serişdeler bilen amala aşyrylýar.

Der bölünip çykmagyny üpjün edýän ýygyndylar:

Rp. Flor.	Chamomillae	25.0	(Çopantelpegiň guli)
Flor.	Tiliae	25.0	(Lipanyň güli)
Fol	Menthae piperitae	25.0	(Narpyzyň ýapragy)
Flor.	Sambuci	25.0	(Gara buzynanyň guli)
M.F.spec. D.S. 1 nahar çemçe ýygyndyny 1 bulgur gaýnan suwda demlemeli. Demlemäni gyzgyn görnüşinde, alawlama kesellerinde günde 2-3 bulgurdan içmeli.			
Rp. Rad.	Glycyrrhizae	40.0	(Buýanyň köki)
Flor.	Tiliae	60.0	(Lipanyň güli)
M.F.spec. D.S. 1 nahar çemçe ýygyndyny 1 bulgur gaýnan suwda demlemeli. Demlemäni günde 2-3 bulgurdan içmeli. Onuň derlediji, üsgülewügi aýryjy we gakylyk gopduryjy häsiýeti bar.			

Döş boşlugynyň töweregine gyzdyrgyçlar goýulýar. Gurak, gyjyndyryjy üsgülewükde 3-4 günüň dowamynda üsgülewüğe garşy serişdeler bellenilýär. Şeýle hem ipekakuananyň kökünüň demlemesi (0.6:200.0) her 3-4 sagatdan 1 nahar çemçeden berilýär. Mundan başga-da şu aşakdaky ýygyny bellenilýär:

Rp. Rad.	Althaeae	20,0	(Çerbiýäniň köki)
Fol.	Farfarae	20,0	(Eje-ejeligiň ýapragy)
Herb.	Origani	10,0	(Ýakymlyjanyn oty)
M.F.spec. D.S. 1 nahar çemçe ýygyny 1 bulgur gaýnan suwda demlemeli. Demlemäni S bulgurdan nahardan 2-3 sag soň içmeli.			

Gagylyk goparyjy we üsgülewige garşy serişdeler hökmünde birnäçe ýygyny ulanylýar.

Üsgülewigi aýyrmak üçin sosnanyň pyntyklarynyň demlemesiniň bugundan peýdalanmak ýa-da ony içmek hem bolar. Aýrylmasy kyn bolan gakylygy käbir ýygyny bilen kömegi bilen aýyrmak bolar. Anis yagy gakylyk goparyjy serişde hökmünde günde 4-6 wagtyna 2-3 damjadan 1 çemçe ýyly suw bilen içilýär.

Bronhlaryň gysylmagynda olary giňeltmek üçin serişdelerden: teofedrin (günde 3 wagtyna ½-1 gerdejikden), efedrin (günde 2-3 wagtyna 0,25 g) eufillin (günde -3 wagtyna 0,15 g) we ş.m. ulanylýar.

Mundan başga-da ýygyny asakdakylar bellenil-ýär:

Rp. Rad.	Glycyrrhizae	20,0	(Buýanyň köki)
Fruct	Anisi	20,0	(Anisiň miwesi)
Fol	Salviae	20,0	(Bidenegiň ýapragy)
	Gammarum pini	20,0	(Sosnanyň pyntygy)
M. F. spec. D. S. 1 nahar çemçe ýygyny 1 bulgur gaýnag suw bilen demläp goýmaly Demlemäni nahardan soň, her 4-5 sagatdan 1/3-bulgur we ýatmazdan öň S bulgur içmeli. (gakylyk gopduruýy, spazmolitiki, sedatiw häsiýeti ýüze çykyar).			

Rp. Fol	Farfarae	20,0	(Eje-ejeligiň ýapragy)
Fol	Plantaginis	20,0	(Atgulagyň ýapragy)

Rad.	Glycyrrhizae	20,0	(Buýanyň köki)
Herb.	Violae tricolor	20,0	(Benewşaniň oty)

M.F.spec. D.S. 1 nahar çemçe ýygyndyny 1 bulgur gaýnag suw bilen demläp goýmaly. Demlemäni ýyly görnüşde günde 4-6 wagtyna nahardan oň j bulgur içmeli

Bronhitde – antibakterial, bronhlary giňeldiji we gakylyk gopdurujy serişdeler toplumlaýyn terapiýa görnüsinde prednizolan bilen bilelikde 25-30 mg-dan 5-7 günün dowamynda ulanylýar. Şu ýagdaýda aşakdaky ýygyndylar hem ulanylýar:

Rp.	Rad.	Althaeae	40,0	(Çerbiýäniň köki)
	Rad.	Glycyrrhizae	15,0	(Buýanyň köki)
	Fol.	Farfarae	20,0	(Eje-ejeligiň ýapragy)
	Fruct.	Foeniculi	10,0	(Arpabadyýanyň miwesi)

M.F.spec. D.S. 1 nahar çemçe ýygyndyny 1 bulgur gaýnag suw bilen demläp goýmaly. Demlemäni ýyly görnüşinde 1 bulgurdan 4-5 gezek içmeli.

Rp.	Fol	Farfarae	10,0	(Eje-ejeligiň ýapragy)
	Fol	Plantaginis	20,0	(Atgulaýyň ýapragy)
	Herb.	Equiseti	30,0	(Meýdan kyrkbogunynyň oty)
	Flor.	Primulae	40,0	(Nowruzgüliň güli)

M.F.spec. D.S. 1 nahar çemçe ýygyndyny 1 bulgur gaýnag suw bilen demläp goýmaly. Demlemäni 1 bulgurdan ýyly görnüşinde 4-5 gezek içmeli.

Gaýtalanyp durýan ýiti bronhitler soňra dowamly bronhitlere öwrülýär. Dowamly (ötüşen) bronhidiň ösmegine-çilim çekmeklik, howanyň tozany we gazlar bilen hapalanmagy, alkohol içgileri mümkinçilik döredýär.

Dowamly bronhit öýken kesselleriniň içinde esasy orunlarynyň birini eýýeleýär. Ilkinji dowamly bronhit köplenç 30-40 ýaşdan geçen erkek adamlarda, esasan hem çilim çeyän we hapalanan howadan hem almak netijesinde ýüze çykýar.

Dowamly bronhidiň ýüze çykmagyna burun, burun-bokurdak kesseleri sebäp hem bolup biler.

Dowamly bronhidi anyklamak kynçylyk döredýär. Ony kesgitlemeklik esasy 4 alamatlar boýunça – üsgürmek, gakylyk gopmagy, dem gysma, we umumy bedeniň

ýagdaýynyň ýaramazlaşmagy zerarly anyklamak amala aşyrylýar.

Bejerlişi. Toplumlaýyn bejergi çärelerini geçirmek dowamly bronhidiň etaby boýunça kesgitlenilýär. Dowamly bronhidiň ähli görnüşlerinde umumy terapewtiki çäreleri geçirmeli, ýagny:

Çilim çekmegi gadagan etmek, dem alyş ýollaryny gyjyndyryjy maddalardan daşda durmak, (öýde we önümçilik şertlerinde) bedeniň umumy durnunykylygyny ýokarlandyrmak, fizioterapiýa, bedenterbiýe çäreleri, ingalýasiýa, gakylyk gopduruýy serişdeler ulanmak ähmiýetlidir. Iriňli bronhitde goşmaça, antibakterial terapiýa, emma dykylan bronhitde bolsa, bronhlary giňeldijiler we glýukokortikoidlar ulanylýar.

Bronhlary giňeldiji, bronh mázleriniň bölüp çykaryş işini güýçlendiriji we gakylygy gopduryjy indiki ýyggyndylar ulanylýar:

1) Buýan köki we atgulagyň ýapyragy-3 bölekden, ejejeligiň ýapragy-4 bölek alynyp demleme taýýarlanýar. Demlemäni günde 4-5 wagtyna j bulgurdan bermeli.

Efir ýaglary bronhlaryň nemli bardasynda bölünip çykyp-bronholitiki täsiri, gakylyk gopduruýy we antiseptiki täsiri ýüze çykarýar.

Aýdyň bronholitiki täsiri-sosnanyň pyntyklarynyň demlemesi ýüze çykarýar, ol günün dowamynda 1/3 bulgurdan içilýär. Şu bejergide gakylygyň mukdary köpelmeyär, hyňhyldy bolsa 3-5 gün ulanylandan soňra ýitýär, bronhlaryň geçirijiligi hem ýokarlanýar.

Öýken emfizemasy bilen bilelikde dowamly bronhidi bejermek üçin esasy preparat termopsisiniň oty hasaplanylýar. Preparat dem alyş merkezine gyjyndyryjy täsir edip, dem alyş ýollarynyň bölüp çykaryş işini güýçlendirýär we alkaloidleriň (sitiziniň, metilsitizin) täsirinde dem alyşyň çuňlaşmagy we ýygylaşmagy bolup geçýär. Termopsisiniň demlemesini (0,6-1,0- 200 ml) günde 6-8 gezek 1 nahar çemçeden belleýärler. Seýrek ýagdaýlarda ony ürgün görnüşinde (0,01-0,05 g günde

2-3 wagt) ýa-da gury ekstrakt görnüşinde ulanylýarlar. Bejergi 12-14 gün dowam etdirilýär. Bu preparat şepbeşik iriňli suwuklygyň bölünip çykmasyny peseldýär.

Dem gysmaly we öýken emfizemaly, dykynly bronhitlerde iň ähmiýetli serişde-buýan köküdir, ol goýy ekstrakt, şerbet we ýygyndy görnüşde ulanylýar. Buýan köki öz düzüminde birnäçe glikozidleri saklaýar. Glisirizin turşusy – alawlama garşy täsiri ýüze çykarsa, likwiritozid – spazma aýyryjy, emma likurazid bolsa alawlama garşy hem-de spazma aýyryjy täsiri ýüze çykarýar.

Kükrek eleksiri 20-40 damjadan nahardan 1 sagat öň birnäçe gezek içmeli., çagalara bolsa olaryň ýaşyna laýyklykda berilýär (damjada). Bu ýygyndy (owradylan buýan kökini atgulagyň ýapyraklaryny-3 bölek we eje-ejeligiň ýapyraklaryny 4 bölek saklaýar) demleme görnüşinde 1 nahar çemçe 1 bulgur gaýnan suwda taýýarlanýar we nahardan soň günde 2-3 gezekden S-1/3 bulgurdan kabul etmeli. Bejergi tapgyry 10-12 gün.

Ondan daşary hem iri we orta bronhlaryň zeperlenmesinde, gakylygyň köp bolmadyk, goýy bolan ýagdaýynda saponinleri saklaýan ösümlikleri ulanmak amatlydyr. Onuň üçin istodyň köki ulanylýar. Ol bronh mázleriniň bölüp çykaryş işini ýokarlandyrýar, gakylygy suwuklandyryp, onuň gopmagyny üpjün edýär.

Guzygulagyň kökini we porrugyny gaýnatma görnüşinde (20.0:200.0) günde 4-5 nahar çeşmeden kabul etmeli.

Köp mukdardaky serroz gakylykly bronhitlerde terpingidrat gije-gündizde 1.5 g çenli ulanylýar. Iriňli gakylykda terpingidrat 0.2g 3-4 wagtyna, antibiotikler bilen bile ulanylýar. Şeýle täsiri käbir ýygyndylar hem ýüze çykarýar.

Has yokary üsgülewük refleksinde we bronhial dykylmada käkilik otunyň derman görnüşlerini peýdalanýarlar. Ol öz düzüminde efir ýaglaryny saklamak bilen, bakteriosid we rahatlandyryjy täsiri ýüze çykarýar. Käkilik oty demleme, suwuk ekstrakt görnüşinde ulanylýar, şeýle hem ol pertussiniň

düzümine hem girýär. Demleme ulylara- günde 3 gezek 1 nahar çeşmeden, çagalara bolsa günde 3 gezekden 1 desert çemçeden belleniýär. Şeýle hem käbir ýygyndylar ulanylýar.

Dowamly bronhitlerde-ikilenji önüni alyş çäreleri hökmünde bedeniň durnuklylygyny ýokarlandyrmak üçin – umumy sazlaşdyryjy häsiýetli serişdeleriň hem orny ulydyr. Şeýle häsiýeti ýüze çykarýanlara pantokrin, limonniginiň serişdeleri we witaminler degişli. Pantokrin 2-3 hepdeň dowamynda nahardan 30 min öň 30-40 damjadan belleniýär. Hytaý limonniginiň tinkturasy 2-3 wagtyna açöze 20-30 damjadan belleniýär.

Ýitileşme döwründe 300-600mg-dan (1 gije-gündiz üçin) askorbin turşusy, 3 mg witamin A,we B, topar witaminleri (tiamin, riboflawin, piridoksin) 0,03 g-dan belleniýär. Şeýle hem itburunyň miwesiniň demlemesi gara smorodinanyň miwesiniň demlemesi rýabinanyň miwesiniň demlemesi we ş.m ulanylýar. Bu demlemäni günde 3-4 wagtyna ýarym bulgurdan içmek maslahat berilýär. Immun ulgamyna oňaýly täsiri şu aşakdaky ýygyndylar hem ýüze çykarýar:

Rp.	Rad.	Glycyrrhizae	10,0	(Buýanyň köki)
	Rad.	Taraxaci	15,0	(Tozganyň köki)
	Rad.	Rubiae tinctoriae	30,0	(Çopboýanyň köki)

M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe ýygyndyny 0,5 l gaýnan suwda demläp goýmaly we ertirine we agşam 1 bulgurdan kabul etmeli.

Rp.	Cort	Frangulae	10,0	(Garatikenin gabygy)
	Rad.	Glycyrrhizae	10,0	(Buýanyň köki)
	Herb.	Viola tricolor	40,0	(Benewşäniň oty)

M.F.spec. D.S. 1 nahar çemçe ýygyndyny 1 bulgur suwda 30 minut gaýnatmaly (suwly hammamda) we 2 bulgurny bir günün dowamynda içmeli. Bejeriş wagty 4-6 hepde, 3-4 aýdan soň bejergini gaýtalaýarlar.

Gara smarodinanyň, brusnikanyň we itburunyň ýapraklaryndan taýýarlanan witaminli çaylar, şeýle hem düzüminde askorbin turşusyny saklaýn gök önümler, ir – iýmişler (kelem, kädi, arpabadýan, noýba, limon, apelsin,

sogan, sarymsak we ş.m.) hem böwreküsti mäziň gadyk gatlagynyň işjeňligini ýokarlandyrýar.

Pnewmoniýa. Ýiti pnewmoniýa saglygy goraýyş üçin iň wajyp meseleleriň biri bolup durýar.

Ilkinji we ikilenji öňüni alyç çärelerini we terapiýany geçirmek üsin olary – ilkinji ýiti ilkinji dowamly we ikilenji pnewmoniýa bölmek ähmiýetlidir.

Ýiti pnewmoniýa etiologiýasy boýunça (bakterial, wirusly, fiziki we himiki sebäpleriň täsirinde garyşyk), kliniki – morfologiki alamatlary boýunça (ojaklaýyn, kruppoz, garyşyk), geçişi boýunça (ýiti, dowamly gesýän) görnüşlerine bölünýär.

Ýiti pnewmoniýanyň esasy döredijileleri: pnewmokokk, iriňli stafilokokk, Fridlenderiň taýajyklary, grippiň wiruslary, adenowiruslar, gök-iriň taýajyklary, mikoplazma, eşerihi, tulýarmiyanyň bakteriýasy, ötbaş keseliniň basillasy, gyrgynyň taýajyklary we ş.m.

Etiologiki köpdürliligine garamazdan birlenji ýiti pnewmoniýa köplenç pnewmokokklar, stafilokokklar, streptokokklar wiruslar we mikoplazmalar tarapyndan döredilýändir.

Ilkinji ýiti pnewmoniýanyň kliniki alamatlary- kesel döredijiniň görnüşine we onyň kesel döredip biljek ukybyna, şeýle hem bedeniň durnuklylygna baglydyr.

Pnewmoniýany ýiti geçýän we uzak geçýän görnüşlere bölýärler. Ýiti geçýän pnewmoniýa 21-28 gün dowam edip, sagalma bilen gutarýar, emma has uzak dowam edýän, agyr geçýän görnüşli uzak geçýän topara degişlidir. Uzak geçýän görnüşiniň şeýle uzak wagtlap dowam etmegine – näsagyň garrylygy, kabir goşmaça keseller esasan hem dowamly bronhit, süýji keselleri, ýürek-damar keselleri şert döredýär.

Bejergisi. Ýiti pnewmoniýada bejergi toplumlaýyn geçirilýär, we oňa dogry iýmitlenmek, dogry derman bejergisi, fizioterapiýa, saglygy dikeldiş edaralaryny bellemek hem degişlidir.

Düşekde ýatmak kadasy-keseliň ähli geçişinde berjaý edilmeli, tä näsagyň bedeniniň gyrgyzlyk görkezijisi kadalaşynça dowam etmeli.

Ýiti pnewmoniýada esasy ünsi näsagyň iýmitlenişine gönükdirmeli, esasan hem gyzdyrýan döwründe. Iýmit köpdürli, witaminleri köp mukdarda saklaýan we ýeňil siňýän bolmaly. Bu näsaglarda toplumlaýyn terapiýa geçirmekde witaminlere bolan gije-gündizlik talap şeýledir: B₁-12mg, B₂-12mg, B₆-18mg, askorbin turşusy-400mg, PP-100-120mg. Poliwitaminler (undewit günde 3 wagtyna 1 noguldan, dekamewit 1 gije-gündizde 2 noguldan)-köplenç bedeniň witaminlere bolan talapyny kanagatlandyrýar. Şu maksatlar bilen witaminli çaylar we witaminleri köp saklaýan ir-iýmişler, gök- önümler hem giňden ulanmak bolar.

Şeýle näsaglarda suw elektrolit deňagramlygyň bozulmasy bolanlygy üçin olara ýeterlik derejede ir-iýmiş we gök önümler bermeli.

Ýiti pnewmoniýanyň toplumlaýyn terapiýasynda fitopreparatlar hem giňden ulanylýar. Has güýçli gurak üsgülewükde merkezi we periferiki täsirli rahatlandyryjy serişde ulanylýar. Üsgülewügiň ilkinji 22 günleri glausiniň gidrochloridi (0.05 g-dan, nahardan soň günde 2-3 wagtyna), Çerbiýäniň kökünüň demlemesi (6.0:180.0) her 2 sagatdan 1 nahar çemçe içmek bellenilýär.

Üsgülewükde – reflektor gyjynmany aýyrýan ýygyndylara aşakdakylar degişli:

Rp. Rad.	Althaeae	40.0	(Çerbiýäniň köki)
Rad.	Glycyrrhizae	15.0	(Buýanyň köki)
Fol	Farfarae	20.0	(Eje-ejeligiň ýapragy)
Fruct.	Foeniculi	10.0	(Arpabadyýanyň miwesi)

M.F.spec. D.S. 1 nahar çemçe ýygyndyny 1 bulgur suwda 30 minut gaýnatmaly we ýyly görnüşinde her 2-3 sagatdan 2 nahar çemçeden kabul etmeli – ol üsgülewügi köşeşdirýär we gakylygyň erkin çykmagyna şert döredýär.

Şeýle hem gakylyk goparyjy we üsgülewügi basyp ýatyryjy indiki ýygyndyny hem ulanmak bolar.

Rp.	Rad.	Althaeae	20.0	(Çerbiýäniň köki)
	Fol.	Farfarae	20.0	(Eje-ejeliğiň ýapragy)
	Herb.	Origani	10.0	(Ýakyplyjanyň oty)
M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe ýygyndyny 0,5 l gaýnan suwda demläp goýmaly we her 2-3 sagatdan üsgülewük galýança günde j bulgurdan içmeli.				

Aýdyň ýüze çykan bronhitde – çygly hyhhyldylar bolanda we gakylygyň ýeterlik gopmazlygynda – gakylyk goparyjylary – düzüminde istodyň kökünü, sinýuhanyň köki we porrugyny saklaýan serişdeler ulanylýar. Istodyň kökiniň gaýnatmasy (20.0:200.0) görnüşinde beýleki ýumşadyjy serişdeler bilen bilelikde nahardan 1 sagat öň, günde 5 gezek 1 nahar çemçeden işjeňligini ýokarlandyrýar, gakylygy suwuklandyrýar we onuň sepbeşikligini peseldýär. Bu preparat gastritli we baş keselli näsaglara bellemek bolmaýar. Sinýuhanyň köki we porrugy gakylyk gopduryjy we rahatlandyryjy täsiri ýüze çykarýar. Onuň kökleriniň demlemesi (6.0-8.0:200.0), gaýnatmany (3.0-6.0:200.0) 1 sagat nahardan öň günde 5 gezek 1 nahar çemçeden kabul etmeli.

Guzygulagyň köki we porrugy düzüminde efir yağlaryny we saponinleri saklaýar. Gakylyk gopdujy serişde hökmünde gaýnatmasy (20.0:200.0) günde 3-5 nahar çemçeden içilýär.

Has şepbeşikli, iriňli gakylykda – alawlama garşy, bakteriýalara garşy we gakylygy suwuklandyryjy täsirli şu aşakdaky ýygyndylar ulanylyar:

Rp.	Herb.	Serpylli	25.0	(Käkilik oty)
	Herb.	Violae tricoloris	20.0	(Benewşäniň oty)
	Herb.	Gnaphalii uliginosi	10.0	(Keçegüliň oty)
	Fol.	Plantaginis	15.0	(Atgulagyň ýapragy)
		Gemmarum pini	20.0	(Sosnanyň pyntygy)

M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe ýygyndyny 0,5 l gaýnan suwda demläp goýmaly we nahardan öň günde 4-5 gezek j bulgurdan ýyly gornüşinde içmeli.

Agyryny azaltmak üçin suwly hammamlar hem ulanylýar. Şeýle hem fitoserişdelerden - aýy burçuň tinktturasy, kamfóra melhemi, çylşyrymly skipidar we ş.m. sürtmek üçin ulanylýar. Üns sowujy we agyry aýryjy serişdeler hökmünde gyzdyrgyçlar, burçly ýelimler ulanylýar.

Alawlama döwrüniň dowam etmeginiň önüni almak üçin preparat solutan ulanylýar, onuň bronhlary giňeldiji ukybyndan başga-da gakylygy suwuklandyryjy we bronhlaryň drenajy işini gowulandyryjy ukybyny hem ýüze çykarýar. Preparat nahardan soň günde 3 wagtyna 20-30 damjadan içmek üçin belleniýär, bugundan dem almak üçin bolsa günde 1-2 wagtyna 5 ml. –natriniň hloridiniň (izotoniki) ergini bilen bilelikde 6-8-12 damjadan belleniýär. Şu döwürde gakylyk goparyjy ýygýndylardan – buýan köküniň, käkilik otynyň demlemesi örän peýdalydyr. Şeýle hem käbir başga-da ýygýndylary ulanýarlar.

Pnewmoniýanyň ýagny başlanan wagtyndan 2-3 hepde geçenden soň efedriniň bejeriji täsirliligi has ýokarydyr, onuň bronhlary giňeltmek ukyby hem ýokarydyr. Bu halatda şu aşakdaky ýygýndylar ulanylýar:

Rp.	Fol.	Farfarae	20.0	(Eje-ejeliğiň ýapragy)
	Fol.	Plantaginis	20.0	(Atgulagýň ýapragy)
	Flor.	Calendulae	15.0	(Dyrnaklyjanyň güli)
	Herb.	Serpylli	15.0	(Käkilik otynyň oty)
	Rad.	Glycyrrhizae	10.0	(Buýanyň ýapragy)
M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe ýygýndyny 0,5 l gaýnan suwda demläp goýmaly we nahardan ön günde 4-5 wagtyna 1 nahar çemçeden içmeli.				

Şeýle hem damarlaryň tonusyny ýokarlandyrmak we kollapsyň önüni almak üçin kamforadan, kofeinden we kordiaminden başgada saparal, çilibuhanyň tinkturasy günde 2-3 wagtynda 10-15 damjadan ulanmak bolar.

Bedeniň immun ulgamynyň işjeňligini ýa-da bedeniň kesellere bolan durnuklylygyny ýokarlandyrmak üçin biýogen sazlaşdyryjylar, esasan hem saburyň ekstrakty (10-15 günün

dowamynda gūnaša 1-1.5 ml, soñra 30-35 sanjyma çenli ýetirmeli) ulanylýar.

Bronhial dem gysma

Bronhial dem gysmasy – allergiki we allergiki däl tebigatly bolup, dem alyş agzasynyň işjeňliginiň bozulmagy bilen häsiýetlendirilýär.

Patogenezinde – bronhlaryň geçirijiligindäki tutgaýly bozulmanyň ýüze çykmagynda bronhlaryň gysylmagy, bronh sütünleriniň nemli bardalarynyň çişmegi we nem mázleriniň ýokary işjeňligi bolup geçýär.

Dem gysmanyň etiologiyasy birmeñzeş däl. Onuň ýokanç – allergiki we ýokanç däl allergiki gornüşlerini tapawutlandyrýarlar. Keseliň birinji tapgyryna dem gysmanyň tutgaý görnüşli geçişi degişli bolup, ol agyrlygy boýunça ýeňil, orta agyrlykdaky we agyr görnüşlerine bölünýär. Ikinji tapgyry uzak saklaýan tutgaýlar, demniň gysmasy, aýdyň öýken agyrlaşmasy (emfizema, bronhit, III dereje dem ýetmezçiligi we ş.m.) bilen häsiýetlendirilýär.

Dem gysmaly näsaglara wegetatiw nerw ulgamynyň oýanyjylyk çäginin birden pese düşmegi häsiýetlidir. Şunuň bilen hem aşa ýadamaklygyň reflektor gyjynmalarynyň, gormonal üýtgemeleriň we nerw-psihiki şikesleriň netijesinde tutgaýlar ýeňil ýüze çykyp bilýär. Ondan daşary hem tutgaýlar – daşky howa şertleriniň birden üýtgemegi (çyglylygyň ýokarlanmagy, basyşyň üýtgemegi, atmosfera howasynyň elektrik potensialynyň üýtgemegi, dürli yslyar we ş.m.) netijesinde hem döräp bilýärler.

Berelişi. Dem gysmasynda – fitopreparatlar esasan hem tutgaýlary aýyrmak we olaryň önüni almak üçin we kömek beriji terapiýany geçirmek üçin ulanylýar. Ýeňil tutgaýy bejermek üçin esasan hem spazma aýyryjy serişdeler we bronh sütüniniň nemli bardalarynyň çişlerini aýyrmak üçin preparatlar bellenilýär.

Bronhlaryň geçirijiligini ýokarlandyrmakda şu aşakdaky ýygyndylar ulanylýar:

Rp.	Rad.	Glycyrrhizae	10,0	(Buýanyň köki)
	Rad.	Violae tricoloris	10,0	(Benewşäniň köki)
	Herb.	Thymi serpilli	40,0	(Käkilik oty)
M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe ýygyndyny 0,5 l gaýnan suwda demläp goýmaly we 1 bulguryň günde 4 gezekden içmeli. Şonda bronhlaryň geçirijiligi 45-60 min soň gowulanýar we 5-6 sagadyň dowamynda täsiri saklanýar.				

Ýene-de şeýle häsiýetli ýygyndylary mysal getireliň:

Rp.	Herb.	Thymi serpilli	10,0	(Käkilik oty)
	Fol.	Farfarae	10,0	(Eje-ejeliň ýapragy)
	Herb.	Violae tricoloris	10,0	(Benewşäniň köki)
	Rad.	Inulae	10,0	(Guzygulagyň köki)
	Fruct	Anisi	10,0	(Anisiň miwesi)
M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe ýygyndyny 0,5 l gaýnan suwda demläp goýmaly we 1 bulgurdan 4 gezege bölüp içmeli.				

Eger bu demlemeler ýaramasa onda aşakdaky düzümdäki ýygyndylaryny we çäýý ulanmak bolar:

Rp.	Herb.	Ephedrae	10,0	(Borjagyn oty)
	Fol.	Urticae dioicae	10,0	(Çit-çitiniň ýapragy)
	Rad.	Inulae	10,0	(Guzygulagyň köki)
	Herb.	Millifolii	15,0	(Boýbodranýň oty)
	Flor.	Crataegi	15,0	(Alyjyň güli)
	Flor.	Calendulae	15,0	(Dyrnaklyjanyň güli)
	Fol.	Plantaginis	25,0	(Atgulagyň yapragy)
M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe ýygyndyny 0,5 l gaýnan suwda demläp goýmaly we nahardan soň günde 3-4 wagtyňa S bulgurdan içmeli.				

Rp.	Fruct	Anisi	10,0	(Anisiň miwesi)
	Fruct	Foeniculi	10,0	(Arpabadyýanyň miwesi)

Herb.	Thymi serpilli	10,0	(Käkilik otynyň oty)
Rad.	Glycyrrhizae	10,0	(Buýanyň köki)
Gemmarum Pini		10,0	(Sosnanyň pyntygy)
M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe ýygyndyny 0,5 l gaýnan suwda demläp goýmaly we 1 bulgurdan 4 gezege bölüp içmeli.			

Kömek beriji terapiýany we öňüni alyş çärelerini geçirmekde ösümlük serişdeleriniň hem ähmiýeti ulydyr. Esasan hem olar ýokary dem alyş ýollaryny arassalamakda bähbitlidir. Ýokary dem alyş ýollarynyň keselleri reflektor täsir edip dem gysmanyň tutgaýyny ýuze çykaryp bilýär. Şonuň üçin burundan erkin dem almaklygy dikeltmeli. Şeýle ýagdaýda çopantelpegin gyzgyn demlemesiniň bugundan dem almak, çopantelpegin gülüniň demlemesi bilen bokurdagyňy çaykamak gowy netije berýär.

Laringitde, faringitde we tonzillitde-bokurdagy çaykamak üçin belenilýän ýygyndylar:

Rp.	Fruct	Feonicali	5.0	(Arpabadyýanyň miwesi)
	Rhiz.	Potentillae erecti	15.0	(Gaýtarmanyň porrugy)
	Rad.	Althacae	15.0	(Çerbiýäniň köki)
	Cort.	Quercus	15.0	(Dubuň gabygy)
	Fol	Salviae	15.0	(Bidenegiň ýapraklary)
M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe ýygyndyny 0,5 l gaýnan suwda demläp goýmaly we ýyly görmüşde her 2-3 sagatdan bokurdagy çaykamak üçin ulanylýar				

Rp.	Fol.	Rubi truticosi	20.0	(Böwürsleniň yapragy)
	Fol.	Fartarae	25.0	(Eje-ejeliğiň yapragy)
	Fol.	Salviae	30.0	(Akkemençäniň yapragy)

M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe ýygyndyny 0,5 l gaýnan suwda demläp goýmaly we ýyly görmüşinde bokurdagy çaykamak üçin ulanylýar.

Mundan daşary hem birnäçe ýygyndylar ulanylýar. Goldaýjy simptomatiki fitoterapiýany geçirmek üçin antiseptikler, allergiýa garşy serişdeler, rahatlandyryjy

serişdeler we gakylyk suwgardyjylar ulanylýar. Şeýele-de şu aşaky ýygyndylary ulanmak bolar:

Rp.	Herb.	Meliloti	5.0	(Eşek ýorunjanyň oty)
	Herb.	Thymi serpilli	5.0	(Käkilik otunyň oty)
	Fruct.	Feoniculi	5.0	(Arpabadyýanyň miwesi)
	Fol.	Plantaginis	10.0	(Atgulagyň ýapragy)
	Rad.	Althaeae	10.0	(Çerbiýäniň köki)
	Rad.	Glycyrrhizae	10.0	(Buýanyň köki)
	Fol.	Farfarae	20.0	(Eje-ejeligiň ýapragy)
M.F.spec. D.S. 1 nahar çemçe ýygyndyny 1 bulgur suwda 10 min gaýnatmaly (suwly hammamda) we 1 bulgurny ýyly görnüşinde birnäçe gezek kabul enmeli.				

Bagyr we öt haltanyň keselleri bolanda ýygyndynyň düzümine goşmaça zygyr tohumy goşulýar. Indiki dermanlyk serişdelerini bilelikde ulanmak: şirguýrugyň oty, boýbodranyň oty, guzygulagyň ýapragy, mekgejöweniň gulgagy, çit-çitiniň ýapragy, dyrnaklyjanyň güli, narpyzyň ýapragy, çerbiýäniň köki, zygyr tohumy-örän netijelidir. Bu ösümlikleriň hersinden 10 g almaly. Soňra garyşdyrýarlar we ýygyndynyň 2 nahar çeşmesini alyp 200 ml gaýnatma taýýarlap, nahardan 40 min ön günde 3 wagtyna 1/3 bulgurdan içmeli.

Ýygy-ýgydan tutgaýly näsaglarda gorky duýgusy döreyär, şonuň üçin olaryň bejergisine rahatlandyryjy serişdeleri hem goşýarlar. Şonda çopantelppek bilen bir hatarda waleriananyň köküniň (10.0-15.0:200.0) demlemesi ýyly görnüşinde 1-2 bulgurdan bellenilýär.

Rahatlandyryjy ýygyndy:

Rp.	Flor.	Chamomillae	25.0	(Çopantelppegiň güli)
	Fol.	Menthae piperitae	25.0	(Narpyzyň ýapragy)
	Fruct.	Feoniculi	25.0	(Arpabadyýanyň miwesi)
	Rad.	Valerianae	25.0	(Waleriananyň köki)
	Fruct.	Carvi	25.0	(Tminiň miwesi)
M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe ýygyndyny 0,5 l gaýnan suwda demläp goýmaly we günde 2 wagtyna 5 bulgurdan we gijesine 1 bulgurdan bellemeli.				

Öýkeniň gan aýlanyşygyny we ýürek etiniň işjeňligini ýokarlandyrmak üçin ýaz adoniziniň otunyň demlemesi (6.0-8.0:200.0) ululara 1 nahar çemçesinden, çagalara 1 çay çemçesinden günde 4-6 wagtyňa her aýda 10-12 günň dowamynda ulanmaly.

Dem gysmanyň tutgaýynyň önüni almak üçin goşmaça keselleri (bronhit, gepatit, holesistit, dowamly piýelonefrit, gastrit, aşgazanyň we oniki barmak içegäniň baş kesellerini we ş.m.) bejermek zerurdyr.

Öýken emfizemasy

Öýken emfizemasy-bu öýkeniň anatomiki üýtgeşmesi bolup, bronhlaryň boşluklarynyň ulalmagy bilen häsiýetlendirilýär. Bu morfologiki üýtgemede öýkeniň göwrümi ulalýar, onuň işjeňliginiň bozulýar we emfizemanyň kliniki alamaty bolan dem gysmany ýüze çykarýar.

Ilkinji emfizemanyň etiologiýasynda esasy orun mikrosirkulýasiýasynyň bozulmagy, surfaktantyň zeperlenmegi, dem alynýan howanyň hapalygy bilen düşündirilýär.

Kliniki suraty - öýkeniň emfizemasy bilen kesgitlenilýär, dowamly bronhit bilen, dem alyşyň bozulmagy we gan aýlanyşynyň bozulmagy bilen kesgitlenýär.

Birinji ýerde demniň gysmasy, üsgülewik, gakylyk gopmasy we dodagyň gögermegi, şeýle hem döş kapasasynyň görnüşiniň we hereketiniň üýtgemegi bolýar. Şu alamatlaryň toplanmagyna- dykynlanma emfizema özüniň kliniki aýratynlyklary bilen tapawutlanýar.

Öýkeniň dem alyş üst-ýüzüniň azalmagy bilen demniň gysylmagy düşündirilýär, bu bolsa öýkenleriň diffuzion ukybyny peseldýär.

Dem ýetmezçiliginde kislorod terapiýasy we kardiotoniki terapiýa bolsa ýaz odonisiniň demlemesi (6.0-10.0:200.0) bilen geçirilýär. Bu demlemäni 1 nahar çemçeden günde 4-5

wagtyna içmeli. Ýaz adoniziniň demlemesini güýz we gys aýlarynda her aýyň dowamynda 12-14 gün içmeli, eger-de dem gysma ýene-de bimaza etse onda ýaz adonizini tomus hem belleýärler.

Gan aýlanşyny sazlamak we diurezi ýokarlandyrmak üçin aşakdaky dermanlyk ýygyndylar hödürlenýär:

Rp. Fruct. Juniperi 10.0 (Arçanyň miwesi)
Fol. Betulae 10.0 (Berýozanyň ýapragy)
Rad. Taraxaci 10.0 (Tozganyň köki)
M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe ýygyndyny 0,5 l gaýnan suwda demläp goýmaly we nahardan 30min öň günde 2 wagtyna 1 bulgurdan içmeli.

Rp. Fol. Betulae 10.0 (Berýozanyň ýapragy)
Herb. Equiseti 10.0 (Meýdan kyrkbogunynyň oty)
M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe ýygyndyny 0,5 l gaýnan suwda demläp goýmaly we nahardan öň günün dowamynda 3 gezege bölüp içmeli.

Rp. Fol. Betulae 50.0 (Berýozanyň ýapragy)
Fruct. Rosae 25.0 (Itburunyň miwesi)
Rad. Ononidis 25.0 (Polatlynyň köki)
M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe ýygyndyny 0,5 l gaýnan suwda demläp goýmaly we nahardan 30-40 min öň günde 3-4 wagtyna 1/3 bulgurdan kabul edilýär.

Rp. Fruct. Feoniculi 10.0 (Arpabadyýanyň miwesi)
Flor. Sambuci 10.0 (Buzynanyň güli)
Fruct. Carvi 10.0 (Tminiň miwesi)
Herb. Adonidis vernalis 10.0 (Ýaz adoniziniň oty)
Fruct. Petroselini 30.0 (Badyýanyň miwesi)
Fruct. Juniperi 30.0 (Arçanyň miwesi)
M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe ýygyndyny 0,5 l gaýnan suwda demläp goýmaly we nahardan soň 1 günüň dowamynda 1 bulgury üç gezege bölüp içmeli. Bu demleme göwreliler we böwregiň, peşew ýollarynyň ýiti gaýnaglamasyndan ejir çekýänlere ulanmak bolmaýar.

Rp.	Fruct.	Petroselini	10.0	(Badyýanyn miwesi)
	Herb.	Chelidoni	10.0	(Demrewotyň oty)
	Fol.	Uvae ursi	40.0	(Aýy gulagyň ýapragy)

M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe ýygyndyny 0,5 l gaýnan suwda demläp goýmaly we nahardan öň günde 1-2 wagtyňa 1 bulgurdan içilýär

Gakylygy suwuklandyryjy, gakylyk goparyjy, bronhlardaky spazmany aýyrmak üçin indiki ýygyndylar ulanylýar:

Rp.	Gemmarun pini	30.0	(Sosnanyň pyntygy)
	Fol.	Plantaginis	30.0 (Atgulagyn ýapragy)
	Fol.	Farfarae	30.0 (Eje-ejeliğiň ýapragy)

M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe ýygyndyny 0,5 l gaýnan suwda demläp goýmaly we nahardan öň günde 4-6 wagtyňa j bulgurdan kabul edilýär

Rp.	Gemmarun pini	10.0	(Sosnanyň pyntygy)
	Rad.	Glycyrrhizae	10.0 (Buýanyň köki)
	Rad.	Violae tricoloris	20.0 (Benewşäniň köki)

M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe ýygyndyny 0,5 l suwly hammamda 10 min gaýnatmaly, soňra 1 bulguryny günde 4 gezekde bölüp içmeli.

Dem alyş merkezini sazlaşdyryjy serişde hökmünde kordiamin her 2-3 sagatdan 1 çay çemçeden we limonnigiň miwesiniň (10.0:200.0) demlemesi günün birinji böleginde 1 desert ýa-da 1 nahar çemçesindan kabul etmeli.

Gaýnaglama kesellerinde ulanylýan dermannamalar

Rp.	Flor.	Sambuci	(Buzynanyn güli)
	Flor.	Tiliae aa	20,0 (Lipanyň güli)

M.F.spec. D.S. 2 çay çemçe 1 bulgur demleme. Günde 2-3 bulgur gyzgyn içmeli.

Rp.	Herb.	Ulmariae	(Labaznigiň oty)
	Flor.	Sambuci aa	20,0 (Buzynanyn güli)
	Flor.	Tiliae	(Lipanyň güli)
	Flor.	Betulae aa	10,0 (Berýozanyn güli)

M.F.spec. D.S. 2 чай чөмчө 1 bulgur gyzgyn demleme. Günde 2-3 bulgur gyzgyn içmeli.

Rp. Flor. Sambuci (Buzinanyň gülü)

Flor. Tiliae (Lipanyň gülü)

Flor. Betulae aa 20,0 (Berýozanyň gülü)

M.F.spec. D.S. 2 чай чөмчө 1 bulgur gaýnag guýup, 5 min saklamaly. Günde 2-3 bulgur gyzgyn içmeli.

Rp. Flor. Chamomillae (Çopantelpegiň gülü)

Flor. Salviae (Akkemençäniň gülü)

Herb. Agrimoniae aa 10,0 (Hreniň oty)

M.F.spec. D.S. 1 чай чөмчө 1 bulgur gyzgyn demleme – чайkamak üçin (günde birnäçe gezek).

Rp. Flor. Verbasci (Sygyrguýrugyň gülü)

Fol. Farfarae (Eje-ejeligiň ýapragy)

Rad. Althaeae (Çerbiýäniň köki)

Flor. Malvae aa 10,0 (Mamaçöregiň gülü)

M.F.spec. D.S. 1 чай чөмчө 1 bulgur gaýnag bilen чай ýaly demlemeli. Sowadyp, agyz чайkamak üçin.

Rp. Flor. Tiliae (Lipanyň gülü)

Flor. Chamomillae aa 20,0 (Çopantelpegiň gülü)

Flor. Sambuci (Buzynanyň gülü)

Herb. Origani (Ýakymlyjanyň oty)

Herb. Majoranae aa 20,0 (Syçangulagyň oty)

M.F.spec. D.S. 1 nahar чөмчө 1 bulgur gaýnag suw bilen. Gündiz demlemäniň birnäçe bulguryny içmeli.

2. 4. Aşgazan-ісеге keselleriniň fitoterapiýasy

Aşgazan ісеге keselleri barada umumy maglumat we olaryň bejerilişi. Іýmit siňdiriş agzalarynyň keselleri giň ýaýrandyr we olara ýañadan gaýtalanma häsiýetlidir. Bu bolsa emeli preparatlar bilen bejerlende olaryň goşmaça häsiýetleriniň netijesinde ýüze çykyp bilýändir. Gastroenterologiki keselleri bejermekde derman ösümlikleriň preparatlaryny ulanmagyň ähmiýeti uludyr.

Fitopreparatlaryň aýratyn häsiýetleriniň bolmagy ýagny, toplumlaýyn täsiriniň, giň spektr täsiriniň (örtüji, aramlaşdyryjy, rahatlandyryjy, alawlama garşy, vitaminleriň, mineral duzlaryň, mikroelementleriň mukdaryny saklamagy, bardanyň geçirijiligini, bölüp çykaryş hadysalary, sorulmak hadysasyny kadalaşdyryjy häsiýetleriniň) bolmagy olara mahsusdyr. Bu häsiýetler bolsa iýmitiň kadaly siňdirilmegi üçin zerur şertlerdir. Şol sebäpli hem beýleki kesellerden tapawutlylykda aşgazan-içege kesellerinde fitopreparatlary ulanmagyň amatlydygy lukmançylyk amalynda ençeme gezek tassyklanandygyny bellemelidir.

Aşgazan we oniki barmak içegäniň keselleri. Aşgazan we oniki barmak içegäniň keseli giň ýaýran keselleriň biridir. Gelip çykyş alamatlary boýunça ýaraly zaýalanmalar birnäçe topara bölünýärler.

- I. Merkezi nerw ulgamyň işiniň bozulmagynyň netijesinde we nemli bardalarda gormon mehanizmleriniň dolandyryş işiniň bozulmagy netijesinde aşgazanyň we oniki barmak içegäniň baş keseliniň döremegi.
- II. Endokrin ulgamynyň bozulmagy netijesinde ýaranyň (galkan görnüşli mäziň çiş keseli netijesinde, gormonlaryň emele gelmeginiň bozulmasy) emele gelmegi.
- III. Dermanlaryň täsiri ýa-da olaryň nädogry ulanylmagy sebäpli
- IV. Zäherli we allergiki täsirli maddalaryň täsiri netijesinde
- V. Ýokanç keseller (inçe kesel, merezyýel keseli we ş.m) sebäpli döremegi.

Biz aşgazanyň peptiki başynda we oniki barmak içegäniň baş keseliniň üstünde durup geçeliň.

Bejeriş nukdaý nazaryndan aşgazanda baş emele gelmegine onuň nemli bardasynyň böwet işiniň bozulmagy sebäp bolýar. Ýagny onuň alawlama – distrofiki üýtgemesi, we başgalar aşgazanyň bölüp çykaryş, elektrolitiki ýerine ýetirýän işlerini gowşadýar. Şu ýagdaýdan peýdalanyp

wodorod ionlary aşgazandan sypyp gana düşýär, netijede gipohlorgidriniň mukdary köpelip nemli bardadaky alawlama has artýar. Boşan gistamin bolsa ownujak gan damarlaryň geçirijiligini ýokarlandyryp, dokuma suw ýygnaýar. Mundan başga-da boşan wodorod ionlary pepsiniň bölüp çykaryş işini güýçlendirýär, ony işjeňleşdirip pepsinogene öwürýär. Şeýle ýagdaýda nemli barda öz-özünden iýilip başlanýar. Netijede ýara, hat-da aşgazanyň peptiki baş keseli emele gelýär.

Oniki barmak içegäniň baş keselinde nerw ýa-da gumoral häsiýetli güýçli sekretor sazlaşdyrylma netijesinde aşgazanyň nemli bardasynyň öýjüklerinde, aşgazan şiresiniň turşulygy ýokarlanýar. Netijede hlorly wodorod turşusynyň ýokary goýulygyny we pepsin saklaýan bu aşgazan şiresi reabsorbsion hadysalara gatnaşman, oniki barmak içegä baryp düşýär. Ol ýerde aşgazan asty şire we öt bilen neýtrallaşdyrylyp ýetişmänkä, distrofiki-alawlama üýtgemelerini emele getirýär. Bu ýagdaý bolsa has hem köp mukdarda wodorod ionlarynyň bölünip çykmasyna sebäp bolýar. Şeýlelikde aşgazanyň nemli bardasynda bolşy ýaly oniki barmak içegelerde-de ýiti ýaralaryň, peptiki ötüşen baş emele gelmegine sebäp bolýar.

Bejergisi. Baş keseliniň esasy berjaý edilmeli kadalarynyň biri, iýmit iýmek kadasyny saklamak. Günde 6-8 gezek ýeňil siňýän, witaminlere baý iýmit iýmeli. Ýagly hem-de gowrulan naharlary, içi ýellendirýän iýmitleri iýmeli däl.

Ýygy-ýygydan iýmitlenip aşgazanyň bufer kadasyny saklamaly. Özüňi erbet endiklerden, ýagny, çilim çekmekden, alkağol içgilerini içmekden saklamaly. Şeýlelikde dynç alyş, iş, uky we iýmit kadalaryny berjaý etmeli. Bu keseliň has güýjeýän döwri 10-12 gün näsaglara №1a we №16, iýmitlenmek kadasyny 20 günden soň №1 iýmitlenmek kadasyny berjaý etmek maslahat berilýär.

Baş keselde bejergi hlorly wodorod turşusyny aramlaşdyryjy, alawlama garşy täsiri, nemli bardany örtüji, antiholinergiki, agyry aýryjy, rahatlandyryjy häsiýetli bolmalydyr. Bu iki keseliň berjergisiniň aýratynlygy aşgazan

başy berjerlende holinolitiki serişdeler berilmeli dälidir. Sebäbi bu serişdeler aşgazanyň ewakuator işini kynlaşdyrýar.

Aşgarlaýjy serişdeleriň kömegi bilen aşgazan şiresiniň görkezijisi pH=5 derejä deňlense, pepsiniň işjeňligi peselýär we agyry aýrylyp, ýara bitip başlaýar.

Fitoterapewtiki serişdeleriň dürli farmakodinamiki täsirli netijeleriniň bolmagy, olary aşgazan we oniki barmak içegäniň baş kesellerinde giňden ulanmaga mümkinçilik berýär. Has köp ulanylýan fitoterapewtiki ýygynyň mysal getirilýär:

Rp. Rad.	Althaeae	20,0	(Çerbiýäniň köki)
Rad.	Glycyrrhizae	20,0	(Buýanyň köki)
Rad.	Symphyti	20,0	(Akopnigiň köki)
Herb.	Chelidonii	10,0	(Demrewotyň oty)

M.F.spec. D.S. 1 nahar çemçe 1 bulgur suwda 10 min suwly hammamda gaýnatmaly we 2-3 bulgurdan günde nahardan 30 min öň içmeli. Bejergi 3-4 hepde geçirilýär.

Gaýnatma aşgazanyň bölüp çykaryş işini sazlaşdyrýar we gowşadyjy, regenerator hadysany sazlaşdyryjy, agyry aýryjy täsiri ýüze çykarýar.

Rp. Fruct	Foeniculi	20,0	(Arpabadyýanyň miwesi)
Rad.	Althaeae	20,0	(Çerbiýäniň köki)
Flor.	Chamomillae	20,0	(Çopantelpegiň gülleri)
Rad.	Glycyrrhizae	20,0	(Buýanyň köki)

M.F.spec. D.S. 1 nahar çemçe 1 bulgur suwda 10 min suwly hammamda gaýnatmaly we ýylyjak wagty 1 bulgurdan agşam içmeli

Gaýnatma alawlama garşy, spazmolitiki täsiri ýüze çykarýar we içegäniň ýerine ýetirýän işini kadalaşdyrýar.

Rp. Fruct.	Foeniculi	20,0	(Arpabadyýanyň miwesi)
Flor.	Chamomillae	20,0	(Çopantelpegiň gülleri)
Flor.	Tiliae	40,0	(Lipanyň gülleri)

M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly we 1-3 bulgurdan aýjyze ýyly görünüşinde içmeli.

Demlemäniň alawlama garşy, spazmolitiki täsiri bar.

Rp. Herb.	Chelidonii	10,0	(Demrewotyň oty)
Herb.	Millefolii	20,0	(Boýbodranýň oty)

Flor.	Chamomillae	20,0	(Çopantelpegiň gülleri)
Herb.	Hyperici	20,0	(Jerebaýyň oty)

M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly we 2-3 bulgardan nahardan öň içmeli. Demleme saryň gaýnanda peýdaly.

Rp.	Sem.	Lini	20,0	(Zygyryň miwesi)
Rad.	Althaeae		20,0	(Çerbiýäniň köki)
Herb.	Bursae Pastoris		20,0	(Çopan torbanyň oty)
Rad.	Valerianae		20,0	(Waleriananyň köki)

M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly we aýöze ertirine we agşam 0.5 bulgurdan, iç gatamalarda, içege ulgamynda agyry peýda bolanda içmeli

Rp.	Herb.	Centauri	20,0	(Altyn gülüň oty)
	Herb.	Hyperici	20,0	(Jerebaýyň oty)
	Flor.	Chamomillae	20,0	(Çopan telpegiň gülleri)
	Fol	Menthae piperitae	20,0	(Narpyzyň ýapragy)
	Herb.	Gnaphalii uliginosi	20,0	(Keçegülüň oty)

M.F.spec. D.S. 1 nahar çemçe 1 bulgur suwda 30 minut demläp goýmaly we ertir hem-de agşam nahardan 40 min öň $\frac{1}{4}$ bulgur içmeli. Demleme alawlama garşy, bitmesi kynlaşan ýaralary bejermekde, trofiki, antispastiki täsiri ýüze çykarýar.

Bitmesi kynlaşan başlary we newrotiki täsirleşmelerde gök sinýuhanyň gaýnatmasy ulanylýar. Onuň 1 nahar çemçesini günde 3-4 gezek iýmit arasynda içmeli, bejergi 2-3 hepde dowam etdirilýär. Şol bir wagtda bromuň preparatlary, sedatiw dermanlar we trankwilizatorlar ulanylýar.

Agyry peýda bolanda we saryň gaýnanda 2-3 aýyň dowamynda her 10 günden şu ýygyny ulanmaly:

Rp.	Flor.	Chamomillae	5.0	(Çopantelpegiň gülleri)
	Flor.	Calendulae officinalis	20.0	(Dyrnaklyjanyň güli)
	Fol.	Farfarae	20.0	(Eje-ejeliň ýapragy)

M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly we 1 nahar çemçeden günde 3-4 gezek nahardan 20 min. öň içmeli. Bejergini 10 gün dowam etdirilmeli.

Rp.	Flor.	Chamomillae	5,0	(Çopan telpegiň güli)
	Herb.	Hyperici	20,0	(Jerebaýyň oty)

Fol. Plantaginis majoris 20,0 (Uly atgulagyň ýapragy)
M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly
we 1 nahar çemçesi bilen günde 3-4 gezek nahardan 20 min öň 10 günün
dowamynda içmeli.

Ganly içi geçmede şu ýygyndy hödürlenýär:

Rp. Flor. Chamomillae 20,0 (Çopan telpegiň güli)
Rhiz. Potentillae erecti 20,0 (Gaýtarmanyň porrugy)
Herb. Hyperici 20,0 (Jerebaýyň oty)
M.F.spec. D.S. 1 nahar çemçe 1 bulgur suwda 10 min suwly hammamda
gaýnatmaly we günde 1 nahar çemçeden 4-5 gezek nahardan 45-60 min
öň içmeli.

Bedeniň metaboliki hadysalarynda we dikeliji döwründe
witaminleriň B topary, A, U witamini, biogen sazlaşdyrjylar
bolan saburyň ekstrakty, solkoseril we başgalar peýdaly
hasaplanýar.

Aşgazanyň we öniki barmak içegäniň baş keselinde ulanylýan dermannamalar

Rp. Tinct. Belladonnae 30,0 (Belladonanyň tinkurasy)
M.F. spec. D.S. Günde 5-6 damjadan 3-4 gezek çopantelpegiň
demlemesine damdyryp içmeli.

Rp. Sem. Lini (Zygryň miwesi)
Rad. Althaeae (Çerbiýäniň köki)
Lichenis island aa 25,0 (Islant mohy)
M.F. spec. D. S. 2 nahar çemçäni 2 bulgur sowuk suwda birnäçe sagat
goýmaly we soňra 5 min gaýnatmaly. Gaýnatmany bir günde 5-6 gezekde
içmeli.

Rp. Fol. Althaeae (Çerbiýäniň ýapragy)
Rad. Althaeae (Çerbiýäniň köki)
Rad. Glycyrrhizae (Buýanyň köki)
Rad. Symphyti aa 20,0 (Okopnigiň köki)
Herb. Chelidonii 10,0 (Demrewotyň oty)

M.F. spec. D.S. 1 nahar çemçe ýgyndyny 1 bulgur suwda gaýnatmaly. Günde 50 ml 2-3 gezek içmeli.

Rp. Flor. Chamomillae 50,0 (Çopantelpegiň güli)

D.S 3 çay çemçesi 1 bulgur suwda demlemeli. Ertirine ajöze nahardan 1 sagat öň, sagat 17.00 we agşam ýatmazdan öň içmeli. Aşgazany ýuwmak üçin ulanmaly.

Rp. Flor. Chamomillae (Çopantelpegiň güli)

Fruct	Foeniculi aā	10,0	(Arpabadyýanyň miwesi)
Rad.	Althaeae		(Çerbiýäniň köki)
Rad.	Liquiritiae		(Buýanyň köküniň külkesi)
Fol.	Menthae pip aā	20,0	(Narpyzyň ýapragy)

M. F.spec. D.S 2 çay çemçesini 400 ml suwda 30 min ýuwaşja gaýnatmaly. Günde 3 gezek 50 ml ajöze içmeli. Gastrit we baş kesellerinde peýdaly.

Ötüşen gastrit

Bu kesel mahsus bolmadyk ötüşen alawlama hadysalarynyň netijesinde aşgazanyň nemli bardasynyň gurluşynyň hem-de onuň bölüp çykaryş, motor we içerkimäzleriň bölüp çykaryş işiniň bozulmagy bilen häsiýetlendirilýär. Ötüşen gastridiň emele gelmegine dürli ekzogen we endogen ýagdaýlara sebäp bolýarlar. Ekzogen faktorlara: iýmitiň düzüminiň we iýmitleniş kadasynyň bozulmagy, çilim, neşe çekmek, alkohol içgiler içmek hem-de saglyga zyýanly kärde işlemek degişlidir. Endogen ýagdaýlara: patogenetiki mehanizmlerden awtoimmun hadysalary, nerw we gormonal bozulmalar, hem-de toksikohimiki ýagdaýlaryň täsirinde nemli bardanyň dargamagy we ş.m. mysal bolup biler.

Ötüşen gastrit özbaşdak kesel hem bolup biler ýa-da beýleki keselleriň (aşgazan başy, gepatoholesistit, awitominozlar, gipoksemiýa we başgalar) emele gelmegine sebäp bolup biler.

Aşgazanyň motor-ewakuator işiniň, bölüp çykarýan işiniň bozulmagy köp dürlidir. Bu kesel bölümleri boýunça çäklendirilýär (meselem: güjeýän döwri, keseliň gowşamagy).

Gastrit keseli. Bu keselli nasaglar agyr siňdirilýän we gyjyndyrýan iýmiti iýip bilmeýärler. Şeýle iýmit iýlende olar agyrlyk, gysylma duýýarlar, çişmek, aşgazan ulgamynda gaýnaglama, gägirmek, ýürek bulanma ýa-da gaýtarmak ýaly näsazlyklary duýýarlar. Kähalat güýçli bolmadyk agyry duýulýar. Näsagyň diliniň üstüne örgün öryär.

Bejerlişi. Gastritiň güýjän döwründe № 5a düzümlü iýmit kadasy bellenýär. Günde 4-5 gezek iýmit iýmeli we onuň düzüminde nemli çorbalar, dograp, geçirilip gowy gaýnadylan et, balygyň ýagsyz görnüşleri, gyrgyçdan geçirilen gök önümler, kakadylan çörek, süýtde bişirilen aşlar bolmaly we itburunyň demlemesi bellenilýär. Şeýle iýmitlenmek kadasyny 7-10 gün dowam etdirmeli.

Alawlama garşy, spazmolitiki täsiri ýüze çykarýan plantaglusit hem-de witaminlerden B₁, B₂, B₆, C, nikotin turşusy bellenýär. Mundan başga-da ötüşen gastritde aşgazan şiresiniň pes turşulygy bolan nasaglar bejerilende hlorly wodorod turşusy bilen pepsin bellenilýär. Turşulygy ýokary gastritde bolsa, tersine antasid preparatlary bellenýär.

Gastrit keselini bejermekde fitoterapewtiki serişdeleriň hem ähmiýeti uludyr. Bellenilen witaminli ýyggyndylaryň düzümine rýabinanyň, itburunyň, ýertudanasynyň, smarodinanyň miweleri, çit-çitiniň ýapragy we başgalar girýär. Aşgazanyň nemli bardasynyň gaýnaglamasy netijesinde onuň ýerine ýetirýän işiniň bozulmagynda tebigy aşgazan şiresi bellenýär. Onyň 1-2 nahar çemçesini günde 3 gezek iýmit iýilýän wagty içmeli.

Ötüşen gastritde köplenç içegäniň we öt bölüp çykarýan ulgamyň ýerine ýetirýän işi bozulýar. Şol sebäpli bu bozulmalary kadalaşdyrýan derman ösümlükleriň (çopantel-pegiň güliniň, narpyzyň ýapragynyň, aýy ýowşanyň, boýbodranyň, jerebaýyň otunyň, mekgejöweniň gulpagynyň we ş.m.) demlemeleri bellenýär.

Sekretor ýetmezçiligi bolan gastritde bellenýän ýyggyndylar:

Rp.	Herb.	Absinthii	10,0	(Ajy ýowşanyň oty)
	Rhiz.	Calami	10,0	(Süýji ýekeniň porrugy)
	Fol.	Trifolii	10,0	(Üç ýaprakly watanyň ýapragy)
	Fruct.	Carvi	10,0	(Tminiň miwesi)

M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly we S bulgurdan günde 3 gezek nahardan 30 min öň içmeli.

Işdäni açmak üçin bellenilýän ýygyndy:

Rp.	Extr.	Centaurii fluidi		(Altyngüliň ergin ekstrakty)
	Extr.	Absinthii fluidi	aa 15,0	(Ajy ýowşanyň ergin ekstrakty)
	T-rae.	Menthae piperitae	20,0	(Narpyzyň ýapragynyň tinkturasy)

M.D.S. 20 damjadan 1 bulgur suwa damdyryp nahardan öň içmeli.

Içgeçmeli näsaglara bellenýän ýygyndy:

Rp.	Herb.	Absinthii	10,0	(Ajy ýowşanyň oty)
	Herb.	Equiseti	20,0	(Meýdan kyrkbogynynyň oty)
	Herb.	Millefolii	20,0	(Boýbodranyň oty)
	Rhiz.	Potentillae erecti	10,0	(Gaýtarmanyň porrugy)

M.F.spec. D.S. 1 nahar çemçe 1 bulgur suwda 10 min gaýnatmaly we günde S bulgur içmeli.

Rp.	Flor.	Chamomillae	10,0	(Çopan telpegiň güli)
	Herb.	Millefolii	10,0	(Boýbadranyň oty)
	Herb.	Absinthii	10,0	(Ajy ýowşanyň oty)
	Fol.	Salviae	10,0	(Ak kemençäniň ýapragy)

M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly we günde S bulgyr ýyly görnüşinde nahardan 20-30 min öň içmeli

Aşgazanyň we içegäniň ýerine ýetirýän işiniň bozulmalarynda (dispepsiýasynda) bellenýän ýygyndylar

Rp.	Fruct.	Foeniculi	20,0	(Arpabadyýanyň miwesi)
	Rhiz.	Calami	20,0	(Süýji ýekeniň porrugy)
	Rad.	Valerianae	20,0	(Waleriananyň köki)
	Fol.	Menthae piperitae	30,0	(Narpyzyň ýapragy)
	Fol.	Chamomillae	30,0	(Çopantelpegiň güli)

M.F.spec. D.S. 1 nahar çemçe 1 bulgur suwda 10 min gaýnatmaly we 1 bulgurdan günortan naharyndan soň we ukalmazdan öň içmeli.

Ýokary sekretor funksiýaly gastritde bellenýär:

Rp.	Fol.	Plantaginis	40,0	(Uly atgulagyň ýapragy)
	Herb.	Hyperici	40,0	(Jerebaýyň oty)
	Herb.	Gnaphalii	40,0	(Keçegüliň oty)
	Herb.	Polygonii evicularis	20,0	(Suw kyrkbogunyň oty)
	Herb.	Millefolii	15,0	(Boýbodranyň oty)
	Fol.	Menthae piperitae	10,0	(Narpyzyň ýapragy)
	Fruct.	Carvi.	10,0	(Tminiň miwesi)
	Rhiz.	Calami	10,0	(Süýji ýekeniň porrugy)

M.F.spec. D.S. 1 nahar çemçe 1 bulgur suwda 10 min gaýnatmaly we 0,5 bulgurdan günde 4 gezek nahardan soc içmeli.

Rp.	Flor.	Tiliae	20,0	(Lipanyň güli)
	Sem.	Lini	20,0	(Zygyryň miwesi)
	Rad.	Glycyrrhizae	20,0	(Buýanyň köki)
	Rhiz.	Calami	20,0	(Süýji ýekeniň porrugy)
	Fol.	Menthae piperitae	20,0	(Narpyzyň ýapragy)
	Fruct.	Foeniculi	20,0	(Arpadyýanyň miwesi)

M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly we günde 2-3 bulgurdan nahardan 1 sagat öc içmeli.

Rp.	Rad.	Althaeae	20,0	(Çerbiýäniň köki)
	Fruct.	Foeniculi	20,0	(Arpadyýanyň miwesi)
	Flor.	Chamomillae	20,0	(Çopantelpegin güli)
	Rad.	Glycyrrhizae	20,0	(Buýanyň köki)

M.F.spec. D.S. 1 nahar çemçe 1 bulgur suwda 10 min gaýnatmaly we agşam 1 bulgurdan içilýär.

Sary gaýnamaly we iç gatamaly näsaglara bellenýär

Rp.	Herb.	Hyperici	10,0	(Jerebaýyň oty)
-----	-------	----------	------	-----------------

Fol.	Trifolii	10,0	(Üç ýaprakly wahtanyň ýapragy)
Herb.	Tanacetii	10,0	(Tanasetumyň oty)
Rad.	Valerianae	10,0	(Waleriananyň köki)
Rhiz	Calami	10,0	(Süýji ýekeniň porrugy)

M.F.spec. D.S. 1 nahar çemçe 1 bulgur suwda 10 min gaýnatmaly we günde 0,5 bulgurdan nahardan 1-1,5 sagat öc içmeli.

Işdäsizlikde we aşgazanda agyry bolanda bellenýär

Rp.	T-rae	Belladonnae	5,0	(Belladonanyň tinkturasy)
	T-rae	Centaurii		(Altyngülün tinkturasy)
	T-rae	Absinthi aā	20,0	(Ajy ýowşanyň tinkturasy)
M. D.S. Günde 0,5 bulgur suwa 30 damja damdyryp nahardan öň içmeli				

Agyry duýlanda we iç ýellenende bellenýär:

Rp.	Fruct.	Anisi	10,0	(Anisiň miwesi)
	Fruct.	Foeniculi	10,0	(Arpabadyýanyň miwesi)
	Fruct.	Carvi	10,0	(Tminiň miwesi)
	Fol.	Menthae piperitae	20,0	(Narpyzyň ýapragy)
M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly we 1 bulguryň günüc dowamynda owurtlap içmeli.				

Iç ýellenende bellenilýär

Rp.	Herb.	Hyperici	30,0	(Jerebaýyň oty)
	Fol.	Trifolii	20,0	(Üç ýaprakly wahtanyň ýapragy)
	Fol.	Menthae piperitae	15,0	(Narpyzyň ýapragy)
	Herb.	Millefolii	15,0	(Boýbodranyň oty)
	Sem.	Anethi	15,0	(Şebidiň tohumy)
M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly we 1/4 bulgurdan günde 4-6 gezek nahardan 1-1/2 sagatdan soc içmeli.				

Inçe içegänic keselleri (enteritler)

Inçe içegänic kesellerinde onuc belli bir derejede sekretor, motor, iýmit sicdiriji, rezorbtiw ýerine ýetirýän işiniň bozulmagy bolup geçýär. Bu bozulmalar nemli bardada morfologiki üýtgame bolmasada bolup bilýär. Inçe içegänic

ýerine ýetirýän iş bozulan näsaglaryň inçe içegesinde we beýleki synalarynda-da organiki üýtgemeler bolup biler.

Şeýle ýerine ýetirilýän iş bozulmalara, inçe içegäniň hereketleniş işiniň bozulmagy, onuň siňdiriliş işiniň bozulmalary ýagny uglewodlaryň, ýaglaryň siňdirilmek hadysalaryň bozulmagy mysal bolup biler.

Inçe içegäniň gaýnaglamasynda ýagny enteritde aşgazan ýa-da ýogyn içege zaýalanyp biler. Netijede gastroenteritler, enterokolitler we gastroenterokolitler ýüze çykýar.

Inçe içegäniň alawlama keseliniň ýüze çykmagyna ýymitlendiriş ulgamynyň ýokarky bölümleriniň hereketleniş işiniň we sekretor işiniň bozulmagy (atrofiki gastrit, kesilen aşgazan, öt haltanyň we öt ýollarynyň hereketleniş işiniň bozulmagy, ötüşen pankreatit) sebäp bolup biler. Mundan başga-da ýürek näsazlyklary we gipertoniýa sebäpli gan bilen arassalanyşyň bozulmagy, ýimit üpjünçiligiň bozulmagy (proteinleriň, witaminleriň ýetmezçiligi) madda çalyşygynyň bozulmagy, (süýjülik keseli we tireotoksikos), aşgazan içegäniň täsirleşmek ýagdaýy, (adaty däl klimatiki we fiziki täsiri) we ş. m. sebäp bolup biler.

Köp halatlarda ýiti enteritleriň ýüze çykmagynda salmonellalar, Escherichi coli we dürli mikrobedenjikleriň, enterowiruslaryň, kandidileriň dürli görnüşleriniň ýüze çykaran, toksiki ýokanç kesel döredijiniň ähmiýeti ulydyr. Bu keseliň emele gelmegine ýimitleniş kadanyň bozulmagy, derman serişdeleriň toksiki täsiri, himikatlar, hili pes ýimitler sebäp bolup biler. Ötüşen enteritiň ýüze çykmagyna ýiti enterit bilen näsaglamak sebäp bolup biler ýa-da onyň bildirgisiz ötüşmegi mümkin. Ýiti enteritiň ötüşen görnüşine geçmegine ýokarda sanalan ýagdaýlar gös-göni sebäp bolup biler.

Mundan başga-da ötüşen enteritiň ýüze çykmagyna lýamblioz parazitiniň bolmagy ýa-da içegäniň üpürjikleriniň atrofiýasy, içegede ýimitiň sorulmagynyň bozulmagy we ş.m.sebäp bolup biler.

Patogenezi. Enteritde inçe içegäniň esasy 4 sany ýerine ýetirýän işiniň bozulmagy ýagny: sekretor, motor, rezorbtiv we ekstreter bozulmagy bolup geçýär.

Şeýle ýagdaý bolsa iýmitiň siňdirilmegine we onuň düzüminiň doly sorulmagyna päsgel berýär. Ýaglaryň siňdirilmesi bozulsa, ýagda ereýän witaminleriň ýetmezçiligi duýulýar. Netijede gipo, we awitaminozlar, gipoproteinemiýa we güýçli horlanma ýüze çykýar.

Netijede, inçe içegede mikroflorasynyň aram kadasy bozulýar we ol ýogyn içegä hem geçýär. Netijede, iýmitiň siňdirilşi bozulup, autointoksikasiýa başlanýar. Bakteriýalar goňşy beden agzalaryna aralaşyp, öt ýollarynyn, böwrek, peşew haltanyň alawlamasyny döredýär.

Inçe içegäniň enteritinde näsaglar garyn boşlugynda agram duýýar, we nahardan soň garyn çişme duýulýar. Göbegin daşynda agyry peýda bolýar. Içdäsi pes we ýokary bolup biler. Uly täret bozulup günde 2-4 gezek, ýa-da sary yaşyl reňkli suwuklyk görnüşinde bolýar. Garnyň çişmesini we agyrsyny elläp görüp bilmek bolýar. Has agyr ýagdaýlarynda gipoproteinemiýanyň alamatlaryny duýmak bolýar. Näsaglar horlanýar. Tejribe barlaglaryň netijesinde ganyň düzümindäki elektolitleriň üýtgeýändigini, proteinleriň, albuminleriň, holesterolyň azalýandygyny bilmek bolýar.

Bejergisi. Näsagy hassahanalarda bejermeli. Etiotrop bejergiden soňra ýokanç kesel döredijilere garşy, soguljana garşy serişdeleri ulanyp, etiotrop iýmitleniş kadasyny berjaý etdirmeli. Näsagyň iýmiti düzüminde az mukdarda uglewodlary we ýaglary saklamaly. Witaminoterepiýany (A, B₁, B₂, B₁₂, PP, C witaminleri) bellemeli.

Ýogyn içegäniň keselleri (kolitler)

Etiologiýasy we patogenezi. Ýogyn içegäniň esasy ýerine ýetirýän işiniň biri- ol hem inçe içegeden barýan iýmit massanyň sorulmagyny üpjün etmek. Ol ýerde suwuň we elektrolitleriň sorulmagy we uly täret massanyň daşary

çykarylmany üpjün edilyär. Ýogyn içegä günde 1200 ml himus baryar olaryň 200 g, täret görnüşinde çykarylýar. Ýogyn içegede günde 70 mekw natriý, 30 mekw hloridler, 40 mekw bikorbonatlar, 5 mekw kaliý ionlar çykarylýar. Gerek bolan ýagdaýynda ýogyn içege öz kadasyndan baş esse köp erginleri we elektrolitleri reabsorbirlemäge ukyplydyr. Ýogyn içegäniň esasan hem sag tarapy rezorbirleýji häsiýeti berýär. Onuň bu işi bozulanda iç geçme, hereketlendiriji işi bozulan bolsa, iç gatama ýüze çykýar.

Ýogyn içegäniň alawlama keseli has köp duş gelýär. Ýiti kolit esasan ýokanç kesel döretmeýän agentler, ýönekeýjeler tarapyndan we iýmitdäki nasazlyklary tarapyndan döreýär.

Otüşen kolitiň ýüze çýkmanynda bolsa ýokanç kesel döredýän agentler, ýönekeýjiler, soguljanlar, zäherli maddalar, metabolizmiň bozulmagy, fiziki ýagdaýlar, allergiki we immun mehanizimleriniň bozulmalary we başgalar sebäpli bolup biler. Otüşen kolit birnäçe toparlara bölünýär. Zäherli, ýokanç kesel döredijilerden soň, radiosion, allergiki ikilenji, baş – gemorragiki bolup biler. Ýokanç kesel döredýän otüşen kolitleriň arasynda iň esasy ýeri otüşen bakterial dizenteriya tutýar. Mundan başga-da patogen ştamlar eşerhiýa koli, kesel döredijileriň dünýäsinden (antibiotiklerden soň emele gelen disbakterioz) tarapyndan ýüze çykan otüşen kolitler, inçe keseliň we merezýel keseliniň kolitleri hem uly rol oýnaýar. Ýogyn içege güýçli ýokanç kesel dörediji döwründe zaýalanyp, birnäçe wagt geçenden soň hem bildirip biler. Otüşen kolit ekzogenlere, we endogenlere bölünýär. Ekzogen kolitler gurşun, simap, bilen zäherlenende ýa-da uzak wagtlap gowşadyşy preparatlar ulanylanda ýüze çykýar (fenolftalein). Endogen toksiki kolitler uremiýada, gipertireozda we böwrek üsti maziň gabyk gatlagynyň gipofunksiýasynda ýüze çykýar.

Ýaraly - gemoraggiki kolit

Ýaraly - gemoraggiki kolit – bu ýogyn içeganiň iriňli ýara gaýnaglama keseli bolup gaýtalamaga ukyplydyr. Bu keseliň etiologiýasy patogenezi doly takykklanmadyk, ýöne onuň ýüze çykmagyna immun ulgamynyň bozulmagy sebäp bolup biler.

Keseliň alamatlary. Pes tonusly näsaglarda ýa-da olaryň ýogyn içegesiniň uzynlygyna ösmeginde iç gatama alamaty ýüze çykýar. Garry adamlarda iç gatama endikleriniň uzak wagtlap dowam etmegi ýogyn içegede ýokary basyşyň netijesinde içi boş haltajyklaryň emele gelmegi mümkin, şeýlede ýogyn içegäniň birleşdiriji dokumasynyň we tekiz muskulaturanyň trofiki bozulmagy mümkindir. Funksional keselleriň arasynda ýygy duş gelýäni (diskineziýa) hereketiň kynlaşmagy (ýogyn içegäni gyjyndyryjy; colica mucosa, ýogyn içegäniň spastikligi). Bu kesel beýleki keseller sebäpli ýa-da ruhy - emosional agramsalmalar sebäpli döräp biler.

Kliniki keşbi. Bu keseliň kliniki keşbi uly täretiň bozulmagy, aşgazanyň ýerine ýetirýän işiniň bozulmagy we agyry ýüze çykmagy bilen hasiýetlendirilýär. Agyrynyň ýüze çykmagy uly täret bilen baglanşykly ýa-da uzak wagtlap dyngysyz agyry bolýar. Aşgazanyň ýerine ýetirýän işiniň bozulmagy işdä peselmegine, iç ýellenmegine we içiň jugurdamagyna getirýär. Uly täretiň bozulmagy, içgeçme gysga wagytly we az mukdarda bolup, näsagyň umumy ýagdaýyna hem-de onuň daýawlygyna täsir etmeýär. İç gatama 24-sagatdan hem köpräk bolup biler, ýöne näsag uly täreti kynlyk bilen we az mukdarda günde edip biler. Uly täret bilen bölünip çykýan gan gyzyň reňkini saklaýar.

Bejergisi: Ýokanç keselli kolitde we ondan soň näsaglara sulfanilamidler (sulfaguanidin), antibiotikler, dezinfisirleýji preparatlar, bellenilýär. Ikilenji kolitler esasy keseliň zygider bejergisini talap edýär.

Zäherleýji madda bedenden çykarylanda näsagyň ýagdaýy gowulaşýar.

Ýogyn içegäniň keseliniň bejergisinde iýmit kadasyny we suw-elektrolitiki deňagramlylygy saklamaly. Funkisional bozulmalarda – ýogyn içegäniň (diskineziýasynda) hereketiň bozulmasynda sedatiw we trankwilizirleýji serişdeler üstünlikli ulanylýar.

Içgeçme we içgatama alamatlary bolanda ýörite simptomatiki bejergi belleniýär.

Fitoterapewtiki serişdeden ýara bitiriji häsiýetli kelemiň şiresi, gülgün kartoşkanyň şiresi, dermanlyk çopantelpegiň gülüniň suwly demlemesi, buýanyň köküniň gaýnatmasy ulanylýar.

Iç geçme we iç gatama alamatlary bolan näsaglara fitoterapewtiki serişdelerden tanine baý (iç geçmede) ösümlükler ulanylýar. Meselem: olhanyň bişen miwesi, kiziliň bişen miwesi, ak ýaseniň köki, gaýtarmanyň köki, böwürsleniň ýapragy, ýandagyň güli, çäýiň ýapragy we ş.m..

Iç gatama alamatlary ýüze çykanda gowşadyjy fitoterapewtiki serişdeleriň uly topary ulanylýar. Ösümlüklerden taýýarlanan gowşadyjy serişdeleriň bir topary içegede çişip onuň tolkun şekilli ýygrylmasyny üpjün edýär. Kābirleri bolsa – içegäniň nemli bardasyny gyjyndyryp, onuň tolkun şekilli ýygrylmasyny üpjün edýär we köp mukdarda suwly sekresiýa bolünip çykyp, gaty täret massany ýumşadýar.

Ýene-de bir görnüşi bolsa düzüminde nemli massany saklap, içegäniň içindäkile nejesatlary hereketlendirip daşary çykarylmalygyny üpjün edýär. Gowşadyjy täsirli derman ösümlüklerine: sabur, senaýmekge zygyr, garatiken, şugundyr, käşir, kadi, ak bāgūl, injir, meýdan peçegi we başgalar degişlidir.

Babasil – artbujak ulgamynyň deriasty we atrbujak akalgasynyň nemli bardasynyň aşakdaky gatlagyndaky wenzor örümleriň babasil düwünli giňelmeleridir. Babasil düwünleriň emele gelmegi birnäçe göni arteriýawenaly seplemeleri bolan köwek dokumanyň ýygnanmagydyr. Bu örān köp ýaýran kesel bolup, göwrelilikde (iç gatama, çaga dogrulanda)

çygylmagy sebäpli wenoz akymynyň kynlaşmagy sebäpli, infeksiýada (proktit) iç geçmede, içege ýellenmesinde, göni içege uly täretiden doly arassalanmadyk halatynda, derweze wena ulgamynda basyşyň ýokarlanmagy sebäpli ýuze çykyp biler. Bu keselde bedeniň gurluş aýratynlygynyň uly ähmiyeti bardyr.

Keseli anyklamak näsagyň arzy, ýerli seretmek we rentgen barlaglarynyň esasynda geçirilýär. Babasil ýogyn içegäniň nemli bardasynyň daşyna çykkmagy, polipler we göni içegäniň çişmegi bilen düşündirilýär.

Bejergisi. Babasil keseli köplenç hammamda oturyp buglanmak ýa-da gyzdyryjy ýapgylyar, semleri, iç sürüji serişdeleri ulanmak bilen bejerilýär. Ýiti dowründe rahatlyk bermeli we ihtiolly, proteolitiki enzimli we nowokainli şemleri belleniýär. Babasil düwünler gaçyp çykanda we kesel güýjände gowusy operasiýa geçirmeli. Düwünler çişen halatynda bolsa fitoterapewtiki serişdeleri ulanmak amatlydyr. Bu serişdeleri hammamça etmek, ýapgy ýapmak, şeýle hem içmek peýdalydyr.

Babasilde wenatoniki serişde hökmünde at kaştanyň gyzgyn demlemesi ulanylýar.

At kaştanynyň miwesinden esflazid we eskuzan preparatlar goýberilýär. Eskuzan 10-20 damja günde 3 gezek nahardan öň içmeli. Esflazid 1 gerdejikden ýa-da 1 şemden günde 2 gezek, 2 gün, soňky günler bolsa günde 3-4 gezek göni içegä goýbermeli. Bejergini 4 hepde down etdirmeli.

Babasilde artbujak ulgamyny hammamça ýa-da ýapgy etmek üçin ýygyndy.

Rp.	Sem.	Hippocastani	30,0	(At kaştanyň miwesi)
	Flor.	Chamomillae	30,0	(Çopan telpegiň güli)
	Fol.	Salviae	20,0	(Akkemençäniň ýapragy)
	Cort.	Quercus	50,0	(Dubuň gabygy)

M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly we hammamça ýa-da ýapgy etmek üçin ulanylýar.

Rp.	Cort.	Quercus	50,0	(Dubuň gabygy)
Herb.	Equiseti		20,0	(Meýdan kyrkbogynyň oty)
Rad.	Valerianae		20,0	(Waleriananyň köki)

M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly we hammamça etmeli.

İç ýumşatmak üçin ulanylýan ýygyny.

Rp.	Cort.	Quercus	30,0	(Dubuň gabygy)
Sem.	Lini		30,0	(Zygyryň tohumy)
Flor.	Chamomillae		40,0	(Çopan telpegiň güli)

M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly we 1/2-1 bulgurdan ertir we agşam içmeli.

Babasilde göni içegede gaýnaglama emele gelende zygyr çigidiniň demlemesi bilen iç ýuwmalı. Bu maksat üçin 1 çemçe zygyr çigidini 1 bulgur gaýnan suw bilen 2-3 sagat demläp goýmaly. Soňra 50 ml taýýarlanan nemli ergini (ýylyjak) içegä goýberip birnäçe gezek ýuwmalı.

İçge kesellerinde ulanylýan gök önümler we miweler

Gök önümlerden we miwelerden içge kesellerinde ulanylýanlary gowşadyjy, berkediji, spazmolotiki, gaýnaglama garşy, gan saklaýjy täsiri ýüze çykarmalydyr.

İç gatamalarda gowşadyjy serişde hökmünde bişirilmedik kădi, şugundyr, turp, garpyz, gawun, kăşir, kelem şiresi, zeýtun, böwürslen we üzüm ulanylýar.

Kolitlerde, iç gatamalarda agyry aýryjy we gowşadyjy serişde hökmünde: kryhownigiň miwesiniň gaýnatmasy, şebidiň tohumynyň demlemesi, garaugyň köküniň demlemesi we şiresi we zirkiň miwesiniň şiresi ulanylýar. İç geçmelerde gaýnaglama garşy we örtüji serişde hökmünde behiniň, naryň (güllerinden, tazeje miwelerinden gabygy bilen) kakadylan armydyň, böwürsleniň, ýertudanasynyň, ýapraklaryndan, kalinanyň güllerinden, ýandagyň gülünden taýýarlanan demlemeler we gaýnatmalar ulanylýar. İç geçmä garşy täsiri

smorodinanyň täzeje we guradylan miweleri hem ýüze çykarýar.

Aşgazanasty mäziň keselleri

Aşgazanasty mäs garyn boşlugynda on iki barmak içegäniň deňesinde ýerleşendir. Ýmit siňdiriş hadysasynda onuň işi örän wajypdyr. On iki barmak içegäniň hanasyna dökülýän pankreatik şire proteinleri özleşdirmek üçin tripsin enzimlerini, uglewodlary, ýaglary özleşdirmeklik üçin gerekli amilaza we lipaza enzimlerini öz düzüminde saklaýar.

Aşgazanasty mäs - süýnmek görnüşli parenhimatoz beden agzasydyr. Görkezilip geçilen daşky ýagdaý işinden başga-da, ol uglewodlaryň özleşdirilmekligine ýardam ediji insuliň gormonyňy işläp çykarýar.

Aşgazanasty mäs, on iki barmak içege, aşgazan, öt ýollary we bagyr bilen jebis arabaglanşykdadyr. Bu baglanyşyk diňe bir anatomik taýdan däl, eýsem olar fiziologik taýdanda ysnyşykly özara ylalaşykdadyr. Öt we hlorly wodorod turşusy aşgazanasty mäziň daşky sekretor işiniň höwesjeň gyjyndyryjylarydyr. Şeýlelikde, aşgazanasty mäziň işjeňliginiň bozulmaklygy, köplenç, görkezilen agzalaryň patalogik näsazlyklary bilen şertlenendir. Ol ýa-da beýleki enzimatiki işiň bolmazlygynda ýmitiň düzümi böleginiň siňmegi bozulýandyr. Meselem, lipazanyň bölünip çykmagy bozulanda, ýaglaryň siňdirilmesi bozulyar. Netijede täretin düzüminde siňmedik ýaglaryň mukdary ýokarlanýar (steatoreýa). Tripsiniň bölünip çykmagynyň bozulmaklygynda täretde siňdirilmedik muskul süýümjikleri tapylýar (kreatoreýa).

Pankreatit. Ýiti pankreatit - aşgazanasty mäziň ýiti alawlamasy - ýimitden aşa düşlmeginden, zäherlenmeden ýa-da aşgazanasty mäze zäherli täsirlerden (intoksikasiýa) duýdansyz döräp biler. Oslagsyz, garnyň daşyna guşaklaýyn egriliji agyry, öt gusmaklyk, bedeniň gyzgyn görkezijisiniň ýokarlanmagy, leýkositozyň mese-mälim ýüze çykmagy bilen

utgaşýandyr. Ýiti pankreatiti bejermeklik klinikada hirurgiki amala aşyrylýar.

Ötüşen pankreatit. Bu giňden ýaýran keseldir. Ugurdaş agzalaryň dowamly keselleri, köplenç, ötüşen pankreatitiň sebäpleri bolup bilerler. Meselem: bu kesel ötüşen holesistitden we aşgazanyň ýara-baş keselinden ejir çekýänleriň 1/3-de duş gelýär. Bu näsaglarda, pankreatit, ötüşen geçiş akymyna eýe bolýar, ýagny, wagtal-wagtal garnyň daşyna egriliji agyry, şeýle hem, göbegiň töwereginde, garnyň çep tarapyna ýaýraýan agyry peýda bolýar. İçegeler ýellenýär.

Düýpli barlaglarda, iç ýellenme zerarly, garnyň dartylyp durmagy, elläp göründe, garynasty maziň öndäki garyn perdejigine düşýän nokadynda (göbegiň töwereginde we göbekden çepde) agyry kesgitlenilýär. Agyry, on iki barmak içegäniň ýerleşýän yerinde hem (göbekden sagda) döräp biler. Täret bolsa, düzüminde siňmedik ýag goşundysynyň bardygy sebäpli ýagjymakdyr. Täretde dargap ýetişmedik kleçatkalary-da görmek bolýar.

Ganyň biohimiki barlaglary, kä halatlarda, pankreatik enzimleriň düzüminiň ýokarlanýandygyny ýüze çykarýar. Edil şonuň ýaly üýtgemeler peşewde hem bolýar.

Bejerişi: berhiz örän ähmiýetlidir. Trasilol, kontrikal bilen bejeriş tapgyry belleniýär. Zerur halatlarda, tebigy aşgazan şiresi, pankreatin, antibiotikler ulanylýar. Ugurdaş agzalaryň utgaşykly kesellerini bejermek hem örän wajypdyr.

Näsaglara bejergi bellende, berhiziň berjaý edilişine gözegçilik etmeklik möhümdir. Berhiz bozulanda, bolup biläýjek düýpli kesel çylşyrymlaşmalary barada, olara duýdurmaladyr.

Ötüşen pankreatiti fitoterapewtiki serişdeler bilen bejermegiň maksady, aşgazanasty maziň yerine ýetirýän işini dikeltmekden ybaratdyr. Şeýle-de alawlama garşy täsiri ýüze çykarýan ýygyny belleniýär.

Rp.	Fructl.	Anisi	10,0	(Anisiň miwesi)
	Herb.	Chelidonii	10,0	(Demrew otynyň oty)
	Stygm.	Maydis	10,0	(Mekgejöweniň gulpagy)
	Rad.	Taraxaci	10,0	(Tozganyň köki)
	Herb.	Polygonii avicularis	10,0	(Kyrkbogunyň oty)
	Herb.	Hyperici	10,0	(Jerebaýyň oty)
	Herb.	Violae tricolor	10,0	(Benewşäniň oty)
M.F.spec. D.S. 1 nahar çemçe 1 bulgur suwda 10 min gaýnatmaly we gyzgyn görünüşinde 1 bulgurdan günde 3 gezek nahardan 20-30 minut öň içmeli.				

Aşgazanasty mäziň enzimleriniň ýetmezçiligini, aşgazanasty mäziň preparatlary bolan pankreatin bilen üstüni ýetirip bolar. Preparat aşgarly suwlar bilen içilýär. Mundan başga-da, utgaşdyrylan preparat - panzinorm forteden 1-2 noguldan nahar iýilende 3 gezek içmeli.

Bu keseli bejermekde derman ösümlükleriniň preparatlary giňden ulanylýar. Olar rahatlandyryjy, spazmolitiki, agyry aýryjy bölüp çykarmagy sazlaşdyryjy, şeýle-de, antimikrob täsiri ýüze çykarýarlar.

Ýokarda agzalan täsirleri ýüze çykarýan ýygyndylara aşakdakylar degişlidir:

Rp.	Sem.	Anethi	30,0	(Şebidiň tohumy)
	Fruct.	Crataegi	20,0	(Alyjyň miwesi)
	Fol.	Menthae piperitae	30,0	(Narpyzyň ýapragy)
	Flor.	Chamomillae	10,0	(Çopan telpegiň güli)
	Flor.	Helichrysi arenarii	10,0	(Gurtgyranyň güli)
M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly we 1/2 bulgurdan, nahardan 1 sagat geçenden soň, günde 3 gezek içmeli.				

Pankreatiti bejermekde dermanlyk çäýler ulanylýar. Şeýle çäýlere: lipanyň gülleri, çopantelpegiň gülleri, jerebaýyň, narpyzyň, benewşäniň oty degişlidir. Bu çäýlary ýyly görünüşinde, günde, 1 -1/2 bulgurdan 3 gezek nahardan öň içmeli.

**Aşgazan-ıçege kesellerinde ulanylýan derman
ösümlükleriniň ýygyndylary**

Sekretor ýetmezligi bolan gastritde bellenýän ýygyndlar:

Rp.	Herb.	Absinthii	10,0	(Ajy ýowşanyň oty)
	Rhiz.	Calami	10,0	(Süýji ýekeniniň porrugy)
	Fol.	Trifolii	10,0	(Üç ýapprakly wahtanyň ýapragy)
	Fruct.	Carvi	10,0	(Tminiň miwesi)
M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly we S bulgurdan günde 3 gezek nahardan 30 min öň içmeli.				

Işdä açmak üçin bellenilýän ýygyndy:

Rp.	Extr.	Centaurii fluidi		(Altyngülüň ergin ekstrakty)
	Extr.	Absinthii fluidi	15,0	(Ajy ýowşanyň ergin ekstrakty)
		aa		
	T-rae.	Menthae pip	20,0	(Narpyzyň tinkturasy)
D.S. 20 damjadan 1-bulgur suwa damdyryp nahardan öň içmeli.				

Içgeçmeli näsaglara bellenýän ýygyndy:

Rp.	Herb.	Absinthii	10,0	(Ajy ýowşanyň oty)
	Herb.	Equiseti	20,0	(Meýdan kyrkbogynynyň oty)
	Herb.	Millefolii	20,0	(Boýbodranynyň oty)
	Rhiz.	Potentillae erecti	10,0	(Gaýtarmanyň porrugy)
M.F.spec. D.S. 1 nahar çemçe 1 bulgur suwda 10 min gaýnatmaly we günde S bulgur içmeli.				
Rp.	Flor.	Chamomillae	10,0	(Çopan telpegiň güli)
	Herb.	Millefolii	10,0	(Boýbodranynyň oty)
	Herb.	Absinthii	10,0	(Ajy ýowşanyň oty)
	Fol.	Salviae	10,0	(Akkemençäniň ýapragy)
M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly we günde S bulgyrdan ýyly görnüşinde nahardan 20-30-min içmeli.				

Işdäsizlikde we aşgazanda tutgy bolanda bellenýän ýygyndy:

Rp.	T-rae	Belladonnae	5,0	(Belladonnanyň tinkturasy)
	T-rae	Gentaurii		(Altyngülüň tinkturasy)
	T-rae	Absinthii aa	20,0	(Ajy ýowşanyň tinkturasy)
D.S. Günde 0,5 bulgur suwa 30 damja damdyryp nahardan öň içmeli.				

Aşgazan we içegäniň ýerine ýetirýän işiniň bozulmalarynda (dispepsiýasynda) bellenýän ýygyndy

Rp.	Fruct	Foeniculi	20,0	(Arpabadyýanyň miwesi)
	Rhiz.	Calami	20,0	(Süýji ýekeniň porrugy)
	Rad.	Valerianae	20,0	(Waleriananyň köki)
	Fol.	Menthae piperitae	30,0	(Narpyzyň ýapragy)
	Fol.	Chamomillae	30,0	(Çopan telpegiň güli)

M.F.spec. D.S. 1 nahar çemçe 1 bulgur suwda 10 min gaýnatmaly we 1 bulgurdan günortan naharyndan soň we uklamazdan öň içmeli.

Bölüp çykaryş işi ýokary bolan gastritde bellenýän ýygyndylar

Rp.	Fol	Plantaginis	40,0	(Uly atgulagyň ýapragy)
	Herb.	Hyperici	40,0	(Jerebaýyň oty)
	Herb.	Gnaphalii	40,0	(Keçegüliň oty)
	Herb.	Polygonii evicularis	20,0	(Kyrk bogunyň oty)
	Herb.	Millefolii	18,0	(Boýbodranyň oty)
	Fol.	Menthae piperitae	10,0	(Narpyzyň ýapragy)
	Fruct.	Carvi	10,0	(Tminiň miwesi)
	Rhiz.	Calami	10,0	(Süýji ýekeniň porrugy)

M.F.spec. D.S. 1 nahar çemçe 1 bulgur suwda 10 min gaýnatmaly we 0,5 bulgurdan günde 4 gezek nahardan soň içmeli

Rp.	Flor.	Tiliae	20,0	(Lipanyň güli)
	Sem.	Lini	20,0	(Zygyryň tohumy)
	Rad.	Glycyrrhizae	20,0	(Buýanyň köki)
	Rhiz.	Calami	20,0	(Süýji ýekeniň porrugy)
	Fol.	Menthae piperitae	20,0	(Narpyzyň ýapragy)
	Fruct.	Foeniculi	20,0	(Arpabadyýanyň miwesi)

M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly we günde 2-3 bulgurdan nahardan 1 sagat öň içmeli

Içi gatamaly gastritli näsaglara bellenýän ýygyndy

Rp.	Rad.	Althae ae	20,0	(Çerbiýäniň köki)
	Fruct	Foeniculi	20,0	(Arpabadyýanyň miwesi)
	Flor.	Chamomillae	20,0	(Çopantelpegiň güli)
	Rad.	Glycyrrhizae	20,0	(Buýanyň köki)

M.F.spec. D.S. 1 nahar çemçe 1 bulgur suwda 10 min gaýnatmaly we agşam 1 bulgurdan içilýär.

Sary gaýnamaly we içi gatamaly näsaglara bellenyän ýygyndy

Rp. Herb.	Hyperici	10,0	(Jerebaýyň oty)
Fol.	Trifolii	10,0	(Üç ýaprakly wahtanyň ýapragy)
Herb.	Tanacetii	10,0	(Tanaçetiniň oty)
Rad.	Vallerianae	10,0	(Waleriananyň köki)
Rhiz.	Calami	10,0	(Süýji ýekeniň porrugy)
M.F.spec. D.S. 1 nahar çemçe 1 bulgur suwda 10 min gaýnatmaly we günde 0,5 bulgurdan nahardan 1-1,5 sagat ön içmeli			

Agyry duýlanda we iç ýellenende bellenyän ýygyndy

Rp. Fruct.	Anisi	10,0	(Anisiň miwesi)
Fruct.	Foeniculi	10,0	(Arpabadyýanyň miwesi)
Fruct.	Carvi	10,0	(Tminiň miwesi)
Fol.	Menthae piperitae	20,0	(Narpyzyn ýapragy)
M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly we 1 bulguryň günün dowamynda owurtlap içmeli.			

Iç ýellenende belleniýän ýygyndy

Rp. Herb.	Hyperici	30,0	(Jerebaýyň oty)
Fol.	Trifolii	20,0	(Üç ýaprakly wahtanyň ýapragy)
Fol.	Menthae piperitae	15,0	(Narpyzyň ýapragy)
Herb.	Millefolii	15,0	(Boýbodranýň oty)
Sem.	Anethi	15,0	(Şebidiň tohumy)
M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly we j bulgurdan günde 4-6 gezek nahardan 1-1/2 sagatdan soň içmeli			

2. 5. Bagyr we öt ýollarynyň keselleri

Bagyr we öt ýollarynyň keselleri barada umumy maglumat. Bagyr bedeniň baş tejribe barlaghanasy diýlip

atlandyrylýar. Bu wajyp beden sag gapyrganyň eteginde, garyn boşlugynda ýerleşýär. Bagryň agramy 1,5 — 2 kg.

Bagryň esasy iki: sagky (uly) we çepki (kiçi) bölümleri bardyr. Bu bölümleriň aralygynda oýtajyk bolup, onda - öt haltasy ýerleşýär. Öt haltanyň bedenjik bölümi oniki barmak içege bilen degşip durýandyr. Öt halta özünde 50 ml çenli (kadada) öt saklaýar. Gepotositdler- bagyr öýjügi, bagryň esasy gurluş birligidir.

Gepatositlerde ýmit siňdiriji wajyp suwuklyk öt bölünip çykýar, soňra ol geptosidleriň arasynda ýerleşen öt çekiji ownujak damarlaryna düşýär. We öt akalgajygy boýunça öt halta düşýär. Bagryň daşyndaky öt akalga, bagyr we öt halta akalgajyklarynyň birikmelerinden emele gelýär. Muňa umumy öt akalgasy diýilýär, bu ödüň guýulýan ýeri bolan oniki barmak içegäniň uly emzijekine açylýar.

Bagryň nerw gurşawy wegetatiw nerwi ulgamyň simpatik we parasimpatik bölümleri tarapyndan amala aşyrylýar.

Bagryň wajyp daşky (bölüp çykaryş) işiniň biri-de — öt bölüp çykmasıdyr. Öt birnäçe maddalary: bilirubini, öt turşularyny, kalsini, fosfory, holesterini we ş.m. özünde jemleýär. Öt wajyp ýmit siňdiriji suwuklyk bolup, ol pankreatik suwuklygy bilen birlikde, esasan-da, ýaglaryň siňdirilmegine täsir edýär. Öt bagyr öýjüklerinden bölünip çykmak bilen, öt haltada toplanýar, bu ýerden bolsa ýmit massasynyň oniki barmak içegä düşmegi bilen baglylykda, wagtal-wagtal oniki barmak içegä akyp gelýär.

Öt haltasyndan öt pürkülmegi şu aşakdaky ýaly bolup geçýär: öt halta diwaryň muskul süýümjikleri azaşan nerwiniň täsiri astynda ýygrylýarlar we simpatik nerwiniň täsirinde bolsa ýazylýarlar. Käbir emosional dartgynlyklaryň (gorky, gazap we ş.m.) täsirinde oniki barmak içegeden degişli nerw impulslary iberilip bilner, netijede öt halta muskulaturasy ýygrylýar we umumy öt akalgasynyň agzynyň muskul bogusy — Oddi sfinkteri gowşaýar we öt on iki barmak içegä guýulýar.

Onuň keseli (daş bolmagy) bilen baglylykda öt halta kesilip aýrylandan soňra, öt bagyrdan emele gelişçe üznüksiz akyp durýar, bu bolsa oniki barmak içegede, aşgazanasty mäsde we ş.m. üznüksiz gyjyndyrma döredýär. Ödün düzümi bagryň we öt ýollarynyň, şol sanda öt haltanyň-da ýagdaýyny aşgär görkezýändir. Öt barlaglary üçin birnäçe usullar bar. Mikroskopiki usul boýunça öt möçberi, ondaky kerepler, durulygynyň üýtgemegi, reňki, iriň, gan, düşmegi we ş. m. kesgitlenilýär. Mikroskopda ötdäki leýkositler, bilirubiniň kristaljagazlary we ş.m. ýüze çykarylýar. Bakteriologiki barlaglar (ödi ekmeklik) mikroflorany ýüze çykarmaklyga we onuň antibiotiklere duýgurlygyny barlamaga mümkinçilik berýär. Şeýle hem ödün biohimiki barlaglary geçirilýär.

Bagyr keselleri anyklanylanda ganyň düzümindäki bilirubini kesgitlemegiň ähmiýeti ulydyr. Ötde-de bilirubiniň möçberi kadada 1,7-17,1 mk mol/l deňdir. Kadaly öt akymy bozulanda (meselem, umumy öt akalgasynyň, daş ýa-da döme çişler bilen baglanmagy sebäpli) bilirubiniň gandaky düzümi 171-256,6 mk mol/l çenli we ondan-da ýokary geçýär. Näsagyň endamy, şirejimek örtügiň göze görünýän ýerleri we göz agy saralýar — obturasion saraltma (mehaniki) emele gelýär. Bagyr saraltmasy, meselem bagyr dokumasyna zeper ýetende emele gelýändir. (ýokanç gepatit). Eritrositleriň gemolizinde (anemiýanyň dürli görnüşlerinde) gemolitik saraltma ýüze çykýar. Bu halatlarda bilirubiniň kesgitlenilişi dürli usullar boýunça amala aşyrylýar.

Bedende bilirubiniň özboluşly aýlanyşygy bolup geçýär, ol öt bilen bilelikde içegä düşüp, ol ýerde sterkobiline öwrülýär. Sterkobiliniň bir bölegi tärete reňk berip, soňra daşary çykarylýar.

Sterkobiliniň galan bölegi bolsa bagra gaýdyp gelýär we gaýtadan bilirubine öwrülýär. Peşewde urobiliniň agdyklyk etmegi we ganyň düzüminde bilirubiniň köpelmegi, bagyr dokumasyna haýsy-da bolsa bir alawlama hadysasyndan soň şikes ýetendigi hakynda güwä geçýär. (ýiti gepatit).

Bedeniň işjeňliginde bagryň tutýan orny örän ulydyr. Iýmit bilen adam bedenine düşýän ýaglar, proteinler, uglewodlar, witaminler iýmit siňdiriş synalarynda özleşdirilýärler we gan akymy bilen bagra gelýärler. Bu ýerde ol maddalar dürli agzalaryň we ulgamlaryň ýeňil özleşdirip biljek önümlerine öwürüji himiki täsirleşmeler bolup geçýärler. Meselem, uglewodlar bagyrdaky glikogene öwürülýärler, zerur halatda bolsa, glikogen bagyrdan glýukoza görnüşinde gana düşýär. Proteinler dürli iýmit siňdiriş şireleriniň täsiri astynda dargamaklygyň belli bir etabyny geçip, içegeler arkaly sorulýarlar we bagra gelýärler. Bagryň protein çalşygyndaky tutýan orny beden üçin derwaýys bolan albuminiň, birinji ýagdaýynyň (fibrinogen) ýa-da protrombiniň emele gelmeklerine gatnaşýandygyndan ybaratdyr.

Içegede ýaglaryň siňdirilmegi we sorulmagy öt, hususan-da öt turşulary bolmazdan mümkin däldir. Bagyrdaky holesterin emele gelýändir.

Bagyrdaky witaminleri we bedeniň kadaly işlemegi üçin gerekli mikroelementleri saklaýjy özboluşly ambardyr.

Bagryň wajyp ýerine ýetirýän işiniň biri-de zäherlere garşy durujy işidir: bu ýerde bedene düşen käbir zäherli maddalar zähersizlendirilýärler.

Gepatitler. Wirusly gepatit — wirusyň ýüze çykarýan ýokanç keseli bolup, bedeniň zäherlenmegi esasanam sary getirmede bagryň zäherlenmegi netijesinde ýüze çykýar. Olara “A” gepatiti (ýagyny ýokanç gepatit, Botkiniň keseli) fekal-oral we howa-damja mehanizmi boýunça geçýän we B-gepatitine (syworotka gepatiti) ýagyny keseldörediji ilki ganda toplanyp, soňra parenteral ýol bilen ýokuşyp bilýändir.

Wirusly gepatit anyklananda we bejerilende keseliň geçiş etabyny göz önünde tutmalydyr (sary getirmeli, sary getirmeli däl, gizlin ýa-da uzaga çeken, holestatiki – öt akymynyň durmagy).

Bejergisi: wirusly gepatitli näsaglar bejerilende düşek we iýmit kadasyny berk berjaý etmelidirler. Iýmitiň düzüminde ýagsyzlandyrylan proteinler we uglewodlar bolan 5-nji berhiz

bellenilýär. Gije-gündiziň dowamynda 2-3 litre çenli suwuklyk, ýagny miwe şirelerinden, aşgarlaşdyrylan mineral suwlary içmeli. Mundan başga-da, witaminleriň B-toparyndan B₁, B₂ witamini 6-9 mg we B₆, we PP witamini 100-150 mg, askorbin turşusy 600-900 mg, rutin, kokarboksilaza, lipoý turşusy belleniýär. Mundan başga-da, glýukozanyň 5% we natriý hloridiniň izotonikt erginleri wenadan goýberilýär. Keseliň agyr akymlarynda şeýle-de, uzaga çeken görnüşinde, öt akymynyň durgunlygynda ýüze çykan görnüşlerinde we çişli-assitiki görnüşlerinde, bagryň distrofiýasynyň emele gelmelerinde glýukokortikoid preparatlary belleniýär.

Wirusly geppatitde ulanylýan fitoterapewtiki serişdeler aşgazan-ichege ulgamyna toplumlaýyn (alawlama garşy, smazmolitiki, zäherlenmä garşy, bakteriostatiki, kähalatda bakterisid we ş.m.) täsir edip fagositozy sazlaşdyrýar we gepatitiň ýiti döwründe gerekli fitoterapiýany üpjün edýär.

Bu keseliň başlangyç etaplarynda şu aşakdaky ýygyny belleniýär.

Rp.	Rad.	Valerianae	20,0	(Waleriananyň köki)
	Flor.	Crataegi	20,0	(Alyjyň güli)
	Cort.	Berberis	30,0	(Zirkiň gabygy)
	Fol.	Menthae piperitae	30,0	(Narpyzyň ýapragy)
M. F. spec. D. S. Demlemäni S - s bulgurdan irden ajöze we uklamazdan ön agşam içmeli.				

Mundan başga-da virusly gepatitde witaminli çaylary, şol sanda rýabinanyň we itburunyň miwelerinden (25,0) günde bir bulgur içmeli. Şeýle-de, smarodinanyň, kryhownigiň we beýleki miweleriň şirelerini saklaýan içgiler belleniýär.

Näsagyň gutulýan döwründe öt erginleriniň we beýleki bölüp çykýan şireleriniň bölünip çykyşyny sazlaşdyrmak maksady bilen oňa miwe şirelerini (käşiriň, şugundyryň, kelemiň, kartoşkanyň we ş.m.) bermeli. Ol şireleri 1:4 gatnaşykda suw garyp günde bulguryň 1/3 mukdaryny kem-kemden köpeldip içmeli.

Ötüşen hepatit. Etiologiýasy we patogenezi. Ötüşen hepatit — bagryň ötüşip geçiş akymyna eýe bolan alawlama keselidir. Bu alawlama kesellere ýokanç hepatiti (Botkiniň keseli) garahassalykdaky we gaýry ýokanç kesellerindäki ýiti hepatiti, ol ýa-da beýleki zäherlenmeler zerarly dörän hepatiti goşmak bolar.

Kesel ençeme sebäplere görä, meselem, ýokanç hepatitde wagtynda bejergä girişilmedik ýagdaýda we keseliň özboluşly görnüşine baglylykda, näsaglar tarapyndan düzgünleriň äsgerilmezligi, lukmanyň maslahatynyň berjaý edilmezligi netijesinde ötüşen geçiş akymyna eýe bolýandyr. Ötüşen hepatitde gepatositleriň parenhimanyň (parenhimatorz hepatit) ýa-da aralyk dokumalaryň – mezenhimalarynyň (mezenhimal hepatiti) umumy diffuzlaýyn weýrançylyklaryna gözegçilik edilýär. Ötüşen hepatitiň başlangyç etabynda bagyr ulalýar, bu gepatositleriň çişmegi we olary ýag tutmagy bilen baglanyşyklydyr. Beýle üýtgemeler ýokanç keseller we zäherlenme sebäpli (ýokanç hepatitde, ötüşen enterokolitde we holesistitde, malýariýada, merezýel kesellerinde, sepsisde, gurşundan we alkogoldan zäherlenmelerde) ýüze çykýar. Şeýlede zäherli önümleriň gepatositlere we bagyr içi ownujak damarlara edýän täsirinden ýüze çykyp bilýär.

Ötüşen alawlamanyň güýjemegi netijesinde bagyrdaky aralyk birleşdiriji dokuma ösüp berçikýär.

Kliniki keşbi. Näsaglary köplenç, esasan hem, parenhimany berbatlaýjy hepatitde sag gapyrganyň etegindäki gowşagrak agyry, endam gijemesi, kemişdälik, ysgynsyzlyk, iç ýellenmeklik, içege işiniň näsazlygy biynjalyk edýär.

Bagryň ölçegleri we ulalyş derejesi anyklananda kadada ýaýjyk orta çyzyk boýunça 10 sm deňdir. Şeýle hem bagryň ölçegleri öňki goltuk çyzygy boýunça (7 sm) we orta goltuk çyzygy boýunça (12 sm) kesgitlenýär. Şeýle hem perkussiýa we barmak bilen barlanyş usullary bilen bagyryň dalagyň ölçegleri kesgitlenýär. Kada boýunça perkussiýada kesgitlenilýän ini 6 sm golaýdyr. Parenhimatoz hepatitde bagyr we dalak ulalýar, endamyň, şirejimek örtügiň reňki we

gözün agy solagrak sary öwüsýär. Bu bagyryň işiniň bozulmagy bilen baglanyşyklydyr. (bagyr sarygetirmesi). Bagyryň ýerine ýetirýän işiniň bozulmagy ganaýjylyk (protrombiniň emele geliş işiniň bozulmagy), ganyň düzümindäki proteiniň (gipoproteinimiýa) we holesteriniň (gipoholesterinemiýa) azalmagy bilen ýüze çykýandyr.

Esasan hem, mezenhimal dokumany weýran ediji gepatitde sag gapyrganyň etegindäki agyry parenhimatoz gepatitiniňkiden has güýçli ýüze çykýar, bu ýelmeşmeklik hadysasynyň garyn bardasyna we bagyr örtüğine (bagryň daşyny örtüp duran gabyk) aralaşmaklygy bilen düşündirilýär. Seýrek bolmadyk halatlarda bagryň deňölçegsiz ulalýandygyna gözegçilik etmek bolar, bu bolsa birleşdiriji dokumanyň ojaklaýyn ösmegi bilen baglydyr. Barmak bilen barlanyşda bagyr agyryýandyr. Dalak ulalyp biler. Parenhimatoz gepatitden tapawutlylykda mezenhimal gepatitde adaty saraltma bolmaýar. Umuman bularyň ikisini hem tapawutlandyrmak kynrakdyr.

Keseliň dürs anyklanmagy üçin häzirki wagtda biohimiki barlaglar, radioizotop anyklanylşy we beýleki öndebaryjy usullar ulanylmalydyr.

Bejerilişi. Ötüşen gepatitiň bejerilişi bagyr sirrozynyň bejerilişi bilen köp umumylyklary bardyr. 5-nji iýmit berhizini saklamaly. Aşgazaniçege ulgamynyň keselleri bilen utgaşanda 5-^a berhizini saklamaly.

Derman serişdeleri bilen bejergi bagyr öýjüklerinde madda çalyşygy hadysasynyň gowulandyrylmagyna ugrukdyrylýar. Witaminler, kokarboksilaza, lipoý turşusy, aminoturşulary we proteinleriň gidrolizatlary belleniýär.

Gormonal terapiýany talap etmeýän ötüşen gepatitde derman ösümlükleriniň preparatlary bilen bejergi täsirli bolmagy mümkin. Fitoterapiýany has ir başlasaň, şonça hem peýdaly bolup, ony bagyryň ýerine ýetirýän işi doly dikelyänça dowam etdirmeli. Gepatitiň beýleki görnüşlerinde fitoterapewtiki serişdeler goşmaça serişdeler hasaplanýar. Bu kesellerde bellenen derman ösümlükleriň düzümini her 2-3

aýdan çalşyryp durmaly. Şeýle-de, бүтін bedeniň we aşgazan-
içege ulgamynyň we beýleki beden agzalaryň ýerine ýetirýän
işiniň ýagdaýyna gözegçilik edip durmaly.

Öt sekresiýasynyň bölünip çykyşyny kadalaşdyrmak üçin
bellenilýän ýygyny:

Rp.	Rad.	Valerianae	20,0	(Waleriananyň köki)
	Flor.	Crateagi	20,0	(Alyjyň güli)
	Cort.	Berberidis	30,0	(Zirkiň gabygy)
	Fol.	Menthae piperitae	30,0	(Narpyzyň ýapragy)
M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly we ertirine, agşam 1 bulgurdan içmeli.				

Şeýle-de, öt bölünip çykmagy sazlaşdyryjy derman
ösümlüklerinden taýýarlanan ýygyny ulanylýar:

Rp.	Flor.	Helichrysi	40,0	(Gurtgyranyň güli)
	Fol.	Trifolii	30,0	(Üç ýaprakly wahtanyň ýapragy)
	Fol.	Menthae piperitae	20,0	(Narpyzyn ýapragy)
	Fruct.	Coriandri	10,0	(Kinzanyň miwesi)
M.F.spec. D.S. 1 nahar çemçe 1 bulgur suwda 10 min gaýnatmaly we S - $\frac{1}{3}$ bulgurdan günde 3 gezek nahardan 30 min öň içmeli. Sary getirmede öt kowujy serişde hökmünde bellenilýär.				

Rp.	Fruct	Berberidis	10,0	(Zirkiň miwesi)
	Fol.	Betulae	10,0	(Berýozanyň ýapragy)
	Herb.	Hyperici	10,0	(Jerebaýyň oty)
	Herb.	Millefolii	10,0	(Boýbodranyň oty)
M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly we bir bulguryň 2-3 gezekde günün dowamynda içmeli. Öt bölüp çykmagy sazlaşdyrýar.				

Içegäniň işini sazlaşdyryjy ýygyny:

Rp.	Fruct.	Foeniculi	10,0	(Arpabadyýanyň miwesi)
	Fruct .	Carvi	10,0	(Tminiň miwesi)

Cort.	Frangulae	20,0	(Garatikenin gabygy)
Fol.	Menthae piperitae	20,0	(Narpyzyn yapragy)
Herb.	Millefolii	20,0	(Boýbodranyň oty)
Herb.	Centauri	20,0	(Altýngülün oty)

M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly we bir bulguryny günün dowamynda içmeli. Için ýöreşmegini sazlaşdyrýar.

Gepatit bilen utgaşyp gelyän tutgaýda ulanylýan ýygyndy:

Rp.	Flor.	Chamomillae	10,0	(Çopantelpegin güli)
	Rad.	Glycyrrhizae	10,0	(Buýanyň köki)
	Herb.	Hyperici	20,0	(Jerebaýyň oty)
	Herb.	Chelidonii	20,0	(Demrewotyň oty)
	Fol	Menthae piperitae	20,0	(Narpyzyn yapragy)

M.F.spec. D.S. 1 nahar çemçe 1 bulgur suwda 10 min gaýnatmaly we 1 bulgurdan günde nahardan öň 2 gezek içmeli.

Gepatitde we anasid gastritde iç ýöreşmesini sazlaşdyrýjy ýygyndy belleniýär:

Rp.	Cort	Frangulae	20,0	(Garatikenin gabygy)
	Fol	Trifolii	20,0	(Üç ýaprakly wahtanyň yapragy)
	Rad.	Gentianae	20,0	(Ýer bahasynyň köki)
	Herb.	Chelidonii	20,0	(Demrewotyň oty)
	Rad.	Taraxaci	20,0	(Tozganyň köki)
	Fol	Menthae piperitae	20,0	(Narpyzyn yapragy)

M.F.spec. D.S. 1 nahar çemçe 1 bulgur suwda 10 min gaýnatmaly we 1 bulgurdan günde nahardan öň 2 gezek içmeli.

Bagyr sirrozy. Bagyr sirrozy -- bu bagyr parenhimalarynyň distrofiýasy we nekrozy bile häsiýetlendirilip, birleşdiriji dokumalaryň diffuzlaýyn ösmekligi bilen geçýän ötüşen keseldir.

Bagyr sirrozynyň postnekrotik, portal, bilial we garyşyk görnüşleri bardyr.

Bagryň sary distrofiýasy. Gepatitli ýa-da sirrozly näsagyň ýagdaýy çalt ýaramazlaşyp, haly teňleşýär. Nerw ulgamyň düýp näsazlyklarynyň alamatlary peýda bolýarlar (ysgynsyzlyk, özüňi ukyly duýmaklyk, soňabaka galýusinasıya, ýokary nerw oýanyjylygy). Bu gepatositleriň nekrozy we gaýtadan başgaça döremekligi netijesinde bagryň zäherlenmeklige garşy durmak ukybynyň we gaýry ýerine ýetirýän işiniň ýitileşmegi bilen bagly bolup, bagyr özüniň päsgelçilik dörediji ornunyň oýnamaklygy bes edýär. Bedeniň öz-özüni zäherlemekligi başlanýar. Adalatly barlaglar bagryň gabarasynyň örän kiçelýändigini görkezýär. (bagyr dokumalary ölýärler). Bedeniň gyzgyn görkezijisi peselýär. Uly gan öýmeler — ganyň bir ýere köp toplanyp çişmekligi bolýar, kentlewükden gan akýar. Kesilip görende bagryň belli bir ýerinde ýag tutup saralandygyny (şonuň üçin oňa bagryň sary distrofiýasy diýilýär), onuň gabarasynyň ep-esli kiçelýändigini saýgarmak bolýar (atrofirlenýär).

Bejergisi. Ýokarda aýdylyp geçilişi ýaly, ötüşen gepatitiň öňünden: ýokanç gepatit, sary getirmeli leptospiroz (Weýll Wasilýewiň keseli), senagat zäherlerinden, fosfordan we myşýakdan, zäherli komeleklerden, şeýle hem käbir dermanlardan, meselem, sulfanilamid preparatlaryndan, nowarsenoldan zäherlenmek zerarly döreýän — zäherli gepatiti emele gelýändir. Şeýlelikde, bagyr sirrozynyň bejergisi we onuň öňüniň alnyşy, ozaly bilen zäherli gepatitiň öňüni almak we bejermekdir.

Ötüşen gepatitli we bagyr sirrozly näsagy düzüminde uglewodlaryň, proteinleriň ýeterlik mukdary bolan doly bahaly iýmitler bilen üpjün etmeklik möhümdir. Her näsaga, onuň ýagdaýyna, beden agramyna we ş.m. baglylykda ösümlük we mal ýagyny (zeýtun, günebakar, mesge ýaglaryny) utgaşdyryp bermegi maslahat berilýär. Näsaglar witaminleriň zerur mukdaryny kabul etmelidirler.

Gowurlan we duzlanan tagamlar, ýiti işdä açyjylary iýmeklik gadagan edilýär. Iýmite gaýnan ýagsyzrak et, gaýnadylan ýagsyzrak balyk, gaýnadylan kartoşka, käşir, kelem, süýt önümleri, miwe suwlary, miwe şireleri, kisel girizmek maksada layk hasaplanýar. Mundan başga-da, näsagyň iýmitiniň süýtli mannyý, tüwi, külkelenen greçka aşy bilen dürli-dümenleşdirip bolar. Iýmit günde 5-6 gezek uly bolmadyk möçberde iýilmeli. Içilýän suwuň möçberi, ylaýta-da assit ýüze çykanda çakdanaşa köp bolmaly däldir.

Ötüşen gepatitli we bagyr sirrozly näsaglar derman preparatlary bilen bejermeklik ilki bilen, näsagyň etiologik alamatlary esasynda gurulýandyr. Meselem, bagryň biliýar sirrozynnda, bagyr içi öt akalgalary mese-mälim alawlama hadysasynda mikroflora anyklanylandan soňra antibiotikler belleýärler.

Gyzdyрма (malýariýa) ýa-da merezýelli gepatitde mahsus terapiýasy geçirilýändir. Ötüşen gepatitli we bagyr sirrozly näsaglara witaminleriň “B” toparyny (piridoksin, sianokobalamin), şeýle hem, askorbin turşusyny bellemeklik maksada laýykdyr. Näsaga glýukozanyň ergini kähallatlarda bolsa, gormonlar, bagyr ekstrakty we holin hloridi sanjym görnüşinde bellenýär. Gan gitmede gan guýulýar ýa-da fillohinonlar (K-witami) bellenilýär.

Bagryň sirrozynyň assitli görnüşinde esasy işleriň biri laparosintezdir. Ol ýeterlik deliller bar wagtynda, haçanda ýygananan suwuklyk garyn perdejiginiň diwaryny we garyn hamyny ep-esli dartanda, garyn juda ulalanda we dartylanda geçirilýändir. Laparosinteziň geçiriliş ýygylgy suwuklygyň toplanyş tizligine we onuň göwrümüne baglydyr.

Laporosentez näsagyň garyn diwaryny troakor (guraly) bilen deşip, çiş suwuklygynyň (bir gezekde 2 litrden 5 litre çenli) çykarylyşy.

Fitoterapewtiki serişdeler sirroz keselinde bagyr öýjükleriniň metabolizmini gowulandyrýar, içegede iýmitiň siňdirilmegini, içiň ýöremegini sazlaşdyrýar we peşew

kowujy täsiri ýüze çykarýar. Şeýle täsiri ýüze çykarýan derman ösümlüklerinden taýýarlanan ýygyndy:

Rp. Fruct Rosae 40,0 (Itburunyň miwesi)
 Fol Urticae dioicae 20,0 (Çit-çitiniň ýapragy)
 M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly
 we bir bulguryny günün dowamynda 2-3 gezekde içmeli.

Rp. Fol. Menthae piperitae 20,0 (Narpyzyň ýapragy)
 Herb. Absinthii 20,0 (Ajy ýowşanyň oty)
 Herb. Hyperici 30,0 (Jerebaýyň oty)
 Rad. Valerianae 20,0 (Waleriananyň köki)
 Strobuli Lupuli 10,0 (Hmeliň miwesi)
 M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly
 we 1-2 bulgurdan günde nahardan 30 min ön 2-3 gezek içmeli. Holesistit
 we holangit kesellerinde ulanylýar.

Iýmit siňdirişini, içegäni kadalaşdyryjy we peşew bölüp çykyşyny ýokarlandyryan ýygyndylar:

Rp. Rad. Cichorii 20,0 (Sycratgynyň köki)
 Herb. Equiseti 20,0 (Meýdan kyrkbogynynyň oty)
 Herb. Millefolii 20,0 (Boýbodranyň oty)
 Herb. Hyperici 20,0 (Jerebaýyň oty)
 M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly
 we bir bulguryny günün dowamynda 2-3 gezekde içmeli.

Rp. Cort Frangulae 10,0 (Gara tikenin gabygy)
 Fruct Carvi 10,0 (Tminiň miwesi)
 Herb. Hyperici 10,0 (Jerebaýyň oty)
 Herb. Millefolii 10,0 (Boýbodranyň oty)
 M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly
 we 2-3 bulgurdan günde nahardan ön içmeli.

Rp. Herb. Adonidis 20,0 (Ýaz adoniziniň oty)
 Herb. Equiseti 20,0 (Meýdan kyrkbogynynyň oty)
 Herb. Millefolii 20,0 (Boýbodranyň oty)
 Herb. Chelidonii 40,0 (Demrewotyň oty)

M.F.spec. D.S. 1 nahar çemçe 1 bulgur suwda 10 min gaýnatmaly we günde 1 bulgurdan 2 gezek içmeli.

Rp.	Herb.	Absinthii	25,0	(Aýy ýowşanyň oty)
	Fol	Trifolii	25,0	(Üç ýaprakly wahtanyň ýapragy)
	Fruct	Carvi	25,0	(Tminiň miwesi)
	Fol	Plantaginis	25,0	(Uly atgulagyň ýapragy)

M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly we 1 nahar çemçeden günde nahardan öň işdä açyjy serişde hökmünde içmeli.

Bagryň howply çiş keseli. Bagryň çiş keseli köplenç ötüşen bagyr keselleriniň düşeginde: ötüşen gepatitde, bagyr sirrozynda we ş.m. döräp bilýändir.

Onuň alamatlary. basmarlaýjy ysgynsyzlyk, işdäniň kesilmegi ýa-da üýtgemegi, sag gapyrganyň eteginde barha güýjeýän üznüksiz agyry, işe ukyplylygyň peselmegi, horlanmaklykdyr. Barlaglarda bagryň ep-esli ulalandygyny bilmek bolýar, seýrek bolmadyk halatlarda barmak basyp barlamak arkaly bagryň gyrasynyň gatap, çykyn-çykyn bolýandygy kesgitlenilýär. (düwünli çiş diýip atlandyrylýar) Näsagyň endamy mese-mälim sary öwüsýär. (howply hilli dömme çişin öt ýollaryny gysmagy), howply hilli dömme çiş derweze wenasyny gysanda, assit emele gelýär. Gan barlaglarynda gan azlyk ýüze çykýar.

Keseli anyklamak — bagryň ilkinji çiş keseliniň başlangyç etabynda keseli anyklamak kyndyr. Kliniki usullar bilen bir hatarda bagryň çiş keselini anyklamagyň gaýry usullarynyň-da: bagryň punksiýa biopsiýasy we çiş üçin mahsus öýjükleri ýüze çykarmaklyga mümkinçilik beriji biopsiýa materiallarynyň gistologik barlaglarynyň bagry skanirlemeginiň (radio-izotoplar arkaly barlag) we ş.m. ähmiýeti uludyr.

Bejergisi. Adatça simptomatikdir, seýrek halatlarda hirurgikdir, şöhle terapiýasyndan (ionizirleýji şöhläni ulanmak), dömme çişin garşysyna himioterapiýany ulanmakdan ybaratdyr.

Öt haltanyň we öt ýollarynyň keselleri

Holesistit — öt haltanyň alawlamasy bolup, ol ýygy duş gelýän keseldir. Holesistit - daşsyz we daşly (öt haltanyň alawlamasy, öt daşlaryň döremekligi bilen utgaşdyrylmagy) bolýar. Daşly holesistiti käte öt-daş keseli diýip hem atlandyrylýar, ýöne ol öt haltada alawlama hadysasynyň ýok wagtynda-da döräp biler, beýle halatlarda daşlaryň döremegi gaýry ýagdaýlara bagly bolup durýar. Öt haltasy we öt ýollary keselleriň hataryna diskineziýa degişlidir.

Diskineziýa - bu öt halta muskulaturasynyň ýygryjlyk ukybynyň bozulmagy, netijesinde ödüň bagyrdan we öt haltadan oniki barmak içegä gelişiniň bozulmagydyr.

Adatça, diskineziýa özbaşdak kesel hökmünde ýüze çykman, eýsem daşsyz ýa-da daşly holesistit bilen utgaşýar. Holesistit keseli öt ýolarynyň lýamblioz, opistorhoz, askaridoz ýaly we şuna meňzeş mugthorlaryň döreden keselleri we öt daş keseli bilen utgaşyp gelýär.

Holesistit keseli çylşyrymlaşma bilen-de geçip bilýändir. Olaryň içinde has ýygy duş gelýäni biliýar sirrozyna getirip biljek gepato-holesistit, holesisto pankreatit, reaktiw hepatitdir (ugurdaş hepatitdir). Daşly holesistitiň we öt daş keselleriniň çynlakaý kesel çylşyrymlaşmasynyň biri-de (öt) bagyr sanjysydyr. Bu, öt halta ýa-da umumy öt akalganyň daş bilen dykylmagy netijesinde obturasion saraltma, öt haltanyň suw almagyna ýa-da öt halta emfiemasyna getirip biler (iriň ýygnanmagy).

Etiologiýasy we patogenezi. Daşsyz, şonuň ýaly-da daşly holesistitiň sebäpleriniň köp taraplary biri-birine kybapdaşdyr. Köplenç halatlarda daşsyz holesistit öt daş keselleriniň önünden gelýändir diýmek bolar. Çünki alawlama öt daşlarynyň döremegine ýardam ediji ýagdaýlaryň biridir. Holesistit alawlama hadysasy güýçli geçende ýiti, kliniki

keşbi gowşagrak ýüze çykanda ötüşen bolup biler. Iki ýagdaýda hem alawlama hadysasy mikrofloranyň içegeden (ýokary çykyjy diýilýän) ýa-da bedendäki islendik alawlama ojakdan gan damarlary ýa-da limfatik damarlar boýunça (aşak düşüji) öt halta aralaşmagy zerarly döreýändir. İçege ýokanç kesel döredijisinde (garyn gara hassalygy, dizenteriýa) edil mahsus däl kolit ýaly öt haltanyň alawlamasyna ýardam edýändir. İçege saprofiti, meselem, içege taýajyklary amatsyz şertlerde holesistit keseliniň sebäbi bolup bilýändir. Ötüşen otit, gaýmorit, adneksit (ýatgy çykyntgysynyň alawlamasy), piýelit, osteomiýelit we şuna meňzeş aşak düşüji ýokanç kesel döredijisiniň çeşmeleri bolup bilýärler. Bu ojaklardan öt haltasyna köplenç stafilokokk, streptokokk we başgalar aralaşýarlar.

Allergiýa - bedeniň käbir mikrobodenlere ýa-da ýagdaýlara (iýmit allergiýasy) aşa duýgurlygy holesistit keseline itergi berip biler. Öt haltada öt dykyn almaklygy holesistit emele gelmekligine ýardam edýär. Bu gipotonik diskineziýasy şeýle hem gysby edip eşikleri geýmeklik (korsetler, guşaklar we ş.m.) iç ýöremezligi bilen baglydyr. Az hereket etmek: fiziki işjeňlik bilen bagly däl işler, adaty hojalyk işlerinde hereketiň azlygy, naharyň seýrek we aşa köp iýilmegi, dykyn almaklyga getiriji amatly şertlerdir. Mikrofloranyň gös-göni öt haltasyna aralaşmasyna we onda alawlama hadysasynyň ösmegine ahiliýa (aşgazan şiresinde hlorly wodorod turşusynyň bolmazlygy) ýa-da aşgazanyň şire bölüp çykaryş işjeňliginiň peselmegi gönüden-göni ýardam edýär. Çünki, aşgazan şiresiniň düzümine girýän hlorly wodorod turşusynyň bakteriosid häsiýeti bardyr. Öt haltada alawlama hadysasy ösende onuň şirejimek örtüginin astyndaky gatjagazda leýkositler we limfoid infiltratlar peýda bolýar.

Kliniki keşbi. Holesistit aram kataral alawlamasy halynda dowamlyrak ýa-da gysgarak möhletde dowam edip biler. Näsaglar sagky gapyrganyň etegindäki güýçli bolmadyk agyrydan, agyz aýamasyndan arz edýärler. Duýedenal

zondirlemek boýunça alnan ötdä leýkositler, şirejimek suwuklyk epitelial öýjükler bardyr. Ödün bakterial barlaglarynda ol ýa-da beýleki bakterial flora tapylýar. Rentgenologik usul öt haltanyň ýygrylyk ukybynyň bozulmaklyga, ýagny diskineziýanyň alamatlaryna meýil edýändigini äşgär edip biler. Bu alamatlar daşsyz holesistitiň kliniki ýüze çykmalarydyr.

Seýrek bolmadyk wagtynda öt haltadaky alawlama hadysasyna täsiri astynda ödün fiziki häsiýetleri (kollod) üýtgeýär. Daş döreme bedendäki çalyşma hadysasynyň bozulmagy, ilkinji nobatda ýag çalşygynyň näsazlygy ep-esli orun tutýar, bu naharyň aşa köp iýilmegi, semizlik hem-de bedendäki neýroendokrin gysarmalar (göwrelilikde, klimaks döwürde, galkan şekilli mäziň işjeňliginiň peselmeginde we ş.m. ýag çalyşmagynyň bozulmagy bilen baglanyşyklydyr. Holesterin daşlarynyň döremegi, meselem, bedende diňe bir ýagyň agdyk düşmegine däl, eýsem suw ergininiň ýetmezçiligine we doly bahaly dældigine-de baglydyr. Öt gepatositlerde emele gelýär, onuň wezipesi wirus hepatiti ýa-da zäherlenme ýaly hadysalaryň täsiri netijesinde bozulyp bilner. Öt dykyn almaklygy öt daşlarynyň döremekligine ýardam edýändir.

Daşly holesistitde, ýagny öt halta alawlamasy öt daşlarynyň döremekligi bilen utgaşanda onuň kliniki keşbi daşsyz holesistitiden başgaçadyr. Daşly holesistitde agyry (sag gapyrganyň eteginde) adatça güýçlidir, şol bir wagtda tutgaý görnüşindedir, agyry guşaklygyň sag tarapyna ýa-da pilçe asty töweregine berýändir. Daş umumy öt akalgany baglasa, obturasion saraltma ýüze çykyp biler.

Duodenal zondirlenip alnan öt halta ödünde (“B” bölegi) edil daşsyz holesistitinki ýaly leýkositler, şirejimek suwuklyk, epitelial öýjükler bardyrlar. Emma daşly holesistitde hromatik duodenal zondirlenip alnan ödün “B” böleginde holesteriniň, bilirubiniň, kalsiniň kristaljyklaryny anyk kesgitlemek bolýar, rentgenologik holesistografiýada konkrementleriň kölegeleri ýüze çykarylýar.

Bejergisi. Bejeriş çäreleri keseliň etabyna we çylşyrymlaşmagyna bagly bolup, iýmit kadasyny saklamak, ýokanç kesel döredijini ýok etmek, alawlama garşy göreşmekden ybaratdyr. Şeýle-de, öt sekresiýasyny sazlaşdyryjy, öt sürüji serişdeleri ulanmak, immunoterapiýany we sedatiw we tonizirleýji serişdeleri bejeriş, fiziki maşklary, fizoterapewtiki çäreleri belleniýär.

Derman ösümlikleri we käbir derman preparatlary (holenzim, allahol, holesin, nikodin, sikwalon, öt bölüp çykmagyny sazlaşdyrmak bilen ýa-da öt kowmak bilen (holagon, holesistokinin, iç ýumşadyjy — ksilit, sorbit) öt ýollarynyň geçirijiligini dikeldip gowulandyrýarlar. Şeýle-de, agyry peýda blanda, öt akymalarynyň boşamagy kynlaşanda, spazmolitiki serişdeler: atropin, platifillin, belladonna belleniýär.

Derman ösümlikler bilen ötüşen holesistiti öt ýollarynyň alawlamasyny bejermek köp halatlarda täsirlidir.

Käbir agzap geçjek ýygyndylarymyz öt emele getiriji we öt kowujy täsirden başga-da alawlama garşy, bakterisid we bakteriostatiki täsiri ýüze çykarýar. Olar iýmitiň özleşdirilişini ýokarlandyrýarlar, içegede ajamak we iç ýellenmek hadysasyny peseldýär. Öt kowujy täsiri ýüze çykarýan ýygyndy belleniýär.

İç geçmeli näsaglara belleniýän ýygyndy:

Rp.	Flor.	Helichrysi arenarii	15,0 (Gurtgyranyň güli)
	Herb.	Hyperici	15,0 (Jerebaýyň oty)
	Fol	Menthae piperitae	15,0 (Narpyzyň oty)
	Herb.	Leonuri	15,0 (Şirguýrugyň oty)
M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly we S bulgurdan nahardan 30 min öň içmeli.			
Rp.	Flor.	Helichrysi arenarii	20,0 (Gurtgyranyň güli)
	Flor.	Calendulae	20,0 (Dyrnaklyjanyň güli)
	Herb.	Origani	10,0 (Yakymlyjanyn oty)
	Flor.	Centaureae cyani	10,0 (Altýngüliň güli)

M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly
we ýyly görnüşinde 1/3 bulgurdan nahardan 30 min. öň içmeli.

Içi gatama ýygynly näsaglar üçin ýygyndy:

Rp.	Rad.	Rhei	20,0	(Yşgynyň köki)
	Flor.	Helichrysi arenarii	30,0	(Gurtgyranyň güli)
	Herb.	Millefolii	50,0	(Boýbodranyň oty)
M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly we 1 bulguryňy agşam bir gezekde içmeli.				

Rp.	Fruct.	Foeniculi	10,0	(Arpabodyýanyň miwesi)
	Cort.	Frangulae	10,0	(Gara tikenin gabygy)
	Fol.	Menthae piperitae	20,0	(Narpyzyň ýapragy)
	Herb.	Millefolii	20,0	(Boýbodranyň oty)
M.F.spec. D.S. 1 nahar çemçe 1 bulgur suwda 10 min gaýnatmaly we 1 bulgurdan ertir we agşam içilýär.				

Täret kadaly bolanda gurtgyranyň gaýnatmasyny (6.0—10,0:200,0). 1 nahar çemçeden günde 3-4 gezek nahardan 15 min. öň içmeli. Narpyzyň ýapraklarynyň demlemesini (1:10 ýa-da 1:3) 1 nahar çemçeden gyzgyn görnüşde günde 3-4 gezek nahardan öň içmek belleniýär.

Holesistitde we holangitde belleniýän ýygyndy:

Rp.	Fruct.	Berberidis	20,0	(Zirkin miwesi)
	Fol.	Betulae	20,0	(Berýozanyň ýapragy)
	Fruct.	Juniperi	20,0	(Arçanyň miwesi)
	Herb.	Absinthii	20,0	(Aýy ýowşanyň oty)
	Herb.	Millefolii	20,0	(Boýbodranyň oty)
M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly we ertir we agşam 1 bulgurdan içilýär.				

Tutgaýly holesistitde we holangitde belleniýän ýygyndy:

Rp.	Fol.	Menthae piperitae	20,0	(Narpyzyň ýapragy)
	Herb.	Artemisiae vulg	20,0	(Aýy ýowşanyň oty)
	Rad.	Valerianae	20,0	(Waleriananyň köki)
	Herb.	Hyperici	30,0	(Jerebaýyň oty)
	Strobuli	Lupuli	10,0	(Hmeliň miwesi)

M.F.spec. D.S. 2 nahař çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly
we 1 bulgurdan ertirine we aýşam içmeli.

Gowşadyjy we spazmolitiki täsiri ýüze çykarýan damja:

Rp. T-rae. Chamomillae (Çopantelpegin tinkturasy)
T-rae. Foeniculi, (Arpabadyýanyň tinkturasy)
T-rae. Absinthii, (Aýy ýowşanyň tinkturasy)
T-rae. Belladonnae aa 10,0 (Belladonnanyň tinkturasy)
D.S. 50 ml suwa 20 damja damdyryp günortan we aýşam nahardan soň
içmeli.

Dartgynlyk ýüze çykanda bellenilýän damja:

Rp. Ol Carvi 5,0 (Tminiň ýagy)
T-rae Belladonnae (Belladonnanyň tinkturasy)
T-rae Chelidonii aa 10,0 (Demrewotynyň tinkturasy)
T-rae Valerianae aether 15,0 (Waleriananyň eýirinli tinkturasy)
D.S. 25 ml suwa garyndynyň 20 damjasyny damdyryp içmeli.

Gowşadyjy, rahatlandyryjy we öt kowujy serişde hökmünde şu aşakdaky ýaly damja bellenilýär

Rp. Ol Carvi 5,0 (Tmin ýagy)
T-rae Absinthii (Aýy ýowşanyň tinkturasy)
T-rae Stryshni (Strihhiniň tinkturasy)
T-rae Valerianae aa 15,0 (Waleriananyň tinkturasy)
D.S. 30 damjasyny günde 3 gezek nahardan soň içmeli

Öt ýollarynyň diskineziýasy

Öt halta we öt ýollary keselleriniň hataryna –diskineziýa
degişlidir.

Diskineziýa-bu öt halta muskulaturasynyň ýygrylyjylyk
ukybynyň bozulmagydyr, netijede ödüň bagyrdan we öt
haltadan oniki barmak içegä gelişi bozulýar. Diskineziýa
muskulaturalaryň gowşamagy we tonusyň peselmegi bilen
gipotoniki ýa-da tersine, gipertoniki (öt halta
muskulaturasynyň ýygrylmagy) bolýandyr. Adatça

diskineziýa özbaşdak kesel hökmünde ýüze çykman, eýsem daşsyz ýa-da daşly holestit bilen utgaşýar. Öt ýollarynyň lýamblioz, epistorhoz, askaridoz ýaly we ş.m. mugthorlaryň ýüze çykaran keselleri holisistit we öt daş keseli bilen utgaşyp gelýär. Kähalatlarda öt akymy üçin mehaniki bökdençlikleriň döremegine sebäp bolýar.

Bu keseliň etiologiýasy we patogenezi dürli-dürlidir. Olaryň esasy sebäbi MNU-nyň işjeňliginiň bozulmagy we wirusly gepatit keselidir. Şeýle-de öt haltanyň hereketleniş işiniň bozulmagy, ötüşen holestitit we ot daş keseli sebäp bolup biler.

Bejergisi. Keseliň görnüşine bagly geçirilýär. Umumy çärelere iýmit kadasyny berhiz saklamak, öt bölüp çykmasyny sazlaşdyryjy serişdeleri, fiziki maşklary, ukyny kadalaşdyrmak, newrotiki bozulmalara ýol bermezligi gazanmaly.

Öt sürüji serişdeleri diskineziýanyň haýsy görnüşiniň agdyklyk edýändigini göz önünde tutup bellemeli.

Diskineziýanyň gipertoniki görnüşinde trankwilizatorlary belladonna, şeýle-de gowşak minerallaşdyrylan suwlar, esentuki №4 we №20, narzan we ş.m. bellenilýär.

Diskineziýanyň gipotoniki görnüşinde köp mukdarda ösümlük we haýwan ýaglary, gök önümler, miweler bellenilýär. Derman serişdelerden strihniniň nitraty sanjym görnüşinde şeýle-de henşen içmek üçin bellenilýär. Mundan başga-da gowşak minerallaşdyrylan mineral suwlar, esentuki №17, we ş.m. bellenilýär.

Öt sürüji serişdeler hökmünde derman ösümlikleri giňden ulanylýar. Olar bagyr gepatositleriniň ödi işläp çykarylşyny güýçlendiriji häsiýeti ýüze çykarýarlar, şeýle-de olar ödüň öt akalgalar boýunça akymyna päsgelçilik bolanda, ot ýollarynyň we ot haltanyň atoniýasynda ýa-da öt daşlary tarapyndan şirejimek örtüjeginiň gyjyndyrylmagy zerarly ot halta muskulaturasynyň ýygrylmalarynda bellenilýär.

Diskineziýanyň gipertoniki görnüşinde holosas 1 çay çemçeden günde 2-3 gezek nahardan 30 min ön içmeli.

Mekgejöwen gulgagynyň demlemesi (10,0:200,0) her 3 sagatdan 1-2 nahar çemçe içmeli. Zirkiň ýapraklaryndan taýýarlanan tinktura günde 15-20 damjada 2-3 gezek nahardan 30 min öň içmeli.

Mundan başgada diskineziýanyň giperkinetiki görnüşinde tutgaý bilen utgaşýan bolsa belleniýän ýygynydy:

Rp. Herb.	Potentillae anserinae	30,0	(Gaýtarmanyň oty)
Herb.	Chelidonii	30,0	(Demrewotynyň oty)
Fol	Menthae piperitae	30,0	(Narpyzyň ýapragy)

M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly we gyzgyn görnüşinde günde 1-2 bulgur içilýär.

Rp. Fol	Trifolii pratensis	30,0	(Ýorunjanyň ýapragy)
Herb.	Absinthii	30,0	(Ajy ýowşanyň oty)
Fol	Menthae piperitae	30,0	(Narpyzyň ýapragy)

M.F.spec. D.S. 1 nahar çemçe 1 bulgur suwda 10 min gaýnatmaly we 2-3 nahar çemçeden 30 min nahardan öň içmeli.

Diskineziýanyň gipokinetiki görnüşinde holesistokine-tiki ot kowujy serişdeler (gurtgyran we ş.m.), umumy gurplandyryjy täsirli preparatlar (henşen, hytaý limonnigi we ş.m.) belleniýär.

Gurtgyranyň gury ekstrakty günde 1g. 3 gezek belleniýär. Bejerginiň dowamlylygy 2-3 hepde.

Gurtgyranyň güllerinden taýýarlanan demleme (10,0 : 200,0) nahardan 30 min öň şu tertip boýunça içmeli:

1-nji gün 1/3 bulgur, 2-nji gün 1/3 bulgur 2 gezek; 3-nji gün 1/3 bulgur 3 gezek; 4-nji gün 1/ 3 bulgur 3 gezek; 5-nji gün S bulgur 2 gezek; 6-nji gün S bulgur 1 gezek; Zerurlyk çykanda demlemäni 7 günden soň gaýtalap kabul etmeli. Gipokineziýada we aşgazanyň bölüp çykaryş işiniň näsazlyklarynda belleniýän ýygynydy:

Rp. Fol.	Trifolii pratensis	15,0	(Ýorunjanyň ýapragy)
Rad.	Gentianae	15,0	(Ýer bahasynyň köki)
Rad.	Taraxaci	20,0	(Tozganyň köki)
Fol	Menthae piperitae	20,0	(Narpyzyn ýapragy)

M.F.spec. D.S. 1 nahar çemçe 1 bulgur suwda 10 min gaýnatmaly we 2-5 nahar çemçeden nahardan 30 min öň içmeli

Içegäniň işjeňligini we ot bölünip çykmasyny güýçlendirýän ýygyny:

Rp. Herb. Hyperici	40,0	(Jerebaýyň oty)
Rad. Taraxaci	40	(Tozganyň köki)
Flor. Helichyrysi arenarii	15,0	(Gurtgyranyň güli)
Fol Trifolii pratensis	15,0	(Ýorunjanyň ýapragy)
Flor. Chamomillae	15,0	(Çopan telpegiň güli)
Herb. Centauri	15,0	(Altyn gülüň oty)
M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly we ertir we aňşam 1 bulgurdan içmeli.		

Öt daş keseli

Öt daş keseli ödüň kolloid düzüminiň bozulmagy netijesinde öt haltada, öt ýollarynda ýa-da bagryň içinde öt daşlarynyň çökmegi bilen häsiýetlendirilýär. Öt haltada daş emele gelme ýygy duş gelýän kesel bolup, ol erkek adamlara seredende aýallarda 4 esse köp duş gelýär.

Öt daş keseliniň esasynda indiki patogenetiki mehanizmi durýandyr:

Öt akymynyň togtamagy.

Öt halta ýokanç kesel döredijiniň düşmegi.

Holesteriniň we beýleki madda çalyşygynyň bozulmagy. Kesel döremegine naharyň aşa köp iýilmegi, semizlik, bedende neýroendokrin bozulmalar (göwrelilikde, klimaks döwürde, galkan şekilli mäziň ýerine ýetirýän işiniň peselmegi, ýag çalyşygynyň bozulmagy we ş.m.) sebäp bolup bilerler. Öt gepatositlerde emele gelýär, onuň ýerine ýetirýän işi wirusly gepatit ýa-da zäherlenme ýaly ýagdaýlaryň täsirinde bozulyp biler. Öt dykyn almaklygy hem öt daşlarynyň döremegine ýardam edýändir.

Öt daşlarynyň garyşan düzümi bolup, onuň merkezini protein esasy düzýär. Öt daşlarynyň köpüsiniň esasy düzümi

bölegi holesterindir. Bilirubin we hek suwly pigment daşlary bolsa seýrek duş gelýär.

Keseliň bejerilişi we klinikasy köp ýagdaýlara baglydyr, şol sanda:

Öt daşlarynyň ýygananan ýerine,
Öt daşlarynyň ululygyna we sanyna,
Öt haltanyň alawlama ýagdaýyna,

Näsagyň ýaşayyş durmuşyna we ýerine ýetirýän işine (ýagly naharlaryň aşa köp iýilmegi, bedeniň şikeslenmegi, fiziki dartgynlylygy we ş.m.)

Beýleki iýmit siňdiriş agzalarynyň zaýalanmagy.

Öt daş emele gelmeleriniň (holelitiaz) birnäçe görnüşleri (latent, dispepsiki, agyryly sanjy görnüşli hem-de torpid) tapawutlandyrylýar.

Öt daş keselinde alawlama hadysalary ýokdur. Sag gapyrganyň eteginde üznüksiz syrkyrap durýan agyry bolýar. Garyn barmak bilen barlananda öt haltanyň ulalanlygy kesgitlenilýär.

Holesistogrammada öt haltanyň örän ulalandygy we ýaramaz ýygrylýandygy görünýär.

Bejergisi. Öt tutgylarynda agyry aýryjy, spazmolitiki we antibakterial serişdeler bellenilýär.

Tutgysyz ýagdaýda ödüň akymyny üpjün etmeli we şol bir wagtda holesterinemiýa, alawlama ýol bermeli däl.

Iç gatama ýol bermeli däl, tiz-tiz az mukdarda iýmit, ýyly içgiler bellenilýär. Bedeni gysmaýan geým geýmeli we bejeriş maşklaryny ýerine ýetirmeli.

Öt ýollarynyň kataral alawlamalaryny we öt daş keselini bejermekde fitopreparatlar täsirli hasaplanýar. Bu maksat üçin öt sürüji, öt emele getiriji we rahatlandyryjy häsiýetli derman ösümlikleriniň demlemeleri bellenilýär. Bejergi yzygiderlilikde we dowamly bolmalydyr. (2-3 aý). Agzalan häsiýetleri derman ösümliklerinden taýýarlanan käbir ýygyndylar hem ýüze çykarýar, mundan başga-da bagyr we öt ýollarynyň kesellerinde iýmitiň siňdirilişini sazlaşdyrýan gök önümler we miweler hem ulanylýar.

Adaty kădi. Bugdaý unundan we kădiden bişirilen aş içegäniň işjeňligini gowulandyrýar, peşew bölüp çykarmasyny gowulandyrýar, duzlary bedenden çykarýar. Şol sebäpli bedende madda çalşygy bozulanda, bagyr we öt halta kesellerinde, içege işiniň bozulmagy bilen baglanyşykly ýetmezçiligindäki kolitde bellenilýär.

Kelem. Duzlanyp ýatyrylan kelem we onuň şiresi S bulgurdan günde 2-3 gezek nahardan öň ýyly görnüşinde içilende, öt, aşgazan we pankreatiki şireleriň bölünip çykmagyny ýokarlandyrýar. Şeýle-de, bagyr, öt haltanyň kesellerinde holangiogepatitde bejeriş täsiri ýüze çykarýar.

Adaty zirk. Miwesi öt kowujy täsiri ýüze çykarýar.

Tokaý ýer tudanasy. Miwesinden we ýapraklaryndan taýýarlanan demlemesi öt kowujy serişde hökmünde bellenilýär. Onuň terje miwesiniň şiresini 4-6 nahar çemçesini öt daş keselinde ajöze içmek maslahat berilýär.

Itburun, miwesinden taýýarlanan demleme öt bölünip çykmasyňy sazlaşdyryp, bakteriosid täsir edýär. Şeýle-de, aşgazan-ičege ulgamynyň bölüp çykaryş we motor işini sazlaşdyrýar. Mundan başga-da öt we peşew kowujy serişdelere jerebaýyň otundan, mekgejöweniň gultpagyndan gurtgyranyň gülünden taýýarlanan demlemeler degişlidir.

Bagyr we öt ýollarynyň kesellerinde ulanylyan derman ösümlüklerinden taýýarlanan ýygyndylar:

Rp.	Fruct.	Carvi	10,0	(Tminiň miwesi)
	Cort.	Frangulae	30,0	(Garatikenin gabygy)
	Rad.	Althaeae	30,0	(Çerbiýäniň köki)
	Fol.	Menthae piperitae	30,0	(Narpyzyň ýapragy)
	Fol.	Salviae	30,0	(Akkemençäniň ýapragy)

M.F.spec. D.S. 1 nahar çemçe 1 bulgur suwda 10 min gaýnatmaly we 1-2 bulgurdan aňşam täretiniň äsiýetine görä ulanylýar. (Täret kadaly bolsa 1 bulgur, iç gatamada 2 bulgur).

Rp.	Cort.	Frangulae	20,0	(Garatikenin gabygy)
	Fol.	Menthae piperitae	30,0	(Narpyzyň ýapragy)
	Flor.	Chamomillae	30,0	(Çopan telpegin güli)
	M.F.spec. D.S.	2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly we 1 bulguryny günün dowamynda 2-3 gezekden içmeli.		

Öt daş keseli sebäpli aşgazanyň ýerine ýetirýän wezipesi bozulanda (dispepsiýa) bellenilýän ýygyny:

Rp.	Flor.	Chamomillae	10,0	(Çopan telpegin güli)
	Cort.	Frangulae	10,0	(Garatikenin gabygy)
	Fruct.	Foeniculi	10,0	(Arpabadyýanyn miwesi)
	Flor.	Helichrysi	20,0	(Gurtgyranyň güli)
	Fol.	Menthae piperitae	20,0	(Narpyzyň ýapragy)
	Herb.	Millefolii	20,0	(Boybodranyn oty)
	Herb.	Absinthii	20,0	(Aýy ýowşanyň oty)
	M.F.spec. D.S.	1 nahar çemçe 1 bulgur suwda 10 min gaýnatmaly, ertir we aňşam 1 bulgurdan nahardan 30minut ön içmeli.		

Holesistitiň ýitileşmeginiň alamatlary ýüze çykanda bellenilýän ýygyny:

Rp.	Fol.	Menthae piperitae	10,0	(Narpyzyň oty)
	Herb.	Absinthii	10,0	(Aýy ýowşanyň oty)
	Flor.	Helichrysi	10,0	(Gurtgyranyň gabygy)
	Cort.	Frangulae	10,0	(Gara tikenin gabygy)
	Rad.	Taraxaci	10,0	(Tozganyn köki)
	Rad.	Rubiae tinctoriae	40,0	(Böwürlenin köki)
	M.F.spec. D.S.	1 nahar çemçe 1 bulgur suwda 10 min gaýnatmaly we ertirine hem-de aňşamyna 1 bulgurdan nahardan ön içmeli.		

Agyry aýyryjy we rahatlandyryjy täsiri ýüze çykarýan ýygyny:

Rp.	Herb.	Chelidonii	50,0	(Demrewotynyň oty)
	Fol.	Menthae piperitae	50,0	(Narpyzyň ýapragy)

M.F.spec. D.S. 1 nahar çemçe 1 bulgur suwda 10 min gaýnatmaly we ertir-agşam 1 bulgurdan nahardan öň içmeli.

2. 6. Bówrek we peşew ýollarynyň keselleri

Bówrek we peşew ýollarynyň keselleri barada umumy maglumat. Bówregiň roly bedeniň işjeňlik hadysasynda emele gelýän jerhetleri bedenden çykarmakdan ybaratdyr.

Bówrekde peşew emele gelip, bu ýerde ol inçejik maýyşgak turbajyk – peşew akalga boýunça peşew halta gelýär we peşew çykaryjy akalga boýunça daşary çykarylýar.

Bówrek (olar jübütdirler) oňurgalygyň sag we çep taýynyň guşaklyk ulgamynda garyn perdejiginden daşarky kletçatkada ýerleşýär. Sagky bówregiň ýokarsynda bagyr, çep taýkysynyň ýokarsynda bolsa dalak ýerleşýär. Bówrek noýba şekilli bolup 10-12 sm. uzynlykda, agramy 150-170 g. aralygynda bolýar. Bówrek ýukajyk birleşdiriji dokuma örtügi we ýag dokumalarynyň galyň gatlagy bilen gurşalandyr.

Bówrek gan bilen ýeterlik üpjün edilýär we nerw süýümleri bilen gurşalandyr. Bówrek kesilende onuň daşky gabyk gatlagyny we içki beýni gatlagyny görmek bolýar. Gabyk gatlagynda şahalanýan bówrek arteriýasyndan emele gelýän bówrek bedenjiginiň ýumajygy ýerleşýär. Her bir ýumajygyň daşy ýörite örtük bilen gurşalandyr. Bu örtügi özboluşly süzgüç bilen deňeşdirse bolar: bu ýerde ganda toplanan beden üçin gerekmejek maddalar, bówrek bedenjiginiň ýumajyklary boýunça örtükden aýrylyp gaýdýan akalgalara duşýar. Akalgajyklar bówregiň gabyk we ýilik jisimlerine ýerleşendirler. Akalgajyklar ahyr soňy peşewiň ýygnaýan we peşew akalga açylýan ýeri bolan bówrek ýaprajygyna birikýär. Gan bówregiň üsti bilen üznüksiz geçip durýar (takmynan 1 min. 1 L), netijede bedeniň jerhetlerinden arassalanmasy bolup geçýär. Adatça jany sag uly adam gije-

gündizde 2 L. köp peşew bolup çykarýan däldir, ýöne suwuklyk köp içilende peşewiň mukdary artýar, gury-gurak iýlende bolsa peşew azalýar. Yssy howada onuň mukdary azalýar.

Böwrek işjeňligi merkezi nerw ulgamyň täsiri astynda bolup geçýär. Peşewiň bölünip çykmany ol ýa-da buýanky nerw-psihiki zor salynmalarda bozulup bilner. Aşa tolgunmaklyk peşew saklap bilmezlige getirip bilýändir.

Peşew emele gelmegiň düýpden bozulmagyna anuriýa diýilýär (böwrege zeper ýetende, meselem, zäher bilen zäherlenende peşew emele gelmeginiň togtamagy). Peşewiň az bölünip çykmagyna oliguriýa we köp bölünip çykmagyna poliuriýa diýilýär. Bu fiziologiki üýtgeşmeler böwrek we beýleki agzalaryň hem-de ulgamlaryň kesellerinde bolup biler.

Sagat adamlaryň peşewiniň dykzylygy 1,017 – 1,024 aralygynda. Dykzylygy pes bolan peşewiň bölünip çykmany - gipostenuriýa diýilýär. Bu ýagdaý böwregiň ýerine ýetirýän işi bozulanda duş gelinýär. Böwrek we peşew ýollarynyň keselleri köp dürli bolsalar-da, olar ýerli (inçekesel, dömmе, peşew daş, piýelonefrit) we umumy (nefrit, nefroz) kesellere bölünýärler. Haýsy-da bolsa ýörite bir kesel üçin aýratyn häsiýetli bolan alamatlar bilen bir hatarda peşew bölüp çykaryş agzalaryň keselleriniň aglabasynda mahsus alamatlaryda bardyr.

Alawlama, böwrek daş, howply hilli dömmе çişli we ş.m. keselli näsaglaryň guşaglyk ulgamynda agyrynyň bolmagy mahsusdyr. Agyry ýiti (böwrek sanjysynyň tutgaýynda) ýa-da sorkuldaýjy, üzniksiz (ötüşen alawlamalarda) bolup biler. Näsaг ýygy bugşukmakdan, bugşygylanda peýda bolýan agyrydan, peşewde çökündiniň emele gelmeginden arz edip biler, meselem peşewde gan bolmagy (gematuriýa) nefrit, sistit uretrit üçin mahsusdyr.

Gözegçilikde näsagda reňk agarmaklygy, çişli, ýüzi ýellenmekligi saýgarmak bolýar. Ýokarda belleýşimiz ýaly, peşewde patalogiki garyndylar bolup biler. Gematuriýadan

başga-da piuriýa (peşewde iriň bolmagy), albuminuriýa (peşewde proteiniň bomagy), bolýar.

Böwrek keselleriniň gaýry alamatlarynyň içinde ýiti we ötüşen nefritde duş gelýän arterial basyşyň ýokary galmagy(arteriýal gipertenziýasy), şeýle hem göz düýbündäki üýtgemeler belenip geçilmäge mynasypdyr. Ötüşen nefritde gipertenziýa zerarly ilki başda göz torjagazlarynyň gan damarlary gysylýarlar, soňabaka damarlaryň sklerozy emele gelýär.

Glomerulonefritler

Bu böwregiň iki gapdallaýyn allergik düzümlü diffuzlaýyn ýiti alawlamasy bolup, esasan böwrek bedenjiginiň ýumajygyna zeper ýetmeklikdir. Bu keseliň iki görnüşi bar: ýiti we ötüşen glomerulonefrit.

Ýiti glomerulonefritiň etiologiýasy we patogonezi. Bu keseliň etiologiýasyna basyk, iriňli otit, pnemoniýa, alawlama ýagdaýlar degişli. Keseliň patogonezi allergik bolup-antigen antitela toplumynyň böwrek ýumajygynyň ownujak gan damarlarda berkemegidir.

Kliniki keşbi. Umumy gowşaklyk, kellagyry, bedeniň gyzgynlygy ýokarlanýar. Peşewde ganyň (gematuriýa) peýda bolmagy mümkin. Peşewiň reňki et ýuwundysynyňka çalyň edýär. Näsagyň ýüzi çişýär, gabaklary ýellenip gözi gömülýär, (kapillýar syzyjylygyň artmagy zerarly süzülme hadysasynyň bozulmagyndan natriý hloridiniň we suwuklugyň dokumalarda saklanyp galmagy netijesinde), gipertenziýa (böwrek ownujak damarlaryň ýygrylmagy) ýüze çykýar.

Glomerulonefritiň geçiş akymynyň dürli görnüşleri: çiş agdyklyk etmegi bilen geçiji-nefrotik ýa-da arterial gipertenziýasy bilen geçiji-gipertoniýaly görnüşi bardyr. Kesel çalt ösüşe eýe bolup we agyr geçende, çiş diňe bir näsagyň ýüzüne ýaýraman, eýsem tutuş bedenine-de ýaýraýandyr. Arteriýal basyş düýpli ýokary galyp biler. Bu

ýagdaý birnäçe hepde çekende ýürekde organiki üýtgeşmeler, (çepki mädējigiň gipertrofiýasy) ýüze çykyp, dem gysma, ýürek çalt urmak, göz düýbündäki üýtegemeler peýda bolup bilerler.

Keseliň ýaýbaňlanyş döwründe peşewiň mukdary gije-gündizde 250 ml. çenli azalyp bilner. Bu keselde peşew suwuklugynda gan bolmagy (gematuriýa), proteiniň bolmagy we peşewiň dykzylygynyň peselmegi häsiýetlidir.

Bejergisi. Berk düşek düzgüni berjaý edip alawlamanyň önüni almaly. Ýmit kadasyny saklamaly. Ilkinji hepdeňiň dowamynda mürepbeli suw, üzüm şiresi, klukwanyň şireli içgisi, biraz süýjedilen maniý bulamagy, süýt bermeli. Içilýän suwuň mukdaryny çäklendirmeli. Nahar duzuny çäklendirmeli.

Çiş gaýdyşyňça näsaga duzsyz nahar, süýji we gyjyndyryjy önümler бүтінлеý аýрылан (marinadlar) 7-nji belgili berhiz berilýär.

Derman serişdelerinden gipotenziw preparatlary (ýokary arterial basyşy peseldip): magniniň sulfatynyň 25% ergininiň 10 ml. beden etine göýberilýär. Glýükozanyň 40% ergininiň 20ml. wena damaryna göýberilýär. Keseliň önüni almak üçin geçirilýän çäreler ilkinji nobatda bedendäki ötüşen alawlama ojagyna garşy göreşmekden ybarat. Bu ojaklar bolsa ötüşen tonzillit, gaýmorit, adneksit, dişiň çüýremegi we beýleki kesellerdir. Ýiti glomerulonefritiň seýrek bolmadyk halatlarynda öýken sowuklamasy we başga birnäçe, hususanda ýokanç keselleriň kesel çylşyrymlaşmasydygyny unutmak bolmaz.

Ötüşen glomerulonefridiň etiologiýasy we patogenezi.

Ýiti glomerulonefridiň öz wagtynda anyklanylmazlygy we bejerilmezligi, bejeriş çäreleriniň delilsiz goýbolsun edilmegi, lukmanlaryň bellikleriniň bozulmagy ötüşen glomerulonefride getirýär. Egerde ýiti glomerulonefride näsagda başga bir ötüşen alawlama ojagy saklanyp galsa, hatda bejerginiň dürs alnyp gidilmeginde hem keseliň ötüşen görnüşe geçmeklik howpy döreýändir.

Böwrek ýumajygyndaky patologiki näsazlyklar, diňe bir alawlama üýtgemeleri bolmak bilen çäklenmän, eýsem bu ýerde birleşdiriji dokumalaryň-da örmekligi bolup geçýär. Bu hadysa akalgajyklaryň ýerleşýän bölegini öz içine alýar. Böwrek бүрүшmekligi emele gelýär.

Kliniki keşbi. Ötüşen glomerulonefridiň alamatlary köp halatlarda ýiti glomerulonefridiň çiş, artelial gipertenziýasy, gematuriýa ýaly alamatlaryna meňzeşdir. Ýöne ötüşen glomerulonefridiň käbir mahsus aýratynlyklary-da bardyr. Hususanda peşewiň barlagy, onuň dykzlygynyň peselýändigini görkezýär. Peşewde “Dänejimek silindr” diýip atlandyrylýan protein emele gelmeler tapylýar. Ýiti we ötüşen glomerulonefritleriň birnäçe geçiş taraplary bardyr. Ötüşen glomerulonefridiň arterial basyşynyň durnukly ýokary galmaklygy, ýürek ýetmezçiligi (ýürek çalt urmak, özüne fiziki zor salmalarda, soňa baka dynçlyk ýagdaýynda-da demniň gysmagy, çişniň ýaýramagy) bilen geçiji gipertoniýaly görnüşli gözegçilik edilýändir. Ötüşen glomerulonefridiň çiş agdyklyk etmegi bilen geçiji nefrozly (çişli) görnüşinde arterial basyş kadadan ýokary galmaýar, ýöne çiş mese-mälim bildirýändir.

Bejergi. Öz wagtynda geçirilmese, böwrek eklampsiýasy emele gelýär (esasanda, beýnä çiş ýöremegi zerarly). Bu patologiki hal güýçli kellagyry tutgaýy, gusmak, essi aýylmak, beden etiniň damarlaryň çekmesi arkaly ýüze çykýar.

Bejerginiň bozulmagynda we keseliň öňe ösüşlik geçiş akymynda näsagyň bedeniniň azotly jerhetler bilen zäherlenmegi netijesinde uremiýa ýüze çykyp biler. Azotly jerhetler böwrek işjeňliginiň bozulmagy zerarly bedenden öz wagtynda çykyp bilmeýärler.

Bu ýagdaýlarda näsagyň haly teňleşýär, damary çekýär, aňy garjaşýar, dili guraýar, agzyndan peşewiň ysy gelýär, çünki moçewina iýmit siňdiriş agzasynyň şirejimek örtügi arkaly bölünip çykarýar. Uremiýada gözün görşi peselýär, we beden agzalarynyň köpüsine zeper ýetýär, MNU-da

näsazlyklar bolýar (tutgaýly) beden etiniň damar çekmesi, ukylylyk). Köplenç perikardit emele gelýär. Ganda azot galyndylarynyň köpelmegi - azotemiýa, şeýle-de asidoz, giperkaliýemiýa giponatriýemiýa kesgitlenýär.

Bejergisi. Ötüßen glomerulonefritiň esasy bejeriş kadalary ýiti glomerulonefridiňkä meňzeşdir.

Aşgar gipertenzion ýa-da çiş alamatlarynda düşek düzgüni berjaý edilmelidir. Alawlamadan gaça durmaklyk möhümdir, fiziki zor salynmalardan saklanmaly. Berhiz kadany berjaý etmeli nahar duzuny, proteinleri aşa köp iýmekden gaça durmaly. Ýokary arterial basyşda gipoten-ziw serişdeler bilen bejergi bellemeklik maksada laýykdyr.

Uremiýada protein köp saklaýan önümler (ýumurtga, et) bermek bolmaýar. Bu ýagdaýda düzüminde köpräk uglewod saklaýan önümler bermeli.

Peşewiň düzümi kadalaşandan soň içine limon atylan we gara smorodinanyň şiresi goşulan süýjüli suw bermek peýdaly. Deriden üznüksiz bölünip çykýan moçewina gijilewuk döretmegi mümkindir.

Fitopreparatlar bilen bejerilişi. Glomerulonefridi bejermekde ulanylýan fitoterapewtiki serişdeler keseliň etiologiki, patogenetiki ýagdaýyna şeýle hem keseliň alamatlaryna täsir edýändir.

Basyk we laringofaringit kessellerini bejermekde agyz çaykamak üçin derman ösümlüklerden taýýarlanan ýygyndy ulanylýar. Meselem bidenegiň ýapraklaryny we çopantel-pegiň güllerini deň derejede garyp 1 çay çemçesini 1 bulgur gaýnag suwda demlemeli we agyz çaykamak üçin ulanmaly.

Ýene-de şu maksat üçin şeýle ýygyndy ulanylýar:

Rp.	Fruct.	Foeniculi	5,0	(Arpabadyýanyň miwesi)
	Fol.	Menthae piperitae	15,0	(Narpyzyň ýapragy)
	Flor.	Chamomillae	15,0	(Çopantelpegiň güli)
	Fol.	Salviae	15,0	(Akkemençäniň ýapragy)
M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 0,5 sagat demläp goýmaly we gyzgyn görnüşinde agyz çaykamak üçin ulanylýar.				

Glomerulonefritde bedeniň durnuklylygyny ýokarlandyrmak we peşew kowujy we arterial basyşyny peseldiji täsiri ýüze çykarmak maksady bilen şu ýygyny belenilýär:

Rp. Fol.	Ribes nigrum	10,0	(Gara smarodinanyň ýapragy)
Fol.	Betulae	10,0	(Berýozanyň ýapragy)
Fruct.	Juniperi	10,0	(Arçanyň miwesi)
Strobili	Lupuli	10,0	(Hmeliň miwesi)
Fol.	Uvae ursi	20,0	(Aýy gulagyň ýapragy)
Fol.	Plantaginis majoris	20,0	(Uly atgulagyň ýapragy)
Herb.	Eguiseti	30,0	(Meýdan kyrkbogunynyň oty)
Fol.	Vitis idaeae	20,0	(Brusnikanyň ýapragy)
Fol.	Urticae dioicae	30,0	(Çit-çitiniň ýapragy)
Fruct.	Rosae	40,0	(It burunyň miwesi)
Fruct.	Fragariae vescae	60,0	(Ýer tudanasynyň miwesi)

M.F.spec. D.S. Ýygynyň 5-6 g. 500 ml. gaýnan suw guýup, suwly hammamda 30 min gyzdyrmaly (gaýnatman) Demlemäni 150 ml. günde 3 gezek ýyly görnüşde nahardan 30 min öň içmeli. Soňra peşewiň bulançaklygyna gözegçilik etmeli. Gematuriýa ýokarlananda ýygynydan meýdan kyrkbogunyny aýyrmaly.

Bokurdak çaykamak üçin laringitde şeýle ýygyny ulanylýar:

Rp. Fruct.	Foeniculi	5,0	(Arpabadyýanyň miwesi)
Rhiz.	Potentillae erecti	15,0	(Gaýtarmanyň porrugy)
Rad.	Althaeae	15,0	(Çerbiýäniň köki)
Cort.	Quercus	15,0	(Dubuň gabygy)
Fol.	Salviae	15,0	(Akkemençäniň ýapragy)

M.F.spec. D.S. 1 nahar çemçe bir bulgur suwda 10 min gaýnatmaly we gyzgyn görnüşde bokurdak çaykamak üçin ulanmaly.

Glomerulonefritde alawlama garşy allergiýa garşy, peşew kowujy häsiýeti ýüze çykarýan şeýle-de witaminleriň (A, C we B witaminleriniň toparynyň, we başgalaryň) çeşmesi bolup hyzmat edýän fitopreparatlar ulanylýar.

Rp. Fol.	Fragariae vescae	10,0	(Ýer tudanasynyň ýapragy)
Fol.	Urticae dioicae	10,0	(Çit-çitiniň ýapragy)
Fol.	Betulae	20,0	(Berýozanyň ýapragy)
	Sem Lini	50,0	(Zygyryň tohumy)

M.F.spec. D.S. 1 nahar çemçe bir bulgur suwda 10 min gaýnatmaly we nahardan öň günde 1-2 bulgurdan içmeli.

Rp. Semen	Lini	40,0	(Zygyryň tohumy)
-----------	------	------	------------------

Rad.	Ononidis	30,0	(Polatlynyň ýapragy)
Fol.	Betulae	30,0	(Berýozanyň ýapragy)

M.F.spec. D.S. 1 nahar çemçe bir bulgur suwda 10 min gaýnatmaly we 1 bulgaryny günüň dowamynda birnäçe bölege bölüp içmeli.

Ýiti we ötüşen glomerulonefrit giperazotemiýa alamatynda Lespenefril dermany belleniýär. Bu preparat kösükliler maşgalasyndan bolan Lespedeza ösümliginiň spirtli tinkurasydyr. Ony 1-2 çay çemçeden (agyr ýagdaýlarda 6 çay çemçeden) günde belleniýär. Ýa-da bu preparatyň sanjym üçin niýetlenen görnüşleri ulanylýar.

Mundan başga-da glomerulonefridi bejermekde şu ýygynyndylar belleniýär:

Rp. Herb.	Eguiseti	10,0	(Meýdan kyrkbogunyň oty)
Fruct.	Rosae	15,0	(It burunyň miwesi)
Fol.	Plantaginis	15,0	(Uly atgulagyň ýapragy)
Herb.	Millefolii	10,0	(Boýbodranýň oty)
Flor.	Calendulae	20,0	(Dyrnaklyjanyň güli)
Herb.	Bidens tripartitae	5,0	(Üç bölek goşa dişiň oty)

M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly we demlemäni 1/4 -1/3 bulgurdan günde 3-4 gezek, ötüşen glomerulonefritde içmeli.

Ötüşen glomerulonefridiň gematuriýaly görnüşinde düzüminde çit-çitiniň ýapragyny saklaýan ýygynyndylaryň demlemesi ulanylýar.

Piýelonefrit. Piýelonefrit – bu esasan böwregiň interstistal dokumasy-nyň we böwrek ýargajygynyň alawlamasydyr. Bu kesel ýokary çykyjy kesel döredijiniň, köplenç, kokkileriň peşew çykaryjy akalganyň, peşew haltanyň alawlamasynda, şeýle hem, aşak düşüji ýokanç kesel döredijiniň gan damarlary we limfatik ýollar boýunça aralaşmagy (bedendäki islendik alawlama ojagyndan) zerarly döräp biler. Allergiýa itergi beriji sebäp bolup hyzmat edýändir. Ýiti piýelonefrit fiziki aşa dartgynlygyň, alawlamanyň täsirinden örän çalt ýaýbaglanýandyr.

Kliniki keşbi. Bedeniň gyzgyn görkezijisi ýokary galýar, näsag umumy gowşaklykdan, nähoşlukdan arz edýär,

guşaklykda agyrynyň peýda bolmagy, bu keseliň baş alamatydyr. Näsag ýygy buşugýar. Peşew bulançak bolup, onda köp sanly leýkositler anyklanýar.

Bejergisi. Näsag düşek düzgünini berjaý edip, 7-nji berhiz bilen iýmitlenmeli. Bulardan başga-da, näsaga, köp mukdarda adaty içilýän suw, mineral suwlar, şireli içgi we miwe suwlary bellenýär.

Peşewiň suwuklygynyň tejribe barlagy geçirilip, bakterial gelip çykyşy tebigaty anyklanylandan soň, antibiotikler bellenilmelidir.

Piýelonefritiň fito preparatlar bilen bejerilşi Piýelonefritli näsaglara klýukwanyň morsy, şireler hem-de peşew kowujy we antiseptiki täsirli derman ösümlükleriň demlemeleri bellenilýär. Şeýle täsiri ýüze çykarýan derman ösümlükleriniň ýygýndylaryndan taýýarlanan çäylara şu aşakdakylar degişlidir:

Rp.	Fol.	Betulae	10,0	(Berýozanyň ýapragy)
	Fol.	Uvae ursi	10,0	(Aýy gulagyň ýapragy)
	Herb.	Eguiseti	10,0	(Meýdan kyrkbogynyň oty)
	Rad.	Taraxaci	10,0	(Tozganyň köki)
	Fruct	Juniperi	10,0	(Arçanyň miwesi)
	Fol.	Vitis idaeae	20,0	(Brusnikanyň ýapragy)
	Sem.	Lini	20,0	(Zygyryň tohumy)
	Rad.	Glycyrrhizae	10,0	(Buýanyň köki)
M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly we 150 ml-den günde 4 gezek nahardan 30 min öň içmeli..				

Bu ýygýndynyň demlemesi antibakterial serişdeler bilen utgaşdyryp ulanmaly

Rp.	Fruct.	Juniperi	60,0	(Arçanyň miwesi)
	Fruct.	Foeniculi	20,0	(Arpabadyýanyň miwesi)
	Rad.	Glycyrrhizae	20,0	(Buýanyň köki)

M.F.spec. D.S. 1 nahar çemçe 1 bulgur suwda 10 minut gaýnatmaly we 1/3-1/4 bulgurdan günde 3 gezek peşew kowujy serişde hökmünde içmeli. (Göwrelilikde, böwrek we peşew ýollarynyň ýiti alawlama kesellerinde ulanmak gadagandyr).

Alawlama hadysasy geçenden soň, keseliň gowşan halatynda, antibakterial preparatlary ulanmagy bes etmelidir. Näsaglara klýukwanyň şiresini günde 1 bulgurdan 4 gezek we metioniniň gerdejigini 0,5 g-dan 4 gezek bellemeli. Şeýle utgaşdyрма bagyrda gippur turşusynyň sintezini üpjün edýär. Gippur turşusy peşewiň düzüminde böwrek bilen bölünüp çykyp, piýelonefriti emele getirýän kesel döredijilere bakteriostatiki täsir edýär.

Piýelonefritde bakterial kesel döredijä garşy we bedeniň daşky gurşawa durnuklylygyny artdyrmak üçin belleniýän ýygýndylar:

Rp.	Fol.	Uvae ursi	20,0	(Aýy gulagyň ýapragy)
	Fol.	Plantaginis majoris	20,0	(Uly atgulagyň ýapragy)
	Fol.	Ribes nigrum	10,0	(Gara smarodinanyň ýapragy)
	Fol.	Betulae	10,0	(Berýozanyň ýapragy)
	Fruct.	Juniperi	10,0	(Arçanyň miwesi)
	Fol.	Urtical dioicae	30,0	(Çit-çitiniň ýapragy)
	Fruct.	Rosae	60,0	(It burunyň miwesi)
	Fruct.	Fragariae versae	60,0	(Ýertudanasynyň miwesi)
	Herb.	Equiseti	60,0	(Meýdan kyrkbogunyň oty)
M.F.spec. D.S. 1 nahar çemçe 1 bulgur suwda 10 minut gaýnatmaly we 150 ml-den günde 3 gezek 30 min nahardan öň ýyly görnüşinde içmeli.				

Rp.	Herb.	Equiseti	30,0	(Meýdan kyrkbogunyň oty)
	Rhiz.	Potentillae	30,0	(Gaýtarmanyň porrugy)
	Fol.	Plantaginis	40,0	(Uly atgulagyň ýapragy)
M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 minut demlemeli we 1/3-1/4 bulgurdan, günde 3-4 gezek, böwregiň we peşew ýollarynyň alawlama kesellerinde aňşamlaryna ýyly görnüşinde içmeli.				

Rp.	Herb.	Leonuri	25,0	(Şirguyrugyň oty)
	Herb.	Hyperici	25,0	(Jerebaýyň oty)
	Herb.	Viola tricolor	25,0	(Benewşäniň oty)
	Herb.	Equiseti	25,0	(Meýdan kyrkbogunyň oty)

M.F.spec. D.S. 1 nahar çemçe 1 bulgur suwda 10 minut gaýnatmaly we 2-3 bulgurdan günde içmeli.

Rp. Fruct Juniperi 25.0 (Arçanyň miwesi)
Fol. Betulae 25.0 (Berýozanyň ýapragy)
Rad. Taraxaci 25.0 (Tozganyň köki)
M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 minut demlemeli we 1 nahar çemçeden günde 3 gezek nahardan öň içmeli. Bejerginiň dowamlylygy her aýda 10-12 gün.

Piýelonefritde antibakterial bejergini goldaýan ösümlik ýygynydlary bellenilýär:

Rp. Herb. Equiseti 1 çay çemçe (Meýdan kyrkbogunynyň oty)
Fruct Juniperi 1 nahar çemçe (Arçanyň miwesi)
Rad. Glycyrrhizae 1 nahar çemçe (Buýanyň köki)
Fol. Uvae ursi 1 çay çemçe (Aýy gulagyň ýapragy)
Fol. Vitis idaeae 1 nahar çemçe (Brusnikanyň ýapragy)
M.F.spec. D.S. 3 nahar çemçe derman sümlükleriniň garyndylaryny 3 bulgur suw bilen garyp, hammamda 10 min gyzdyrmaly. Demlemäni 1 nahar çemçeden günde 3 gezek nahardan öň içmeli. Bejergini 1-1.5 ýyl dowam etdirmeli.

Böwrekdäki daş keseli

Böwrek daşlary adam bedeninde bolup geçýän madda çalyşma (duz, mineral) hadysalarynyň bozulmagy, iýmit bidüzginçiliginiň (her gün şol bir iýilýän tagamlar, naharyň aşa köp iýilmegi, etli iýmitlere, gyzyl şeraba ýykgyň edilmegi), awitaminozyň, hususan-da, A awitaminozyň, böwrek ýargajygyndaky dykyn almak hadysasy netijesinde döräp bilýändir. Peşew dykyn almasynda daş emele gelmekligiň düýp özeni hasap edilyan peşew turşusynyň duzлары (uratlar) kristallaşyp bilýändirler.

Böwrek daşlarynyň düzümi dürli-dürlüdür. Daşlaryň dykyzlygy we reňki olaryň düzümine baglydyr. Meselem, oksalat daşlarynyň reňki garamtyl-goňrasdyr, üsti бүдүр-сүдүр we gatydyr. Fosfat daşlary (uratlar) sarymtyl-gyzgylt, ýylmanak, oksalat daşlaryna görä ýumşakdyrlar. Böwrek

daşlary sany boýunça ýeke-täk ýa-da ençeme (100-e çenli, hat-da ondan hem köp sanly), ululygy boýunça çäge dänejiğinden tä uly ýumurtga ýaly bolup bilýärler.

Daş döremeklige itergi beriji çalyşma hadysalarynyň bozulmagy neýroendokrin näsazlyklar bilen bagly bolup bilerler.

Kliniki keşbi. Köp ýyllaryň dowamynda daşlaryň bardygy ýüze çykman hem bilýändir. Böwrek sanjysynyň tutgaýy: guşaklygyň sagynda we çepinde döreýän hem-de gasyk ulgamyna beriji güýçli agyry - bu keseliň baş alamatydyr. Hassanyň gusmaklygy, hat-da çaşmaklygy hem mümkin. Peşewde gan we täzeje eritrositler ýüze çykyp biler.

Böwrek sanjysy içinden daş geçende, peşew akalganyň gyjyndyrylmagy bilen baglanyşyklydyr. Özünü fiziki zor tutmak, bitekiz erden ulagly gitmek, zeperlenme böwrek sanjysynyň ýüze çykmagyna gös-göni itergi berip biler.

Böwrek sanjysy uzaga çekip biler ýa-da daş peşew haltasyna süýşüp gelen bolsa (adatça, olar kiçiräk we ýylmanak), böwrek sanjysy basym gowşaýar(2-3 sagatdan). Eger-de, daş böwrek ýargajygynda saklanyp galsa we töwerekdäki dokumany gyjyndyryp durýan bolsa, ol ýerde özünüň ahli mahsus alamatlary bilen alawlama hadysasy (piýelit we piýelonefrit) emele gelip biler. Beýle bolanda, gaty bir güýçli bolmasa-da, guşaklyk ulgamynda agyry duýulýar, beden gyzgynlygynyň görkezijisi ýokarlanýar, käte peşewde gandan başga-da iriň hem görünýär. Peşew bölünip çykyşynyň bozulmagy bilen baglylykdaky alamatlaryň hem ýüze çykmagy mümkindir, käte garyn hem ýellenýär.

Guşaklyk ulgamyna seredilip göründe, onuň ol ýa-da beýleki gapdalynda agyry peýda bolýar. Peşew akalgasyna daş dykylanda bolsa, ýygynanan peşew böwrek ýargajygyny süýndirip, gidronefroz emele getirip biler. Şeýle ýagdaýda, ulalan böwregi elläp görmek ýoly bilen kesgitlemek başardýar.

Bejergisi tutgaý aralygyndaky döwürde näsaga degişli berhizi kesgitlemelidir. Bu maksat üçin, daşlaryň düzümini

kesgitleýärler. Fosfat daşlarynda peşewiň aşgar täsirleşmesinde kömürturşy minerally suwlary bermek bolar, iýmitde bolsa, gök önümler artdyrylyp, etiň mukdary çäklendirilýär. Iýmitde ýeňil siňýän her dürli we doly bahaly proteinler, uglewodlar, ýaglar, witaminler bolmalydyr. Näsag köp hereketde bolmalydyr, maşklar bilen meşgullanmalydyr we suwuklyklaryň ýeterlik mukdaryny kabul etmelidir.

Böwrek sanjysy tutanda, ýyly hammamlary, gyzgyn suwly gyzdyryjyny peýdalanmak maslahat berilýär. Berhiz tutmak daşyň düzümi bilen baglydyr.

Eger peşewturşy daşlar (uratlar) bar bolsa, iýmitde çorbanyň mukdaryny azaltmaly, böwrek iýmegi çäklendirmeli. Fosfat daşlary aşgar ulgamynda emele gelýär. Bu daşlar bar bolsa, süýt önümlerini, miweleri, gök önümleri iýmegi çäklendirmeli. Oksalat daşlary bar bolsa, turşuja ysmanak we beýleki gök önümleri çäklendirmeli.

Böwrek daş keselinde berhiz saklamak bilen bir hatarda, köp mukdarda (her gün 8-10 bulgur) suwuklyk içmeli. Dermanlardan bakteriýalara garşy, spazmolitiki, peşew kowujy preparatlary, şeýle hem, içegede duzlaryň sorulşyny peseldip, olary peşew suwuklygy boýunça çykarmagy üpjün edýän derman serişdeleri ulanylýar.

Böwrek daş keselinde fitoterapewtiki serişdeler giňden ulanylýar. Böwrek daş keselinde ulanylýan derman önümlikleriniň preparatlary madda çalşygyny kadalaşdyryjy derman serişdeleridir. Böwrek daş keselinde, fitopreparatlar, bejergi we keseliň önüni alyjy serişdeler hasaplanýar. Çöp boýanyň gury ekstrakty spazmolitiki, peşew kowujy hem-de fosfatlary, magnini saklaýan peşew daşlaryny ownadyjy täsirleri ýüze çykarýar. Onuň günde 2-3 gerdejigini (0,25 g) 0,5 bulgur ýyly suw bilen 3 gezek içmeli. Bejerginiň dowamlygy 20-30 gün.

Toplumlaýyn preparat olimetin spazmolitiki peşew kowujy, alawlama garşy täsiri ýüze çykarýar we owunjak daşlary peşew bilen çykarýar. Örtük görnüşinde (0,5 g) ol, günde 2 örtükden, 3-5 gezek, nahardan ön içilýär. (Preparaty

glomerulonefritde, gepatitde, aşgazanyň baş keselinde ulanmak gadagan)

Awisan preperaty diş amminiň miwesiniň maddalar toplumyny saklaýar. Preparat böwrek daş keselinde spazmolitiki täsiri ýüze çykarýar we daşlaryň çykarylmagyny üpjün edýär. Preparaty, günde 2 gerdejikden (0,1 g), 4 gezek nahardan soň, 4 hepďäniň dowamynda içmeli.

Pinabin. Sosnanyň püründen alnan agyr fraksiýaly efir ýagynyň 50%-i şetdaly ýagyndaky ergini. Preparatyň spazmolitiki we bakteriostatiki täsiri bar. Ony 5 damjadan ganda damdyryp, günde 3 gezek, 20 minut nahardan öň içmeli. (Nefritde bu preparaty ulanmak bolmaýar.)

Sistenal spazmolitiki we peşew kowujy täsiri ýüze çykarýar. Ony 4 damja ganda damdyryp, günde 3 gezek içmeli. Preparaty ötüşen glomerulonefritde, peşew daş keselinde, aşgazanyň baş keselinde ulanmak bolmaýar.

Peşew ýollarynyň alawlama kesellerinde bakteriaýalara garşy serişdeleri bellemek bilen bilelikde, meýdan kyrkbogunyň otunyň gaýnatmasy hem günde 1/4 bulgurdan 3-4 gezek bellenilýär. Gaýnatmany glomerulonefritde ulanmak gadagan.

Peşew ýollarynyň daşlarynda spazmolitiki, antiseptiki we peşew kowujy täsiri ýüze çykarýan ýygdy:

Rp.	Fol.	Urticae dioicae	5,0	(Çit-çitiniň ýapragy)
	Rhiz.	Calami	5,0	(Süýji ýekeniň porrugy)
	Fol.	Menthae piperitae	5,0	(Narpyzyň ýapragy)
	Herb.	Equiseti	15,0	(Meýdan kyrkbogunyň oty)
	Flor.	Sambuci	15,0	(Buzinanyň güli)
	Flor.	Tiliae	15,0	(Lipanyň güli)
	Fruct.	Juniperi	15,0	(Arçanyň miwesi)
	Fruct.	Rosae	15,0	(Litburunyň miwesi)
M.F.spec. D.S. 1 nahar çemçe 1 bulgur suwda 10 min gaýnatmaly we 1 bulguryň ertirine we aňşam içmeli.				

Rp.	Herb.	Equiseti	10,0	(Meýdan kyrkbogunyň oty)
	Flor.	Tanacetii	10,0	(Piňmanyn güli, tanasetumyň)

Fol. Vitis idaeae 20,0 (Brusnikanyň ýapragy)
 M.F.spec. D.S. 1 nahar çemçe bir bulgur suwda 10 min gaýnatmaly we 1 bulgyrdan etirine we agşam içmeli.

Rp. Fol. Betulae 20,0 (Berýozanyň ýapragy)
 Rad. Ononidis 20,0 (Polatlynyň köki)
 Fruct. Juniperi 20,0 (Arçanyň miwesi)
 Herb. Protentillae anserinae 20,0 (Gaýtarmanyň oty)
 M.F.spec. D.S. ýygýndynyň 4 nahar çemçesini 1 litr gaýnag suwa demläp, sowayança basyryp goýmaly we şol pursat içmeli. Şeýle-de peşew bölünip çykmasyny saklajak bolmaly. (Ýygýndyny glomerulonefritde ulanmak gadagan).

Rp. Fruct. Petroselin 50,0 (Arpabadyýanyň miwesi)
 Fruct. Anisi 50,0 (Anisiň miwesi)
 Herb. Bursae pastoris 15,0 (Çopan torbanyň oty)
 Fruct. Juniperi 15,0 (Arçanyň miwesi)
 Fol. Uvae ursi 15,0 (Aýy gulagyň ýapragy)
 Rad. Ononidis 15,0 (Polatlynyň köki)
 Rad. Taraxaci 15,0 (Tozganyň köki)
 M.F.spec. D.S. 1 nahar çemçe 1 bulgur suwda 10 min gaýnatmaly we 1 burguldan ertirine we agşam içmeli.
 Böwrekden ürgün we daş çykarmak üçin belleniýän ýygýndy

Oksalat tebigatly daşlar bar bolsa, ulanylýan ýygýndy:

Rp. Rad. Rubiae tinctorum 10,0 (Çop boýanyň köki)
 Rad. Ononidis 20,0 (Polatlynyň köki)
 Sem. Lini 40,0 (Zygyryň tohumy)
 M.F.spec. D.S. ýokardaky ýygýndynyň 4 nahar çemçesini 1 litr gaýnag suwa demläp basyryp goýmaly we sowandan soň, süzüp, bir günde içmeli.

Böwrek keselinde ulanylýan we alawlama garşy täsiri ýüze çykarýan ýygýndy:

Rp. Fol. Uvae ursi 10,0 (Aýy gulagyň ýapragy)
 Herb. Polygonii avicularis 10,0 (Suw kyrkbogynyň oty)
 Herb. Herniariae 20,0 (Ingilijäniň oty)
 Stigmatis Maydis 10,0 (Mekgejoweniň gulpagy)
 M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 minut demläp goýmaly we 1/4 bulgyrdan, günde 3-4 gezek, nahardan 1 sagat soň içmeli.

Rp. Herb.	Chelidonii	25,0	(Demrewotynyň oty)
Herb.	Hyperici	10,0	(Jerebaýyň oty)
Herb.	Thymi Serpylli	25,0	(Käkilik otynyň oty)

M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 minut demläp goýmaly we 1 litrini sowandan soň içmeli

Rp. Fruct.	Petroselini	5,0	(Arpabadyýanyň miwesi)
Fruct.	Juniperi	5,0	(Arçanyň miwesi)
Fruct.	Anici	5,0	(Anisiň miwesi)
Flor.	Convallariae	30,0	(Landyşyň güli)
Fol.	Betullae	30,0	(Berýozanyň ýapragy)

M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 minut demläp goýmaly we 1/3 bulgurdan, günde 3 gezek, nahardan 1 sagat soň içmeli. (Glomerulonefritde ulanmak gadagan).

Böwrek daş keselinde ulanylýan peşew kowujy täsiiri ýüze çykarýan gök önümler we miweler

Garpyz - böwrek daş keselinde, sistitde, glomerulonefritde we piýelonefritde ulanylýar, şeýle-de bedende suwuklyk ýygananan näsaglara 2-2,5 kg garpyz iýmek belleniýär. Garpyzy böwrek daşlarynyň urat, oksalat görnüşlerini, peşew turşy duzlarynyň çökündili sistein urolitiazyny bejermekde ulanylýar.

Kelem - düzüminde kaliý ionlaryny saklaýandygy sebäpli, bedenden suwuklyk çykaryp, peşew kowujy täsiiri ýüze çykarýar.

Tokaý ýer tudanasy - ýapraklarynyň, miwesiniň demlemesi peşew kowujy serişde hökmünde ulanylýar.

Adaty zirk - ýapraklarynyň, miwesiniň demlemesi peşew kowujy we alawlama garşy täsiiri ýüze çykarýar.

Armyt - şiresi, miwesiniň gaýnatmasy peşew daş keselinde peşew kowujy täsiiri ýüze çykarýar.

Gawun - maňzyzy we çigidi peşew kowujy täsiri ýüze çykarýar.

Meýdan kyrkboguny we gara çaýyr, berýoza, arça we ş.m. hem ulanylýar.

Sistitler

Sistitler-peşew haltanyň alawlama keselidir. Bu keseli doredijiler: içege taýajygy, stafilakokk, streptokokk, proteý we ş. m. Peşew halta ýokanç kesel döredijiniň düşmek ýollary dürlüdür (urogen, renal, limfogen, gematogen). Bu keseli emele getiriji sebäpler bolup: peşew haltanyň arassalanşy, boşadylşy, ýerli gan aýlanşygynyň bozulmagy, alawlamak, peşew haltanyň nemli bardasynyň himiki maddalar bilen gyjyndyrylmagy, ýadawlyk sebäpli bedeniň daşky gurşowa durnuklylygynyň peselmegi, keselden soň, süýji diabet keseli bilen kesellemek we ş m. bilerler.

Bejergisi: Sistitiň toplumlaýyn bejergisi geçirilende bakterialara garşy, spazmolitiki, agyry aýryjy, alawlama garşy täsiri ýüze çykarýan serişdeler bilen bir hatarda, bedeniň ýerli we umumy işjeňligini ýokarlandyryjy serişdeler belleniýär. Şeýle häsiýetler derman ösümlikeriň preparatlaryna-da mahsusdyr. Olar esasan-da ýygyndy görnüşinde ulanylýar .

Antiseptiki alawlama garşy rahatlandyryjy we peşew kowujy täsiri ýüze çykarýan fitoterapewtiki serişdeler:

Rp. Fol.	Uvae ursi	20.0	(Aýy gulagyn yapragy)
Fol.	Betulae	20.0	(Berýozanyň ýapragy)
Stigmatis	Maýdis	20.0	(Mekgejöweniň gulpagy)
Rad.	Glycyrrhizae	20.0	(Buýanyň köki)
M.F.spec.	D.S. 1	çaý çemçe	1 bulgur suwda gaýnatmaly we 1/3 bulgurdan günde 3 gezek nahardan soň içilýär.

Sistitde spazmalitiki, alawlama garşy agyry aýryjy seriş-de hökmünde, esasan hem, peşewiň aşgar täsirleşmesinde ulanylýan ýygyny:

Rp.	Fruct.	Petroselini	10.0	(Badyýanyň miwesi)
	Herb.	Chelidonii	10.0	(Demrew otynyň oty)
	Fol.	Uvae ursi	40.0	(Aýy gulagyn ýapragy)
	Herb.	Herniariae	40.0	(Ingilijäniň oty)
M.F.spec. D.S. 1 çay çemçe 1 bulgur suwda gaýnatmaly we 1/2 bulgurdan günde 3-4 gezek nahardan 1.5-2.0 sag. soň içmelidir.				

Ürgünli we aşgarly peşewde belleniýän we spazmolikiki, peşew kowujy täsirli ýygyny:

Rp.	Herb.	Herniariae	10.0	(Ingilijäniň oty)
	Fruct.	Petroselini	10.0	(Badyýanyň miwesi)
	Fol.	Menthae piperitae	10.0	(Narpyzyň ýapragy)
	Rad.	Ononidis	30.0	(Polatlynyň köki)
	Fol.	Uvae ursi	40.0	(Aýy gulagyň ýapragy)
M.F.spec. D.S. 2 çay çemçe 1 bulgur gaýnag suwda 30 min demläp goýmaly we 1/3 bulgurdan günde 3 gezek içmeli.				

Aşgarly peşewde we diurezde ulanylýan ýygyny:

Rp.	Herb.	Herniariae	20.0	(Ingilijäniň oty)
	Fruct.	Petroselini	20.0	(Badyýanyň miwesi)
	Fol.	Uvae ursi	60.0	(Aýy gulagyň ýapragy)
M.F.spec. D.S. 2 çay çemçe 1 bulgur gaýnag suwda demlemeli we 1/3 bulgurdan günde 3 gezek nahardan öň içmeli				

Gemorragiki sistitde ulanylýan ýygyny:

Rp.	Herb.	Equiseti	30.0	(Meýdan kyrkbogynyň oty)
	Rhiz.	Potentillae	30.0	(Gaýtarmanyň porrugy)
	Fol.	Plantaginis	40.0	(Atgulagyň ýapragy)
M.F.spec. D.S. 2 çay çemçe 1 bulgur gaýnag suwda 30 min demläp goýmaly we gyzygynlygyna 1 bulgurdan agşam içmeli.				

Aşgarlaýjy peşewde we gematuriýada belleniýän ýygyny:

Rp. Flor. Tiliae	20.0	(Lipanyň güli)
Cort. Quercus	20.0	(Dubuň gabygy)
Fol. Uvae ursi	20.0	(Aýy gulagyň ýapragy)

M.F.spec. D.S. 2 çay çemçe 1 bulgur gaýnag suwda 30 min demläp goýmaly we gyzgynlygyna 1 bulgurdan agşam içmeli.

Peşew ýollaryny dezinfisirleýji we peşew kowujy täsirli ýygyny:

Rp. Herb. Equiseti	20.0	(Meýdan kyrkbogunynyň oty)
Flor. Ghamomillae	20.0	(Çopan telpegiň güli)

M.F.spec. D.S. 2 çay çemçe 1 bulgur gaýnag suwda 30 min demläp goýmaly we 3 bulgurdan täze taýýarlanan gyzgyn ýagdaýda içmeli.

Böwrek we peşew ýollarynyň kesellerinde ulanylýan fitoterapewtiki-diuretiki täsirli dermannamalar

Rp. Herb. Equiseti	20,0	(Meýdan kyrkbogunynyň oty)
Herb. Virgaureae	15,0	(Solidagonyň oty (Zolotaznik))
Fol. Betulae		(Berýozanyň ýapragy)
Herb. Urticae aa	30,0	(Çit-çitiniň oty)

M.F.spec.D.S. 1 çay çemçe 1 bulgur gaýnag suw bilen demlemeli. Günde birnäçe bulgur içmeli. (Böwregiň ýiti gaýnaglamasynda ulanmak maslahat berilmeyär).

Rp. Fruct. Juniperi	60,0	(Arçanyň miwesi)
Fruct. Foeniculi		(Arpabodyýanyň miwesi)
Rad. Liquiritae aa	20,0	(Buýanyň köki)

M.F.spec.D.S. 1 çay çemçe 1 bulgur gaýnag bilen 10 min gaýnatmaly. Günde birnäçe bulgur içmeli. (Nefrit keselli näsaglara, göwrelilere ulanmak maslahat berilmeyär).

Rp. Fol. Uvae ursi	30,0	(Aýy gulagyň ýapragy)
Flor. Cyani		(Gök daş kekranin güli)
Rad. Liquiritia aa	10,0	(Buýanyň köki)

M.F. D.S. spec. 1 nahar çemçe 1 bulgur gaýnag suw bilen 10 min gaýnatmaly. Sowadyp süzmeli. Günde 1 nahar çemçeden 3-4 gezek nahardan öň içmeli.

Rp. Fol. Uvae ursi 30,0 (Aýy gulagyň ýapragy)
Fol. Vitis idaei (Brusnikanyň ýapragy)
Herb. Equiseti aã 50,0 (Meýdan kyrkbogunynyň oty)
Sem. Lini 40,0 (Zygyryň tohumy)
Fol. Betulae 20,0 (Berýozanyň ýapragy)
M.F.spec.D.S. 2 nahar çemçe ýygyndyny 500 ml gaýnag suw guýup 10 min demlemeli. Günde 4 gezek 50 ml içmeli.

Rp. Fruct. Juniperi (Arçanyň miwesi)
Fruct. Petroselini aã 10,0 (Badyýanyň miwesi)
Herb. Virgaureae 30,0 (Solidagonyň oty (zolutarnik))
M.F.spec. D.S. 1 çay çemçe 1 bulgur gaýnag suw bilen 30 min demlemeli.
Günde 3 bulgur içmeli.

Rp. Herb. Equiseti 30,0 (Meýdan kyrkbogunynyň oty)
Herb. Polygoni avic 40,0 (Suw kyrkbogynyň oty)
Herb. Galeopsidis 20,0 (Pikulnigiň oty)
M.F.spec. D.S. 3 nahar çemçesiini 500 g gaýnag suw bilen 30 min demlemeli. Gije-gündizki mukdary owurtlap içmeli.

Rp. Rad. Taraxaci (Tozganyň köki)
Fol. Betulae (Berýozanyň ýapragy)
Fruct. Juniperi aã 25,0 (Arçanyň miwesi)
M.F.spec.D.S. 1 nahar çemçe garyndyny 1 bulgur gaýnag suw bilen demläp goýmaly. Sowadyp, süzmeli. Günde 1 nahar çemçeden 3-4 gezek nahardan öň içmeli. (Peşew kowujy serişde).

2.7. Madda çalşygynyň bozulmalarynda ýüze çykyan keselleriň fitoterapýasy

Semizlik. Semizlik has giň ýaýran kesel bolup, madda çalşyk hadysanyň çuňňur bozulmagy bilen häsiýetlendirilýär. Semizligiň ösmegine birnäçe içki we daşky sebäpler täsir edýär. Ol bedeniň metaboliki hadysalarynyň has üýtgemegi, energetiki disbalans, madda çalşygynyň merkezi sazlaşygynyň bozulmagy, gormonal bozulmalar we enzim dizadaptasiýasy bilen häsiýetlendirilýär.

Bu keseliň toparlara bölünişi:

I. Semizligiň birlenji görnüşi:

- 1) Alimentar – konstitusion
- 2) Neýroendokrin:
 - a) Gipotalamo-gipofizar semizlik
 - b) Adipozo-genital distrofiýa (çagalarda we ýetginjeklerde)

II. Semizligiň Ikilenji (simptomatiki) görnüşi:

1. serebral
2. Endokrin
 - 1) Gipotireoid
 - b) Gipowarial
 - w) Klimaksly
- g) Böwreküstli.

Semizlik derejeleri:

- I – bedeniň agramy adatkysyndan 29%-den öte geçmeli däl;dir;
- II – bedeniň agramynyň artykmaçlygy 30-49% ýetýär;
- III – bedeniň agramynyň artykmaçlygy adatkysyndan 50-99,9%-den öte geçýär;

IV – bedeniň hakyky agramynyň artykmaçlygy 100% we ondan hem köpdür.

Bularyň içinde iň ähmiýetlisi alimentar-konstitusion görnüşidir.

Alimentar – konstitusion semizligiň patogenezinde – esasy zat bedeniň doglyş aýratynlygy bolup, ol alimentar ýagdaýlar tarapyndan amala aşyrylýar. Käbir adamlarda çagalykda dolmuşlyk we işdäniň ýokary bolmagyna ýykgyňlylyk, birnäçe aýallarda bolsa, semizlik, çaga dogurandan soň ýüze çykýar. Gipotalamus – gipofiz ulgamy tarapyndan üýtgemeler, çagalyk döwründe artykmaç emdirilmegi bilen baglanyşykly; – ikilenji sebäp hökmünde hem bolup biler, bu bolsa, enzim we gormonal işjeňligiň bozulmagyna, şonuň bilen baglanyşykly hem gipotalamo-gipofizar ulgamynyň işjeňliginiň zeperlen- meGINE getirýär.

Semizligiň patogenezinde işdäni sazlaýan ýimit-nerw merkeziniň ýokary gyjyndyryjylygy hem kesgitli orny eýeleýär. İşdäniň ýokarlanmagyna agyz boşlugynyň tagam biliş reseptorlarynyň gyjyndyrylmagy hem täsir edýär. Ýimit merkeziniň gyjyndyrylmagynda gandaky gandyň mukdarynyň peselmegi esasy ähmiýetli bolup, ol uzak wagtlaP ýimit iýilmedik ýagdaýynda, şeýle hem insuliniň işjeňliginiň ýokarlanmagy bilen baglydyr.

Semizligiň patogenezinde – ýag dokumasynyň özünde madda çalşygynyň bozulmagy bolup geçýär. Prolaktin gormony, şeýle hem alkohol içgileri we B₁witamin, uglewodlardan, ýaglaryň emele gelmegini güýçlendirýär.

Aşgazanasty mäsiniň insulýar aparatynyň işjeňliginiň ýokarlanmagy lipogeneZ hadysasyny güýçlendirip, semizligiň – dinamiki fazasynda bedeniň agramynyň artmagyna getirýär. Galkan şekilli mäsde bolsa, onuň işjeňliginiň peselmegi netijesinde – ýag deposyndan ýaglaryň çykmagy togtaýar we bagyrda onuň okislenmegi hem bolmaýar.

Ekzogen sebäplerden semizlige täsir edýän – aşa köp iýmeklikdir, esasanam hem uglewodly iýmitler, aýy iýmitler, alkohol içgileri, şeýle hem iýmitlenmek düzgüniniň fiziki zähmet bilen utgaşdyrylmagynyň gatnaşygy bozulanda (az hereket bilen) ýüze çykyp bilýär.

Bejerilişi. Bejerginiň esasy usuly – berhiz saklamakdyr. N8-nji berhiz belenilýär (proteinler 120-130 g, ýaglar – 80 g, onuň 2/3 bölegini ösümlük ýagy tutmaly, uglewodlar 120 g, umumy kaloriýalylygy 1800 kkal). Eger bu berhiz ýeterlik bolmasa, onda N8a berhizi bellemelidir. Onuň üçin, ýokarkylardan daşary, hepdede 1-2 gezek agram salma günleri (proteinli, ir-iýmişli, gök önümlü) geçirilýär.

Açlyk duýgusyny aýyrmak üçin näsaglara az kaloriýaly iýmit maddalaryny ýygy-ýygydan iýmeklik maslahat berilýär, şonda, gysga wagtyň içinde, birden horlanmaga ymtylmaly däldir. Eger bir aýyň dowamynda horlanmak 500-1000 g, has aşa semizlikde 2-3 kg bolsa, şol in gowy amatly horlanma diýlip hasap edilýär.

Toplumlaýyn terapiýadan – bejergi maşklary, suw bilen bejermek usullary we fizioterapiýa maslahat berilýär.

Işdäni peseldýän derman preparatlary ulanylanda seresap bolmaly, sebäbi, goşmaça täsirleriň we agyrlaşmalaryň bolmagy mümkin.

Uglewod çalşygyny sazlamak üçin biguanidler (glibutid ýa-da adebit, metformin, fenfluramin we başg.) ulanylýar. Şeýle hem tiriodin ýa-da triýodtironin ulanmak bolar.

Patogenetiki terapiýada – ýag dokumasynda okislenme hadysasyny ýokarlandyrmak üçin çäreler hem ähmiýetlidir.

Ýag dokumasynda, metaboliki inertligi peseltmek üçin witamin B₆ (100 mg günde 1 gezekden etň içine 3-4 hepdäniň dowamynda) we askorbin turşusy (2 ml 5% erginini etň içine 3 hepdäniň dowamynda) bellenilýär.

Fitopreparatlardan – semizlikde horlanmak üçin ýygýndylar ulanylyp, olar öt çykaryjy, içegede iýmitiň sorulmagyna täsir ediji, madda çalşygyna we işdä täsir ediji we berhiz üçin täsiri bardyr.

Işdäni peseltmek we semizligiň öňüni almak üçin, mekgejöweniň gulpagynyň ekstrakty ulanylýar, ony nahardan öň günde 2-3 wagtyňa 30-40 damjadan, onuň demlemesini ýada gaýnatmasyny bolsa, nahardan öň günde 4-5 wagtyňa 1 nahar çemçeden kabul etmeli.

Peşew çykaryjy we iýmit siňdirişi gowulandyryjy, gowşadyjy täsirli ýygyny:

Rp.	Cort.	Frangulae	60,0	(Gara tikenin gabygy)
	Rad.	Taraxaci	20,0	(Tozganyň köki)
	Fruct.	Petroselini	20,0	(Badyýanyň miwesi)
	Fruct.	Foeniculi	20,0	(Arpabadyýanyň miwesi)
	Fol.	Menthae piperitae	20,0	(Narpyzyň ýapragy)
M.F.spec. D.S. 2 çay çemçe 0,5 l gaýnag suwda 30 minut demlemeli we iki bulgurny ertirine içmeli.				

Madda çalşygyny sazlaýan ýygyny:

Rp.	Fruct	Foeniculi	15,0	(Arpabadyýanyň miwesi)
	Flor.	Chamomillae	15,0	(Çopantelpegin güli)
	Flor.	Tiliae	15,0	(Lipanyň güli)
	Flor.	Sambuci	20,0	(Buzynanyň güli)
	Fol.	Menthae piperitae	20,0	(Narpyzyň ýapragy)
M.F.spec. D.S. 2 çay çemçe 0,5 l gaýnag suwda 30 minut demlemeli we 2-3 bulgurdan günün dowamynda içmeli, bejeriş tapgyry 8-10 hepdedir.				

Peşew çykaryjy serişde hökmünde indiki ýygyny ulanylýar:

Rp	Fol.	Betulae	5,0	(Berýozanyň ýapragy)
	Fol.	Farfarae	5,0	(Eje-ejeligin ýapragy)
	Fol.	Rubi fruticosi	40,0	(Böwürsleniň ýapragy)
M.F.spec. D.S. 2 çay çemçe 0,5 l gaýnag suwda 30 minut demlemeli we ertir we günortan 1 bulgurdan içmeli.				

Semizligiň öňüni almakda ulanylýan miweler we gök-önümler. Düzüminde köp mukdarda kletçatka saklaýanlygy üçin kabački (kädiniň bir görnüşi) içegäniň hereketini güýçlendirýär, holesteriniň sorulmagyna we semizligiň emele gelmegine päsgel berýär.

Semizligi bejermek we öňüni almak üçin käşir, gök önüm, klýukwa ýaly önümleri düzüminde köp mukdarda ýod saklaýanlygy üçin iýmeklik maslahat berilýär.

Semizlikde ulanylýan ösümlik çig mallaryndan has köpi suw otulardyr (agar-agar, köpürjik görnüşli goňur suw otular – *Fucus vesiculosus* L., Sistozeýriň – goňur suwotusy – *Cystosiera barbata*, Good.et Wood). Bu suw otulary düzüminde polisaharidleri, nemli maddalary, algin turşusyny saklaýar. Bu maddalaryň köp mukdarda ergin siňdirijilik ukyby bardyr. Şol sebäpli aşgazan we içege erginden doly bolmak bilen doýgunlygy duýduryp, işdäni kesýär. Şu ýagdaýda ýokarda agzalan nemli maddalar bolsa, işlenilmän we bedenden siňdirilmän ergini özlerine siňdirmek bilen, umumy agramyň pese düşmegine getirýär. Suw otulardaky, ýod, galkan görnüşli mäziň işini sazlaşdyryp, çalyşma hadysalaryny çaltlandyrýar we bedeniň agramynyň pese düşmegine, ýagny, horlanmagyna getirýär.

Semizlikde derman ösümliklerden taýýarlanan çaylar peýdalydyr, olar ýeňil gowşadyjy täsiri, peşew kowujy, öt çykaryjy täsirleri ýüze çykarýarlar.

Semizligi bejermekde ulanylýan dermannamalar:

Rp.	Fruct	Vesiculosi	(Gabarçakly fukusyc miwesi (suwotysy)
Rad.	Levistici		(Dermanlyk l'yubistogyň köki)
Cort.	Frangulae		(Garatikenin gabygy)
Herb.	Millefolii aa	20,0	(Boýbodranyň oty)

M.F.spec. D.S. 1 nahar çemçe bir bulgur suwda 30 min gaýnatmaly. Bir bulgurdan günde 3 gezek içmeli

Rp.	Cystoseirae barbatae	(Sistozeýpa (gocur suwoty))
-----	----------------------	-----------------------------

Cort. Frangulae aā	20,0	(Garatikenin gabygy)
Rad. Levistici		(Dermanlyk lyubistogyn köki)
Fruct Juniperi aā	5,0	(Arçanyň miwesi)
Herb. Millefolii	60,0	(Boýbodranyň oty)

M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 0,5 sagat demläp goýmaly we ony 3-4 gezekde içmeli

Rp. Cort. Frangulae	50,0	(Garatikenin gabygy)
Fruct. Petroselini		(Badyýanyň miwesi)
Fruct. Foeniculi aā	20,0	(Arpabadyýanyň köki)
Rad. Taraxaci		(Tozganyň köki)
Fol. Menthae pip. aā	15,0	(Narpyzyň ýapragy)

M.F.spec.D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly. Irden baryny içmeli.

Podagra (bogunlarda duz ýygnanma keseli)

Podagra – dowamly kesel bolup, purin çalşygynyň bozulmagy we ganda peşew turşusynyň derejesiniň ýokarlanmagy bilen, şeýle hem, peşewturşy natriniň bogunlaryň ketirdewüklerinde we beýleki dokumalarda toplanmagy bilen häsiýetlendirilýär.

Ganyň plazmasynda, peşew turşusy, natriniň uraty görnüşinde saklanýar. Kalorimetriki usul bilen kesgitlenende, onuň yokarky araçägi erkekler üçin 357-387 mkmol/l (6,0-6,5 mg/100 ml), aýallar üçin bolsa 297-327 mkmol/l (5,0-5,5, mg/100 ml) deňdir.

Giperurikemiýanyň ýüze çykmagyna bedende peşew turşusynyň köp mukdarda emele gelmegi ýa-da onuň peşew bilen çykarlanda azalmagy, ýa-da bu ýagdaýlaryň utgaşmagy sebäp bolup biler. Giperurikemiýanyň birnäçe patologiki görnüşleri tapawutlandyrylýar: birinji, nesilleýin we ikilenji.

Nesilleýin, maşgalada duş gelýän podagranyň görnüşi boýunça, garyndaşlaryň 1/3 böleginde we maşgala agzalarynyň hem 20%-de podagra bolup, şolarda giperurikemiýa ýüze çykarylady. Ikilenji giperurikemiýa bolsa, 2-5% ýagdaýda we köplenç, peşew turşusynyň böwrek bilen

çykarylyşy peselende ýa-da çykarylmany bozulanda bolup bilýär. Şeýle ýagdaý gan kesellerinde (miyeloleýkoz, miýeloem keseli we ş.m.) duş gelip, ol öýjük nukleoproteinleriň katobolizminiň güýçlenmegi we öýjük merkezleriniň dargamagy netijesinde peşew turşusynyň ýokarlanmagyna getirýär. Giperurekemiýa – käbir derman preparatlarynyň (diuretikler, sitostatikler, kortikosteroidler) täsirinde hem ýüze çykyp bilýär.

Podagra artridinde has häsiýetli ýiti tutgaý, ýagny 60% ýagdaýlaryň içinde, esasan, aýagyň başam barmagynyň bogunlarynda bolýar. Agyry, tutgaý monoartrit görnüşinde (diňe bir ýerde) bolmagy mümkin, ýöne käwagt birnäçe bogunlar, adaty, köpýyllyk giperurekemiýadan soň ýüze çykýar. Bu keseliň beterleşmegine alkohol içgileri we uzak wagtlaýyn açlyk hem täsir edýär. Bulardan başga-da peşew turşusynyň kadaly çykamazlygy agyr şikes ýetmeler, süňk döwügi, fiziki agram salmalar, käbir derman preparatlarynyň ulanylmagy (gipotiazid, furosemid, asetilsalisil turşusy) hem bozup bilýär. Purinlere we ýaglara baý iýmitler hem podagranyň döremegine itergi berýär.

Bejerilişi: Toplumlaýyn bejeriş çärelerine şular degişlidir:

- 1)Berhiz saklamak;
- 2)Köp mukdarda suw içmek;
- 3)Podagranyň tutgaýyny gozgaýan sebäpleriň önüni almak;
- 4)Derman we fito serişdelerini bellemek.

Iýmitiň düzülişinde purinleri saklaýan iýmitleri iýmekden saklanmaly (böwrek, beýni, bagyr gowrulan et we balyk, etli çorba, ysmanak, noýba, turşuja we ş.m.).

Podagranyň fitoterapewtiki serişdeler bilen bejerilişi. Podagrada – brusnikanyň (20,0: 200,0) ýapraklarynyň demlemesini günde 3-4 wagtyna 1 nahar çemçeden bellemeli.

Podagranyň ýiti tutgaýynda – alawlama garşy, agyry aýryjy we peşew çykaryjy täsirli aşakdaky ýygyndylar ulanylýar.

Rp Flor. Gentaurae cyani 5,0 (Gök daş kekranyň güli)

Flor. Calendulae	5,0	(Dyrnaklyjanyň güli)
Flor. Paeoniae	5,0	(Pionyň güli)
Fruct. Juniperi	5,0	(Arçanyň miwesi)
Flor. Sambuci	5,0	(Buzinanyň güli)
Cort. Frangulae	5,0	(Gara tikenin gabygy)
Flor. Urticae dioicae	10,0	(Çit-çitiniň gülleri)
Cort. Salicis	20,0	(Söbüdiň gabygy)
Herbae Equiseti	20,0	(Meýdankyrkbogunynyň oty)
Fol. Betulae	20,0	(Berýozanyň ýapragy)

M.F.spec. D.S. 1 çay çemçe 1 bulgur suwda 10 minut
gaýnatmaly we her 2 sagatdan 1 bulgurdan gyzgyn
görnüşinde içmeli.

Madda çalsygyny sazlaýan we peşew turşusynyň
çykmagyny sazlaşdyrýan ýygyny:

Rp. Herb. Hyperici	20,0	(Jerebaýyň oty)
Flor. Chamomillae	20,0	(Çopantelpegin güli)
Flor. Tiliae	20,0	(Lipanyň güli)
Flor. Sambuci	20,0	(Buzinanyň güli)
M.F.spec. D.S. 2 çay çemçe 0,5 l gaýnag suwda 30 minut demlemeli we günde 2 bulgurdan içmeli.		

2. 8. Endokrin ulgamynyň keselleri

Diffuz toksiki zob. **Bu kesel ganda tiroid gormonlarynyň mukdarynyň ýokarlanmagy bilen häsiýetlendirilýär.**

Keseliň ýüze çykmagyna ruhy şikes ýetmeler, kesel döredijiler(dümew, basyk), nesile geçiji alamatlar we autoimmun hadysalary sebäp bolýarlar.

Galkan şekilli mäziň ölçegi tireotoksikozyň agyrylyk derejesini kesgitlemäge mümkinçilik bermeýär. Bejergisi birnäçe alamtalaryň toplumyny göz önüne tutmak bilen (göz alamaty, ýürek-damar bozulmalary, ruhy üýtgemeler, wegetatiw damarlaryň we trofiki bozulmalaryň jemi) geçirilýär.

Bejerlişi: Bejergide hirurgiki we konserwatiw (radioişjeň ýod, tirostatiki serişdeleri ulanmak) usullar ulanylýar. Diffuz

toksiki zobuň bejeriliş usulyňa garamazdan sedatiw we bedeni umumy berkidiji serişdeler belleniýär. Keseliň bejergişinde-zähmediň we dynç almagyň düzgünleriniň berjaý edilişi witaminleri we proteinleri saklaýan iýmitleriň iýilmegi uly täsir edýär. Kömekçi serişdeler hökmünde derman otlary peýdalanylýar. Ukyny kadalaşdyrmak üçin, walerianany kökünüň demlemesini günde 2-3 wagtyňa 1/3 bulgurdan bermeli. Rahatlandyryjy serişde hökmünde şirguýrugyň demlemesi günde 3-4 wagtyňa bir nahar çeşmeden berilmelidir.

Şeýle hem, ýürek urgusyny we ýokary duýujylygy peseltmek üçin we ukyny gowulandyrmak üçin, alyjyň miwesi belleniýär. Ony tinktura görnüşinde ulanylanda 20 damjadan, günde üç wagtyňa bermeli, ergin, ekstrakt görnüşinde bolsa 20-30 damjadan nahardan öň, günde üç wagtyňa berilmelidir.

Mundan başga-da şeýle ýygyny belleniýär:

Rp.	Rad.	Glycyrrhizae	20,0	(Buýanyň köki)
	Rad.	Rubiae tinctorum	40,0	(Çöp boýanyň köki)
M.F.spec. D.S. 1 çay çemçe 1 bulgur suwda 10 minut gaýnatmaly we ertirine 1-2 bulgurdan içmeli.				

Witamin we elektrolit çalşygyny sazlaşdyrmak üçin itburnuň miwesiniň demlemesi günde 3 wagtyňa 1/2 bulgurdan belleniýär.

Süýjili diabet keseli

Süýjili diabet keseli- kliniki simptomo-toplum bolup, ol birlenji ýa-da ikilenji insulin ýetmezçiligi bilen häsiýetlenýär. Bu bolsa ähli madda çalyşygyc bozulmagy bilen ýüze çykýar, giperglikemiýa, glýukozuriýa, ketoza ýykgyňlyk we irki mikro, makroangiopatiýanyň döremegine sebäp bolýar.

Süýji keseliniň döremeginde nesile geçijilik esasy orun tutýar. Mundan başgada ýeňil özleşdirilýän uglewodlaryň

çenden aşa iýilmegi, az hereketlilik (gipodinamiýa) semizlik we ruhy şikes ýetmeler, operasiýalar we zäherlenme, ateroskleroz, gipertoniki keseller, ýiti we uzaga çeken pankreatit, holesistit we gepatitler, endokrin kesseller, göwrelilik we ş. m. sebäp bolup biler. Agyrlaşmadyk süýji keseliniň nesile geçijilik sebäpleri: aşgazan asty mäziň zaýalanmagy (dömmе, kista, gemahromatoz we başgalar) bolup biler.

Süýji diabet ýeňil, orta we agyr akymda bolup biler.

Bejerilşi. Esasy ugry bozulan madda çalşygy maksimal dikeltmek, esasanam uglewodlaryň çalyşygyny, iýmiti sazlamaly we peroral süýji peseldiji preparatlary we insulini ulanmaly.

Berhiz saklap iýmiti sazlamak näsagda süýji keseliniň geçişine bagly bolmaly, mundan başga-da umumy ýagdaý, bedeniniň agramy göz önünde tutulmaly.

Insulin bedende düýpden insulin ýetmezçiligi ýüze çykanda bellenýär.

Ýetginjeklik döwrüň süýji keseli esasan insulin talap edýär, dekompensasiýa çalt döreyär, horlanýär, polidipsiýa, poliuriýa ýüze çykyp agyr patologiýa öwürlmegi we hirurgiki bejergini talap etmegi mümkin.

Sulfanilamidler we sulfanil moçewinanyň önümleri süýji keseliniň ýeňil we orta görnüşinde bellenilýär.

Bu preparatlar aşgazan asty mäziň β -öýjüklerini işini sazlaýar.

Sulfanilamidler (nagizan, opanil, bukarban we başgalar).

Sulfanil moçewinanyň önümleri (butamid, talbutamid, opabet we başgalar).

Düzüminde hlor saklaýan sulfanilamid preparatlary

(hlorpropamid, diabenez, opadiat, diaboral we başgalar).

Soňky ýyllarda täsirliligi ýokary we zäherliligi pes bolan dermanlar ulanylýar (glibenklamid, daonil, euglýukon we başgalar).

Süýji keselinde kömekçi serişde hökmünde derman ösümlikleri ulanylýar. Olar iýmit bilen utgaşdyrylyp monoterapiýa hökmünde ulanylýar.

Çernikanyň ýapragy. Magtymguly we Oguz aýynda ýygnaýyp, demleme görnüşinde ulanylýär. S bulgur 4-5 gezek nahardan öň içmeli.

Tokaý ýertudanasy. Ter ir-iýmişleriň şiresini 4-6 nahar çemçe günde içmeli. Demleme taýýarlamak üçin guradylan görnüşlerini hem ulanmak bolýar. Demlemäniň günde 1 bulguryny içmeli.

Süle. Demlemesiniň (100 g. dänisini 3 bulgur gaýnan suwda) S bulguryny 3 gezek nahardan öň içmeli.

Lawryň ýapragy: lawryň 10-sany ýapragyny 3 bulgur gaýnan suw bilen 2-3 sagadyň dowamynda demläp goýmaly. Soňra S bulgurdan 3 gezek günde içmeli.

Süýji peseldiji serişde hökmünde ösümlikler köplenç ýygyndylar görnüşinde ulanylýar.

Rp. Fol. Myrtilli 20,0 (Çernikanyň ýapragy)
Rad. Taraxaci 20,0 (Tozganyň köki)
Fol. Urticae dioicae 20,0 (Çit-çitiniň ýapragy)
M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30m dem-
läp goýmaly. S bulgurdan günde 3 gezek nahardan öň içmeli.

Rp. Fol. Myrtilli 50,0 (Çernikanyň ýapragy)
Fol. Urticae dioicae 20,0 (Çit-çitiniň ýapragy)
Fol. Sambusi 20,0 (Buzinanyň ýapragy)
M.F.spec. D.S. 1 nahar çemçe 1 bulgur suwda 10 min
gaýnatmaly we 150 ml. günün dowamynda içmeli.

Rp. Fol. Myrtilli 25,0 (Çernikanyň ýapragy)
Rad. Bardanae 25,0 (Gulaklynyň köki (lopuh))
M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min dem
läp goýmaly we 1 nahar çemçeden günde 3-4 gezek
nahardan öň içmeli

Rp	Herb. Equiseti	50,0	(Meýdan kyrkbogunyň oty)
	Herb. Fragariae vescae	50,0	(Ýertudanasynyň oty)
	Herb. Polygonii avicularis	100,0	(Suw kyrkbogynyň oty)
	M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min		
	demläp goýmaly we 2 bulgurdan içmeli		

Uglewod çalşygyny kadalaşdyryjy we tonizirleýji täsiri ýüze çykarýan ösümlük serişdeleri: Henşeniň köki, Lewziniň ergin ekstrakty 20-30 damjasyny günde 3 gezek nahardan soň içmeli, Zamanihanyň tinkurasyny 30-40 damja günde 3 gezek içmeli, Eleuterokokkanyň ergin ekstraktyny 2 ml nahardan 30 min öň içmeli. Mundan başga-da süýji diabet keselini bejermekde derman ösümlüklerinden ak tudana, dermanlyk galega, semzek we başgalar ulanylýar. Süýji peseldiji täsiri käbir gök önümler, miweleriň şireleri ýüze çykarýar. Bu şireler enzimleric bölünip çykmagyny güýçlendirýär Hatda şireler 1:1 gatnaşykda suw bilen garylada-da peýdalydyr. Ilki $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{3}$ bulgur miwe şirelerini 30-40 min nahardan öň içmeli. Soňra olaryň mukdaryny 1 bulgura çenli köpeltmek bolar. Bu keselde kartoşkanyň täzeje şiresini, kelemiň ýapraklarynyň, malinanyň miwesiniň, kiziliň, armydyň şirelerini içmek maslahat berilýär. Süýji peseldiji täsiri salat, nohut, ýorunja we kömelekler hem ýüze çykarýar.

Süýji diabet keselini bejermek üçin ulanylýan derman ösümlüklerinic ýygnyndylaryc dermannamasy

Rp.	Herb. Galegae	20,0	(Galeganyç oty)
	Peric. Phaseoli	20,0	(Noýbanyc kösügi)
	Fol. Myrtili	20,0	(Çernikanyň ýapragy)
	Fol. Urticae	20,0	(Çit-çitiniň ýapragy)
	Fol. Salviae	20,0	(Akkemençäniň ýapragy)
	Rad. Taraxaci	20,0	(Tozganyň köki)
	M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe çig maly bir bulgur		
	gaýnatmany günde 2-3 gezek içmeli.		

Rp.	Fol. Myrtili	20,0	(Çernikanyň ýapragy)
-----	--------------	------	----------------------

Folliculi Phaseoli	20,0	(Noýbanyc kösügi)
Herb. Galegae	20,0	(Galeganyň oty)
Fol. Menthae	20,0	(Narpyzyň ýapragy)

M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min demläp goýmaly. 3-4 gezekde içmeli.

Süýjüli diabet keselinde gipoglikemiki täsirli derman oşumliklerine ilkinji nobatda dermanlyk galega, ak tudana, gara tudana, adaty noýba degişlidir. Tejribe üsti bilen kliniki barlaglaryc netijesi dermanlyk galeganyc otunyc düzüminde alkaloid galeginic (guanidinic önümi) bolmagy onuc gipoglikemiki täsirinic bardygyny acladýar. Noýbanyc şeýle täsiri ýüze çykarmagy onuň düzüminde argininiň bolmagy bilen baglanyşykly.

15 g noýbanyc ownadylan kösügi 200 ml gaýnan suw bilen 10 min ýuwaş otda gaýnatmaly. Süzüp günde 2 nahar çemçeden 3 gezek nahardan öc süýji diabet keselinde içmeli.

Noýbanyc kösügi 1 nahar çemçe, çernikanyc ýapraklaryny 1 nahar çemçe almaly we 400 ml gaýnan suwda 1 sagat demläp goýmaly. Süzmeli we günde 0,5 bulgur 3-4 gezek nahardan 30 min öc içmeli. Süýjili diabet we pankreatit keselinic bejergisini 2 aý dowam etdirmeli.

Noýbanyc kösügi 2 nahar çemçe, çernikanyc ýapraklary 2 nahar çemçe, sülänic samany 2 nahar çemçe, zygyr tohumy 2 nahar çemçe almaly we 600 ml gaýnan suw bilen 20 min gaýnatmaly. Sowatmaly, süzmeli we günde 3 nahar çemçe bilen 3 gezek nahardan öc süýjüli diabet keselinde 2 aýyc dowamynda içmeli.

Patologiki klimaks

Klimaks döwri – bu adamyň garran etaplarynyň biri bolup, erkeklerde, aýallarda häsiýetlidir.

Aýallaryň klimaksy – aýalyň fiziologiki ýagdaýy ol jyns ulgamynyc yzyna gaýtmasy bilen häsiýetlenilýär. Klimaks fiziologiki we patologiki bolup biler. Klimaks we menosaklanma bolup bilýär. Klimaks irki, giçki we fiziologiki bolup biler. Patologiki klimaksyň akymy häzirki wagtda klimatiki sindrom diýilýär. Onuň kliniki suratlandyrylyşy dürli bolup biler. Şoňa häsiýetli deriň guýulmagy, newroz, biynjalyk, kelle agyry, ukysyzlyk, üşetme, bogunlarda agyry, gulakda ses, kelle aýlanma we başga westibulýar bozulma, jyns agzalarynda gijelewik ýaly alamatlar peýda bolýar.

Bu kliniki alamatlaryň içinde esasy orny vegetatiw-damar bozulmalary eýeleýär.

Klimaks sindromynyň klinikasynyň aýratynlygy köplenç galkan şekilli maziň we böwrek üsti maziç gabyk gatlagynyň işjeňligi bilen baglanyşyklydyr.

Klimaks döwrüniň "agyrlaşan" görnüşini bellemek zerurdyr. Şonda keseliň kliniki aýratynlygy onuň gan basyşynyň ýokarlanmagy ýa-da gipotalamiki bozulmalar bilen bilelikde geçýänligi bilen häsiýetlendirilýär. Ol örän agyr we uzak wagtyň dowamynda geçýär.

Bejergisi. Klimaks sindromy bejermek üçin köp sanly usullar hödürlenilýär, ýöne şol terapewtiki çäreleri saýlap almakda lukmanlar kynçylyk çekýärler. Bu soragy çözmek, keseliň patogenezini çuňňur öwrenmek we keseliň kliniki dowamlylygynyň aýratynlygyny öwrenmek bilen amala aşyrmak bolar.

Ilkinji ýerde berhizi berjaý edip, gündelik iýmit witaminleri saklaýan ir-iýmişleri goşmak we gök önümleri we miweleri köpräk iýmekligi ýola goýmak maslahat berilýär.

Dermanlardan holinolitik rahatlandyryjy preparatlary ulanylýar.

Klimaks sindromy döwründe gormon preparatlaryny bellemek uzak wagtyň dowamynda ulanylan esasy usullaryň biri bolupdyr, sebäbi kesel gormonlaryň täsiriniň peselmegi bilen baglanyşykly bolup geçýär. Ýöne

**gormon preparatlary bilen uzak wagtlap bejermek
endokrinolog-ginekologyc gözegçiliginde geçirilmelidir.**

Kömekçi serişdeler hökmünde rahatlandyryjy prepatarlar (ýürek-damar newrozlar üçin) ýygyndylar we aýbaşynyň görüm gelşini sazlaýjy ýygyndylar ulanylýar.

Dismenoreýada şu ýygyndy ulanylýar:

Rp. Cort. Frangulae 20,0 (Gara tikenin gabygy)
Fol. Betulae 20,0 (Berýozanyň ýapragy)
Fol. Menthae piperitae 20,0 (Narpyzyň ýapragy)
Herb. Millifolii 20,0 (Boýbodranýň oty)
Rad. Valerianae 20,0 (Walerianany köki)
M.F.spec.D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min dem-
läp goýmaly we 1 bulgur demlemäni 1 günüç dowamynda
içmeli.

Gipertenziýa we dismenoreýa bilelikde bolanda aşaky
ýygyndy ulanylýar

Rp Herb. Polygonii avicularis 10,0 (Suw kyrkbogunynyň oty)
Herb. Equiseti 10,0 (Meýdankyrkbogunynyň oty)
Herb. Centauri 30,0 (Altyn gülüň oty)
Herb. Potentillae erecti 50,0 (Gaýtarmanyň oty)
M.F.spec.D.S. 2 nahar çemçe 0,5 l gaýnan suwda 30 min dem-
läp goýmaly we 1 bulguryny günüň dowamynda owurtlap
içmeli.

Agyry aýyryjy we rahatlandyryjy ýygyndy:

Rp. Rad. Valerianae 30,0 (Walerianany köki)
Fol. Menthae piperitae 30,0 (Narpyzyň ýapragy)
Flor. Chamomillae 40,0 (Çopan telpegin güli)
M.F.spec.D.S. 1 nahar çemçe 1 bulgur suwda 10 min gaýnat-
maly we 1 bulgurdan ertirine we agşam içmek maslahat
berilýär.

Aýbaşy has köp gelende ulanylýan ýygyndy:

Rp.	Cort. Quercus	10,0	(Dubuň gabygy)
	Herb. Bursae pastoris	25,0	(Çopan torbanyň oty)
	Herb. Millifolii	25,0	(Boýbodransyň oty)
	Rhiz. Potentillae erecti	25,0	(Gaýtarmanyň porrugy)

M.F.spec.D.S. 1 nahar çemçe 1 bulgur suwda 10 min
gaýnatmaly we 1 bulgurdan ertirine we agşam kabul etmeli

Damarlaryň tonusynyň bozulmagynda, ýagny gipertoniki görnüşinde we menorragiýada ulanylýan ýygyny:

Rp.	Herb. Bursae pastoris	30,0	(Çopan torbanyň oty)
	Herb. Polygonii avicularis	30,0	(Suw kyrk bogunyň oty)
	Herb. Visci albi	30,0	(Ak omelanyň oty)

M.F.spec.D.S. 1 nahar çemçe 1 bulgur suwda 10 min gaýnat-
maly we ertir we agşam 1 bulgurdan içmeli

Erkeklik klimaksy. Jyns mázleriniň ýerine ýetirýän işinic ýagdaýyny görkezýän, ýaş üýtgemeleri bilen baglanşykly androgen ýetmezçilik görnüşini köp ýazarlar erkeklik klimaksy diýip düşündirýärler. Jyns mázleriniň işjeňliginiň peselmegi bilen deň derejede neýroendokrin ulgamynda ýaşa bagly üýtgemeler bolup geçýär. 10-20 % erkeklerde neýrogumoral regulýasiýanyň nädogry üýtgemeleri netijesinde patalogiki klimaks ýüze çykýar.

Ýüze çykyş aýratynlygy boýunça irki (45 ýaşa çenli), adaty (46-60 ýaş) we giçki (60 ýaşdan soň) klimaks tapawutlandyrylýar. Klimaksyň esasy kliniki ýüze çykmalary - ýürek-damar, newrotiki, peşew- jyns ýollarynyň, endokrin bozulmalary bilen bolup geçýär.

Adatça klimaks 2-4 ýyl dowam edýär. Irki klimaks-köplenç infantil -asteniki durkly erkeklerde we semizlikde bolýar. Klimaksyň emele gelmeginde nesilleýin sebäpler, nerw – ruhy bozulma we ýokanç keseller hem ähmiýetli orun tutýar. Irki klimaks agyr geçýär we kähalatlarda 5-10 ýyl dowam edip bilýär.

Bejerilşi: Patologiki klimaksly näsaglary bejerlende jyns taýdan bozulmalary hökman göz öňüne tutmaly, sebäbi ol bütin bedeniň üýtgemeleriniň netijesi bolup biler. Bejergi hususy we toplumlaýyn bolup biler.

Wagtynda iýmitlenmek we dynç almak, zähmet şertleriniň düzgünlerini berjaý etmek wajypdyr. Dolmuş adamlarda bolsa bedeniň agramyny azaltmaklyga ymtylmaly. Bedenterbiýe maşyklary, gezelençler gurnamaly.

Ýokary duýuşlykda, ukusyzlykda, wegetodamar bozulmalarda we eýakulýasiýa hadysasynyň bozulmala-rynda - piýonyň tinkurasyny 40 damjadan günde 3 wagtyna nahardan öň kabul etmeli. Dyrnaklyjanyň tinkurasyny 1 çay çemçeden S bulgur ýyly suw bilen günde 3 wagtyna nahardan 3 minut öň içmeli. Bejergi 1-3 aýyň dowamynda geçirilýär.

Beden etiniň gowşaklygynda, çalt yadawlyk ýüze çykanda – araliýanyň tinkurasyny 30 damjadan günde 2 wagtyna, zamanihananyň tinkurasyny 30 damjadan günde 2-3 wagtyna nahardan öň içmeli, henşeniň tinkurasyny 25 damjadan günde 3 wagtyna içmeli.

Rahatlandyryjy täsiri ýokarlandyrmak üçin trankwilizatorlar we heýroleptikler (triokszin, rudotel, aminazin we ş.m.) az mukdarda belleniýär. 1 gerdejikden günde 3 wagt 2-4 hepdäniň dowamynda belleniýär.

Aýdyc ýüze çykýan newrozlarda we wagtyndan öň tohum dökülmesi bolanda, belloid, akliman, teobromin, magniý sulfaty ulanylýar. Erreksiýany güýçlendirmek üçin korazol, dibazol-sanjymda ulanylýar.

Toplumlaýyn terapiýanyň düzüminde, biologiki işjeç maddalar (apilak) we witaminler (B₁, E, A we başg.) bolmalydyr. Witamin serişdesi hökmünde indiki ýygynyň belleniýär:

Rp. Fruct.Sorbi	25,0	(Rýabınanyn miwesi)
Fruct.Rosae	25,0	(Itburunyn miwesi)

M.F.spec. D.S. 1 nahar çemçe ýygynyndy bir bulgur gaýnag
suwda 30 min demläp goýmaly we 1/2 bulgurdan 2-3 wag-
tyna nahardan öň içmeli

Rp. Fruct . Sorbi 35,0 (Rýabinanýn miwesi)
Flor. Urticae dioicae 15,0 (Çit-çitiniň güli)
M.F.spec. D.S. 1 nahar çemçe ýygynyndy bir bulgur gaýnag
suwda 30 min demläp goýmaly we 1/2 bulgurdan günde
2-3 wagat nahardan öň içmeli.

Klimaks newrozlarynda hödürlenilýän - gök önümler, ir-iýmişler we miweler

Akkelleli kelem - ter kelemiň şiresini 1/2 bulgurdan
ýatmazdan 40-60 minut öň ukusyzlykda içmeli.

Sarymsak - Ukusyzlygy aýyrmak we kelle agyrysyny
aýyrmak üçin 2-3 üleşni iýmeli.

Garauk - tohumnyň demlemesini aýbaşy agyryly geçende
ulanylýar, ter şiresi bolsa agyry aýryjy täsiri ýüze çykarýar.

Şebit- otunyň gury külkesi ýa-da tohumynyň
demlemesini- ýeňil uky getiriji serişde hökmünde ulanmaly.

Böwürslen - Miweleri we olaryň demlemesi umumy
berkidiji we rahatlandyryjy täsiri ýüze çykaryp newrozlary
bejermekde ulanylýar.

Adaty kalina - miwesinden taýýarlanan vitaminli
demlemesi - newrozlarda, damar gysylmalarynda we gan
basyşynyň ýokarlanmasynda ulanylýar, şeýle-de ol umumy
berkidiji we rahatlandyryjy täsiri ýüze çykarýar. Demleme 2-3
bulgurdan günün dowamynda içilýär.

Bogunlaryň keselleriniň fitoterapiýasy

Guryagyryly artriti. Guryagyryly artriti-umumy ýokanç-
allergiki kesel bolup, gelip çykyşy we alamaty doly
öwrenilmedikdir.

Bu kesel bilen esasan hem zähmet çekmäge ukyby bolan ýaşdaky (20-50 ýaş) adamlar keselleýärler we şolaryň köpüsi diýen ýaly maýyp bolup galýarlar.

Keseliň gelip çykyşynda ojaklaýyn ýokanç kesel döredijiniň ähmiýeti örän yokarydyr, ýöne belli-bir derejede adamyň immun ulgamynyň durnuklylygy hem täsir edýändir. Ojaklaýyn ýokanç kesel döredijiden zäherleriň yzygiderli gana düşüp durmagy bedeniň immunologiki täsirliligini üýtgedip, allergiýanyň emele gelmegine getirýär. Bu hadysa wagtynda (allergiýa) autoimmun häsiýetine eýe bolan biologiki işjeň maddalar bölünip çykýar. Guryagyryly ýagdaýlaryň bolmagy birleşdiriji dokumanyň proteinleriniň zeperlenmegi bilen baglanyşyklydyr.

Keseli üç tapgyra bölýärler:

I-tapgyr - ýiti görnüşi bu periartikulýar dokumanyň çişmegi, bogunlaryň boşluklarynda ekskudasiýa hadysalarynyň bolmagy bilen häsiýetlendirilýär.

II-tapgyr-kekirdewügiň proleferatiw ösmegi.

III-tapgyr fibroz-distrofiki üýtgemeler bilen süňk ankilozlarynyň emele gelmegidir.

Bejergi işleri geçirilende guryagyryly artritini 3 derejä bölmeklik ähmiýetlidir. Birinji dereje-bogunlarda “ýeňil agry” bedeniň gyzgyn gorkezijisi kadaly, ganyň gorkezijileri bütinleý diýen ýaly üýtgemedik. Ikinji derejede gyzgyn gorkeziji subfibril, biohimiki gorkezijileri - alawlama alamatlarynyň bardygyna şaýatlyk edýär. Üçünji derejede - gowşaklyk, horlanma, fibril gyzgyn gorkezijisi we içki üýtgemeler ýüze çykýar.

Bejerilişi. Guryagyryly artridiniň bejergisi has çylşyrymly meseleler bilen baglanyşykly. Ilki bilen ýokanç kesel döredijiniň ojagyny tapyp, şony arassalamaly. Bejerginiň etaplaýyn alnyp barylşyna- (hassahanalarda, saglyk öýlerinde, bejergi-saglygy dikeldiş edaralarda-dispanser gözegçiligi) gözegçilik etmeli. Guryagyryly artridiň ösüşiniň işjeňligini basyp ýatyrmaklyk, şol ýokanç kesel döredijiniň ojaklaryna ýerli ýa-da umumy täsir etmeklik bilen amala aşyrylýar, onuň

üçin alawlama garşy dowamly däl täsirli (alawlama garşy steroid däl preparatlar, glükokortikoidler) serişdeler bellenyär. Sünklerde we bogunlarda dokumalaryň düzüm bozulma we dargama hadysalaryna garşy göreşmeklik esasan hem has dowamly, ýöne haýal täsirli toplumlaýyn terapiýanyň kömegi bilen amala aşyrylýar.

Häzirki döwürde guryagyryly artridi bejermeginiň esasy terapiýasynyň 5-topary bellidir.

Aminohiloniniň önümleri (delagil, plakwenil)

Altynyň duzlary (krizanol)

D-penisillamin (kuprenil)

Hakyky immunodepressantlar (azatioprin, beýkeran, siklofosamid we ş.m.)

Lewamizol

Steroid däl gurluşly alawlama garşy preparatlardan butadion ulanylýar, ol günde 3-4 wagtynda 0.15-0.2g möçberde ulanylýar. Preparat çalt sorulyar, onuň ganda bejeriji täsiri 1 S -2 sag. soň ýüze çykýar. Preparat baş keselinde we gan basyşynyň ýokarlanmagynda ulanylmaýar. Has netijelisi indometasin hasaplanylýar, sebäbi preparat gowy sorulyar we 1 sagatdan soň iň ýokary duýujylyga ýetýär. Täsiriniň dowamlylygy 4-5 sagat. Ony içmek üçin adatça günde 2 wagtyna 25mg-dan 5 gün belleýärler, soňra 25mg 1-2 gün goşmaça girizilýär.

Kortikosteroidler toplumlaýyn (esasy) bejergä degişli däldir. Olaryň ulanylmagy indiki ýagdaýlarda bolup biler:

Köpçülikleýin bogun içki görnüşlerde

Bogunly görnüşiň has ýokary işjeňliginde

Beýleki serişdeler bilen bejergi netije bermedik ýagdaýynda

Şunda esasy preparat-prednizolon ulanylýar, preparadyň möçberi keseliň ýagdaýyna we içki üýtgemeleriň häsiýetine baglylykda belleniýär. Diňe bogun zeperlenmeleri bolanda bejergi uzak dowam etdirilmeli däldir. Fizioterapiýany I-II derejeli işjeňlilikde belleýärler.

Kömekçi serişdeler hökmünde-agyry aýryjy, alawlama garşy, umumy berkidiji, derlediji, bakteriýalara we wiruslara garşy indiki dermanlyk ýygnyndylary ulanylýar:

- | | | | |
|---|-----------------------|------|-----------------------|
| Rp. | Flor. Sambuci | 10.0 | (Buzinanyň güli) |
| | Fol. Betulae | 40.0 | (Berýozanyň ýapragy) |
| | Cort. Salicis | 50.0 | (Söbüdiň gabygy) |
| M.F.spec. D.S. 2 çay çemçe 1 bulgur gaýnag suwda 30 min demläp goýmaly demlemeli | | | |
| Rp. | Flor. Sambuci | 30.0 | (Buzinanyň güli) |
| | Fol. Utricae dioicae | 30.0 | (Çit-çitiniň ýapragy) |
| | Rad. Petroselini | 30.0 | (Badyýanyň köki) |
| | Cort. Salicis | 30.0 | (Söwüdiň gabygy) |
| M.F.spec. D.S. 2 çay çemçe bir bulgur gaýnag suwda 30 min demläp goýmaly we S bulgurdan nahardan öň günde 4 wagtyna içmeli. | | | |
| Rp. | Fol. Betulae | 25.0 | (Berýozanyň ýapragy) |
| | Fol. Utricae dioicae | 25.0 | (Çit-çitiniň ýapragy) |
| | Herbae Viola tricolor | 25.0 | (Benewşäniň oty) |
| M.f.spec. D.S. 2 çay çemçe 0,5 l gaýnag suwda 30 minut demlemeli we S bulgurdan nahardan öň günde 4-6 wagtyna içmeli. | | | |

Şeýle hem böwrek üsti mäziň gabyk gatlagynyň ýerine ýetirýän işini witamin çäýlerini içmek bilen sazlaşdyryp bolýar. Bu maksat üçin gara smorodinanyň, brusnikanyň ýapraklaryny we itburunyň miwesini deň garyp çäý görnüşinde günde 2 bulgurdan nahardan öň içmeli.

Deformirlenen osteoartroz

Deformirlenen osteoartroz-ilkinji kesel hökmünde bogunlaryň distrofiki zeperlenmegi bilen degenerasiýa we süňk dokumasynyň soňraky proleferasiýasy bilen bogun

ketirdewüginin destruksiýasy, sinowial gatlagynyň galyňlaşmagy bilen ýüze çykýandyr. Sinowial gatlagynyň üýtgemegi (sinowit) ikilenji häsiýete eýedir. Deformirlenen osteoartrozda bogunlaryň zeperlenmegine adamyň wagtyndan öň garramagy sebäp bolup biler. Bogun ketirdewükleriniň wagtyndan öň zeperlenmesi bedeniň içki ulgamynyň, esasan hem genetiki, endokrin, enzimatiki, immunologiki üýtgemelere getirýär, şol sanda önümçilik şertleri hem uly täsir edýär. Bu kesel adaty 40-60 ýaşdaky aýal maşgalalarda duş gelýär.

Bu keseliň häsiýetli aýratynlygy- keseliň kem-kemden başlamagy, deformasiýa hadysalaryna garamazdan bogunlaryň öz işjeňligini uzak wagtlaý saklap bilmegidir. Agyry esasan hem bogunlara agram düşende ýüze çykýar we dynçlyk wagtynda agyry ýitýär.

Adaty az sanly bogunlar zeperlenýär: çanaklyk but (koksartroz) süňkleri, el-aýak süňkleri (gonartroz), oňurga (spondilýoz, spondilartroz, oňurgaara osteohondroz) süňkleri, barmaklaryň bogunlary.

Umumy bedeni berkidiji we bejeriji serişde hökmünde alawlama garşy serişdeler (indometasin we başg.) ulanylýar. Ol keseliň ýiti döwründe we täzedan gaýtalanýan döwründe hem ulanylýar.

Gan aýlanyşygy gowulandyrmak we beden etiniň atrofirlenmeginiň önüni almak üçin fizioterapiýa çäreleri we bejeriji fiziki maşklary geçirmek zerurdyr.

Berhiz tutmaklyk we gormon serişdelerini ulanmak madda çalşygynyň bozulmagynyň häsiýetini göz önünde tutmak bilen geçirilýär.

Deformirlenen osteoartrozda, şeýle hem guryagyryly artridinde in gowy agyry aýyryjy we alawlama garşy serişde hökmünde fitopreparatlar amatlydyr. Fitopreparatlar ondan daşary hem bedendäki bozulan hadysalara we bogun ketirdewüklerine bejeriji täsir edýärler.

Bedeniň artykmaç agramynda berhiz bilen bilelikde horlanmak üçin ýygyny hödürleýär:

Rp Cort. Frangulae 60.0 (Gara tikenin gabygy)

Rad. Taraxaci	20.0	(Tozganyň köki)
Fructus Petroselini	20.0	(Badyyanyň miwesi)
Fructus Foeniculi	20.0	(Arpabadyýanyň miwesi)
Fol. Menthae piperitae	20.0	(Narpyzyň oty)
M.F.spec. D.S. 1 nahar çemçe 1 bulgur gaýnag suwda 30 minut demläp goýmaly we 2 bulgurdan nahardan öň ertirine içmeli.		

Işdäni peseltmek üçin mekgejöweniň gulpagynyň demlemesi we gaýnatmasy (15.0:200.0) - nahardan 15-30min. öň günde 4-5 wagtyňa 1 nahar çemçesinden içmeli. Klimaks döwründe-ýüregiň çalt urmasynyň, gijilewükli örgünleriň öňüni almak üçin we beýleki alamatlaryc öňüni almak üçin ýygyndylar ulanylýar:

Rp.	Herb. Potentillae	25.0	(Gaýtarmanyc oty)
	Herb. Chelidonii	25.0	(Demrewotynyc oty)
	Herb. Millefolii	25.0	(Boýbodranyc oty)
	Flor. Chamomillae	25.0	(Çopantelpedic güli)
M.F.spec. D.S. 1 nahar çemçe 1 bulgur gaýnag suwda 30 minut demläp goýmaly we ajöze günde 2 bulgurdan owurtlap içmeli.			

2. 9. Soguljan keseliniň fitoterapiýasy

Iýmit siňdiriş ulgamynda mugthorlaryc döreden keselleriniň 20 köpräk görnüşi duş gelýär. Bu keselleriň has ýygy duş gelýänleri enterobioz, askaridoz, tenioz we teniarinhoz degişlidir.

Soguljan keseliniň dürli görnüşlerini bejermekde himioterapiýa ulgamynda soňky döwürde gazanylan üstünlikler uly. Muňa seretmezden bu keseli bejermekde fitoterapiýanyň hem ähmiýeti uludyr. Bu keseli bejermekde ulanylýan fitoterapewtiki serisdeler zähersizligi bilen (esasanam çagalary we horlanan näsaglary bejermek üçin) tapawutlanýar. Bu ösümlüklere sarymsak, ýabany sarymsak we kăşir, kădi, kăkilik oty, naryň gabygy we köki, piňma, selme, erkeklik biseperesi degişlidir.

Soguljan kesellerini bejermekde naryň gabygy, köki, erkeklik biseperänic köki ulanylanda olaryň taýýar

ekstraktyny ulanmak amatly we lukmanyň gözegçiliginde bolmaly.

Enterobioz. Enterobioz mugthorlaryc döreden keselleriň biri bolup, ol çagalarda has köp ýaýrandyr. Bu keseli *Enterebius vermicularis* gurçugy emele getirýär. Bu gurçugyň erkeginiň ululygy 2-5mm, urkaçysynyňky 9-12mm deňdir. Bu mugthor ýogyn içegäni we inçe içegäniň aşaky bölümlerini zaýalaýar. Tohumlanan urkaçy gurçugy näsagyň artbujagynda ýumurtga taşlaýar we ol ýerde ýumurtgalardan ýaşajyk gurçuklar ösüp ýetişýär. Her urkaçy gurçuk 12 müňe çenli ýumurtga taşlap bilýär. Bu ýumurtgalar arassaçylyk berjaý edilmedik halatynda, gaşalanda barmaklaryň üsti bilen agyz boslugyna düşüp, inçe içegä baryp ýetýär we ol ýerde olar iki hepdäniň dowamynda tohumlanmaga ukyplanýarlar. Bu keseli ýokaşdyryjy näsag adamdyr.

Keseliň keşbi. Şeýle kesel bilen kesellän näsaglaryň göbeginiň daşynda we ýogyn içegäniň ýollarynda tutgy şekilli agyry peýda bolýar.

Mundan başga-da artbujakda gijelewük peýda bolýar, näsagyň işdäsi peselýär. Gijelewük gijelerine has hem güýjeýär.

Bejergisi. Ilkinji nobatda arassaçylygy berjaý etmeli we mugthorlary ýok etmek üçin preparatlary ulanmaly. Adipinat, Helmicid, Combantrin we başgalar. Derman preparatlary ulanmak bilen bir hatarda näsagyň içini ýuwmagy hem utgaşdyryp ýerine ýetirmeli.

Askaridoz. Bu kesel dörediji mugthor hem çagalarda köp duş gelyär. Bu keseli dörediji togalak gurçuk *Ascaris lumbricoides*. Onuň erkeginiň ululygy 15-25 sm, urkaçysynyňky bolsa 25-40 sm deňdir. Bu mugthor gurçugy adamyň içegesinde ýumurtga taşlaýar. Olar daşky täsire düşenlerinde 20⁰S 10-15 gününň dowamynda ýetişýärler. Ýene-de ýuwulmadyk gök önümleriň, miweleriň ýa-da hapa elleriň üsti bilen, agyz boşlugyna düşýärler we ýumurtgalardan içegede gurçujaklar ösüp ýetişýär, içege diwarlaryna sorulyp gan aýlanşygynyň üsti bilen bagyra,

öykene baryp ýetýärler. Soňra dem alyş ýollaryň üsti bilen ýene-de içegä ýetip şol ýerdede mugthorlar ösüp ulalýarlar. Bu soguljan gurçugy agyz boşlugyna düşenden soň 60-75 günň dowamynda ösüp ýetişýär.

Kliniki keşbi. İçege görnüşli parazitler bilen kesellän näsaglaryň işdäsi kesilýär we newrotiki ýüze çykmalar duýulýar. Migrasiýa tapgyrynda- ýagny gurçujaklaryc öýkende ýetişýän döwründe üsgülewük, dem gysma, gan tüýkürmek we başgalar bolup geçýär. Bu döwürde nasagyň öýkenini rentgene düşerilende soguljanyň ýumurtgasy we käbir parazitler hem anyklanypdyr.

Bejergisi. Bu keseli bejermek derman serişdeleriň-Santonin, Combantrin kömegi bilen şeýle-de fitopreparatlaryň kömegi bilen amala aşyrylýar.

Tenioz we teniarinhoz.Tenioz doňuz soguljany tarapyndan, teniarinhoz bolsa öküz soguljany tarapyndan ýüze çykarylýar. Bu keseliň döremegine ýokarda agzalan soguljanlaryň liçinkasyny saklaýan donuz ýa-da sygyr etiniň iýilmegi sebäp bolýar. Doňuz ýa-da iri şahly mallarda bu soguljanlaryň ýumurtgalarynyň ösüş dowürleri bolup geçýär. Soňra olar iýmit üsti bilen adam bedeniniň içegesinde tasma şekilli mugthor-teniý ösüp ýetişýär. Soňky döwürde mal etine barlaglar yzygiderli geçirilmeginiň netijesinde tenioz bilen keselleme peseldi.

Keseliň ýüze çykarýan alamatlary. Tenioz paraziti bilen kesellän näsaglar göbeginiň töwereginde we ýogyn içegäniň ýollarynda güýçli agyry duýýarlar, öz bedeninde ýarawsyzlyk, ysgynsyzlyk duýýarlar. Kä halatlarda allergiýa, endamyna örgün örýär. Näsagyň täretinde ýuwudylyan parazitler tapylýar.

Bejergisi. Bu keseli bejermekde derman preparatlaryndan “ýomesan” ulanmak maslahat berilýär. Fitoterapewtiki serişdelerden erkeklik biseperisinic ekstrakty - amatly hasaplanýar.

Ýakymlyja rufa bu ösümligic kesel dörediji mikrobe-denjiklere şeýle-de soguljanlara garşy täsirini tejribeleriň

netijeleri görkezdi. Esasan hem *Ascaris lumbricoides* – soguljanyna garşy täsiri ýüze çykarýar. Onuc otunyc demlemesi ulanylýar. Bu maksat üçin 1 g ownudylan otuny 400 ml sowuk suw bilen garyp 8 sagat goýmaly. Demlemäni süzüp 1 günüc dowamynda içmeli.

Bu ösümligi lukmanyc gözegçiliginde ulanmaly ýokary duýujylygy bolan we göwreliler üçin ulanmak gadagan.

Soguljan kesellerini bejermekde ulanylýan fitoterapewtiki serişdeler

Nar. Naryň miwesiniň, şahalarynyň we köküniň gabygy soguljanlara (teniý) garşy täsiriniň bardygy halk lukmançylygyndan bize mälimdir. Ylmy lukmançylykda geçirilen tejribeler hem bu ösümligiň şeýle täsirini tassyklaýar. Teniý görnüşli soguljanlara garşy gaýnatma: 50g naryc kökünic we baldagynyc ownudylan gabygyny S litr suw bilen 15 minut gaýnatmaly/ sowandan soc süzüp lukmanyc gözegçiliginde 2-3 sagadyc dowamynda ony içmeli.

Ajy ýowşan. Gurçuga garşy serişde esasan onuc düzümindäki Santonin hasaplanýar. Askaridlere garşy ulanylýar. Santonin lukmanyc gözegçiliginde berilýär we şol bir wagtda näsaga gowşadyjy serişdeleri magninic ya-da natrinic sulfatyny bermeli. Kastor ýagyny bermeli däl ol santoninic zäherlilikini güýçlendirýär.

Ýakymlyja selme. Bu ösümlük esasan hem soguljana garşy täsiri ýüze çykarýar. Onuň otunyň 5% gaýnatmasy, askaridozlary bejermekde täsirli. Onuň ýagy bolsa askaridleri we teniýleri bejermekde has täsirli hasaplanýlar. Häzirki wagtda bu ösümligic ýagy ulanylýar. Onuc ýagynyc damjasy çaganyc ýaşyna laýyk berilýär. Ony irden ajöze içmeli we 2 sagatdan soc ýumşadyjy serişdeler bilen iç ýuwmalı. Bejergini bir hepdeden soc gaýtalamaly. Ösümligic ýagynyc täsiri arassa askaridol bilen deçeçerdir.

Käşir. Käşiriň şiresi ýa-da ondan alynan efir ýagy enterobioza, askaridoza garşy serişde hökmünde ulanylýar. Bu serişdeler esasanam çagalary we ysgyndan gaçan näsaglary bejermekde has amatly. Sebäbi beýleki serişdeler olara zäherli täsir etmegi mümkin. Käşiriň düzüminde karotinoidleriň bolmagy vitaminiň “A” çeşmesi hasaplanýar. Ony gyrgyçdan geçirip dürli görnüşli ýanyklary bejermekde, bitmeýän ýaralary bejermekde hem ulanylýar.

Adaty piňma (tanasetum). Piňmanyc esasan hem soguljana garşy, antiseptiki, alawlama garşy täsiri bar. Ösümligiň otundan alynan efir ýaglary soguljana garşy, bakteriostatiki täsiri ýüze çykarýar (5% gaýnatmasy). Mundan başga-da onuň otundan 5% demlemesi ýürek damar näsazlyklarynda, arterial basyşy peseldiji, ot öwürji häsiýetiniň bardygyny bellidir.

Piňmanyň pes doýgynlykly çykyndysynyň antiseptiki, antimikrob, we rahatlandyryjy täsiri bardyr. Şol sebäpli ol iç ýellenende, kolitde, iç geçmede, we agyz boşlugynda emele gelýän alawlama kesellerinde we gepatit keselini bejermekde ulanylýandygyny tejribe barlaglary görkezdi.

Adaty kădi. Tejribe we kliniki barlaglaryň netijeleri kădiniň çigidiniň we miwesiniň dürli keselleri bejermekde ähmiýetlidigini subut etdi. Kădiniň çigidi soguljan keselleri bolan teniý, oksiur kesellerine garşy ulanylýar. Öň belleýşimiz ýaly, çigidiň magzynyň daşyndaky gögümtil-ýaşyl barda geterozid pipoperazin saklanýar. Onuň gurçuga garşy täsiri hut şu maddanyň bolmagy bilen baglansyklydyr. Kădiniň çigidi we onuň preparatlary goşmaça täsiri ýüze çykarmaýar, ulylary we çagalary (2-3 ýaşdaky) göwrelileri, çaga emdirýän eneleri we 60 ýaşdan geçen, şeýle-de agyr keseli geçiren näsaglary bejermek bolýar.

Teniýoz keselini bejermekde 80-100 sany gabygy arassalan kădi çigidini, gowy ýenjip iýmeli. Soňra 1 sagatdan kastor ýagyny içmeli. Ýa-da çigidi deň mukdarda süýt bilen garyp içmeli.

300 g arassalanan we gögümtıl-ýaşyl bardasy saklanan kădi çigidini 50-60 ml suw bilen sokuda gowy ýenjip, oňa 1 nahar çemçe bal garyşdyrmaly. Näsag ony 1 sagadyň dowamynda ajöze iýmeli. 2 sagatdan soň magniniň sulfatyny (çagalara 15-30gr), bermeli we 1 sagatdan soc içegäni ýuwmaly. Ulular üçin kădi çigidi- 300g, 10-12 ýaşly çagalara – 150g, 5-7 ýaşly çagalara- 100g, 3-4 ýaşly çagalara- 75g, 2-3 ýaşly çagalara –30-50g çigidi gaýnatma görnüşinde-de bu keseli bejermekde ulanylýar. Näsaga diňe onuň süzülen ergini içirilýär.

Çagalardaky oksiur keselini bejermekde günde 10-15 sany çigidi iýdirmeli we 1 sagatdan 1 çay çemçe kastor ýagyny içirmeli.

Kădiniň özüniň berhizlik we gowşadyjy täsiri bardyr. Ol dürli suw ýygnanmalarda, böwrek, peşew ýollarynyň kesellerinde, iç gatamalarda ulanylýar.

Kădiniň bagyr kesellerinde ulanylýandygy bize mälimdir. Ony gyrgyçdan geçirip deriniň zaýаланan bölegini-ýanygy bejerýärler. Gülünden taýýarlanan gaýnatmasy ýaralary bejermekde ulanylypdyr.

Gyrgyçdan geçirilen kădi aýagyň dabanyňa ýapgy edilse ýadawlyk aýrylypdyr. Ýa-da ony furunkullar, absessleri

bejermekde ulanylypdyrlar. Peşew kowyjy serişde hökmünde 0,5 kg kădini 1 günün dowamynda iýmeli ýa-da 0,5 bulgur şiresini içmeli. Gowşadyjy serişde hökmünde 0,5 kg çig kădini iýmeli.

Erkeklik biseperesi. Lukmançylykda erkeklik biseperisiniň porrygyndan taýýarlanan efir ekstrakty tenioz keselini bejermekde ulanylýar. Ekstrakty suwda eremeýär, ýagda ereýär, erbet ysy bar. Bu ösümligiň suwly, spirtli ekstraktynyň öýjüksiz wiruslara garşy täsiri bar. Gadymy lukmançylykda bu ösümlük wenalaryň giňelmesinde, deri kesellerinde daşky serişde hökmünde ulanylypdyr. Bu maksat üçin 0,5 kg ownadylan porrugy 5 litr suwda 5 sagat gaýnatmaly. Gaýnadylanda suw guýup durmaly. Gaýnatmanyc 1 l-ni

ýuwunmak üçin ulanmaly. Deri kesellerinde aýak wenalar giňelende 30 gezek ýuwunmaly.

Erkeklik biseperisiniň çykyndysyny soguljan keseline garşy ulanylanda şu düzgünleri berjaý etmeli. Bejergiden 1 gün öň näsag ýagly iýmit iýmeli däl: has gowusy süýt önümleri iýmeli: Onuň ekstraktyny ajöze içmeli we näsaga gowşadyjy serişdeleri bermeli (kastor ýag bermeli däl). Has gowusy 30g inlis duzyny bermeli.

Bu ösümligiň porrugyndan taýýarlanan gaýnatmany hem ulanmak bolýar. 1 nahar çemçe porrugy 400 ml. suw bilen 10 min. gaýnatmaly. Gaýnatmany süzmeli we her 2 sagatda üçe bölüp içmeli, 2 sagatdan soň bolsa inlis duzuny (30 g.) içmeli.

Soguljan keselini bejermekde ulanylýan ýygyndylar

Rp: Ol. Ricini 30,0 (Kastor ýagy)
Gummi arabici (Şepbik)
Tinct Allii sativi aä 10,0 (Sarymsagyň tinkturasy)
Aq. Menthae pip. ad. 100,0 (Narpyzyň suwy)
M.F. emuls. D.S. Açlygyňa 1çaý çemçe (2-5 ýaşa çenli üçin)
2 çay çemçe (6-10 ýaşa çenli üçin) 3 çay çemçe (11> ýaşlylar üçin) 2 günüň dowamynda içmeli.

Rp: Bulbi Allii sativi 10,0 (Sarymsak)
D.S. 5-10 g 1 litr suwda eretmeli we iç ýuwmaly.

Rp: Flor. Tanacetii pulv. (Pihmanyň gülüniň külkesi)
Rad. Jnulae pulv. (Guzygulagyň kökünüň külkesi)
Fruct. Myrtilli aä 5,0 (Çernikanyň miwesi)
M.F. D.S. Ertir. S bölegini 2 sagatdan soc 2 gezek içmeli
(askaridoza garşy)

Rp: Semen Cururbitae (Kädiniň çigidi)
Flor. Tanacetii (Pihmanyn gülleri)
Cort Frangulae aä 20,0 (Garatikenin gabygy)
M.F. Spec. D.S. 1 nahar çemçe 1 bulgur suw bilen 10 min
gaýnatmaly. Günde 1 bulgurdan 3 gün içmeli.

Rp: Extr.Filicis maris spissi 0,5 (Erkeklik biseperesiniň ekstrakty)
D.f.d. № 10.In capsulis (Helatina örtükde)
gelatinosis.
D.S. 5 örtükden her 0,5 sagatdan 2 gezekde bölüp içmeli.
1 sagatdan soc 30g natrinic sulfatyny içmeli.

Rp: Herb. Tanaceti 25,0 (Pihmanyň oty)
D.S. S çay çemçe 1 bulgur suwda demlemeli. Ertir,
agşam içmeli.

Rp: Herb. Tanaceti 1,0 (Pihmanyň oty)
M.F. pulvis D.t.d.№10.D.S. 1 külleden iki gezek bal bilen içmeli.

2. 10. Deri keselleri

Häzirki döwürde deri kesellerini bejermekde ulanylýan derman ösümlikleri gowy netijeleri berýändir.

Derman ösümliklerinden alynan derman serişdeleri öz düzüminde biologiki aktiw maddalary saklaýar, hem-de hiç hili zyýanly goşmaça täsirleri ýüze çykarmaýarlar.

Şonuň üçin-de olar bilen deri kesellerini we beýleki keselleri uzak wagtlap hiç-hili zyýansyz bejerip bolýar.

Deri keselleriniň ähli görnüşlerinde hem derman ösümlikleri bilen kesel bejermeklikde, olaryň goldaýjy hem-de esasy bejerijilik häsiýetlerine esaslanyp umumy we ýerli bejergileri amala aşyrmak üçin ulanylýar. Keseli bejermekde derman ösümlikleri keseliň sebäbine we geçiş döwürlerine görä saýlanyp alynýar. Deri kesellerinde olar esasy bejeriji ýada goşmaça derman serişdesi hökümünde hem ulanylyp biliner.

Derman ösümlikleri ulanylanda olaryň bejeriş usuly we möçberi ulular üçin görkezilýär. Çagalar üçin bolsa möçberi azaldylan bolmalydyr, ýagny ululara berilýän möçberiniň 1/3 - 1/4 bölegini bermelidir. Çagalaryň deri kesellerini bejermeklik üçin güýçli täsir edýän derman ösümlikleri ulanylanda möçberlerini has-da azaltmalydyr. Käbir derman ösümlikleri bolsa asla çagalara ulanmak bolmaýar.

Deri keselleriniň köp sanly görnüşleri bardyr. Olaryň esaslaryna şular degişlidirler, ýagny:

Pis keseli;

Mikozlar;

Kandidozlar;

Kel keseli;

Seboreý saç düşmesi;

Piodermiýa ;

Mehaniki gysylmalaryň we sürtülmeleriň netijesinde ýüze çykýan deri keselleri;

Gyzgyn görkezijiniň ýütgemeginde ýüze çykýan deri keselleri;

Ekzema;

10-Mör-möjekler çakanda ýüze çykýan deri keselleri;

11-Iriňli häsiýetli deri keselleri;

12-Wirusyň we mugthorlaryň ýüze çykaran deri keselleri;

Bu keselleriň bejeriş usullary we olarda ulanylýan derman ösümlükleriniň görnüşleri özaralarynda tapawutlan-ýandyrlar.

Pis keseli. **Bu kesel adam bedeninde pigment ýetmezçiligi sebäpli döräp, tende ak tegmil gornüşinde çykýar. Köp sanly ylmy çeşmelere görä bu ýagdaýda enzimleriň okislenme hadysalarynyň saklanmagy sebäpli tirozini melanine öwürüp bolmaýar. Şeýle-de bu ýagdaý bedende demiriň, misiň ýetmezçiligi sebäpli hem ýüze çykyp bilýär. Şol bir wagtyň özünde bu keseliň döreyiş we geçiş sebäpleri ylymda doly öwrenilen däldir. Şonuň üçin hem bu keseliň ýöriteleşdirilen belli bir bejergisi ýokdyr. Bu keseliň döremeginde birnäçe kesgitli sebäpleri bardyr, meselem nesilleýin geçýän neýroendokrin bozulmalar, akyla şikes ýetirmeler, bowrek üsti mázleriň, şeýle-de galkan şekilli we jyns mázleriň işiniň bozulmasy, içki agzalaryň keselleri, ýokanç keseller, zäherlenmeler ýaly güýçler täsir edýär. Mundan başga-da, bu ýagdaý melonositleriň kadaly işiniň bozulmasy bilen hem ýüze çykyp bilýär, ýagny deride melanostimulirleýji**

gormonlaryň antogonistleri melatonin we kateholamin bar, olar bolsa gormonlaryň işini togtadyrlar.

Bu kesel ownuk reňksiz tegmiliň emele gelmegi bilen başlanýar. Kesel köplenç bildirmän başlap, duýdansyz ýüze çykýar, netijede bolsa reňksiz tegmiller ýuwaşlyk bilen emele gelýär. Zaýalanan ýerdäki bedeniň suwuklyklary hem reňksizlenýär. Pis keseliniň ýerleşşi hem dürlüdür. Bu kesel islendik ýaşda, şol sanda erkeklerde-de, aýallarda-da bolup biler. Bu keseliň dowamlylygy uzakdyr.

Pis keseliň döreýşiniň sebäbini doly anyklap bolmaýandygy üçin ony bejermeklik hem kyn düşýär. Şu maksatlar üçin soňky 40 ýylyň içinde ultramelewşe şöhleler hem-de furokumarin saklaýan derman ösümlikleri ulanylýar. Furokumarinlere meludinin, beroksan, psoralen, ammfurin degişlidir. Bular ýokary derejede bedeniň ýagtylyga bolan duýujylygyny (fotosensibilizirleýji işjeňligini) ýokarlandyrýar we melaniniň emele gelşini sazlaşdyrýar. Netijede bolsa deri ortüğine tebigy reňkini gaýtaryp berýär.

Bedeniň ýagtylyga bolan duýujylygyny käbir derman ösümlikleriniň ýygyndylary hem ýokarlandyrýar, ýagny olaryň düzümine jerebaýyň oty we beýleki pigment çalşygyny gowulandyryan otlar girýändir.

Käbir barlaglaryň netijesinde bu kesel ýaňy döräp başlan wagtynda jerebaýyň ekstraktyny birnäçe aýlap, içmek hem-de daşky ulanmak bilen bejergileri geçirilse gowy netijeleri almak mümkinçiliginiň bardygy kesgitlenildi. Bu ýagdaýda şol bir wagtyň özünde teni simap-kwars lampasynyň ýa-da tomusyna gün şöhlesiniň kömegi bilen şöhlelendirmelidir. Şeýle bejergileriň netijesinde melaniniň pis keseliniň ojagynda emele gelýändigini anyklanandyr. Bu bejerginiň goşmaça zyýanly täsirleri ýokdyr.

Melanin – fenilalaniniň enzimleýin okislenmeginiň zynjyrynyň ahyrky ovrümidir. Melaniniň polimer molekulalarynyň çylşyrymly gurluşy bardyr hem-de bular erkin radikallary we beýleki şöhlelenmäniň aktiw önümlerini fokusirlämege ukyplydyr. Furokumarin serişdeleriniň täsirliگی

zaýаланан yeriň üst ýüzüniň ululygyna baglydyr. Mundan başga-da näsagyň ýaşyna, goşmaça kesellere, näçe wagtdan bäri keselleýändigine baglydyr. Şöhleleriň tolkunlarynyň hem täsiri bardyr. Meselem orta tolkundaky (290-320 nm ýygylkda) ultramelewşe şöhleleriň uzyn tolkunlaryndaka (320-400 nm ýygylkda) seredende täsiri azdyr.

Ultramelewşe şöhleleriň melanini sazlaşdyryjy ukyby furokumarinler bilen bilelikde ulanylýan usulyna pis keseliniň bejerilişiniň fotohimiki usuly diýilýär. Fotohimiýa bilen bejermeklik näsag doly barlanandan soň, bejergä garşy görkezmeler bolmadyk halatynda geçirilýär. Bejergi hepdede 3 gezek geçirilýär, ýagny şöhlelenmeden 2 sagat öň beroksan, psoralen ýa-da ammifurin ýaly dermanlar berilýär. Şöhlelenmeklige başda 3 minut, soňra her 2 gezek şöhlelenen soň ýene-de 3 minut uzaldylýar, soňky bilen bilelikde onuň dowamlylygy 12-15 minuda çenli ýetirilýär.

Bejergini 15-18 şöhlelenme bilen 3 hepde arakesmeden soň ýene-de gaýtadan geçirilýär. Şeýdip 2 gezek bejergi geçirilenden soň keseliň ojagynda pigmentleriň kiçijik bölejikleri emele gelip başlaýar. Soňky bejergiler bilen ol bölejikler ulalýar. Doly pigmentiň emele gelmegi 5 gezek bejergi geçirilenden soň döreýär. Bu hem diňe 50% näsaglarda bolýar, 30% näsaglarda biraz pesrāk ýagdaýda bolup geçýär.

Pis keseliniň bejerilişiniň bu usuly beýleki bejergiler bilen deňeşdirilende gowy netijeleri berýändigini üçin köplenç ýagdaýlarda bu bejergini ulanmak maslahat berilýär.

Fotohimiýa usuly bilen bejermekde kähalatlar da goşmaça täsirler hem ýüze çykýar, ýagny: ukynyň bozulmagy, gaýtarmaklyk, kelle agyry, baş aýlanma we ş.m.

Furokumarin serişdeleriniň käbir kesellerde, ýagny: sarygetirmede, ýürek-damar ýetmezçiliginde, göwrelilikde, inçe keselde we ş.m. ulanmaklygy maslahat berilmeýär.

Ammifuriniň dermanyny pis açma keselini bejermekde ulanyp boljagyny ylmy barlag işleriň netijeleri görkezýär. Bu serişdäniň düzümine furokumarinleriň birnäçesi,

izopimipinellin ksantotoksin, we bergapten girýär. Olar “uly Ammi” ösümliginiň tohumyndan bölünip alynýandyр. Ammifurin bilen bejermegiň täsirliligi ýokarydyр.

Pis keselini bejermekde derman ösümlükleriniň toplumlary hem giňden ulanylýar, mysal üçin olara şular degişlidirler:

Rp.	Herb.	Hyperici	30.0	(Jerebaýyň oty)
	Fbor.	Calendulae	30.0	(Dyrnaklyjanyň gülleri)
	Flor	Chamomillae	20.0	(Çopantelpеgiň gülleri)
	Herb.	Salviae	40.0	(Bidenek oty)
	Herb.	Origani	20.0	(Ýakymlyjanyň oty)
	Herb.	Bidentis	20.0	(Üç bölek goşa dişiň oty)
	Fol.	Urticae dioicae	40.0	(Çit-çitiniň ýapragy)
M.F. spec. D.S. Bu ýygýndynyň 1-2 nahar çemçesiniň demleme görnüşinde 1 bulgur gaýnag erginde taýýarlap, nahardan öň 0,5 bulgurdan günde 2-3 gezek 1-2 aýyň dowamynda içmeli.				

Olardan başga-da şeýle maksatlar üçin birnäçe derman serişdeleri hem giňden ulanylýar:

- 3) Pirroksanyň 1 gerdejigini günde 2 gezek 20 günün dowamynda içmeli. Arakesme 10- gün. Bejergi 2-3 gezek geçirilýär we bejergi döwründe gan basyşy barlanyp durulýar.**
- 4) Metildofa (dopegit) 1 gerdejikden günde 2 gezek nahardan öň içmeli. Bejergi 20 gün dowam edýär. Arakesme 10 gün bolup, bejergini 2-3 gezek gaýtalamaly.**
- 5) Araliýanyň we waleriananyç tinkturasyny deň mukdarda çay çemçesi bilen günde 2 gezek nahardan öň suw bilen içmeli. Bejergini 2-3 aý dowam etdirmeli.**
- 6) Biosediň 1 ml-ni myşsa, günde bir gezek, 30 günün dowamynda sançmaly.**
- 7) Kwarsyň suberutem möçberini (15 gezek) günde kabul etmeli, 2 sagat öň pigmentiň ýok yerlerini jerebaýyň tinkturasy bilen süpürmeli ýa-da dopegit çalgysyny çalmaly.**

Näsaga bejergi alýan döwründe köp mukdarda käşir, kelem, şugundur we erik iýmekligi maslahat berilýär.

Her üç günden näsaga kyrk bogunyc we waleriananyc kökünic suwyna ýuwunmaklygy maslahat berilýär. Bu suwy taýýarlamak üçin 20 ml waleriananyc tinkturasyny hem-de kyrk bogunyc ekstraktynyň 2 nahar çemçesini 1 l suwa goşmalydyr. Bu ýagdaýda näsag, mundan başga-da 2-3 aýlap derman ösümlükleriniň ýygyndylarynyň demlemesini ýa-da irden we agşam 1-2 gerdejigini içmelidir.

Näsaglara toplumlaýyn bejergi geçirilende ýene-de legalon, lipoý turşusyny, B₁, B₂, B₁₂, C, witaminlerini, demiriň, misiň, margensiň, kobaltyň dermanlaryny bermek maslahat berilýär. Bulardan başga-da käbir ýagdaýlarda biýohinol, fotin, pantokrin, nowokainiň erginini, fosfren, pituitrin, tolbutamid we anaboliki steroidleri, kortikosteroid dermanlaryny we başgalary ulanmaklyk maslahat berýärler. Şu maksatlar üçin patogenetiki esaslandyrlan derman bolan Metildofany ulanmak hem bolýandygy subut edilendir.

Bu keselde fiziki bejergilerden ultramelewşe şöhleleri, ultrases, dürli ýylylyk täsirleri ulanylýar. Şeýle näsaglara saglygyň dikeldiji we bejeriji öýlerinde bejergi almaklygyň, ýagny arassa howada gezelenç etmekligiň, deňizde suwa düşmekligiň, günün we howanyň täsirlerinden peýdalanmaklygyň hem uly ähmiýetiniň bardygy anykdyr.

Mikozlar. Mikozlar deri keselleriniň uly toparyna degişli bolup, olar patogen kömelegiň üsti bilen kesel döredýärler. Häzirki wagtda şeýle kömelekleriň 500-e golaý görnüşi ylma bellidir we olar dürli ýurtlarda duş gelýändirler. Olaryň köp ýaýran käbir görnüşleri barasynda şeýle maglumatlary berip bolar, ýagny:

Keratomikoz - bu epidermisiň gatlagyny zaýalaýar we alawlama keseli ýüze çykmazdan emele getirýär (meselem, turb-şekilli, dürli reňkli lişay).

Epidermomikozlar (gasyk epidermofitiýasy, dowamly mikoz, rubomikoz, kandidozlar) - bular epidermise

kömelekleriň aralaşmagy bilen alawlama keselini ýüze çykarýarlar.

Trihomikozlar (trihofitiýa, mikrosporiýa we fawus) - olar deriniň şahly gatlagyny we saçlary zaýalaýarlar.

Çuň mikrozzlar (blastomikoz, hromamikoz sporotrihoz we başgalar) - bolsa deriniň özüni we deriasty kletçatkany zaýalaýarlar.

Mikozlaryň döremeginde madda calşygynyň bozulmalarynyň täsiri bardyr. Olaryň döremeginiň esasy sebäpleri hökminde gan aýlanşygynyň bozulmagyny, witaminleriň deňagramlylygynyň üýtgemegi, disbakterioz, deriň bölünip çykmasynyň ýokarlanmagyny, ýiti hem-de uzaga çeken ýokanç keseller sebäpli emele gelen trofiki bozulmalary, döwür-ýenjikleriň bolmagyny, sürtülmeleri we başgalary görkezmek bolar. Yerli täsir edýän hadysalaryň netijesinde ýuwaş-ýuwaşdan bedeniň işjeňligi üýtgeýär, bu bolsa belli bir derejede immunobiologiki üýtgemelere alyp barýar.

Mikozlar dürli reňkli lişaydyrlar we ownuk sary-goňur tegmiljik bolýarlar. Olar garnyňda, arkaňda, göwüsde, seýregräk halda eginde duş gelýärler. Tegmilleri gyrsaň ýüzi gopýar, oňa ýodyň erginini çalsaň zaýаланan yeri has tutuk reňk bilen belli bolýar.

Gasyk epidermofitiýasy esasanam erkek adamlarda duş gelýär. Olar gasyk gasynlarynda, ýumurtgalykda, ýanbaşyň arasyndaky gasynlarda duş gelýär. Olar bir ýa-da birnäçe tegelek bildirip duran, esasanam gijelerine gijeýän gülgüne- gyzyl tegmillerden ybaratdyrlar.

Dabanda mikozyň emele gelmegi dürlidir. Bu keseliň birnäçe görnüşleri bardyr. Olar köplenç mikrobedenjikler (stafilokokk) bilen we örgün örtükleriniň netijesinde ýüze çykýarlar.

Rubomikoz bilen daban, eliň aýasy, dyrnaklar, esasanam barmak aralary we tüýjümek yerler, kelle zeperlenýär. Ýaramaz örgünleri ýüze çykarýarlar.

Mikozlary bejermegiň birnäçe usullary bar. Olaryň esasyalaryna şu aşakdakylar degişlidirler, ýagny:

1) Umumy – immunobiologiki usuly;

2) Ýerli bejergi;

3) Mikrobodenleriň, kömelekleriň ösmegini we köpelmegini togtatmaklyk usuly. Bu maksatlar üçin antiparazitar, fungusid serişdeleri ulanmaklyk ýa-da derini guratmaklyk, deriniň turşu täsirleşmesini ýokarlandyrmaklyk maslahat berilýär. Olaryň netijesinde kömelegiň ösüşi üçin mümkinçilikler bolmaýar.

Epidermisde dörän dürli reňkli lişaýlary bejermek üçin keratolitiki serişdeler bolan: ýaşyl sabyn, Wilkonsonyň çalgysy, Andriasýanyn ergini, ýoduň spirtli ergini, salisil spritiniň 2-5% ergini, benzil benzoatyň 20% emulsiýasy, kükürtli çalgy, Demýanowiçiň ergini ulanylýar.

Mikoz gaýtalanyp, ötüşen yagdaýynda wenadan natriniň tiosulfatynyň, kalsiniň glýukonatynyň ýa-da kalsiniň hloridini goýbermeli. Soňra dimedrol, suprastin, diazolin, fenkarol we başgalary bellemeli. Mundan başga-da olary ýok ediji dermanlary bilen ýuwmaly ýa-da şeýle pastalary çalmaly.

Mikozy bejermekde antiparazitar ya-da fungusid täsiri ýüze çykarýan dermanlar bolan: salisil, benzoý, süýt turşularynyň dermanlary we kükürdiň, timolyň anilin boýaglarynyň dermanlary, kömelege garşy dermanlary – mikoazolony, mikoseptini, undesini, dekamini, sinkundany, amikozoly we başgalary ulanmaly. Eger kömelek dyrnakda we saçlarda bolsa, onda griseofulwin ulanylýar.

Mikozlary bejermekde 1000 köpräk osümlikleriň, 137 ösümlik maşgalasynyň antimikoz täsiriniň bardygy ylmy çeşmelerde yazylýar. Olaryň köpüsi mikroba we mugthorlara garşy täsiri ýuze çykarýan maddalary saklaýarlar. Meselem, salisil, benzoý turşulary - kâbir ösümliklerden; lýuterin - sary kubyşka ösümliginden;

nowoimanin- jerebaý öşümliginden we başga-da dürli furokumorinler – psoroleýadan we beýlekilerden alynandyr.

Mundan başga-da bu keselde iýmit şirelerini ulanmak hem peýdalydyr, ýagny olara badam, ýer tudanasy, ülje, kizil we beýlekiler degişlidirler. Olaryň düzümine dürli aldegidler, uçujy aromatiki maddalar girýär we olar kömelege hem-de mikroblara garşy täsirleri ýüze çykarýandyrlar. Olaryň has täsirlisi badam şiresidir.

Berýozadan we sosnadan alynan deg ot hem fungisid täsiri ýüze çykarýar, ony dermatologiki amallarda arassa (5-10%) özüni ýa-da kükürt, salisil turşusy ýa-da naftalan bilen garyp ulanýarlar.

Antimikolitiki täsiri pihtanyň pürleri, ewkalipt, adaty çemerisa, gara derek, uly sabyn oty, gorçisa we başgalar hem ýüze çykarýarlar.

Deriniň kömelekli keselleri. Hamyrmaýa gornüşli kömelekleriň kandida gornüşine degişlileri deride, nemli bardalarda mesgen tutýarlar. Bu kömelekler süýtde, süýtli önümlerde, miwelerde, kandidozly näsagyň gapdalyndaky zatlarda, onuň otagynyň tozanlarynda, howasynda köp duş gelýär. Bu kömelekler adamyň özünde saklanýar, ýöne kesgitli bir şertlerde özleriniň kesellerini döredip bilýärler. Hamyrmaýa görnüşli kömelekleriň işjeňliginiň ýokarlanmagynda antibiotik derman serişdeleriniň hem täsiri bardyr. Bu kömelekler iýmitiň bozulmagyna, madda we uglewod çalyşygynyň bozulmagyna getirýär hem-de witaminleriň yetmezçiligini ýüze çykarýar.

Kandidozlar nemli bardalary we derini zaýalaýarlar. Köplenç III we IV barmaklaryň arasynda, dabanda, gasyk we goltuk oýtumlarynda, semiz aýallaryň süýt mäsleriniň aşagynda we artbujagyň arasynda bolup bilerler. Mundan başga-da bu kömelekler agyz boşlugynyň nemli bardasyny, daşky jyns agzalaryny zaýalap bilerler. Kesel ownuk haltajyklaryň emele gelmegi

bilen döräp tizden ýalpyldap gyzyl reňkli çygjaryp duran ýara owrulýär. Ýaranyň üsti anyk aýrylyp duran gabykly bolýar.

Nemli bardadaky kandidoz dürli kliniki görnüşlerde emele gelýär (droň görnüşli stomatit, kandidomikotiki glossit, basyk, heýlit we başgalar).

Hamyrmaýa meňzeş kömelekleriň içki agzalary hem zaýalaýan wagty duş gelinýär. Olar koplenç wiseral kandidoz wagtynda gyzyldödegi, öýkeni, inçe we ýogyn içegäni, peşew haltany zaýalaýar. Ýüregiň we bagryň kandidozy has seýrek duş gelýär.

Wiseral kandidozyň iýmit siňdiriş ulgamy zaýalamagy ilkinji orunda durýär. Şeýle näsaglaryň işdäsi kesilýär, agyz boşlugynda alawlama duýulýar, çeynemegiň agyry sebäpli agyrlaşmagy, tiz-tizden içiň geçmegi, içegäniň ýellenmegi we bedeniň gyzgyn görkezijisiniň ýokarlanmagy bolup geçýär.

Kandidozlary bejermek üçin kömelege garşy antibiotikleri nistatin, leworin, amfoterasin-B, amfoglýukamin we başgalar ulanylýar. Umumy bedeniňi berkidiji serişdeler höküminde plazma çalyşygy erginleri, immunoglobulinleri we başgalary sançýarlar.

Kömekçi serişdelerden anilin boýaglary, Kastellanyň ergini, bor tuşrysý, kümüşniň nitraty, bioform ergini, nistatin ýa-da leworin çalgylary we beýleki daşky serişdeleri ulanmalydyr.

Antiseptiki we kömelege garşy häsiyetli lukmançylyk amalyňa girizilen tebigy immunitet serişdeleri – fitonsidleri saklaýan ösümlükler hem giňden ulanylýandyr.

Sarymsagyň, soganyň fitonsidleriniň adamda kesel dörediji kömelekleriň ştamlarynyň on üçüsine – fungistatiki, fungisid täsiri ýüze çykarýandygy bellidir. Şol sebäpli soganyň, sarymsagyň fitopreparatlary kömelek keselleri bolan kandidozda kömekçi serişdeler hökmünde giňden peýdalanylýar.

Ösümlüklerden alynýan birnäçe dermanlar Candida albicans toparyndan, droh gornüşli kömelekler bolan altynsöw stafilokokklara garşy ulanylýar. Olar deri we kandidoz kesellerini bejermekde giňden ulanylýandyr. Mysal üçin, şeýle bejergilerde biosediň 1 ml-ni deriniň aşagyna ýa-da myşsadan 20-30 günün dowamynda günde sançmalydyr. Mundan başga-da saburyň ekstrakty, henşeniň, eleuterokokanyň, zamanihanyň ekstraktlary hem ulanylýar. Ýene-de şu maksatlar üçin saparaly 1 gerdejikden 1-2 aýlap ertirine we agşamyna içmelidir. Kömekçi bejergi hökmünde indiki derman ösümlikleri we olaryň ýygyndylary ulanylýar, ýagny: adaty arçanyň miweleri, adaty boýbodronyň oty, dermanlyk bidenegiň ýapraklary, ewkaliptiň yaprakalary, dermanlyk çopantelpegiň gülleri, dermanlyk dyrnaklyjanyň gülleri, gara deregiň we berýozanyň pyntyklary. Bu derman ösümlikleriň çig mallaryndan we ýygyndylaryndan demleme taýýarlamak üçin 1-2 nahar çemçesini bir bulgur (200 ml) gaýnan suw bilen suwly hammamda 5-10 minut gaýnatmaly. 45 minut demläp goýup onuň 1/3 bulgur demlemesini nahardan soň günde 3 gezek içmeli, ýa-da demleme bilen agyzyňy çäýkamalydyr. Zaýаланan ýere hlorofillipt, rozonolom, dyrnaklyjanyň tinkturasyny, berýozanyň we deregiň pyntyklarynyň tinkturalaryny (1:10) çalmalydyr.

Kel keseli

Bu keseliň döreýşi näbellidir. Çaklamalara görä nerwä agram salmalar, ukusyzlyk, agyr gaýgy-aladalar, gormonal bozulmalar, zäherleýji maddalaryň täsirleri, ötüşen ýokanç keselleriň ojaklary (gaýmorit, dişleriň kariýesi, tonsillit), awitominozlar, mikroelementleriň yetmezçiligi we ş.m. onyň döremeginiň esasy sebäpleri bolup bilerler.

Kel keseli dörände ilki bilen kelläniň saçly böleginde birden, yekelikde we köpsanly doly saçyň düşen ojagy ýüze çykyar. Saç düşen ojagy tegelek ýa-da süýnmek görnüşli dürli ululykda bolup biler. Käbir yerlerde olar birigip uly saç düşen bölegi emele getirýär.

Saç düşen yeriniň gyrasyndaky saçlar ýukajyk we tiz düşegen bolýar, deri bolsa üytgemeýär. Keseliň dowamlylygy birnäçe aýdan başlap birnäçe ýyla çenli gidip biler. Saç düşmeklik ýagdaýynda saçyň kadaly ösüşi bozulýar. Kesel duýdansyz bolup geçýär.

Bu keseliň bejergisi uzak wagtlap dowam edýär. Kähalatlarda bejergi netijesiz hem bolýar, esasanam köpçülikleýin saç düşmede. Toplumlaýyn bejergilerde biostimulýatorlary hem ulanynýarlar, ýagny saburyň sanjym üçin niýetlenilen ergini ýa-da biosedi. Bu dermanlar goşmaça täsirleri ýüze çykarmaýarlar. Şol bir wagtyň özünde bejergini 2-4 tapgyrdan geçirmelidir.

Newrotiki ýagdaýlarda sedatiw dermanlary hem bellenilýär. Olardan başga-da demiriň, myşyagyň, fosforyň dermanlary bilen bilelikde witaminli bejergiler hem amala aşyrylýar. Biostimulirleýji serişdelerden henşeniň köki, eleuterokokanyň ekstrakty, manhur aralıýasynyň we gülgün rodiolanyň tinkturalary ulanylýar. Bu ýagdaýlarda fizioterapewtiki bejeriş usullarynyň hem ähmiyeti ulydyr.

Ýerli bejerginiň ähmiýeti saçyň düşen yerleriniň gan damarlaryny giňeltmek bilen dokumalardaky m elichrysi adda çalşygyny sazlaşdyrmak bilen baglanşyklydyr. Bu bolsa saçyň ösmegine mümkinçilik döredýär. Bu maksat üçin ösümliklerden bolan dermanlar gyjyndyryjy serişde hökmünde ulanylýar. Saçyň düşen ojaklaryny repeý, ýagny birýyllyk burçuň spirtli tinkturalaryny, soganyň, sarymsagyň, şeýle-de beýleki derman ösümliklerinden bolan ýyggyndylaryň dermanlaryny çalmalydyr.

Olardan:

Rp: Rad. Arctium 30.0 (Uly lapuhyň köki)
 Fol. Urticae 70.0 (Çit-çitiniň ýapragy)
 M.F.spec. D.S. Ýygyndyny 1 nahar çemçe 1 bulgur gaýnan suwda demleme görnüşinde taýýarlap saçyň düşen ýerlerini ýuwmaly.

Rp: Rad. Arctium 15.0 (Uly lapuhyň köki)
 Herb. Hyperici 15.0 (Jerebaýyň oty)
 Herb. Bidensis 15.0 (Üç bölek goşa dişiň oty)
 Fl. Helichrysi arenarii 10.0 (Gurtgyranyň gülleri)
 Fl. Chamomillae 10.0 (Çopantelpeginiň gülleri)
 Stigmatis Maydis 10.0 (Mekgejöweniň gulgagy)
 Fl. Tancetii 10.0 (Adaty pihmanyň gülleri)
 Rad. Araliae manshuricae 15.0 (Manhur araliýanyň köki)
 M.F.spec.D.S. Demlemäni 1 nahar çemçe 1 bulgur gaýnan suwda demlemeli, 1/2-1/3 bulgurdan günde 3 gezek nahardan 30 min öň içmeli.
 Saçyň düşende we kelliğe peýdalydyr.

Rp: Fol. Plantaginis majoris 10.0 (Uly atgulagyň yapragy)
 Rad. Arctium 10.0 (Uly lopuhyň köki)
 Fl. Calendulae 10.0 (Dyrnaklyjanyň gülleri)
 Herb. Menthae piperitae 10.0 (Dermanlyk narpyzyň oty)
 Herb. Hyperici 15.0 (Jerebaýyň oty)
 Stigmatis Maydis 10.0 (Mekgejöweniň gulgagy)
 Fl. Helichrysi arenarii 10.0 (Gurtgyranyň gülleri)
 Fol. Urticae dioicae 10.0 (Çit-çitiniň ýapragy)
 M.F.spec.D.S. Demlemäni 1 nahar çemçe 1 bulgur gaýnan suwda demlemeli, 1/2 - 1/3 bulgurdan nahardan 30 min öň, günde 3 gezek içmelidir. kelligi bejermekde peýdasy ýokarydyr.

Rp: Herb. Hyperici 15.0 (Jerebaýyň oty)
 Stigmatis Maydis 10.0 (Mekgejöweniň gulgagy)
 Fl. Helichrysi arenarii 10.0 (Gurtgyranyň gülleri)
 Fol. Urticae dioicae 10.0 (Çit-çitiniň ýapragy)
 M.F. spec. D.S. 1 nahar çemçe 200 ml. gaýnan suwda demlemeli.
 Demlemäni 1/2-1/3 bulgurdan nahardan 30 min. öň, günde 3 gezek içmeli. Kelligi bejermekde peýdasy ýokarydyr.

Mundan başga-da, kelligi bejermekde bedeniň ýagtylyga duýýujylygyny ýokarlandyryň serişdelerini ultramelewşe we gün şöhleleri bilen bilelikde utgaşdyrlyp ulanylanda gowy netijeleri berýändigini anykdyr. Olara uly amminiň we pasternagyň dermanlaryny mysal getirip bolar. Jerebaýyň spirtli ekstraktynyň hem şeýle täsiri

bardyr. Kelligi bejermekde bu dermany çalyň, 10-15 minut kwars lampa bilen şöhlendirilýär. Şol bir wagtda näsaga bu ösümligiň şiresini hem içirmelidir.

Saç düşmesi. Bu keseliň ýüze çykmagynyň sebäbi doly öwrenilmedikdir. Ýöne häzirki wagtda seboreý saç düşmesi gipofiziň, jyns mázleriniň bozulmalarynyň netijesinde ýüze çykýanlygy mälimdir. Mundan başga-da oňa nesilegeçijilik sebäp bolup biler. Bu kesel adatça erkek adamlarda 20-30 ýaş aralykda köp ýüze çykýar.

Kelläniň saçly böleginiň seboreýasy, esasan hem, adatça ýagly goňagyň ýüze çykmagy netijesinde başlanyar. Soňra maňlaýyň iki gapdalynyň saçlary seýreklenip, ýuwaş-ýuwaşdan saçsyzlyk emele gelýär.

Kähalatlarda seboreý saçsyzlanmada kelläniň derisinde üýtgame bolup, ol tekizlenýär, ýalpyldaýar we ýukalýar. Goňak ýa-da alawlama hadysalarynda maňlaý we depe deride örgün peýda bolup, soňra ol gijeýär.

Şeýle kesel dörände derman ösümlikleriniň dermanlaryndan bolan biogen stimulyatorlaryny içmelidir. Toplumlaýyn witaminoterapiýa, miwe şirelerini, terje gök-önümleri, şeýle-de mysýagyň, demiriň we fosforyň dermanlaryny ulanmaklyk has-da gowy netijeleri berýär. İç gatamazlygy üçin gowşadyjy täsirli serişdeler bellenýär.

Kelläniň seboreý saçsyzlanmagynda ulanylýan bejergide kelle derisiniň ýag bölüp çykarma ukybyny hem göz önünde tutulmalydyr. Bu bejerginiň netijeliligi ol diýen ýokary bolmasa-da goňagyň emele gelmegi azalyp, saç düşmek hadysasy togtaýar. Adatça şeýle ýagdaýlarda derini mikroblerden aýyryjy serişdeler ulanylanda kelläniň saçly böleginde giperemiýa ýüze çykýar we şonuň bilen birlikde dokumalaryň gan bilen üpjün edilişi gowulanýar. Bu bolsa saç follikulalarynyň işjeňligi sazlaşdyrýar we saçyň düşmegini peselidýär.

Bu kesel ýüze çykanda kelläniň derisine soganyň we sarymsagyň dermanlaryny sürtmek hem-de repeý ýagyny

çalmak gowy netijeleri berýär. Saç ýuwmak üçin düzüminde çopantelpegiň güllerini, dyrnaklyjanyň güllerini, atgulagyň ýapraklaryny saklaýan derman ösümlikleriniň ýygyndylaryny we alawlama garşy täsirli, öýjügiň ýañadan dikelmegini sazlaşdyрма häsiyetli ösümlikleriň dermanlaryny ulanmalydyr. Olardan başga-da, şu maksatlar üçin öňki kelligi bejermekde ulanylýan ýygyndylary ulanmaklyk hem peýdaly bolup biler. Şeýle ýagdaýlarda aşakdaky görkezilen derman ösümlikleriniň ýygyndylary hem gowy netijeleri berip bilerler, ýagny:

Rp.	Rad.	Arctium	30.0	(Uly lopuhyň köki)
	Rad	Inulae	30.0	(Uzyn guzygulagyň köki)
	Herb.	Hyperici	40.0	(Jerebayyň oty)

M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 200 ml. Suw bilen 15 min. gaýnatmaly. 2-3 bulgur gaýnatmany günde adaty örgünjikleri bejermekde ulanylýar.

Rp.	Rad	Arctium	30.0	(Uly lopuhyň köki)
	Fol.	Urticae	70.0	(Çit-çitiniň ýapragy)
M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 200 ml. Suw bilen 15 min. gaýnatmaly. Gaýnatmany depe saçyň düşmeginde kelläni ýuwmak üçin ulanylýar.				

Deriniň iriňleme keselleri. Deriniň iriňlemesi - deri keseli bolup, onuň esasy alamatlary iriňlemedir. Bu kesel giňden ýaýrandyr.

Onuň ýüze çykmagyna deriniň ýokary gatlagyna zeper ýetme, deriniň hapalanmagy, arassaçylyk düzgünleriniň berjaý edilmezligi hem-de sowuk urmak we gaty gyzmak sebäp bolýar. Içki sebäplerden uglewod çalşygynyň bozulmagy (giperglikemiýa), endokrin bozulmalar (gipofizar-böwrek üsti ulgamynyň, galkan görnüşli mäziň işjeňliginiň ýetmezçiligi), nerw ulgamynyň işjeňliginiň bozulmagy (wegetonewrozlar), iýmitlenmegiň bozulmagy (gipoproteinemiýa, A we C gipoawitominozlar), ýiti we dowamly keseller, aşgazan-ıçege bozulmalary we käbir nesile geçiji hadysalar esasy orny tutýandyrlar.

Soňky wagtda deriniň iriňlemesiniň gaýtadan ýüze çykýan görnüşleri bellenilip başlandy.

Onuň geçişinde kesel döredýän bedenjigiň diňe bir häsiýeti uly orny tutman, eýsem-de onuň giň spektr täsirli antibiotiklere-de durnuklylygyny hem bellemelidir.

Häzirki döwürde ötüşen piodermiýanyň A-immunoglobuliniň ýetmezçiligi sebäpli periferik T- limfa ulgamynyň ýetmezçiligi bilen baglanşyklylygy belli boldy. Şeýle hem bedeniň tebigy goraýjy häsiýetiniň peselmegi we çalyşma işjeňlikleriniň bozulmagy oňa sebäp bolup bilerler. Piýodermiýanyň gaýtadan ýüze çykmagyna deriniň bakterisid täsiriniň peselmegi, onuň goraýjy suw-lipid dolanşygynyň bozulmagy, aşgazan-ıçege ulgamynyň we bagyryň keselleri, şeýle-de ötüşen kesel döredijiniň ojagy hem-de ýgy alawlama keselleri sebäp bolup bilerler.

Piodermiýa täsir ediji hadysalara baglylykda 3 topara bölünýärler, ýagny: stafilokokk, streptokokk we garyndyly. Keseliň ýerleşen çuňlugyna baglylykda piodermiýa ýüzleý we çuňňur, geçişiniň häsiýeti boýunça bolsa – ýiti we ötüşen gornüşlere bölünýär.

Stafilodermiýa degişli keseller: ostiofollikulit, sikoz, çuňňur follikulit, furunkul, furunkulez, dokuzdonly, gidra-denit. Streptokokk impetigo keselini döredýär.

Streptostafilokokkly piodermiýasyna bolsa wulgar impetigo, ötüşen ýaraly piodermiýa, şankr gornüşli piodermiýa degişlidirler. Çagalarda we yetginjeklerde streptodermiýa has ähmiýetli, stafilodermiýa bolsa has köp ýaýrandyr.

Şeýle keselleriň alamatlary dürli - dürlidir. Ol keseliň geçiş häsiýetlerine, kesel döredijiniň kesel döredijilik ukybyna, deriniň zaýalanşynyň derejesine we immun ulgamynyň ýagdaýyna we ş.m. baglydyr.

Piodermiýalaryň suratlandyrylyşy dürli görnüşlidir. Streptodermiýa-da keseliň geçiş çäklendirilen häsiýetli, ol üýtgeşik yz galdyрмаýar. Stafilodermiýa tersine saç

follikulalaryny we olary örtýän dokumalary zaýalaýar, ondan başga-da olar ostiofollikulitden başlap has çuňňur iriňli alawlama hadysalaryna aralaşyp bilýar. Kähalatlarda ötüşen we garjaşan piodermiýa ýüze çykýar. Olar belli bir gornüşdäki jemlenen iriňli hadysalary emele getirýär.

Furunkulýozlar (köp sanly we gaýtadan ýüze çykan furunkullar) – ýaýraýan we, toplanýan görnüşlere bölünýärler. Geçiş boýunça olaryň ýiti we ötüşen görnüşleri bolýandyr. Şeýle ýagdaýlarda saç follikulasynyň daşynda açyk-gyzyl reňkli çişler emele gelýärler. 3-4 gije – gündiziň dowamynda furunkuladan iriňli nekrotiki okjagaz emele gelýär. Näsagyň temperaturasy galyp, umumy gowşaklyk, kelle agyry duýulýar. Soňra furunkula kesilip içindäki iriňler akdyrylyp, köki sogrulýar we netijede ol kem-kemden bitýär.

Piodermiýany bejermegiň we onuň önüni almagyň dürli usullarynyň bolmagyna seretmezden bu sorag şu güne çenli çözülmeli zerur meseleleriň biri hasaplanylýar.

Bu keselde arassaçylyk kadalaryny saklamalydyr, dyrnagyny aýyryp, her gün ýoduň spirtli ergini bilen ýumalydyr. Follikulitleri kesip, keseliň ojaklaryny anilin boýaglaryny we kortikosteroidleri saklaýan çalgylary çalmalydyrlar.

Bu keselde derman ösümlükleriniň ýygyndylary hem ulanylýar, ýagny olara şular degişlidirler:

Rp.	Flor.	Chamomillae	50.0	(Çopantelpegiň gülleri)
	Herb.	Melilotus	50.0	(Eşekýorunjanyň oty)

M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 200 ml. Suw bilen 15 min. gaýnatmaly.
Aş görnüşli massa ýaly edip mata dolap yssy wagty näsagyň agyryly ýerine goýulyp buglanýar. Ýumşadyjy serişde hökmünde ulanylýar.

Rp	Flor	Chamomillae	35.0	(Çopantelpegiň gülleri)
	Herb.	Melilotus	35.0	(Eşekýorunjanyň oty)
	Fol.	Althaeae	30.0	(Çerbiýanyň ýapragy)

M.F.spec. D.S. 1 nahar çemçe 200 ml. Suw bilen 15 min. gaýnatmaly.
Aş şekilli massany, mata orap yssy wagty näsagyň agyrlý ýerine ýapyp
buglamaly. Ýumşadyjy täsirli serişde.

Rp.	Fl.	Calendulae	15.0	(Dyrnaklyjanyň gülleri)
	Fol.	Plantaginis majoris	15.0	(Uly atgulagyň yapragy)
	Fl.	Chamomillae	10.0	(Çopantelpegiň gülleri)
	Herb.	Salvia officinalis	15.0	(Dermanlyk bidenegiň oty)
	Herb.	Hyperici	20.0	(Jerebaýyň oty)
	Rad.	Inulae.	15.0	(Uzyn guzygulagyň köki)
	Herb.	Equiseti arvensis	10.0	(Meýdan kyrkbogunyň oty)

M.F.spec. D.S. 1 nahar çemçe 200 ml. Suw bilen 15 min. gaýnatmaly.
1/3-1/2 bulgur demlemäni ýa-da gaýnatmany günde 3 gezek nahara
çenli içmeli. Bu serişde deriniň iriňli kesellerinde peýdalydyr.

**Bu keselleriň toplumlaýyn bejergilerinde antibiotikleri
ulanmaklyk maslahat berilýär: metasiklin, gentamisin,
rifampisin, metasillin, doksisisiklin we ş.m. Şeýle
ýagdaýlarda immunomodulýatorlara hem uly üns
berilýär. Has köp stafilokokka garşy - gammaglobulin,
stafilokokka garşy - plazma ulanylýar. Şol sanda
sulfanilamidiň, nitrofuranyň dermanlarynyň (furaginiň),
vitaminleriň (A, B₁, B₂, B₆, C), demiriň we fosforyň
dermanlaryň, hamyrmaýa we olaryň dermanlarynyň
häzirki wagta çenli ähmiyeti ulydyrlar.**

**Piodermiýada käbir derman ösümlükleri we olaryň
ýyggyndylarynyň peýdalary ulydyrlar. Olaryň mysalynda
şu ýyggyndylary görkezmek bolar, ýagny:**

Rp	Cort.	Querci	50.0	(Dubuň gabygy)
	Rhiz.	Calami	50.0	(Ýeken porrugy)

M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 200 ml. gaýnan suwda demlemeli.
Demleme görnüşinde taýýarlap suwuna ýuwunmaly we agyrlý ýerlere
daňmaly.

Rp.	Herb.	Equiseti arvensis	30.0	(Meýdan kyrkbogynyň oty)
	Flor.	Chamomillae	30.0	(Çopantelpegiň gülleri)
	Herb.	Hyperici	40.0	(Jerebaýyň oty)

M.F.spec. D.S. 2 nahar çemçe 200 ml. gaýnan suwda demlemeli.
Demleme görnüşinde 1/3-1/4 bulgurdan 3 gezek günde içmeli ýa-da
bitmeýän ýaralary ony bilen ýuwmalý.

**Piodermiýany daşky serişdeler bilen bejermekde
himopsini, himiotripsini, dimeksidi, linkomisini, propolis**

we başgalar bilen utgaşdyrylyp ulanylýar. Esasy hem aerosol dermanlaryny (polizol, liwian) ulanmaklyk maslahat berilýär. Ýöne welin uzak wagtlap antibiotik dermanlaryny ulanmaklygyň peýdasy bu keseliň agyr görnüşlerinde ýeterlik däldir. Şol bir wagtyň özünde keseliň gaýtadan ýüze çykmagy hem seýrek däldir. Olar bolsa bu dermatozy bejermekde kämilleşen usullary ulanmagy talap edýär.

Piodermiýany bejermekde iki hadysany göz önünde tutmalydyr, ýagny: antimikrob serişdeler bilen kesel döredijini ýok etmeli we bedeniň goraýjy güýjüni ýokarlandyryjy dermanlary ulanmaly. Şol sebäpli hem piodermiýany bejermekde ösümlikden alynýan dermanlar aýgytly orny tutýarlar. Olarda goşmaça ýaramaz täsirlər seýrek ýüze çykarýarlar we olary beden aňsat özleşdirýär. Şol sebäpli ösümlik dermanlaryny gaýtadan ýüze çykma garşy we uzak wagtlap ulanmak mümkinçiligi bardyr.

Ösümlik ýygyndylarynda şular peýdalanylýar, ýagny:

Rp.	Rad.	Glycyrrhizae	10.0	(Buýanyň köki)
	Rad..	Arctium	15.0	(Uly lopuhyň köki)
	Rad.	Taraxaci	15.0	(Adaty tozganyň köki)
	Herb.	Bidensis	30.0	(Üç bölek goşadişiň oty)
	Rad.	Rubiae	30.0	(Çöpboýanyň köki)

M.F.spec. D.S. 1 nahar çemçe 200 ml. Suw bilen 15 min. gaýnatmaly. 1/2 bulgur gaýnatmany ertir irden içmeli. Diýatezde ulanylýar.

Rp.	Cort.	Frangulae	30.0	(Garatikenin gabygy)
	Rad.	Glycyrrhizae	30.0	(Buýanyň köki)
	Herb	Viola Tricolor	40.0	(Üç gülli benewşäniň oty)

M.F.spec. D.S. 1 nahar çemçe 200 ml. Suwda 15 min. gaýnatmaly. Gaýnatmany 2 bulgurdan günde ekssudatitiw diatezi bejermekde ulanylýar.

Rp.	Rad.	Glycyrrhizae	20.0	(Buýanyň köki)
	Fruc.	Foeniculi	20.0	(Arpabadyýanyň miwesi)
	Cort.	Frangulae	20.0	(Kruşinanyň gabygy)
	Rad.	Arctium	20.0	(Uly lopuhyň köki)

Rad. Taraxaci 20.0 (Aday tozganyň köki)
M.F.spec. D.S. 1 nahar çemçe 200 ml. Suw bilen 15 min. gaýnatmaly.
Gaýnatmany 1/2-1/3 bulgurdan nahardan 30 minut öň, günde 3 gezek içmelidir. Ýmit –siňdiriş agzalaryň we böwregiň işini ýokarlandyrmak üçin deri kesellerinde ulanylýar.

Piodermiýany bejermekde ulanylýan soforanyň tinktury, arnikanyň demlemesi we tinktury, nowoimanin, kalanhoe şiresi, hlorofillipt we beýlekiler antibiotiklere durnukly stafilokokk şamlaryna we beýleki mikrobdenjklere garşy ýokary täsirleri ýüze çykarýarlar. Makleýa ösümliginiň otundan alynan derman sangwiritrin antimikrob we alawlama garşy serişdedir. Ony sargy we liniment görnüşinde deriniň iriňli ýaralaryny bejermekde ulanylýar. Şu maksatlar üçin ulanylan ewkalipt ýagy, gaýnatmasy we onuň tinktury has täsirli netijeleri berýändir.

Jerebaýyň dermany nowoimanin, onuň yagy, tinktury we gaýnatmasy bakterisid hem-de alawlama garşy täsiri, fagositar işjeňligi, şeýle-de dokumalaryň täzeden dikelmegini sazlaşdyryjy täsirleri ýüze çykarmaga ýardam berýärler.

Furunkulýozy bejermekde sitralyň 1% spirtli ergininiň antimikrob täsiri bardyr. Oýjukleriň bitişmegi üçin kalanhoe çalgysy hem ulanylýar.

Piodermiýada ösümlük dermanlaryndan: aloyanyň we atgulagyň şiresi, çasaranyň ýagy, berýozanyň, üç bölek goşa dişiň, jerebaýyň, çopantelpiň, dyrnaklyjanyň, arnikanyň, bidenegiň dermanlary hem giňden ulanylýar. Olaryň hatarynda derman ösümlükleriniň ýygýndylaryny hem görkezmek bolar:

Rp.	Cort.	Frangulae	20.0	(Garatikenin gabygy)
	Fol.	Betulae	15.0	(Berýozanyň yapragy)
	Herb.	Viola Tricolor	15.0	(Üç gülli benewşäniň oty)
	Fruc	Foeniculi	15.0	(Arpabadyýanyň miwesi)
	Rad	Glycyrrhizae	20.0	(Buýanyň köki)

M.F.spec. D.S. 1 nahar çemçe 200 ml. suwda 15 min. gaýnatmaly. j - $\frac{1}{3}$ bulgurdan 3 gezek günde nahardan soň ötüşen iç gatamadan dörän deri örgünlerinde içilýär

Rp.	Cort.	Frangulae	20.0	(Garatikenin gabygy)
	Fol.	Urticae	25.0	(Çit-çitiniň yapragy)
	Sem.	Betulae	25.0	(Berýozanyň tohumy)
	Sem.	Linum	25.0	(Zygyryň tohumy)

M.F.spec. D.S. 1 nahar çemçe 200 ml. gaýnan suw bilen 15 min. gaýnatmaly. Gaýnatmany $\frac{1}{3}$ – S bulgurdan günde 3 gezek nahardan soň içmeli. Ony ötüşen iç gatamada emele gelen deri örgünlerinde içmeli.

Piodermiýada bedeniň tebigy gorayjy we güýjüni berkitmek üçin şu aşakdaky ýygyndylar ulanylýar, ýagny:

Rp.	Rad.	Rhodiolae roseae	20.0	(Gülгүйn Rodiolanyň köki)
	Rad.	Echinopanacii	20.0	(Uzyn zamanihanyň köki)
	Fruct.	Rosae	20.0	(Itburunyň miwesi)
	Herb.	Urticae dioicae	15.0	(Çit-çitiniň oty)
	Fruct.	Crataegi	15.0	(Alyjyň miwesi)
	Herb.	Hyperici	10.0	(Jerebaýyň oty)
M.F. spec. D.S. Demlemäni $\frac{1}{3}$ – S bulgurdan günde 2-3 gezek tonizirleýji, immuniteti ýokarlandyryjy serişde hökmünde ulanylýar.				

Ýokarda getirilen yygyndylardan başga-da bu maksat üçin aloye ekstrakty ýa-da gerdejigi, biosed, eleuterokokanyň ekstrakty, henşeniň tinktury, saparal we beýlekiler ulanylýar.

Piodermiýany bejermekde düzüminde jerebaýyň otuny, üç bölek goşa dişi, çit-çitiniň otuny, berýozanyň pyntygyny, dyrnaklyjanyň we çopantelpegiň güllerini saklaýan yygyndylary ulanmaklyk hem maslahat berilýär. Şol bir wagtda sangwiritriniň 1 gerdejigini nahardan soň bermelidir. Bejergini 10 gün arakesmeden soň ýene-de gaýtalamalydyr. Näsagda utgaşyp gelýän keseller bolan holesistit, holangit ýa-da gepatit bolanda, allaholyň günde

2-3 gerdejigini içmelidir. Bedeniň immunobiologiki häsiýetini ýokarlandyrmak üçin sapaaly 1 gerdejikden ertir we gündiz nahardan soň 2 gezek içmelidir.

Bejerginiň dowamlylygy 20-25 güne çekýändir.

Toplumlaýyn bejergi ýylda 2-3 gezek geçirilýär. Ýerli bejergiler üçin ewkalipt, kamfora, timol we beýleki serişdeleri saklaýan aerözollar hem ulanylýar.

Keseliň gaýtadan ýüze çykmasyna garşy bejergini adatça 3-4 aý geçenden soň, köplenç güýz aýlary geçirilýär. Bu ýagdaýda näsaga 15-20 gezek ultra melewşe şöhlelenmesi we derman ösümlikleriň yygyndylarynyň tinkturasyny, sapaal ýa-da eleuterokokkanyň ekstraktyny bermekligi maslahat berilýär. Şol bir wagtyň özünde yerli kesel döredijiniň (stomatogen, otogen, we başgalar) çeşmesini ýoklamaly, aşgazan-ıcege ulgamynyň kesellerini bejermeli, bagyr we aşgazan asty mäziň kesellerini bejermeli.

Mehaniki gysylmalaryň we sürtülmeleriň netijesinde ýüze çykýan deri keselleri. Bu toparyň kesellerine durmuşda gabat gelýän gündelik täsirleriň netijesinde deride ýüze çykýan näsazlyklary mysal getirip bolar. Olaryň in köp duş gelýän görnüşine gabarçak degişlidir. Ony bejermek üçin esasan-da derman otlaryndan yerli bejergiler ulanylýar. Gabarçak emele gelen yeri terje sabyn otunyň şiresini günde iki gezek çalmaly. Bejergini tä sagalýança geçirmeli. Mundan başga-da plantozan dermanyny çalgy görnüşinde ulanylýar. Bu dermanyň düzümine sabyn otunyň guradylan külkesi lanolin we wazelin girýär. Gabarçak gije - gündiz tä bejerilýänçä çalynýar. Gabarçagy bejermekde ulanylýan gadymy serişdelerden sogan hem bellidir. Onuň terje kerçelen yaşyl ýapraklary disulfidleri saklaýar we keratolitiki täsiri ýüze çykarýar. Gabarçak emele gelen yereine sogany kerçeläp günde bir gezek ýapmaly. Mundan başga-da sarymsak hem gabarçak bejermekde gowy netijeleri berýär. Ony kerçgeläp ýapmaly. Halk lukmançylygynda gowy

netijeleri pomidor hem berýär, ýagny ony gabarçak emele gelen ýerine ýapmaly.

Gabarçak bejermekde käbir derman ösümliklerini içmek usulynda ulanýarlar. Şeýle ösümliklere dyrnaklyja degişlidir. Bu maksat üçin onuň otunyň 2 çay çemçesini 2 bulgur gaýnan suwda demlemeli. Ony günüň dowamynda deň derejede bölüp içmelidir. Bejergini 3-4 hepde dowam etdirmelidir.

Gyzgyn görkezijiniň üýtgemeginde ýüze çykyan deri keselleri. Pes ýa-da ýokary gyzgyn görkezijiniň üýtgemeginiň täsiri esasynda deride her hili özgermeler bolup bilerler, olara sowuk urma, bedeniň ýanmagy we ş.m. mysal bolup bilerler.

Pes temperaturanyň netijesinde deride ýüze çykan sowuk urma keselini bejermekde şu derman ösümlikleri ulanylýar.

Dyrnaklyja. Bu ösümligiň tinkturasynyň 1 çay çemçesini 500 ml suwda garyp, zaýаланан ýere günde 1-2 gezek ýapmaly. Bu ösümlük sowuk urmany bejerýär we deride yz galdyrmaýar.

Süle. Süläniň samanyň gaýnatmasyny taýýarlamak üçin onuň 0,5 - 1 kg samanyň 30 minudyň dowamynda birnäçe litr suwda gaýnatmaly. Soňra alynan gaýnatmany suwda ýuwunmak üçin ulanylýar.

Dub. Onuň gabygynyň gaýnatmasyny (500 g ownadylan gabygyny 30 min 3-4 l. suwda gaýnatmaly) ýuwunmak üçin niýetlenen suwa goşulýar ýa-da bu gaýnatmany deň derejede suw bilen garyp sowuk uran ýere ýapmaly. Şeýle-de ony iç ýuwmak üçin hem ulanmak bolýar.

Hoz. Sowuk uranda we üşütdirmede ulanylýar:

Rp. Fol. Juglandis	(Hozyň ýapragy)
Flor. Chamomillae aa 50.0	(Çopantelpiň gülleri)
M.F. spec. D.S. 1 nahar çemçe çig maly 1 bulgur suwa demlemeli. Günde 1-2 gezek bedeniň sowuk uran ýerine ýapmaly.	

Bejergini 12 gün dowam etdirmeli.

Çopantelppek. Onuň düzümindäki hamazulin sowuklama garşy, agyry aýryjy we täzeden dörediji täsiri ýuze çykaryp, sowuk uran bedeniň ýerini bejermekde giňden ulanylýar.

Çit-çiti. Bu ösümligiň guradylyp we külke şekilli ownadylan yapraklaryny ýapgy görnüşinde ulanylýar.

Bedeniň sowuk urup zaýаланan yerine çalmak üçin bir ýyllyk burç hem ulanylýar. Ony günde 2 gezek çalmalydyr.

Rp. Flor. Chamomillae		(Çopantelpeginiň gülleri)
Fol. Juglandis aa	50.0	(Hozyň ýapragy)
Fol. Cotini		(Skumpiýanyň ýapragy)
Cort. Querci aa	40.0	(Dubuň gabygy)

M.F. spec. D.S. Bedeniň sowuk uran ýerine ýapgy etmeli ýa-da onuň bilen ýuwmaly. Soňra ol ýerik zeýtun ýagyny çalmaly.

Gorçisa. Bedeniň sowuk uran yerini gorçisa spirti bilen tä öňki durkuna gelyänçä owkalamaly.

At kaştany. Bu ösümligiň Aescuvasin sol. atly dermanynyň 20 damjasyny günde 2 gezek 20 günün dowamynda içmeli ýa-da Aescuvasin comp. dermanyny 10-15 damjadan günde 3 gezek içmeli. Bejerginiň gowy netijeleri bermegi bu dermanlaryň düzümindäki kaştanyň we rýabinanyň damarlara ýeňil berkediji täsir etmegi bilen baglanşyklydyr.

Ýokary temperaturanyň täsir etmegi netijesinde bedende ýanyklar (Combustio) döreýärler. Bu kesel deri keselleriniň ulgamynda has-da köp ýaýrandyr. Derman otlarynyň serişdeleri bilen bejermeklik ýanygyň derejesine (çuňlugyna) baglydyr we şeýle maksatlar üçin köp sanly derman ösümlikleri ulanylýandyr. Mysal üçin:

Dub. Bu ýanykly näsaglary bejermekde giňden ulanylýan belli serişdeleriň biridir.

Çit-çiti . Bu ýanygyň pes derejelerinde ulanylyp, deriniň bitişini çaltlandyrýar. Ýanygyň I derejesinde ýapgy

**goýulanda agyry aýryjy täsiri hem ýüze çykarýar. Bu
ösümligiň tinkturasy we onuň beýleki dürli derman
gornüşleri hem şu maksatlar üçin ulanylyp biliner,
ýagny:**

**Rp. Fol. Urticae droicae 10,0/200,0 (Çit-çitiniň ýapragy)
D.S. 8 çay çemçe ownudylan ýapraklaryny 1 bulgur gaýnan
suw bilen demlemeli. Günde 3 gezekden 10-12 günün
dowamynda ýapgy etmeli.**

**Jerebaý. Ol ýag görnüşinde çalynyp ulanylýar. Onyň 20
g terje güllerini 200 g zygyr ýa-da günebakar ýagy bilen
taýýarlanylýar. Ony 14 günün dowamynda tiz-tizden
garyşdyryp saklamaly. Soňra zaýаланan bedeniň yerini
günde 2 gezekden 10 günün dowamynda çalmalydyr.
Bu yagyň ergin bölegini günde 1-2 gezek ýagly ýapgylyr
üçin ulanmaklygy maslahat berilýär. Onuň dokumalary
dikeldiji täsiri bardyr. Mundan başga-da jerebanyň
alawlama garşy antibakterial häsiyeti bardyr. Onuň
bejeriji häsiyeti düzümindäki reňk beriji madda –
giperisin bilen baglanşyklydyr. Jerebaýyň ýagy we onuň
dermanlary imanin ýanygyň II we III derejelerinde
giňden ulanylýar. Mundan başga-da jerebaýdan alynan
antibakterial derman – nowoimanin giňden ulanylýar.**

**Kartoşka . Ony ownujak kerçgiläp, bedeniň ýanan
ýerine ýapgy etmeli.**

**Dyrnaklyja. Onuň tinkturasyny günde 1-2 gezekden 7-
10 günün dowamynda ýapgy etmelidir. Onuň güllerini
demleme (1 çay çemçe demlemesini 1 bulgur suwa
guýmaly) görnüşinde ýapgy etmeli ýa-da günde 1-2 gezek
7-10 günün dowamynda oňa näsagy ýuwmaly.**

**Dyrnaklyjanyň güllerini ýene-de çalgy gornüşinde-de
ulanylýar.**

**Gara derek . Esasanam ýanykda çalgy gornüşinde
ulanylýar:**

Rp. Cernmarum populi (Deregiň pyntygy)

Lanolini aa 15.0 (lanolin)

M.F. ung. D.S. Günde 1 gezek bedeniňe çalmak bilen

ulanylýar.

Kazanlyk bągüli. Rozalin dermany bu ösümlikden taýýarlanýar. Ol I we II derejeli ýanyklary bejermekde ulanylyar.

Rp. Ung. Rosalini

D.S. Günde 2 gezek çalmaly.

Ýapon soforasy. Onuň ýetişen miweleriniň 1 bölegini 56^o etil spirtiniň 5 bölegi bilen 10 gün goýmaly. Ony ýanan bedeniň yerine esgä siňdirip ýapmaly. Bejergini tä deri dikelyänçä günde 2-3 gezekden dowam etdirmeli.

Gaýtarma. Bu oty şu dermannama boýunça ulanylýar, ýagny:

Rp. Tinct. Potentillae tormentillae 20.0 (Gaýtarmanyň tinkturasy)

D.S. Günde 1-2 gezekden 20-30 damjadan 7-10 günün dowamynda çalmaly.

Ony şol bir wagtyň özünde ýuwunmak üçin hem ulanylsa bolýar. Onuň üçin 1 nahar çemçe gaýtarmanyň ownadylan köküni 1 bulgur gaýnan suw bilen garyp, 30 minutlap otda saklamaly we soňra 2 sagat basyryp goýmaly. Süzeniňden soň ony ýuwunmak üçin ulanylmaly. Bejergi günde 1-2 gezekden 7-10 günün dowamynda amala aşyrylýar.

Çopantelpek. Çig malyň 2-3 nahar çemçesini 500 ml gaýnan suw bilen 1 sagat berk yapyp goýmaly. Günde 2-3 gezekden ýuwunmaklyk üçin ulanmaly. Demleme yerli agyry aýryjy täsir edýär.

Käkilik oty. Ony ýapgy etmek bilen günde 2-3 gezek ulanylýar.

Beýi . Onuň tohumynyň suw bilen 5:100 gatnaşykda demlemesi taýýarlanýar. Demleme ýanygy gowy bejerýär.

Ony günde 1-2 gezekden calmalydyr.

Zygyr hem ýanygy bejermekde ulanylýar. Zygyryň çigidinden gaýnatma taýýarlanyp yapgy edilýär ýa-da

onuň çigidiniň külkesi ulanylýar. Ol lenitol we linol ýaly dermanlaryň düzümine hem girýär.

Kendir. Ol cannabiniň çalgynyň düzümine girip, yanygy bejermekde üstünlikli ulanylýar.

Sabur . Onuň terje yapraklarynyň şiresini yanyga çalsaň kömek edýär.

Çernika. Onuň miweleriniň gaýnatmasy ýanykda peýda-lydyr.

Ýanygy bejermekde ulanylan derman ösümlikleriň ýyggyndysynyň käbirleriniň şeýle düzümleri bardyr:

Rp. Flor. Chamomillae	10.0	(Çopantelpek gülleri)
Flor. Calendulae	15.0	(Dyrnaklyjanyň gülleri)
Flor. Millefolii	25.0	(Boýbodranyň gülleri)
Flor. Hyperici	50.0	(Jerebaýyň gülleri)

M.F. spec. D.S. Terje ösümlikleriň gülleri 2 litr zeýtun yag bilen garyp 40 gün goýmaly. Ýanyk ýere günde 1 gezekden tä

deri doly bitýänçä çalmaly.

Ak selbital. Onuň demlemesi (1 çay cemçe ownadylan gabygyny 2 bulgur sowuk suwda 8 sagat saklamaly) ulanylýar.

Dermanlyk bidenegi derlewükligi bejermekde gowy serişde hasaplanylýar.

Rp. Pulv. Solvia	0.5	(Bidenegiň külkesi)
Ac. Tannici	0.1	(Tanin)
Sacchari	1.0	(Gant)

M.F. Pilula D.t.d № XXX

D.S. 1 gerdejikden agşam ýatmazyňdan öň içmelidir.

Derlewüklikde lipa, buzina, çopantelpek, grek hozunyň yapraklary gowy serişdeler hasaplanylýar. Olaryň suwuna ýuwunylýar.

Ýerli ulanmak üçin bägül suwy (aqua rosarum) hem peýdalydyr.

**Gün şöhleleriniñ emele getiren dermatitini bejermek
üçin ýagtylyga duýujylygy güçlendiriji täsirli derman
ösümlikleri bolan pasternak, psoroleýa we şuna
meñzeşleri ulanmak bolmaýar. Sebäbi olar patologiki
üýtgeşmeleri kynlaşdyryp, bejergini
çylşyrymlaşdyrýarlar.**

**Gün şöhleleriniñ emele getiren dermatitini bejermekde
at kastanynyň dermanlarynyň ýokary bejergilik täsiriniň
bardygy bellidir.**

Rp. Aescuvasini liq.		(Eskuwazin şiresi)
Lanolini		(Lanolin)
Vazelini	aa	5.0 (Wazelin)
Aquae destillatae	30.0	(Arassalanan suw)

**M.F.spec.D. S. Zaýalanan ýeri bejermek üçin günde 2 gezek
çalmaly.**

**Käşir. Onuň ýer asty miwesini keriçgeläp terjeligine
günde iki gezek ýapgy etmeli.**

**Hytaý çayy. Ony gün şöhleleriniň täsirinde öň ulanmak
maslahat berilýär. Deriniň şöhläniň täsirinde ýanan
halatynda ajy demlenen çayy sowadyp, süzüp, ýapgy
etmeli. Ýapgyny günde 2 gezek gaýtalap, 30 minutdan
saklamaly.**

**Beden örgünlerini ýüze çykarýan deri keselleri hem
giňden ýaýrandyr. Olaryň ilkinjisine deri gijilewügi
girýär.**

**Gijilewük keseli allergodermatozlara degişlidirler.
Onuň bejergisinde rahatlandyryjy, gijemä garşy ösümlik
serişdeleri ulanylýar.**

**Waleriananyç porrugynda walepotriatlaryň bolmagy
rahatlandyryjy täsiri ýüze çykaryp, onuň gijilewükde
giňden ulanmaga doly mümkinçilik berýär.**

**Bu keselde gijemä garşy täsiri ýüze çykarýan çit-çiti,
guzygulak hem ulanylýar.**

**Şeýle ýagdaýlarda birnäçe dermannamalar hem
ulanylýandyr:**

Rp. Rad. Althaea conc. (Çerbiýanyň köki)

Fol. Althaea conc. (Çerbiýanyň ýapragy)

Rad. Jnulae helinii conc. aa25.0 (Guzygulagyň köki)

M.D.S. 2 çay çemçesini 2 bulgur sowuk suwda 8 sagat demlemeli. Günde 2 bulgurdan 2-3 hepde içmeli.

Guzygulagy başga usul boýunça-da ulanmak bolýar: ýagny onuň 50 g ownadylan köküni 100 ml suw bilen 20 minut gaýnatmaly. Gaýtanmany süzüp 50 g eredilen iç yag bilen garyşdyrmaly. Ony çalgy üçin ulanmak bolar.

Narpyzyň 2% spirtli çykyndysyny çalmak üçin ulanylýar. Ol gijemä garşy, agyry aýyryjy täsiri ýüze çykarýar. Bu ösümlük diňe bir antimikotiki täsiri ýüze çykarman eýsem antitoksiki täsiri hem bardyr.

Mekgejöwen bu keselde şeýle dermannama görnüşinde ulanylýar, ýagny:

Rp. Stigm. Maýdis 10.0 (Mekgejöweniň gultagy)

D.S. 1 bulgur gaýnan suwda demlemeli we 1 nahar çemçesinden her 3 sagatdan içmeli.

Lopuhýň gaýnatmasyny taýýarlamak üçin onuň 2 nahar çemçe ownadylan köküni 500 ml suw bilen ýarym sagat gaýnatmaly we soňundan sowadyp süzmeli. Alynan ergini zaýаланan ýere yapgy etmeli.

Şeýle häsiyeti gara derek hem ýüze çykarýar. Ondan calgy yasalýar.

Rp. Fol. Farfarae (Eje-ejeligiň ýapragy)

Fol. Urticae dioicae aa 100.0 (Çit-Çitiniň ýapragy)

M.F. spec. D.S. Daşky ulanmak üçin onuň 3 nahar çemçesini 500 ml suwda 30 minutlap gaýnatmaly. Ony deriniň gijeýän ýerini ýuwmak üçin peýdalanyp bolar.

Melissa. Onuň demlemesini içmeli ya-da spirtli çykyndysyny çalmaly.

Gijilewükde umumy suwa ýuwunmak iň gowy bejeriji usul hasaplanylýar. Bu maslahat üçin arçanyň ekstraktynyň 4 nahar çemçesini, sosnanyň miweleriniň

şahalarynyň 10% gaýnatmasyny, zygyryň tohumynyň gaýnatmasyny, hozuň yapraklaryny, çopantelpiğiň güllerini ýuwunmaklyk üçin niýetlenilen suwa goşmalydyr.

Suwbaşy. Suwbaşynyň bejergisinde beýleki allergo-dermatozlarda bolşy ýaly allergeni anyklamaga we ony ýok etmäge çalyşmalydyr. Bu ýagdaýda bolsa köp sanly derman ösümlüklerini ulanyp näsagyň we keseliň aýratynlygyny göz önünde tutup amatlysyny saýlamaly bolýar. Bu keselde lukman diňe bir allergiýa garşy täsiri ýüze çykarýan ösümligi ulanman eýsem-de rahatlandyryjy, sowuklama, gijemä garşy, agyry aýryjy we dermatonizirleýji täsiri ýüze çykarýan derman ösümlüklerini hem ulanmalydyr.

Şu maksatlar üçin giňden ulanyl ýan otlaryň görnüşleri aşakda görkezilenlerden ybaratdyr.

Borjak. Ol adrenaline meňzeş täsiri ýüze çykarýar. Onuň otundan demleme taýýarlanyp içilýär. Ony taýýarlamak üçin onuň 2 g otuny bir bulgur gaýnan suwda 24 sagatlap goýmaly we süzeniňden soň ulanmak bolýar.

Çit-çiti hem ekzema garşy gowy serişde hasaplanýar.

Buýan. Lukman üçin onuň kökünde 20-den köpräk flavonoidleriň bolmagydyr. Olaryň has gymmatlysy – glisirizin turşusydyr. Ol antigistamin, antiflogistiki we kortizon täsiri ýüze çykarýar.

Buýanyň gaýnatmasyny günde 50 ml-den 4 gezek nahardan ön içmelidir. Ol gaýnatmany taýýarlamak üçin onuň 1 nahar çemçe ownadylan kökünü 500 ml suwda 30 minutlap gaýnatmaly.

Boýbodran. Bu ösümligiň anti allergiki täsiriniň bardygyny barlaglaryň netijesinde anyklanyldy. Onuň gaýnatmasyny taýýarlamak üçin 2 nahar çemçe otunyň üstüne 500 ml gaýnag suw guýup 1 sagat saklamaly, ondan soň sowadyp, süzmeli we günde 50 ml-den 4 gezek nahardan ön

içmeli. Mundan başga-da ony deriniň zaýalanan ýerini ýuwmak üçin ulanylýar.

Sypyljyrap duran ekzemyň bejermekde gaýnatma has köp peýdaly, ony şu dermannama görnüşinde ulanmalydyr.

Rp. Rhiz. Potentillae tormentillae 100.0 (Gaýtarmanyň porrugy)

D.S. 1 nahar çemçe köki 1 bulgur gaýnag suw bilen 30

minutlap gaýnadyp 2 sagat saklamaly. Süzüp günde 2 gezek

10-12 günün dowamynda bedeniňe çalmaly.

Tozga. Bu ösümlik köp taraplaýyn täsirli gadymy ösümlikdir. Onuň allergiýa garşy täsiri halk lukmançylygynda tassyklan. Onuň terje ýapraklary içdä açar görnüşinde, limon şireleri we zeýtun ýagy bilen bilelikde ulanylýar. Bu ösümliğin kökünü we otyny hem şu maksatlar üçin ulanmak bolýar. Onuň gaýnatmasyny taýýarlamak üçin otunyň 1 nahar çemçesini 400 ml gaýnan suw bilen 2 sagat demläp goýmaly. Süzülenden soň günde 50 ml 4 gezekden nahardan öň içmeli.

Ekzemyň bejermekde çopantelpegiň gülleriniň demlemesi ya-da gaýnatmasy ýerli we içmek üçin ulanylýar, şeýle-de ol allergiýa garşy täsiri hem ýüze çykarýar.

Dyrnaklyjanyň oty we gülleri zeýtun ýagynda çalgý hökmünde ulanylýar.

Jerebaý. Bu ösümliğin otundaky flavonoidleriň sowuklama garşy täsiri bar. Şol sebäpli döredilen dermanlar Retlavit (nogul) – allergozlarda we dermatitlerde giňden ulanylýar.

Bugdaý. Bugdaýyň dänesiniň enzimleşdirilmeginiň esasynda döredilen “Mitrosiniň ergini” dermany ekzemyň bejermekde giňden ulanylýar. Ol goýy ergindir. Ony nah matadan edilen sarga siňdirilip ýyljajyk ýapgy etmeli.

Hozyň ýapraklaryny günebakar ýagy bilen basyryp 7 gün goýmaly we soňra 3 sagatlap suwly hammamda gaýnatmaly. Çalgý üçin ulanylýar.

Ajy ýowşan otundaky hamazulen maddasy retikulo-endotelial ulgamynyň we fagositar funksiýanyň aktiwatory hasaplanýar. Ony ekzemyň we ýara keselini

bejermekde ulanylýar. Hamazuleniň hasabyna, allergiýa garşy täsiri ýüze çykarýan derman – dimetulen döredilendir.

Mundan başga-da ekzemany bejermekde guzygulak, çit-çiti, ýakymlyja ýaly derman ösümlikleri ulanylýar.

Rp. Herb. Origani 200,0 (Ýakymlyjanyň oty)
D.S. Ösümligiň otuny 3 l gaýnan suw bilen demlemeli we ony suwa düşünmek üçin ulanmaly.

Uly atgulak. Ekzemany bejermekde terje ýapraklary kerçip zaýаланan ýere günde 2-3 gezek ýapmaly. Kartoşkanyň kerçip ulanmak hem peýdalydyr.

Narpyz. İçgi hökmünde 2 nahar çemçe narpyzy 500 ml gaýnan suw bilen 1 sagat demlemeli. Günde 50 ml 4 gezekden içmeli. Mundan başga-da demlemäni ýapgy etse-de, agyz çaykasa-da, ýuwunsa-da bolýar.

Mör-möjekler çakanda ýüze çykýan deri keselleri

Bu keselde ulanylýan derman ösümliklerine şular degişlidirler, ýagny:

Dag kākilik oty. Ösümligiň terje şiresi bal arylary çakanda peýdaly. Bu ýagdaýda gijeme we suw ýygnanma tizden-tiz azalýar.

Sogan. Ony kerçgiläp bal arylar we beýleki arylar çakanda ýapgy etmeli. Şeýle-de sarymsagy hem kerçgiläp ýapgy edilende peýdalydyr. Mundan başga-da badyýanyň ýapraklaryny kerçgiläp şiresinden ýapgy etmekligiň uly peýdasy bardyr.

Malina. Malinanyň güllerini zeýtun ýagynda 20 günläp saklamaly. Soňra alynan tinkturalary zaýаланan ýerlere çalmalydyr.

Atgulganyň ýapragyny kerçgiläp ýapgy edilende bejeriş gowy netijeleri berýär.

Gara buzina möý çakanda peýdalydyr. Onuň miwesinden we kökünden gaýnatma taýýarlanyp suwuna düşmek üçin ulanylýar.

Dyrnaklyjanyň güllerinden demleme ýa-da çalgý taýýarlap mör-möjekler çakanda ýüze çykan dermatit bejerilýär. Şeýle hem bu ýagdaýy kartoşkanyň dermanlary bilen hem bejerilýär.

Iriňli häsiýetli deri keselleri

Furunkul. Şeýle keselli näsaglary bejermekde halk we ylmy lukmançylygynda birnäçe derman ösümlikleri ulanylýandyr. Olara şulary mysal getirip bolar, ýagny:

Lopuh uly. Onuň gaýnatmasy, demlemesi ýa-da repeý ýagy ulanylýar.

Eşekýorunja. Onuň 1 nahar çemçe otuny 300 ml gaýnag suwda 2 sagat goýmaly we süzüp günde 50 ml-den 3 gezek nahardan öň içmeli.

Dermanlyk krowohlebka. Bakterisid täsiri ýüze çykarýar. Onuň kökünüň we porrugynyň gaýnatmasy ulanylýar.

Kazanlyk bągüli. Ol grampoložitel we gramotrisatel mikrobedenjikleri ýok edýär. Şu maksatlarda bągül ýagy hem peýdalydyr. Onuň esasynda alynan derman – Ung. Rosalini has hem peýdalydyr.

Dyrnaklyja güllerinden taýýarlanan dermanlar dokuzdonly keselinde üstünlikli ulanylýar.

Çopantelpek demleme we gaýnatma görnüşinde furunkulary bejermekde ýerli ulanylýar.

Lipa. Bu keselleri bejermekde şu dermannama görnüşinde peýdalanylýar.

Rp Inf. Fol. Tiliae 10,0/200,0 (Lipanyň gülüniň demlemesi)
D.S. daşky serişde (ýumşak ýapgy üçin) günde 2-3 gezekden ulanylýar.

Badamjan. Onuň bişmedik miwesiniň şiresini günde 2-3 gezek çalmak üçin ulanylýar. Onuň antimikrob täsiri bar.

Jerebay. Onuň mikroba garşy täsiri bardyr. Onuň dermanlary bolan imanin we nowoimanin antibiotiklere durnukly mikrobedenjklere garşy ulanylýar we bu ösümlik şeýle keselleri bejermekde gowy serişdeleriň biri hasaplanylýar.

Az sanly furunkullary ýerli bejermek üçin derman ösümlikleriniň demlemeleri, gaýnatmalary, ýapgyly we çalgylary ulanylýar. Şeýle ösümliklere dermanlyk melissany, atgulagyň dürli görnüşlerini mysal getirmek bolar.

Eje-ejeliň terje ýapraklaryny kerçgiläp süýt bilen garyp ýapgy etmeli. Kartoşkany kerçip ýapgy etmeli.

Ak berýoza. Onuň tinkurasyny suwa düşmek üçin ulanylýar. Onuň 1 çay çemçe pyntygynyň S bulgur gaýnan suwda taýýarlanan demlemesini içmek üçin ulanylýar. Onuň dermanlary deriniň başyny bejermekde ulanylýar.

Rp. Gemmarum Betulae 25,0 (Berýozanyň pyntygy)
D.S. 1 çay çemçe pyntygy S bulgur gaýnagda demlemeli.
Günde çay ýalysyny içmeli.

Garatiken hem furunkullary bejermekde ulanylýar.

Rp. Cort. Frangulae 50,0 (Garatikenin gabygy)
D.S. Onuň 1 nahar çemçe ownadylan gabygyny 500 ml suw bilen min gaýnatmaly. Gaýnatmany sowadyp günde 2-3 gezek zeperlenen ýeri ýuwmaly.

Dokuzdonlyny bejermek. Bu maksat üçin derman ösümliklerden dyrnaklyjanyň täzeje kerçilip alynan şiresi peýdalydyr. Atgulagyň ýapraklaryny kerçip şiresini günde 2 gezek ýapgy etmelidir.

Beýiniň çigidinden we suwundan taýýarlanan nemi hem peýdalydyr.

Absessli näsaglary jerebaýyň dermanlaryny içmek we ýerli ulanmak bilen bejermek maslahat berilýär.

Panarisa. Panarisini bejermek üçin şu dermannamany ulanmaly:

Rp. Flor.Chamomillae 50,0 (Çopantelpegiň gülleri)
D.S. 1-2 nahar çemçe gülleri 0,5 l gaýnan suw bilen 15 min demläp goýmaly. Ony günde 3 gezek hammamça kabul etmek we ýapgy üçin ulanmaly.

Rp. Cort. Querci (Dubyň gabygy)
Rhiz.Calami aa 50,0 (Süýji ýekenin porrugy)
M.F.spec.D.S. 1-2 nahar çemçe ownadylan çig maly 30 min S suwda gaýnatmaly. Sowadyp, süzüp günde 2-3 gezek suwuna düşmeli ýa-da ýapgy üçin ulanmaly.

Agzyň gyrasyndaky jaýryk. Bu keselde ösümlikler gözellik maksatlary üçin ulanylýar. Olaryň mikroba garşy we ýara bitirişini gowulandyryjy täsirleri bolmalydyrlar.

Şu maksatlar üçin dynaklyjanyň güllerinden demleme (1:5) taýýarlanylýar, günde 2 gezek 10 günün dowamynda çalmaly. Ýa-da onuň kökünden taýýarlanan gaýnatmany günde 2 gezek 5 damja zaýаланan agzyň gyrasyna damdyrmaly. Çagalara bideneginiň ýapraklarynyň demlemesini içirmeli ýa-da ýerli ýuwunmak üçin ulanmaly. Bu keseli bejermekde benewşe, aýy ýowşan we beýleki ösümlikler hem peýdalanylýar.

Wirusyň we mugthorlaryň ýüze çykaran deri keselleri

Adaty siňňil. Bu maksat üçin antiwirus häsiýetini ýüze çykarýan ösümlikler ulanylýar. Mysal üçin şu ýagdaýlarda içmek üçin

Melissa şu aşakdaky dermannama boýunça ulanylýar:

Rp. Herb.Melissae 200,0 (Melisäniň oty)
D.S. Onuň 2 nahar çemçesini 400 ml gaýnan suwda 1 sagat demlemeli we günde 50 ml-den 3 gezek nahardan ön içmeli.

Sabyn oty. Terje ösümligiň şiresini siňňile çalmaly ýa-da şiresini iç ýag bilen (1:10) garyp çalgy taýýarlamaýly.

Sogan. Ony kerçäp siňňile ýapgy etmeli tä aýrylýança ony gaýtalamaly.

Sarymsak. Ony kerçäp şiresini iç ýag bilen deň derejede garyp siňňile ýapmaly.

Mundan başga-da antimikrob täsiri ýüze çykarýan derman ösümlikleri dürli deri kesellerinde hem ulanylýar. Olara batgaly air, injir, pomidor we başgalar degişlidirler.

Gijilewük. Gijilewük keselini derman ösümlikleri bilen bejerilşi gadymdan bellidir. Gijilewüğe garşy täsiri sarymsagyň we aýy ýowşanyň terje otuny kesip şiresini ýapgy edilýär ýa-da çalgy ýasalyar (wazelin bilen onuň gury ýapraklary garylýar). Bu keseli bejermekde ýene-de ak berýozanyň we adaty sosnanyň şepbigi ýa-da ondan taýýarlanan 10-30% çalgy ulanylýar. Arçany ýa-da onuň efir ýagyny günde 2 gezek çalmaly. Bu keselde ýene-de guzygulagyň kökünü iç ýag bilen garyp çalgy taýýarlanylýar. Ony günde 2 gezek çalmaly ýa-da kulkelenen kökuni zeýtun ýagy bilen (1:10) garyp çalmaly, şeýle-de onuň gaýnatmasyny içmeli.

2. 11. Gözellikde ulanylýan derman ösümlikleri

Derman ösümliklerinden taýýarlanan gözellik serişdeleri halk arasynda giňden ýaýran we gadymdan bellidir. Olar deri keselerinde emele gelen gözellik üýtgemelerini bejermekde giňden ulanylýar.

Saç düşme keselininiň ösümlikler bilen bejerilşi
Köp sanly gözellik bozulmalary saç düşme keseli bilen baglansyklydyr. Deri ýagynyň köp mukdarda çykarylmany we onuň önüminiň bozulmagyna seboreý keseli sebäp bolýar. Bejerilişiň maksady ýag mázleriniň işlerini sazlaşdyrmakdan ybaratdyr. Köp sanly derman ösümlikleri seboreýa garşy täsiri ýüze çykarýarlar.

Uly lopuh. Ol täzeje gaýnatma görnüşinde seboreýa garşy serişde hökmünde gözellik lukmançylygynda ulanylýar. Onuň 1 çay çemçesi 1 bulgur suwa guýulyp taýýarlanan gaýnatmasyny günde 2-3 wagtyňa içmeli.

Häzirki wagtda lopuhyň kökünden taýýarlanan demlemesi hem şol maksatlar üçin ulanylýar. Onuň üçin lopuhyň 1 çay çemçesini 400 ml gaýnan suw bilen garyp 1 gije-gündiz demlemeli we deň böleklere bölüp günde içmeli. Demlemesi ýuwmak we ýapgy üçin hem ulanylýar.

Onuň demlemesi zeýtun we badam ýaglary bilen hem (1:10) taýýarlanylýar.

Sarymsak. Damja görnüşinde onuň tinkturasy iýmite goşulýar. Onuň bu kesele peýdalylygy düzümindäki efir ýagynda kükürdiň bolmagy we ösümliğin keratolitiki häsiýetiniň bolmagy bilen baglansyklydyr.

Adaty hren. Onuň terje köküniň şiresini 100 g bal bilen garyp günde 1-2 çay çemçesinden içmeli ýa-da hren şerabyny taýýarlamaly: 100 g ownadylan köküni 400 ml şerapda saklamaly. Ony günde 2 nahar çemçeden içmeli ýa-da deriniň zaýаланan ýerine çalmaly.

Dyrnaklyjanyň gülleriniň spirtli tinkturasy hem bu keseli bejermekde ulanylýar. Ony suw bilen garyp, ýüzüň ýagly seboreýasynda taýýarlanan ergine ýuwunmaly.

Badam. Badam uny ýa-da badam ýagy görnüşinde seboreýa garşy täsiri ýüze çykarýar:

Rp. Sulfurus precipitati	5,0	(Arassalanan kükürt)
Flor. Amygdalari	10,0	(Badamyň gülleri)
Lanolini	40,0	(Lanolin)
Ol Rosae gtt.	11,0	(Bägül ýagy 11 damja)
M.F.ung. D.S. Çalgý edip günde 2-3 gezekden ulanmaly.		

Çakjagunduz. Onuň ýagy skipidar bilen deň mukdarda garylanda we aktiwator höküminde margensiň sulfatyny goşanynda bejeriş täsiri bardyr.

Seboreý keselini bejermekde derman ösümlükleriň ýerli täsir etmegi, onuň ýüze çykaran gözelligi üýtgemelerini bejermäge we keseliň ötüşmeginiň önüni almaga esaslanandyr. Olara mysal edip şu aşakdakylary görkezmek bolar.

Gury derili ýüzler. Olary bejermeklik üçin efir ýaglaryny saklaýan derman ösümlüklerini ulanmak amatlydyr. Esasanam bu ýagdaýlarda dermanlyk melissanyň we narpyzyň ýapraklaryny, badyýanyň köki we miwesi, çopantelpegiň güllerini, kākilik otunyň güllerini we ýapragy ulanylýar. Olar düzüminde nem saklaýan derman ösümlükler bolan sygyrguýrugyň, dermanlyk çerbiýäniň we eje-ejeligiň kökleri ýa-da beýiniň çigidi bilen utgaşdyryp ulanylsa has amatly hasaplanylýar. Ady agzalan ösümlükler kerçgiläp şiresi alynýar we derä çalynýar ýa-da ýapgy edilýär. Ony 10 gezek gaýtalamaly. Eger efir ýaglaryny saklaýan ösümlüklerden taýýarlanan buga ýüzüni tutsaň bejergi has gowy bolýar. Ady agzalan ösümlüklerden işdä açarlary taýýarlasaň ýa-da demleme hem-de gaýnatma taýýarlanyp içilse has-da peýdalydyr.

Ýokarda agzalan ösümlikleri gury görnüşinde ulanylanda 5 çay çemçe ownadylan çig maly 1 bulgur gaýnan suw bilen ýapyk gapda 10-15 min demlemeli. Süzüp sowadylan demlemäni ýapgy etmek ýa-da çalmak üçin ulanylýar. Zygyr tohumy bilen gaýnadylyp taýýarlanan ergin ýüze ýapgy edilýär. 15 minutdan soň bägül ýa-da bor suwy bilen arassalamaly hem-de ondan soňra çyglandyrýan çalgyny ol ýerik çalmalydyr.

Gury derili ýüzler üçin derman ösümliklerinden taýýarlanan bugly suwlary taýýarlamak üçin deň mukdarda alynan: dermanlyk melissa, şibit, lawanda, dermanlyk çopantelpek, dyrnaklyja, eje-ejelik garyndysy ulanylýar. Her ösümlikden 1 nahar çemçe alyp suwly gaba salmaly. Haçan-da suw gaýnap, bugaryp başlanda, onuň bugyna 20 sm golaýlykda ýüzüňi tutmaly. Kelläň we saçlaryň ýapyk bolmaly, 15 minut saklanandan soň ýüzüňi sowuk suwa ýuwmaly. Soňra şol ösümliklerden taýýarlanan losýon bilen ýapgy etmeli. Bu bejergi hepdede 1 gezek edilse, ýüzde emele gelen gara we ak nokatjyklary ýok edip arassalaýar.

Şu aşakdaky ýapgylar we losýonlar ýüzüň derisini täzeleýär we gowulandyryýar. Ýüz üçin ýapgy sulede taýýarlamak bolýar: 2 nahar çemçe sule ýarmasyny süýt ýa-da suw bilen 15 min gaýnatmaly. Çalaja sowadylan goýy ergine 1 çemçe bal garyp ýüze ýapgy etmeli we 20 minut goýmaly. Soňra sowuk suw bilen ýuwmaly.

Kädi. 2 nahar çemçe gaýnadylan kädini badam ýa-da zeýtun ýagy bilen garyp ýüze ýapgy etmeli. 20 minut goýulandan soň aýyryp ýüzi ýuwmaly.

Käşir. 2 sany käşiri gyrgyçdan geçirip, ýumurtga proteini we zeýtun ýagyny ýa-da azajyk pet garyp ýüze ýapgy etmeli. 30 minutdan soň ýüzüňi ýuwmaly.

Turp ýa-da kartoşkany gyrgyçdan geçirip, limon şiresini damdyryp ýüze ýapgy etmeli. 20 minutdan soň aýyryp ilki mylaýym, soňra bolsa sowuk suw bilen ýuwmaly.

Banan. Banany 1 çay çemçe süýt bilen gowy kerçäp garmaly. Ýüze ýapgy etmeli, 20 minutdan soň aýryp sowuk suw bilen ýuwmaly.

Alma. Bişen almany gyrgyçdan geçirip 1 çay çemçe zeýtun ýagy bilen, süýt ýa-da gaýmak bilen garmaly. Ýüze ýapgy edip 20 minutdan soň aýyrmaly. Mylaýym suw bilen ýuwmaly.

Şetdaly. Bişen şetdalyny kerçäp, çopantelpegiň gaýnatmasy bilen garyp, ýüze ýapgy etmeli we 20 minutdan soň aýryp, ýyly suw bilen ýuwmaly.

Hyýar. Ownujak kerçilen hyýary limon şiresiniň birnäçe damjasy bilen garyp, ýüze ýapgy etmeli. 20 minutdan soň ony pamyk bilen süpürmeli (ýuwmaly däl).

2 nahar çemçe gülälegiň gülüniň ýapraklaryny 200 ml gaýnan suwda 1 sagat goýmaly. Demlemäni sowadyp süzüp, gury derili ýüzler we ýygirtly ýüzler üçin losýon hökmünde ulanmaly.

2 nahar çemçe çopantelpegi 200 ml suwda 10 minut gaýnatmaly. Sowadyp, süzüp, gury derili ýüzleri täzelemek we ýumşatmak üçin ulanmaly.

Ýagly derili ýüzler. Bu ýagdaýlarda derman ösümlikleriniň täsiri ýüzüň ýagyny aýyrmaga, giňelen deşikleri daraltmaga we deriniň gatap guramagynyň önüni almaga esaslanandyr. Bu maksat üçin adaty boýbodran, dyrnaklyja, dermanlyk bidenek, hmel, ýabany kaştan, mar we benewşe ýaly ösümlikler ulanylýar. Bu ösümlikleriň ownudylan çig mallarynyň 3 çay çemçesini 1 bulgur gaýnan suwda 15 minut demlenilýär. Süzüp ulanylýar. Hacan-da derman ösümlikleri ýygyny görnüşinde ulanylanda her haýsyndan 1 çay çemçe alynýar we demleme taýýarlanýar. Demlemäniň ergin bölegini ýuwmak üçin, goýy bölegine bolsa pet ýa-da un garyp ýapgy edilýär. Ýapgy 15-20 min soň deriden aýrylyp ýuwulýar.

Ýagly derili ýüzler üçin derman ösümliklerinden bugly suwlary taýýarlamakda ulanylýan derman ösümlik-

leriniň düzümine deň mukdarda alynýan şu aşakdakylar girýär, ýagny: rozmarin, dermanlyk bidenek, çopantelpek, lipa, narpyz, dub, kaştan, berýoza. 1 nahar çemçe bu ösümlikleriň garyndysyny suwly gaba salyp gaýnaýança gyzdymaly. Suw bugaryp başlandan ýüzüňi buga 20 sm uzaklykda tutmaly.

Ýagly derili ýüzlere derman otlaryndan taýýarlanan ýapgyalary almak üçin badamy, çopantelpegi, lipanyň güllerini, sosnanyň şahalarynyň uçlaryny deň mukdarda almalydyr we garyşdyrmalydyr. 2 nahar çemçe ýygyndydan gaýnatma taýýarlamalydyr. 1 nahar çemçe badamyň çigidini 50 ml taýýarlanan gaýnatma bilen garmaly. Oňa 1 çay çemçe un, S çay çemçe bal garyp bulamalydyr. Soňra ýyljak wagty ýüze ýapgy etmelidir. 30 minutdan soň ýüzi ilki ýyly, soňra sowuk suw bilen ýuwmalydyr.

Banan. 1 banany 1 çay çemçe limon şiresi bilen garyp, gowy kerçip ýüze ýapgy etmeli.

Alma. 1-2 gyrgyçdan geçirilen almany ýumurtga belogy bilen garyp, ýüze we alkymyňa ýapgy etmeli. 20 minutdan soň sowuk suw bilen ýuwmalydyr.

Mundan başga-da jerebaýdan, eje-ejelikden we çopantelpekden taýýarlanan ýapgylar dürli ýaşdaky adamlaryň ýagly derili ýüzleri üçin örän gowy gözellik serişdeleri bolup hyzmat edýärler.

Ýagly derili ýüzler üçin derman ösümliklerinden taýýarlanan losýonlar.

Käkilik oty. 2 nahar çemçe oty 200 ml gaýnan suwda 1 sagat demläp goýmaly. Süzüp, ýyly demlemäni ýüzüň derisini süpürmek üçin ulanylýar. Günde bir gezek.

Daş kekre. Onuň 50 sany terje güllerini 500 ml gaýnan suwda 1 sagat demläp goýmaly. Süzüp, sowuk demleme bilen günde 1 gezek ýüzüňi ýuwmaly.

Badyýan. 20 g badyýanyň terje otuny 500 ml gaýnan suw bilen demläp 1 sagat goýmaly. Süzüp, sowadylan demlemäni daşky serişde hökmünde ulanmaly.

Ýüzüň derisini tämizlemek üçin aşakda görkezilen ýerli derman otlary hem giňden ulanylýandyr.

Çerbiýe. 2 nahar çemçe dermanlyk çerbiýäniň otuny 300 ml sowuk suw bilen demläp 1 sagat goýmaly. Onuň tinkturasyny derini gowulandyrmak üçin ýapgy etmeli.

Narpyz. 100 g narpyzyň otuny 3 l. suwda 30 minut goýmaly. Süzüp ýüzüň derisini ýuwmak üçin ulanmaly.

Ýer tudanasy. 1 bulgur terje ýer tudanasyny 40⁰ etil spirtinde 30 gün goýmaly. Soňra süzüp ergini (suw bilen 1:1 garyp) ýüzüň derisini süpürmek üçin ulanmaly.

Bägüliň gül ýapraklary. Gaýnap duran suwuň bugyna ilki elegiň düýbüne bägül ýapraklaryny ýerleşdirmeli, soňra ony gaýnap duran suwuň bugyna ýüzüni 15 minut tutmaly. Bägülüli suw ýüzi tämizleýär.

Gara nokatly düwürtikler

Gara nokatly düwürtikler gury derili we ýagly derili ýüzlerde emele gelip biler. Olary bejermek maksatlary üçin şeýle görnüşli fitoserişdeler ulanylýar:

Mekgejöwen ýa-da arpa uny. Onuň 2 nahar çemçe unyny protein bilen garmaly. Çalgyny ýüze ýapmaly, gurandan soň gury pamyk bilen süpürmeli. Ýüzüni sowuk suw bilen ýuwmaly.

Limon şiresi. Kamedonlary (aýratyn gara nokatjyklary) ilki ýüzüni buga tutup, soňra limon şiresi bilen süpürip aýyrmak bolar. Bejergini birnäçe gezek gaýtalamaly. Soňra çakjagundyzyň ýagyny çalgy hökmünde ulanmaly.

Adaty örgünler

Bejergi döwründe üns bermeli zat örgüniň emele gelmegine deriniň ýokary duýujlygy sebäp bolup biler. Şol sebäpli hem bejeriji serişdeleriň mukdarlaryny kem-kemden ýokarlandyrmalydyr. Olary ilki deriniň uly bolmadyk böleginde täsir etdirip synamaly. Esasy maksat

derman ösümlükleriniñ antiseboreý sowuklama garşy, antimikrob we ýara bitiriji tasirleriniñ bolmagydyr. Örgünleri bejermekde ulanylýan ösümlük serişdeleriniñ birnäçe dermannamalary bardyr, mysal üçin:

Rp. Fol.Urticae 50,0 (Çit-çitiniň gülleri)

D.S. 2 nahar çemçe çit-çiti ýapragyny 400 ml gaýnan suwda demlemeli. 50 ml-den günde 4 gezekden içmeli.

Rp. Flor. Calendulae 50,0 (Dyrnaklyjanyň gülleri)

D.S. Dyrnaklyjanyň güllerini zeýtun ýagynda (1:5) saklamaly. Ergini örgün örüp başlanda çalmaly.

Jerebaý. Onuň ýagy çalmak üçin ulanylýar. Bejergi günde bir gezek ýerine ýetirilýär. Bu maksat üçin onuň tinkturasynyň 20 damjasyny 1 bulgur suwa damdyryp ulanylsa hem bolýar.

Badyýan. Onuň terje otundan alynan şiresini 2 gezek 20-25 gününň dowamynda ýüze çalmaly. Örgünlerden aňsat saplanmak bolýar.

Adaty hren. Terje köküni gyrgyçdan geçirip günde 2 gezek örgün bilen zaýalanan ýere ýapgy etmeli.

Injir. Terje ýapragynyň şiresini ýüzün derisine çalmaly. Örgüniň önüni alýar.

Gury saçlar

Şeýle ýagdaýlarda bejergileriň geçirilmeginiň maksady öte gury saçlara seboreýa garşy täsirli, ýokanç kesellere garşy täsirli serişdeleri ulanmaga ýa-da bolmasa saçyň aşaguramagyna sebäp bolýan zatlary (gijilewük, deriniň gurap dartylmagy) ýok etmäge gönükdirilendir.

Lopuh. Onuň kökünden taýýarlanan gaýnatma seboreýa garşy serişdedir. Onuň bilen gury derini iki hepdeden bir gezek ýuwmalydyr.

Çopantelpegiň ýa-da günebakaryň gülleriniň ýapraklaryndan taýýarlanan gaýnatmany açyk reňkli saçlary ýuwmak üçin ulanmaly. 2 nahar çemçe günebakaryň

gülleriniň ýapragyny ýa-da çopantelpegiň güllerini 1 l. suw bilen 5 min. gaýnatmaly. Saçy ýuwmazdan öňürti çakjagundyz, badam ýa-da zeýtun ýagy bilen kelläni çalmaly. Soňra gyzgyn suw bilen ölläp, gowy orap goýmaly. 1 sagatdan soň saçyňy ýuwup, ýumurtga ýa-da gatyk çalmaly. Soňra bolsa saç öwüşgün berer ýaly ony çäýň ýa-da çopantelpegiň gaýnatmasyna çäkamaly.

Ýagly saçlar

Bu maksat üçin derman ösümlüklerinden dyrnaklyjany, lopuhy, berýozany we başgalary ulanmaly. Olar nerw derejesiniň ýagdaýyna laýyklykda sedatiw täsiri ýüze çykarýan ösümlükler – pişik oty, alyç we başgalar bilen utgaşdyrylyp ulanylýar.

Ýagly saçlary her 5-7 günden, ýyly suw bilen adaty sabyn ulanyp ýuwmaly. Açyk reňkli saçlary çopantelpegiň ýa-da günebakaryň gaýnatmasyna çäkamaly. Saçdaky artykmaç ýagy dubyň gabygynyň gaýnatmasyna ýuwup (3 nahar çemçe dubuň gabygyna 1 l. suw garyp 15 min gaýnatmaly) aýyrmak bolýar. Bu gaýnatmany her 3 günden ulanyp, bejergini birnäçe hepde dowam etdirmeli.

Goňak

Saçdaky goňagy aýyrmak üçin şu ösümlükleri ulanmak maslahat berilýär.

Adaty sosna. Bu ösümlük “Pit” atly derman görnüşinde çalmak üçin ulanylýar. Onuň düzümine sosnanyň efir ýaglary girýär.

Piıma. Ony ýerli ulanylýar, içmek bolmaýar. Demlemesini taýýarlamak üçin onuň 1 nahar çemçe ownadylan baldaklaryny we güllerini 400 ml gaýnan suw bilen 2 sagat demlemeli. Her iki günden bir gezek saç ýuwmaly. Bejergi 10-12 gezek gaýtalanmaly.

Çit-çiti. Onuň ýapraklaryndan taýýarlanan gaýnatmany (100 g çig maly 500 ml sirke we 500 ml suw bilen gaýnatmaly) süzüp, sowadyp saç ýuwmak üçin ulanmaly.

Çakjagunduz. Onuň ýagy goňak aýyrmak üçin, çalgy hökmünde ulanylýar.

Ýasyýaprak. 2 nahar çemçe köküni 500 ml suwda ýarym sagat gaýnatmaly. Gaýnatma içmek we çalmak üçin ulanylýar.

Sarymsak. Ony kerçip kelläniň saçly bölegine ýapgy etmeli we 2 sagat saklamaly. Bejergini 6-7 gün dowam etdirmeli.

Mundan başga-da goňak aýyrmak üçin taýýar dermanlar hem ulanylsa bolýar. Ýabany kaştanyň, guzygulagyň, meýdan hwoşynyň esasynda 14:5:2 mukdar gatnaşygynda taýýarlanylýan allantoin kremli şampunyny oňa mysal edip görkezse bolar. Bu ekstrakt gündizki kremiň we losýonyň düzümine girýär.

Biokrem şampun eje-ejeligiň ýapraklaryndan taýýarlanylýan we goňagy aýyrmak üçin ulanylýar. Onuň farmakologiki täsiri ösümligiň düzümindäki organiki baglanyşan kükürt bilen häsiýetlendirilýär.

Brezol dermany öz düzüminde ak berýozanyň, çitçitiniň we çopantelpegiň ekstraktlaryny saklaýandyr.

Saçyň tiz düşmegi

Bu ýagdaýda dermotonizirleýji täsirli birnäçe ösümlükler ulanylýar.

Adaty sosna. Taýýar derman bolan “Pit”-ň düzümine sosnanyň efir ýaglary girýändir.

Ýabany sarymsagy kerçap şu maksatlar üçin ony ýerli ýapgy hökmünde ulanylýar.

Piıma. Bu ösümligiň efir ýaglary “Pit”-ň düzümine girýändir.

Sogan. Onuň terje ýapraklary disulfidleri saklaýar we keratolitiki täsiri ýüze çykarýar. Soganyň terje ýapraklaryny kerçip ýapgy etseň, saçyň düşmesiniň önüni alýar. Soganyň terje ýapraklarynyň şiresini saça çalmaly we kelläni 1 sagat orap goýmaly. Soňra kelläni ýuwmaly.

Çit-çiti. Onuň gaýnatmasyny 4 gezek 50 ml-den günde nahardan öň içmeli. Şol gaýnatma bilen saçy sabynsyz ýuwmaly.

Çakjagundyz. Onuň ýagyny saça çalmaly ýa-da şol ýagy saklaýan melhemi ulanmaly.

Saçyň ösmegini sazlaşdyrýan derman ösümlikleri

Saçyň ösmegini sazlaşdyrýan derman ösümliklerine gaýtarmanyň porrugy, çit-çitiniň ýapragy we başgalar degişlidirler.

Boýbodran. Onuň otyndan taýýarlanan gaýnatmany günde bir gezek saçyň düýbüne çalmaly .

Süýji ýeken. Onuň sirke bilen gaýnatmasyny saçyň düýbüne sürtmeli. Ony 2 hepde dowam etdirmeli . Onuň 3 nahar çemçe ownadylan porrugyny 15 minut çakyrly sirkede gaýnatmalydyr.

Ak berýozanyň ýapraklary. 1 nahar çemçe ownudylan ýapraklary 300 ml gaýnan suw bilen 2 sagat demläp goýmaly. Süzüp sowadyp, saça çalmak üçin ulanmaly, ony günde bir gezek ýuwulandan soň çalmaly.

Sogan. Ony ownujak kerçgiläp 300 ml 40⁰ spirtde goýmaly. Süzüp ergini ýuwulan saça günde bir gezek çalmaly. Saçyň ösmegini sazlaşdyrýan “Piloton”-ň düzüminde eşekýorunjanyň we soganyň tinkturasy hem bardyrlar.

Görkezilenlerden başga-da saç üçin ýaglary taýýarlamak hem mümkindir. Mysal üçin 100 g ýasy ýapragyň kökünü 24 sagatlap 200 ml zeýtun ýagynda 15 min gowşak otda gaýnatmaly. Sowadyp süzmeli. Taýýarlanan ýagy saçy ýuwmazdan 5 sagat öň çalmalydyr we soňra ýuwmalydyr.

2. 12. Diş keselleri

Agyz boşlygynyň nemli bardasynyň alawlamasy sebäpli bozulmalaryna stomatit we gingiwit keselleri mysal bolup bilerler. Bu kesellerde agyzy we bokurdagy çäýkamaklyk üçin

derman ösümlikleriniñ birnäçeleri peýdalanylýar. Olar alawlama garşy, mikroba garşy, ortüji, ýumşadyjy täsirleri ýüze çykarmalydyrlar. Şeýle derman ösümlikleriñ has giñden ýaýranlary şu aşakdakylardyr.

Dub. Dubuň ownadylan gabyklaryndan taýýarlanylýan gaýnatma (50 g gabygy 400 ml suwda 30 min gaýnatmaly) bilen agyz boşlygyny çaykamaly. Dub diş kesellerinde alawlama garşy serişde hokmünde ulanylýar. Bu ösümligiñ serişdeleri faringit we tonzilit kesellerinde-de agyz çaykamak üçin ulanylýar.

Çopantelpek. Agyz boşlygyny çaykamak üçin onuň täze taýarlanan gyzgyn demlemesi ulanylýar. Gingiwit we stomatit kesellerini bejermek üçin çopantelpegi birnäçe wagtlap, dowamly ulanmalydyr. Şu maksatlar üçin giñden ulanylýan dermannamalarynyň biri hem şu aşakda görkezilendir, ýagny:

Rp. Inf. Flor. Chamomillae 15,0/200,0 (Çopantelpegiñ gülleriniñ demlemesi)
Ac.borici (Bor turşysy)
M.D.S. 3-4 gezek agyz çaykamak üçin.

Jerebaý . Bu ösümligi şeýle peýdalanýarlar, ýagny:

Rp.: Tinct. Hyperici 50,0 (Jerebaýyñ tinkturasy)
D.S. Bir bulgur suwa 20 damja damdyryp günde 4-5 gezek agyz çaykamaly.

Eger agyz boşlugynda gaýnaglama has ötüşen bolsa onda bu erginiñ özüni günde 1-2 gezek çalmaly. Jerebaý antimikrob häsiýeti ýüze çykarýar. Ony keseliñ önüni almak maksatlary üçin hem ulanýarlar. Ol gingiwit we stomatit kesellerini bejermekde gowy netijeleri görkezýär. Şu maksatlar üçin onuň tinkturasynyñ 30-40 damjasyny bir bulgur suwda taýýarlap agzyňy çaykamaklyk ýa-da onuň demlemesini içmeklik maslahat berilýär. Bu demlemenini düzümi şeýledir:

Rp.: Inf. Herb. Hyperici 10,0/200,0 (Jerebaýyñ otunyñ demlemesi)

D.S. Bir nahar çemçeden günde 1-2 gezek nahardan soň içmeli

Gaýtarma. Gingiwit we stomatit kesellerinde bu ösümligiň kökünden taýýarlanan tinkturasy ulanylýar, ýagny:

Rp. T-rae Tormentillae (Gaýtarmanyň tinkurasy)
T-rae Bistortae aa 5.0 (Suw kyrkbogunynyň tinkturasy)
M.D.S. Bir bulgur suwa 15 damja damdyryp, günde 3-4 gezek agzy çäýkamaly.

Kyrkbogun. Bu ösümligiň kökünüň porrugynda 25 % eý maddalary saklanýar. Şol sebäpli alawlama garşy, örtüji häsiýeti ýüze çykaryp, stomatit, gingiwit kesellerinde ulanylýar. Bu keselleri bejermekde onuň gatnaşmagynda şeýle dermannamar hödürlenýär, ýagny:

Rp: Dec. Polygonii Bistortae 20,0/200.0 (Suw kyrkbogunynyň
gaýnatmasy)
D.S. 1 nahar çemçesini ýarym bulgur suwa salyp, günde 3 gezek agzyňy çäýkamaly.

Käkilik oty. Gingiwit we stomatit kesellerini bejermekde bu ösümligiň gyzgyn demlemesi bilen agyz boşlugy çäýkalýar.

Dermanlyk bidenek. Onuň şu aşakdaky dermannamasy ulanylýar:

Rp: Fol. Salviae 50,0 (Bidenegiň ýapragy)
D.S. 1 nahar çemçe çig malyny 1 bulgur gaýnan suwa garyp
12-15 gününň dowamynda her günde 2- 4 gezek çäýkamaly.

Boýbodran. Onuň gyzgyn demlemesi taýýarlanylanda ösümligiň ýerden ýokarky böleginiň guradylanynyň 2 nahar çemçesini bir bulgur suwda 1 sagadyň dowamynda demlenip goýulýar we soňra süzülýär. Ony diş kesellerinde agyz çäýkamak üçin ulanylýar. Bu ösümligi şu dermannama boýunça ulanylanda uly üstünlikler getirdi: 2 nahar çemçe ownadylan ösümligiň ýokarky ösýän böleklerini ýa-da güllerini 0.5 litr gaýnan suwda demlemeli. Sowandan soň

süzüp agyz çaykamak üçin ulanylýar. Çaykamaklygy günde birnäçe gezek ýerine ýetirmeli.

Narpyz. Onuň sowadylan demlemesi bilen agyz boşlugyny günde birnäçe gezek çaykamaklyk gowy netijeleri berýär..

Meýdan kyrkboguny. Bu ösümligiň otunyň gaýnatmasy bilen günde birnäçe gezek agyz çaykamak maslahat berilýär.

Dyrnaklyja. Dyrnaklyjanyň spirtli demlemesi ýa-da ýöne gyzgyn demlemesi gingiwit we stomatit kesellerini bejermekde gowy netijeleri berýär. Agyz çaykamak günde 5-6 gezek ýerine ýetirmeli. Bu ösümligic spirtli çykyndysynyc 1 çay çemçesini bir bulgur suwa damdyryp içilende hem onuň peýdasy köpdür.

Grek hozy. Hozuc ýapraklaryny demleme görnüşinde diş kesellerinde ulanylýar, ýagny:

Rp. Inf. Fol Juglandis 5,0/200,0 (Hozuň ýapragynyň demlemesi)

D.S. 1 nahar çemçeden 0,5 bulgur suw bilen, 10-12 günün dowamynda, nahardan soň günde 3 gezek agyz çaykamaly.

Uly Demrewot. Paradantozy bejermekde bu ösümligic guradylan otundan taýýarlanan diş ýuwujy hamyrlar ulanylýar.

Süýji ýeken. Onuň porrugynyň gyzgyn demlemesi paradantozy bejermekde giňden ulanylýar. Bu maksatlar üçin onuň 1 nahar çemçe porrugyny 300 ml gaýnan suwda 2 sagat demläp goýmaly we soňra süzüp, alynan ergin bilen agyz çaykamaly.

Sarymsak. Bu ösümligiň önümleri pulpitleri we periodontitleri bejermeklikde giňden ulanylýar.

Olardan başga-da häzirki zaman amaly lukmançylygynda diş kesellerini bejermekde ýokarda agzalanlardan başga-da birnäçe derman otlarynyň toplumlary ulanylýar. Olaryň käbirleri şu aşakda görkezilendir, ýagny:

Rp. Flor. Tiliae 20,0 (Lipanyň güli)

Flor. Chamomillae 30,0 (Çopantelpegiň güli)

M. F. spec. D.S. 2 çay çemçesini bir bulgur gaýnan suwa goşup bokurdak we agyz çaykamak üçin ulanmaly

Rp. Fol. Cotini (Skumpiniň ýapragy)
 Cort. Querci aa 100,0 (Dubyň gabygy)
 Flor. Chamomillae 60,0 (Çopantelpegiň güli)
 M.F. spec. D.S. 2 nahar çemçe 500 ml suw bilen 5 min
 gaýnatmaly we alynan ergin bilen günde 2-3 gezek nahardan
 soň agyz çäýkamaly.

Rp. Cort. Querci 20,0 (Dubyň gabygy)
 Flor. Tiliae 10,0 (Lipanyň güli)
 M. F. spec. D.S. 2 çäý çemçesini bir bulgur gaýnatmada,
 agyz we bokurdak çäýkamak üçin ulanmaly.

2. 13. Ýaralaryň bejerilişi

Ýaralaryň dürli görnüşlerini (gögeren, kesilen, mikroblaryň üsti bilen emele gelen ýokançly) bejermekde derman ösümlikleriniň ähmiýeti uludyr. Derman ösümlikleri deriniň bitişini we ösüşini sazlaşdyryjy we antiseptiki häsiýetleri bolup, sowuklama garşy täsirleri ýüze çykarýarlar. Ýaralaryň dürli görnüşlerini bejermekde şu aşakdaky derman ösümlikleri ulanylýandyr.

Dyrnaklyja. Bu ösümligiň ýara bitiriji täsiri bolup, esasanam ol çalgy görnüşinde ulanylýar. Dyrnaklyjanyň gülünden we otundan taýýarlanan gaýnatmasynyň 4 bulguryny günde içmeli. Şol bir wagtda onuň gülünden zeýtun ýagynda taýýarlanan (1:10) demlemesini çalmaly. Ony ýaralara çalmak we gögermeleri bejermek üçin hem ulanylýar.

Jerebaý. Jerebaýyň ýagy bitmesi kyn bolan ýaralary bitirmek üçin günde 1-2 gezek çalmaly. Bu ösümligiň dermany – “Novoimaninum”_ mikroblaryň emele getiren iriňli ýaralaryny bejermekde antibakteral täsiri ýüze çykarýandygy üçin giňden ulanylýar.

Narpyz. Narpyz ýagy antibakterial täsiri ýüze çykarýan birleşmelere baýdyr. Şol sebäpli ony ýaralary bejermekde ýerli serişde hökümünde günde 1-2 gezek çalynýar.

Rýabina. Bu ösümligiň efirli ekstrakty bakteriosid täsiri ýüze çykarýar we ony ýara bejermek üçin ulanylýar.

Ak berýoza. Onuň 90⁰ spirtli tinkturany (1:5) suwly ýaralary bejermekde ulanylýar. Berýozanyň pyntyklaryndan taýýarlanan demlemeli suwa düşünmeli. Şol bir wagtda ony içmek üçin hem ulanylýar. Onuň antiseptik täsiri gaýtadan mikrob düşen ýaralary bejermekde-de ulanylýar. Berýoza şepbiginiň düzüminde fenollary saklaýandygy sebäpli ony ýerli ulanylanda ýaralara antiseptiki täsiri ýüze çykarýar.

Keçegül ýerli we içmek üçin ulanylanda dikeldiş ýagdaýlaryny sazlaşdyrýar. Bu ösümlik şu dermannama görnüşinde ulanylýar, ýagny:

Rp. Inf. Herb. Gnaphali uliginosi 10,0/200,0

D. S. 1 nahar çemçe çig maly 1 bulgur gaýnan suwda 30 minut demlemeli. Alynan ergini süzmeli we ýaralara ýapgy etmeli.

Sogan. Ýara bejermek üçin ulanylýan gadymy serişdeleriň biri hasaplanylýar. Buglanyp ýumşadylan sogany kerçgiläp ýara ýapgy etmeli. Bu bejeriş usuly häzirkä wagtda-da gowy netijeleri berýär.

Sarymsak. Sarymsak ýaralary bejermek üçin ulanylanda dokumalaryň täzeden döreýşini sazlaşdyrýar. Ol kerçelip ýaralara ýapylýar.

Adaty boýbodron. Bu ösümligiň otundan we güllerinden demleme taýýarlanylýar. Alynan ergin ýaralary ýuwmakda peýdalanylýar. Onuň ýara bitiriji täsiri düzümindäki azulen bilen baglanşyklydyr.

Uly guzygulak. Ol çalgý görnüşinde ulanylýar. Onuň üçin 50g ownadylan köküni 100ml suwda 20 minudyň dowamynda gaýnatmaly we süzmeli.

Syçratgy. Bu ösümligiň kökünden taýýarlanan gaýnatma ýaralary bejermekde ulanylýar.

Lopuh. Bu ösümligi ulanylanda onuň ýaralary bitiriji täsiriniň bardygy bellidir. Ony gaýnatma, demleme we repeý ýagy bilen çalgy gornüşinde ulanylýar.

Çopantelpek. Bu ösümligiň güllerinden taýýarlanan täze çykyndysy ýaralary ýuwmakda ýerli ulanylýar. Onuň düzümindäki hamazulen ýerli agry aýyrjy, alawlama garşy, antiallergiki, antiseptiki, ýaralaryň bitişini sazlaşdyrjy täsirleri ýüze çykarýar.

Uly atgulak. Ýaralary bejermekde ýokary netijeleri berýär. Onuň ýapraklaryny terjeligine kerçgeläp ýara ýapgy etmeli.

Benewşe. Bu ösümligiň şiresi ýaralary bejermek üçin çalynýar ýa-da olardan ýapgy edilýär.

Okopnik. Bu ösümligiň kökünden taýýarlanan gaýnatma ýaralary bejermekde dokumalaryň dikelmegini we öýjügiň ösüşini sazlaşdyrjy serişde hökmünde ýerli ýuwmak şeýle-de ondan ýapgy etmek üçin ulanylýar.

Bägül. Ýara bejermekde onuň taýýar görnüşli çalgysy "Rezolin" ulanylýar. Onuň antiseptik täsirinden başga-da dikeldiji häsiýeti hem bardyr.

Zygyr. Ýara bejermekde has amatly ösümlik. Onuň tohumyny gaýnadyp ýapgy edilýär ýa-da zygyr ýagy ýara çalynýar.

Grek hozy. Ýara bejermekde peýdalydyr. 5 g hozuň ýapraklaryny ownadup 1 bulgur gaýnan suw bilen demlemeli. Gyzgyn demlemäni çay çemçesi bilen günde 3 gezek içmeli ýa-da onyň bilen ýaralary ýuwmaly. Netijede onuň ýara bitiriji täsiri ýüze çykýar. Bu onuň düzümindäki maddalaryň bakterisid täsirleriniň bardygy bilen baglansyklydyr.

Eje-ejeli. Terje ýapraklaryny kerçigiläp süýt bilen garyp ýara ýapgy edilýär.

Dub. Bu ösümlik sowuklama garşy täsiri ýüze çykarýar. Ýara bejermekde onuň gabygyndan taýýarlanan gaýnatma ulanylýar.

Ýer tudanasy. Bu ösümlikde taninleriň we flavanoidleriň bolmagy onuň ýara bitirji täsirini ýüze çykarmagy bilen baglanşyklydyr. Onuň gaýnatmasy suwjaryp we ganjaryp duran ýaralary bejermekde ulanylýar.

Peçek. Ýara bitirji täsir onuň güllerini we şahalarynyň demlemesiniň ýerli ulanylmagy bilen baglanşyklydyr. Demleme taýýarlamak üçin gülleriniň ýa-da şahalarynyň 2 bölegini spirtiň 40⁰ 4 bölegi bilen 2 sagat demläp goýmaly. Ondan soňra süzmeli we 1 nahar çemçe demlemäni ýarym bulgur gaýnan suw bilen garmaly. Soňra ýaralary ýuwmak ýa-da olardan ýapgy etmek üçin ulanmaly.

Gaýtarma. Bu ösümliğin porrugyndan taýýarlanan gaýnatma ýerli ulanylanda gowy netijeler gazanylýar. Bejergi günde 2-3 gezek gaýtalansa ýaralaryň bitmegi tizleşýär.

Atgulak (lanset şekilli atgulak). Bu ösümliğin terje ýapraklary ýara we gögerenleri bejermekde ulanylýar. Onuň kerçilen ýapraklaryny zaýalanan ýere ýapmaly we ony günde 1-2 gezek gaýtalamaly.

Hmel. Ony bedendäki gögeren ýerleri bejermekde ulanmak maslahat berilýär. Onun miwesinden taýýarlanan demleme ýaralary ýuwmak, ýapgy etmek ýa-da çalgı görnüşinde ýerli ulanylýar. Ony zaýalanan ýere günde 1-2 gezek çalmalydyr.

Iriňli ýaralar bejerilende olaryň bitýän döwründe mikrobedenjikler düşen bolsa we iriňlän bolsa olary bejermek üçin ulanylýan derman ösümlikleri diňe bir ýara bitirji täsiri ýüze çykarman, eýsem-de olar bakteriýalara garşy, antiseptiki, sowuklama garşy täsirleri hem ýüze çykarmalydyrlar. Şeýle täsirli derman ösümlikleriň birnäçesi bardyr.

Dyrnaklyja. Bu ösümligiň otundan we güllerinden demleme taýýarlanýar. Dyrnaklyja bakterisid we gany saklaýjy täsiri ýüze çykarýar. Onuň spirtil tinkurasý ýara bejermekde ýerli ulanylýar.

Sogan. Ony ýara bitirmekde içmek üçin ulanylýar. Onuň täzeje şiresiniň 1 çay çemçesini günde 3 gezek iriňli we bitmeýän ýaralary bejermekde peýdalynylýar. Ony keçgeläp ýara ýapgy etseň hem bolýar.

Ýabany sarymsak. Iriňli ýaralary bejermekde onuň dermany bolan "Urazalin" ulanylýar. Ol düzüminde bu ösümligiň efir ýagyny saklaýar. Bu derman bilen ýaralary günde 2 gezek çalmaly ýa-da ondan sargy etmeli. Bu derman uzak ýatan näsaglarda emele gelen ýaralary bejermekde-de ulanylýar.

Lawanda. Iriňli ýaralary bejermekde lawanda ýagy ulanylýar.

Çopantelpök. Onuň güllerinden gaýnatma taýýarlanylýar we iriňli ýaralary ýuwulýar.

Uly atgulak. Ol iriňli ýaralary bitirýär we arassalaýar. Onuň terje ýapraklarynyň şiresi ýaralara ýapylýar.

Aloe. Iriňli ýaralara bu ösümligiň terje ýapraklarynyň şiresi çalynsa gowy netijeleri berýär. Onuň bu häsiýeti bakteriostatiki, bakterisid täsir bilen baglanşyklydyr.

Ýapon sofarasy. Iriňli ýaralary bejermekde üstünlükli ulanylýar. Ýaralara onuň tinkturasyny ýapgy etmeli ýa-da oňa ýuwmaly. Taýýarlamak üçin bu ösümligiň miwesiniň 1 bölegini 56% spirtiň 5 bölegi bilen 10 gün saklamaly.

Gara turp. Iriňli ýaralary bejermekde bu ösümligiň ulanylmagy onuň antiseptiki täsiri bilen baglanşyklydyr. Onuň şiresi ýaralara çalynýar ýa-da kerçgelenip ýaralara ýapylýar.

Kesilen ýarany bejermekde belli bir häsiýetli derman ösümlikleri ulanylýar. Şeýle ýagdaýda ösümlikler gan saklaýjy we ýara bitiriji täsiri ýüze çykarmalydyrlar.

Eşek ýorunja. Bu ösümligiň güllerinden ýa-da ýapraklaryndan taýýarlanan çalgý kesilen ýaralary bejermekde ulanylýar. Bu ösümligiň otundan taýýarlanan ergin bilen ýaralary ýuwmaly. Taýýarlamak üçin 1 nahar çemçe çig maly 500 ml suwda 1 gije gündiz demläp goýmaly.

Ýaralaryň bitişini sazlaşdyrmak üçin köp sanly derman ösümlikleri ulanylýar.

Kelem. Ýapraklaryny kerçgiläp ýumurtganyň sarysy bilen deň gatnaşykda günde 1-2 gezekden ýara ýapmaly.

Käkilik oty. Ýaralary ýuwmak üçin onuň demlemesi ulanylýar. Ol ýakymysyz ysy aýyrýar. Onuň gyzgyn demlemesi agyry aýyryjy täsiri ýüze çykýar.

Guzygulak. Onuň gyzgyn demlemesi (1:10) bitmeýän ýaralary bejermekde ulanylýar. Ol şeýle dermannama görnüşinde hem ulanylýar.

Rp. Inf. Rad. Inulae 20,0/200,0 (Guzygulagyň köküniň demlemesi)
D.S. Günde 1-2 gezekden ýuwmak ýa-da ýapgy etmek üçin
ýerli ulanylýar. Bejergi 10-12 gün dowam edýär.

Çit-çiti. Bitmesi kyn bolan ýäralary bejermekde olaryň
bitişini sahladyrjy häsiýeti bar. Ondan başga-da bu
ösümlik ýaranyň ýaramazlaşmagyny çäklendirýär. 1
nahar çemçe porrugyny 400 ml suw bilen 10 minut
gaýnatmaly. Onuň 50ml möçberinden günde 4 gezek içilse
ýaralaryň bitmesi tizleşýär.

Lawanda. Bu ösümligiň ýagy –bitmesi kyn ýaralary
bejermekde ulanylýar. Onuň ýaralaryň bitişini
çaltlandyryjy täsiri bar.

Meýdan kyrkboguny. Bu ösümligiň otundan taýýar-
lanan gaýnatma bitmesi kyn ýaralary ýuwmak üçin
ulanylýar.

III. LUKMANÇYLYK AMALYNDA ULANYLÝAN **DERMAN ÖSÜMLIKLERI**

Polatly. Bu boýy 60-80 sm ýetýän köpýyllyk otjumak
ösümlikdir. Türkmenistanda hem duş gelýändir.

Lukmançylyk maksatlary üçin ösümligiň kökleri ulanylýar.

Bu ösümligiň köklerinde eýleýji maddalar, sakyzlar, limon
turşusy, pet, glikozidler (ononin we onosnin) saklanýar.

Lukmançylykda onuň dermanlaryny babasil keselinden we
iç gatamasyndan ejir çekýänleri bejermekde giňden ulanylyp
gelnipdir. Ösümligiň demlemesi ýa-da tinkturasy içilende
näsaglaryň içegesiniň hereketi peselýär we şol bir wagtyň
özünde onuň ýygrylyşy ýokarlanýar, diurezi beýgelip,
arterial basyşy bolsa pese düşýär. Ondan daşary hem onuň
dermanlary bogunlarda duz ýygnanmasynda, böwregiň we
peşew haltasynyň kesellerinde peşew çykaryjy serişde
hökmünde-de giňden ulanylýar. Ol şu aşakdaky derman
görnüşlerinde ulanylýar, ýagny:

Ösümligiň köküniň gaýnatmasy– umumy düzgün boýunça
taýýarlanyp 50 ml-den, nahardan öň günde 3 wagtyna 2-4
hepdäniň dowamynda, täret kadalaşýança kabul etmeli.

Ösümligiň tinkturasy – 70% spirtde (1:5) taýýarlanylýar. Ony içiňi gowşadyjy serişde hökmünde 1 çay çemçeden nahardan öň, günde 2-3 wagtyňa içmelidir.

Gowaça. Bu gur şahalanýan baldakly, boýy 130 sm ýetýän, güýçli kökli ösümlükdir. Iri ýapraklary ýekelikleýin bolup, nobatlaýyn ýerleşendir. Miwesi – ýumurtga şekildäki gozalarydan ybaratdyr. Türkmenistanyň hemme ýerlerinde medenileşdirilip ekilýar.

Lukmançylyk maksatlary üçin onuň kökleriniň gabygyny we tohumlaryny ulanylýarlar.

Köküniň gabygynda gossipol, C we K witaminleri, eýleýji madalary, trimetilamin toplanandyr. Onuň tohumlaryndan bolsa gossipol we gossipin, şeýle-de düzümine linolen hem-de olein turşulary girýan ýaglar tapyldy. Şol bir wagtyň özünde onuň tohumlary ýokary hilli proteinleriň çeşmesi bolup durýandyrlar. Ýapraklary limon we alma turşularyny saklaýarlar. Bu ösümlükden – furasilin, furasil, furadonin dermanlary alynýar. Gowaçanyň süými arassa sellýulozadyr.

Halk lukmançylygynda gowaçanyň köküniň gabygyny gan saklaýjy serişde hökmünde ulanylýar. Şol maksatlar bilen ondan taýýarlanan suwuk ekstrakty ylmy lukmançylygynda hem ulanylýandyr. Pagtadan pamygy we sargy serişdelerini alýarlar. Gowaçanyň ýagy günebakar we künji ýagy ýaly linimentleri we melhemleri öndürmekde ulanylýar. Ondan alynýan gossipoly 0,1%-li ergin ýa-da 3%-li liniment görnüşde ulanylýarlar.

Tanasetum (piňma). Bu köp ýylyk otjumak ösümlükdir. Ähli boş ýatan we otluk ýerlerde ösýär.

Lukmançylykda çyg mal höküminde ýerden ýokarky bölegi oty ulanylýar.

Ösümligiň ähli böleklerinde efir ýaglary (sineol, kamfora, borneol), seskwiterpenoidler, bioflawonoidler, karotinoidler we taninler bardyr.

Lukmançylykdaky esasy peýdasy onuň soguljana we aowlama garşy, hem-de antiseptiki täsiri ýüze çykarýandygy bilen baglanşyklydyr. Ondan başga-da onuň otundan

taýýarlanan 5% demlemesiniň ýürek gan-damar näsazlyklarynda arterial basyşyny peseldiji täsiriniň bardygy hem bellidir.

Bu otuň pes doýgunly çykyndysynyň antiseptiki, antimikrob we rahatlandyryjy täsiri hem bardyr. Şol sebäpli ony iç ýellenmesinde, iç sançmasynda, iç geçmede, agyz boşlugynda emele gelyän alowlamada şeýle-de we sary getirme keselini bejermekde ulanmak mümkinçiligi bardyr.

Sabur. Bu köp ýyllyk, ýapragy etlek bolan otjumak ösümlükdir. Ony hemme ýerlerde hem ösdürülip ýetişdirilýändir.

Ösümligiň ter ýapraklary we şiresi öz düzüminde witaminleriň we enzimleriň birnäçe mukdaryny, hem-de fitonsidleri saklaýandyr. Onyň ýapraklaryndan antraglikozid maddalary (aloin, nataloin, rabarberon, gomonataloin), şeýle hem sakyz maddalary we efir ýaglarynyň yzlary tapylandyr.

Saburyň ter şiresi - turşulygy pes bolan dowamly gastridi bejermek üçin, işdä açyjy serişde hökmünde, şeýle hem umumy bedeniň ýokanç kesellere garşy durnuklylygyny ýokarlandyrmakda giňden ulanylýar. Bu deriniň örtükleriniň we nemli bardalarynyň kesellerinde hem örän ähmiýetlidir. Ony esasan hem ýanyklarda, iriňli ýaralarda, osteomiýelitte bedene çalmak üçin, agyz boşlugynyň we bokurdagyň kesellerinde bolsa çaykamak üçin ulanýarlar. Saburyň demir bilen bilelikde taýýarlanan süýji suwy aşgazan-ıçege ýollarynyň ýiti we dowamly kesellerinde, gipohrom gan azlygynda, ýokanç kesellerde we zäherlenmelerde örän peýdalydyr. Ýiti rinidi bejermek üçin ter saburyň şiresiniň 5-8 damjasyny günde 2-3 wagtyna buruna damdyrmak ýeterlikdir. Saburyň sanjym üçin niýetlenen suwuk ekstrakty göz kesellerini bejermekde-de (blefarit, konýuktiwit, keratit) iň bir ygtybarly serişdeleriň biridir. Bu sanjym aşgazanyň we 12-barmak içegäniň ýaralaryny, aýal keselleriniň köp görnüşini, şeýle hem dem gysmany bejermekde giňden ulanylýar.

Saburyň sanjym üçin suwuk ekstrakty – deriň astyna 1ml möçberinde (5 ýaşa çenli çagalara 0,2-0,3 ml, 5 ýaşdan ýokary ýaşdaky çagalara 0,5 ml möçberinde) goýberilýär.

Saburyň linimenti – şöhle terapiýasyndan soň deriniň zeperlenmegini bejermek we onuň öňüni almak üçin ulanylýar. Onuň üçin gije-gündüziň dowamynda 2-3 gezek zeperlenen ýere çalyp, üstüni hasa bölejigi bilen ýapýarlar.

Saburyň demir bilen süýji suwy – gan azlygynda 0,5-1 çay çemçe süýji suwy 1/4 bulgur suw bilen günde 3 wagtyna bermek maslahat berilýär.

Çerbiýe. Bu boýy 120-150 sm ýetýän köp ýyllyk otjumak ösümligidir. Ol Türkmenistanda hem duş gelýän ösümligidir.

Dermanlyk çerbiýäniň kökünde köp mukdarda nemli maddalary bolup, esasan hem olar polisaharidlerden durýandyrlar. Şeýle hem onuň düzüminden pet, pektin, gant, karotin, lesitin, fitosterin, mineral duzlary we suwuk ýaglary hem tapylandyr.

Ol dem alyş ýollarynyň we aşgazan-içege ýollarynyň kesellerini bejermekde ähmiýetli serişdedir. Onuň örtüji, goraýjy, gaýnaglama garşy, gakylyk goparyjy we agyryny aýryjy täsiri bolany üçin ony dowamly bronhitleri, traheitleri, bronhopnewmoniýalary, ýiti üsgülewügi, agyz-bokurdak kesellerini we dem gysmasyny bejermekde, şeýle-de gastritleri, onkibarmak içegäniň we aşgazanyň baş kesellerini bejermekde-de (esasan hem aşgazan şiresiniň turşulygy ýokary bolanda) peýdalanýandyrlar. Çerbiýäniň kökünüň demlemesi we ekstrakty pis keselli we deri örgünli näsaglary bejermekde synag edilende aýratyn gowy netijeleri berýär.

Çerbiýäniň ýumşadyjy täsiri nemli bardalaryndaky gaty yzlary ýumşatmak üçin ulanylýar. Lukmançylykda onuň birnäçe derman görnüşlerinden peýdalanýlandyr:

Çerbiýäniň gaýnatmasy - 1/2-1/3 bulgurdan, nahardan soň günde 3-4 wagtyna kabul edilmelidir.

Çerbiýe köküniň gury ekstrakty – çalymtyl-sary reňkli külke bolup, onuň özboluşly süýjümtik tagamy bardyr.

Çerbiýäniň şerbeti - örtüji we tagam beriji serişde hökmünde miksturalar görnüşinde ulanylýar.

Mukaltin – nahardan öň 1-2 gerdejikden içilýär.

At kaştany. Bu boýy 30 metre ýetýän ağaçdyr. Ony Kawkazda we Merkezi Aziýada bezeg we derman ösümligi hökmünde ösdürilip ýetişdirilýär.

Lukmançylykda onuň çigidi (miwesi) çig mal bolup ulanylýar.

At kaştanynyň miwesi glikozidlerden (eskulin, fraksin, essin) durýandyr. Ondan başga-da eý maddalaryny, flavonoid glikozidlerini (kwersitrin, izokwersitrin, kwersitin, lempferol), peti, ýaglary we beýleki maddalary saklaýandyr.

Lukmançylykda onuň ekstrakty beýleki galen dermanlaryna seredeniňde has täsirlidir. Onuň düzümindäki triterpenglikozidi essin gaýnaglama we çişe garşy, şeýle-de kapilýar berkidiji täsiri ýüze çykarýandyr.

Bu ösümligiň essin saklaýan dermanlary operasiýadan soňky trombozlary bejermekde, şikesden soňky çişleri, gaýnaglamany, tromboemboliýany bejermekde ulanylýar.

Eskuzan antigemoroidal serişde hökmünde göwreli we çaga doguran aýallaryň wenalarynyň warikoz giňelmelerinde we beýni çişlerinde ulanylýar.

Ýürek damar ulgamynyň kesellerinde ulanylýan derman wenostazin düzüminde at kaştanynyň miwesiniň ekstrakty we B₁ vitamini saklanýar. Bu derman ganyň syworotkasynyň antitrombotiki işjeňligini sazlaşdyrýar hem-de ol göwreli aýallaryň we çaga dogran aýallaryň wenasyndaky durgunlyklarda hem-de dykylmalarda ulanylýar. Wazotonin dermany düzüminde at kaştanynyň miwesiniň ekstrakty we arnikanyň dermanlaryny we vitaminleriň B toplumlaryny saklaýar we ol ýürek-damar ulgamynyň kesellerinde ulanylýar.

Häzirki wagtda lukmançylyk amalynda at kaştanynyň dermanlaryndan: eskuzan, esflazid, reparil we başgalar

ulanylýar. Reparil (essin) esasanam gaýnaglama we çişe garşy hem-de antitrombolitiki serişde hökmünde ulanylýar.

Eskuzan at kaştanynyň miwesiniň suwly – spirtli ekstraktydyr. Ol esasy triterpen glikozidi - essin saklaýar. Bu derman ownuk gan damarlarynyc geçirjiligini peseldýär, wenez damarlaryň ýygrylmasyňy ýokarlandyrýar we gaýnaglamany azaldýar. Derman wenasazlaşdyrýjy we antitrombolitiki serişde hökmünde wenanyň giňelmelerinde we dykylmalarynda, şeýle-de babasil keselinde hem ulanylýar. Onuň üçin dermany günde 3 gezek nahardan öň 10-20 damjadan içmeli.

Esflazid - täsiri boýunça eskuzana çalymdaşdyr. Ol at kaştanynyň miwesindäki saponin - essini saklaýar we kaştanyň ýapragyndaky flavonoidleri saklaýar. Ol gerdejik ýa-da şem görnüşinde ulanylýar.

Daştohumlyja. Bu köpyyllyk, yylylygy halaýan otjumak ösümlükdir. Yapraklary we baldaklary şu maşgala degisli beyleki osumlikleriňki yaly gaty gyldyrganjyklar bilen örtülendir. Miweleri ak, ýalpyldawuk we gaty tekiz hozjagazlardyr. Türkmenistanda Kürendagynda , Bathyzda, Günorta-Günbatar we Merkezi Köpetdagyň daşly gaýalarynda ösýär. Lukmançylykda ulanylýan bölekleri olaryň hozjagazlarydyr.

Ösümligiň gabygynda gyzyl reňk beriji madda, hozjagazynda ýaglar, mineral maddalary, esasanam kalsiýniň duzlary we kremniý turşysy bardyr. Ýer üsti böleginde köp bolmadyk mukdarda alkaloidleriň barlygy anyklandy. Ýapraklarynda C witamini tapyldy.

Miwesiniň suwly demlemesi gadym döwürlerden bäri peşew ýollarynyň kesellerinde ulanylyp gelinýändir. Onuň gowy peşew kowujy täsiri bar. Ter ýapraklarynyň maýdalanan bölejiklerini ýara bitiriji serişde hökmünde-de ulanýarlar.

Ýüzärlik. Bu gürr şahaly uzyn bolmadyk baldakly köp ýyllyk otjumak ösümlükdir. Ýogyn ok kökleri agaçlaşandyr. Bölünen ýapraklary nobatlaýyn bolsa, iri gülleri ýeke-ýekeden

ýerleşendirler. Miwesi togalak gozajyk. Ol Türmenistanyň hemme ýerinde duş gelýär.

Lukmançylykda onuň oty, seyrek ýagdaýlarda bolsa tohumy ulanylýar.

Yüzärligiň zäherlidigi üçin ony düýelerden başga haýwanlar iýmeýärler. Düzüminde toplanýan esasy alkaloidlere garmalin, garmin, garmalol, peganin, pegamin, peganol, dezoksi-peganin we pegonidin degişlidirler.

Awisenna bu ösümligi agyryny aýyryjy hökmünde ulanypdyr. Halk lukmançylygynda deri kesellerinde, gijelewükde, gury agyryda bu ösümligiň suwuna düşmekligi maslahat berýärler. Otunyň gaynatmasynyň gaýnaglamada, newrasteniýada, tutgaýlarda ukladyjy serişde hökmünde ulanylýarlar. Otunuň tüssesini ýokanç keselli näsaglaryň ýatan otaglaryna ýaýradýarlar. Mundan başga-da onuň otunuň gaýnatmasyny ginekologiki amalynda ysmazlarda, tutgaýlarda ulanylýar. Ýüzärligiň tohumlaryndan taýýarlanan gaýnatma demgysmada, burç bilen bilelikde gury agyryda, peşew we der kowyjy serişde hökmünde ulanylýar.

Onyň hlór wodorodly duzy görnüşindäki garmin alkaloidini epidemiki ensefalityň, ysmazyň we Parkinson keseliniň galdyran gaýraüzülmesini bejermekde ulanylýar. Ol mundan başga-da ýüregiň koronar damarlaryny giňeldýär, arterýal basyşy peseldýär, merkezi nerw ulgamyny gyjyndyrýar. Ylmy lukmançylygynda peganin diýen dermany miopatiýada we miasteniýada hem ulanylýar.

Keýik oty. Bu şahalanyp gidyň kökporrukly köp ýyllyk ösümlikdir. Köp sanly baldaklary göni ösýär. Yapraklarynyň üst yüzleri köp sanly nokat şekilli mäjzagazlary bilen örtülendir. Miweleri dört sanly hozjagazlardan durandyr. Ol Türkmenistanda Köytendagda, Günorta-Günbatar we Merkezi Köpetdagda duş gelýär.

Lukmançylykda onuň ýer üsti bölegi (oty) ulanylýar.

Gülläp duran ösümlikde efir ýagy (0,64% çenli), pulegon we piperiton bardyr. Efir ýagynyň esasy düzümi (60%) bolup, ondan mentoly bölüp hem almak bolýar.

Halk lukmançylygynda otunuň demlemesi ýürek ýetmezçiliklerinde, içege kesellerinde we newrosteniýada ulanylýar. Onuň örän gowy peşew kowujy we ýara bitiriji täsiri bardyr.

Ylmy lukmançylygynda geçirilen kliniki barlaglaryň esasynda keýik otynyň derman görnüşleriniň miokarda we miokardyň infarktyna edýän täsiri belli edildi. Derman serişdeleri ýüregiň işini goldaýarlar, arterial gan basyşyny peseldýärler.

Ahðarhaot. Bu boýy 30 sm bolan köp ýyllyk ýarymgyrymsy agaçdyr. Kök porrugy berk bolup, ol agaçlaşandyr. Onuň agaçlaşan we şahalanmaýan baldaklary göni ösýändir. Maýda ýapraklary mäjzagazlar bilen örtülen bolup, onuň miwesi süýnmekdir we ýylmanak hozjagazlardan ybaratdyr. Bu ösümlük diňe Türkmenistanda duş gelip, Günorta-Günbatar we Merkezi Köpetdagyň orta we ýokary gaýalarynda ösýär. Lukmançylykda onuň oty we güli ulanylýar.

Ösümligiň otunda alkaloidler, 2,27% flawonoidler, 0,43% kumarinler we 0,08-2% çenli efir ýaglary tapyldy. Ýagynyň düzüminde: pinen, kamfen, limonen, sitral, geraniol bölekleri bardyr.

Halk lukmançylygynda ulanylýandygy barada maglumat ýokdyr. Farmakologiki we lukmançylyk derňewleri üçin bu ösümligiň geljegi ulydyr. Efir ýagy parfümer önümçiliginde, sitraly we geranioly almak üçin giňden ulanylýar.

Çomuç. Bu köp ýyllyk örän uly kökli ösümlükdir. Baldagy ýogyň bolup, ýokarsy şahalanyp gidýär. Ýapraklary ýumşak, gyldyrganlar bilen örtülendir we nobatlaýyn ýerleşendirler. Miweleri ikileýin çigitden ybaratdyr. Türkmenistanda Garagum çölünde, Bathyzda we Köýtendagynda ösýändir. Lukmançylykda onuň esasan-da howada gatan şiresi, sakyzy ulanylýandyr.

Gomjyň sakyzy : smoladan (50-70 %), şepbikden (12-35%), efir ýagyndan (3-6%), wanilinden (0,06 %), çomuç turşusyndan, umbelliferondan, A.B.C farneziferollardan

durýandyр. Çomujyň kökleri bolsa pet (68%) we efir ýagyny (0,4%) saklaýandyрlar.

Halk lukmançylygynda çomujyň sakyzy tutgaýlarda we beýleki käbir nerw kesellerinde, şeýle-de içegedäki gurçyklara garşy hem-de ýaralary bitiriji serişde hökmünde ulanylýar.

Awisenna “Assafetidany” bogun agyrlarda, işdä açyjy we peşew kowujy serişdesi hökümünde hem ulanypdyр.

Sakyzy inçekesele, merezýel keseline, gurçuklara garşy serişde hökmünde ulanýarlar.

Ýaş ýapraklaryny turşy süýt bilen garyp halk lukmançylygynda merezýelde we beýleki zyýanly kesellerde ulanýarlar. Onuň sakyzy pis açma keseline-de peýdalanylýar. Ylmy lukmançylygynda sakyzyň tinkturasy pilýulýalaryň we emulsiýalaryň düzümine girip demgysmada we nerw kesellerinde ulanýarlar.

Çöpboýa. Bu boýy 1-1,5 metre ýetýän, köpýyllyk otjumak ösümligidir. Ol Türkmenistanda giňden ýaýrandыр.

Lukmançylykda onuň köki we kök pörrugy ulanylýar.

Çöpboýanyň köki we kök pörrugy öz düzüminde – antrahinonlary we onuň önümlerini, şeýle hem erkin ýagdaýyndaky alizarini, organiki turşularyny (limon, alma), proteini, gantlary we pektinleri saklaýandyр.

Lukmançylykda çöpboýanyň gury ekstrakty-böwrek-daş keseline nefrolitiki serişde hökmünde, damar gysylmalaryny azaltmak, şeýle-de kiçi daş bölekleriniň ýeňil çykmagy üçin ulanylýar. Onuň köküniň tinkturasy bolsa böwrek-daş keseline ulanylýan toplumlaýyn derman bolan “Sistenalyň” düzümine girýär. Çöpboýanyň derman serişdeleri esasan hem oksalat we fostat tebigatly däşlar bolanda has hem ähmiýetlidir. Bu ösümligiň lukmançylykda ulanylýan görnüşlerine esasan-da şular degişlidirler, ýagny:

Çöpboýanyň gury ekstrakty - ol gerdejik (0,25) görnüşinde goýberilýär. Ony günde 3 wagtyna 2-3 gerdejikden içmek maslahat berilýär. Bejergi wagty 20-30 gün.

2) Sistenal-toplumlaýyn derman bolup, düzüminde 0,01g çöpboýa köküniň tinkturasý, 0,15g magniý salisilaty, 6,15 g efil ýagyny, 0,8 g etil spirtini, 10g-a çenli zeýtun ýagyny saklanýandyr. Ony 3-4 damjadan gandyň üstüne damdyryp nahardan ýarym sagat öň içmeli.

Lopuh. Boýy 100-150 sm ýetýän iki ýyllyk otjumak ösümlükdir. Ol Türkmenistanda giňden ýaýrandyr. Lukmançylyk maksatlary üçin bu ösümligiň kökleri ulanylýar.

Ösümligiň köklerinde efir ýaglary, palmitin we stearin turşulygyndan durýan suwuk ýaglary, inulin, eýleýji we aý maddalar, şeýle-de mineral duzlary we witaminler bardyrlar.

Lukmançylykda bu ösümligiň demlemesini peşew çykaryjy, öt we der çykaryjy serişde hökmünde giňden ulanylmaga mynasypdyr. Ondan daşary ony düwürtiklerde, gijelewiklerde daşky serişde hökmünde ulanmak hem bolýandyr. Şeýle-de bu ösümligiň çig maly artritleri we bogunlara duz ýygnanma keselini bejermekde ulanylýan ýyggyndylaryň düzümine hem girýär.

Ösümligiň köküniň suwly erginini almak üçin onuň 1 nahar çemçesi çyg malynyň üstüne 200 ml gaýnag suwy guýmaly we öňki bar bolan tertipde taýýarlamaly. Taýýar bolan gaýnatmany ýarym bulgurdan ýyly görnüşinde günde 2-3 wagtyna içmek maslahat berilýär.

Arça. Bu boýy 8-10 metre ýetýän, hemişe ýaşyl öwsüp oturan gyrymsy agaçdyr. Türkmenistanda esasan-da türkmen arçasý giňden duş gelýändir. Lukmançylyk maksatlary üçin onuň miwesi we püri ulanylýar.

Arçanyň miwesi öz düzüminde efir ýaglaryny, gandy, şeýle hem sirke, alma we garynja turşularyny, mum we ş. m saklanýandyr.

Lukmançylykda arçanyň derman serişdelerini adatça çişleri gaýtaryjy, ýaralary bitiriji we peşew kowujy serişde hökmünde ulanýarlar. Ol dowamly piýelitlerde we sistitlerde, şeýle hem böwrek-daş kesellerinde has-da peýdalydyr.

Arçanyň miwesini köplenç beýleki derman ösümlik serişdeleri bilen bilelikde dem alyş ýollaryň dowamly kesellerinde (traheit, bronhit, laringit) gakylygy suwuklandyrmak we onuň gopmagyny ýeňilleşdirmek üçin ulanylýandyр. Olardan daşary arçanyň miwesi köp ýygyndylaryň we bejerji çaýlaryň hem düzümine girýändir.

Arçanyň miwesiniň demlemesini taýýarlamak üçin, onuň 10 g owradylan çyg malyny syrçaly gaba ýerleşdirip, üstüne 200 ml gaýnan suw guýup, 15 min suwly hammamda gyzdyrýarlar, soňra sowadyp (45 min), süzýärler we alynan demlemäni gaýnan suw bilen 200 ml-e ýetirýärler. Bu demlemäni günde 3-4 wagtyna 1 nahar çemçesinden nahardan soň içmelidir. Aşgabadýň “Saglyk” derman kärhanasynda arça melhemi hem öndürilip başlandy.

Barwinok. Bu köpýyllyk, hemişe gök öwsüp oturan, boýy 15-25 sm ýetýän otjumak ösümlik bolup, ol Türkmenistanyň çäklerinde hem duşýandyр.

Lukmançylyk maksatlary üçin ösümligiň ýapraklary ulanylýar.

Ösümligiň otunda we ýapraklarynda indol hatarynyň alkaloidleri bolan minorin, winkamin, pubissin, şeýle-de flavonoidler, ajy maddalar, askorbin turşusy, karotin we beýleki birleşmeler bardыр. Lukmançylykda bu ösümlik gadymy döwürlerden bäri rahatlandyryjy serişde hökmünde, gan basyşyňy peseldiji, kelle agyrysyny we baş aýlanmasyny aýryjy serişde hökmünde ulanylyp gelinipdir.

Onuň dewinkan we winkapan dermanlaryny gan damarlary giňeldiji (beýniniň gan damarlarynyň gysylmasynda), gan basyşy ýokary adamlarda ony pese düşürmek, şeýle hem newrozlary bejermekde rahatlandyryjy täsiri bermek üçin ulanylýar. Ondan başga-da bu ösümligiň derman görnüşleri ýüregiň işjeňligini ýokarlandyryjy, ownuk gan damarlaryny durnuklylygyny ýokarlandyryjy serişde hökmünde hem

**örän ähmiýetlidir. Ondan taýýarlanýan derman
görnüşlerine esasan-da şular degişlidir:**

Ösümligiň otunyň demlemesi - 1 nahar çemçe çig malyň üstüne 200 ml gaýnan suw goşup, 15 min suwly hammamjykda gyzdyrýarlar we soňra sowadyp süzýärler. Ondan günün dowamynda 1/3 bulgurdan 3 wagtyna içmelidir.

Winkapan - içmek üçin onuň 0,005-0,01g günde 2-3 wagtyna belleniýär.

Dewinkan-winkamin turşusynyň metil efiri bolup, damar giňeldiji, gan basyşyny peseldiji we gowşak rahatlandyryjy täsiri ýüze çykarýar. Ony içmek üçin 0,005-0,01g ulanylýar, myşsa sanjym etmek üçin bolsa 1 ml 0,5% erginden günde bir gezek göýberilýär.

Alyç. Boýy 5-6 metre ýetýän agaçdyr. Ol Türkmenistan-da hem giňden ýaýrandyr. Lukmançylyk maksatlary üçin alyjyň gülleri we miweleri ulanylýar

Onuň miwesinde flavonoidler (kwersetin, giperin, giperozid), organiki turşular (limon, hlorogen, oleanol, we ş.m), eýleýji maddalar, karotinoidler, witaminler we beýleki birleşmeler bardyrlar. Güllerinden bolsa flavonoidler (kwersetin, kwersitrin) asetilholin, efir ýaglary we beýleki organiki birleşmeler tapyldy. Lukmançylykda alyjyň derman serişdeleri ýürek-damar kesellerinde, gan basyşynyň ýokarlanmagynda, stenokardiýada, aritmiýalarda, umumy aterosklerozlarda, newrozlarda we beýleki kesellerde in bir ähmiýetli serişdeleriň biri hasaplanylýar. Ýüregiň wena damarlarynyň gan aýlanşygyny güýçlendirýänligi, şol sanda beýniniň gan damarlarynyň işini kadalaşdyrýanlygy üçin ony ýürek-damar ulgamynyň kesellerinde, gartaşan adam-larda ulanmak mümkinçiligini ýüze çykarýar.

Alyjyň giňden ulanylýan derman görnüşlerine:

Alyjyň 70%-etil spirdinde taýýarlanan tinkturasy degişli bolup onuň 20-30 damjasyndan günün dowamynda 3-4 wagtyna nahardan ön içmek maslahat berilýär.

2) Alyjyň gülleriniň demlemesini ýarym bulgurdan, nahardan 30 min öň günde 2-3 wagtyňa kabul etmeli.

Alyjyň miweleriniň demlemesini ýarym bulgurdan, nahardan 30 min öň, günde 2-3 wagtyňa içmeli.

Ak omela. Bu boýy 40-60 sm ýetýän, hemişe gök öwsüp oturan, mugthor iki öýli ösümlikdir. Türkmenistanda giňden ýaýrandyr. Lukmançylyk maksatlary üçin ösümliğin ýapraklary ulanylýar.

Ösümliğin ýapraklarynda oleanol we ursol turşusy, wisserin, asetilholin, holin şeýle hem sakyz maddalary, spirtler, suwuk ýaglar, askorbin turşusy, karotin duş gelýär.

Lukmançylykda ösümliğin galen dermanlary I we II derejeli gan basyşynyň ýokarlanmasyny bejermekde gipotenziv serişde hökmünde giňden ulanylýar. Ondan daşary hem onuň dermanlary peşew bölüp çykarmagyny güýçlendirýär, şeýle-de az mukdarda gan saklaýjy serişde hökmünde hem ulanylýar. Olar aterosklerozy, nefridi we böwrek keselleriniň käbir görnüşlerini bejermekde toplumlaýyn bejergileriň düzümine-de girýärler.

Bu ösümliğin suwuk ekstraktyny 20-30 damjadan günde 3 wagtyňa içmeli. Onuň ýapraklarynyň tinkturasyny 30-40 damjadan günde 4 wagtyňa kabul etmelidir.

Rauwolfiýa. Boýy 1-1,5 m. ýetýän, ýarym gyrymsy agaçdyr. Esasy duş gelýän ýeri-tropiki ýurtlardyr. Lukmançylykda esasy köki we kök porrugy ulanylýar.

Ösümliğin köki we kök porrugy öz düzüminde 20-töweregi indol alkaloidlerini (rezerpinin, raupin, serpentin, aýmalin, iýohimbin, papawerin) saklaýandyr. Lukmançylykda ulanylýan derman görnüşlerine şular degişlidirler, ýagny:

Rezerpin-gan basyşynyň ýokarlanmasynyň dürli görnüşlerinde ulanylanda onuň yzygider pese düşmegini üpjün edýär. Bejerjilik netijeliligi 3-6 günden soň ýüze çykyp başlaýar we şol netije uzak wagtlap saklanýar. Ony köplenç gerdejik görnüşinde ulanylýar, kä wagtlar bolsa ergin görnüşinde myşsa ýa-da damara sanjym edilýär. Gan basyşynyň ýokarlanmagynda rezerpini 0,1-0,3 mg

möçberde nahardan soň belleýärler. Mundan başga hem rezerpin ýürek ýetmezçiliginiň ýeňil görnüşlerinde tireotoksikozlarda, göwreliligiň soňky toksikozlarynda hem ähmiýetli netije berýär. Utgaşdyrylan – Plezidreks, adelfan ýaly dermanlaryň düzümine girýär.

Raunatin - esasy görkezmesi gan basyşynyň I we II derejeli ýokarlanma keselidir. Raunatin gerdejik görnüşinde içilýär, onuň üçin adatça 1 gerdejikden gijesine bellenilýär, 2-nji güni 1 gerdejikden 2 wagtyna bellenilýär, 3-nji güni bolsa onuň mukdaryny günde 5-6 gerdejige ýetirilýär, özem nahardan soň kabul etmek maslahat berilýär.

Aýmalin - rezerpinden tapawutlylykda neýroleptiki we arterial basyşyny pese düşürji täsiri ýokarydyr. Aýmaliniň özüne mahsus aýratynlygy hem antiaritmiki täsiriniň bolmagydyr. Aýmalin mersatel aritmiýanyň we paroksizmal tahikardiýanyň agyry tutgaýyny aýyrmak üçin ähmiýetli serişde hasaplanylýar. Derman wena gan damaryna ýa-da myşsa sançmak görnüşinde, şeýle-de içmek üçin ulanylýar. Mersatel aritmiýada ýiti tutgaýy aýyrmak üçin dermanyň 2 ml 2,5% erginini wena gan damaryna 10 ml natri hloridiniň izotoniki ergini bilen garyp sanjym edilýär. Myşsa 2 ml 2,5% ergininden her 8 sagatdan 0,15 g çenli (3 gezege çenli) göýberýärler.

Injir. Bu boýy 3-5 m bolan, ýapragyny düşürýän agaç ýa-da gyrymsy agaçdyr. Ýapraklary iri, dykyz, gülleri bolsa bir jynsly, maýdajyk we gül topbaktaryna toplanandyr. Miweleri maýdajyk, köpsanly hozjagazlardan ybaratdyr.

Türkmenistanda giňden ýaýrandyr we Köpetdagiň sebitlerinde, Çendir we Sumbar derýalarynyň kenarlarynda, çeşmeleriň ýanlarynda, uly Balkanyň Küren dagyň gaýalarynda, Köýtän daglarynda, Badhyzda we hojalyklarda köp duş gelýändir. Lukmançylykda onuň bişen miweleri we ýapraklary ulanylýandyr.

Onuň bişen miweleri şekere baý, ter miwelerinde 21% çenli, gury görnüşinde 71% çenli bolýar. Ol şeýle-de proteine, witaminlere we mikroelementlere, esasanam kaliýyň duzlaryna, ösümlik süýmüne we turşyja turşusyna örän baýdyr. Başga-da ösümlik enzimlerinden-fisin, amilaza, proteaza saklanýar. Ösümligiň hemme böleklerinde furokumarinleriň-psoraleniň we bergapteniň köp mukdary toplanýar.

Baldagynyň gabygyndan glikozidler, saponinler, şepbikler, ýapraklaryndan - furokumarinler, organiki turşular, rutin we C vitamini tapyldy. Süýtli şiresi öz düzüminde kauçugy we çepbigi saklaýar.

Halk lukmançylygynda guradylan ýapraklarynyň we kökünüň gaýnatmasy aşgazan näsazlyklarynda ulanylýar. Ter miwelerini ýara bitriji serişde hökmünde we gan azlykda ulanmagy maslahat berilýär. Miwesiniň gaýnatmasy peşewiň çykyşy agyryly bolanda we böwregiň kesellerinde ulanylýar. Ýapraklarynyň demlemesi demgysmada, şeýle-de ýapraklarynyň we şahalarynyň suwly gaýnatmasy içegedäki gurçuklara garşy ulanylýar. Ylmy lukmançylygynda injir ýürek-damar kesellerinde ulanylýar. Iýmit siňdirişi gowulandyrmakda we ýumşadyjy hökmünde ulanylýar. Pis açma kesellerinde deriniň pigmentasiýasyny dikeltmeklik üçin günüň ultramelewşe şöhleleri bilen utgaşdyryp injiriň ýapraklaryndan taýýarlanan psoralen dermany alynýar.

Injiriň miweleri, senaýmekgäniň ýapraklary we garalynyň miweleriniň etinden düzülen briket görnüşdäki kafiolyň düzüminde ýumşadyjy serişde hökmünde ulanylýar.

Meýdan kyrkboguny. Bu boýy 30-40 sm ýetýän köp ýyllyk otjumak ösümlikdir. Ol Türkmenistanda giňden ýaýrandyr. Lukmançylyk maksatlary üçin ösümligiň oty ulanylýar.

Ösümligiň otunda saponinler, alkaloidler (nikotin, ekwizetin), flavonoidler, askorbin turşusy, karotin, organiki turşulary (turşyja, alma), mineral duzlary, eýleýji maddalar, ajylar we ş.m. saklanýar.

Lukmançylykda ösümligi ýürek-damar ýetmezçilik-lerinde (ýürek şikesi), şeýle-de peşew kowujy serişde hökmünde ulanylýar. Onuň bu häsiýeti öýken-ýürek ýetmezçiliginiň esasynda ýüze çykýan çişleri aýyrmak üçin hem peýdalanylýar. Derman öz täsirini bir gezek ulanylandan ýüze çykarýar we özüne uýgunlaşma ýüze çykarmaýar. Peşew çykaryş ýollarynyň kesellerinde (pýelit, sistit, uretrit) bu ösümligi beýleki peşew çykaryjy we gaýnaglama garşy täsiri bolan ösümlükler bilen bilelikde ulanylýar. Düzümünde kremniniň birleşmeleri bolany üçin ol ýüregiň we kelle beýniniň aterosklerozynda, kapilýar-laryň zeperlenmesinde, şeýle hem deriniň we öýkeniň inçekesesinde himiyoterapiýa bejergisi geçirlende ulanylýar.

Bu ösümligiň gan saklaýjylyk we bedenden gurşuny çykaryp bilmek ukyplylygyna esaslanyp, onuň dermanlaryny ýatgy gan akmalarynda we gurşun bilen ýiti ýa-da dowamly zäherlenme bolanda ulanýarlar. Onuň derman görnüşlerine şular degişlidirler, ýagny:

Ösümligiň otynyň gaýnatmasy. Onuň üçin 4 nahar çemçe çig maly syrçaly gapda ýerleşdirip, üstüne 200 ml (1 bulgur) gaýnan gyzgyn suw goşýarlar we 30 min dowamynda suwly hammamjykda gyzdyrýarlar, soňra 10 min dowamynda otag temperaturada sowadýarlar, süzýärler we göwrümini 200 ml çenli ýetirýärler. Gaýnatmany 1/2-1/3 bulgurdan, nahardan 1 sag ön, günde 2-3 wagtyna içmeli.

2. Suwuk ekstrakty -1/2 çay çemçeden günde 3-4 wagtyna kabul etmeli.

Ýeken. Bu boýy 100-120sm ýetýän köp ýyllyk otjumak ösümlükdir. Ol Türkmenistanda hem duş gelýär. Lukmançylyk maksatlary üçin ösümligiň kök porrugy ulanylýar.

Ösümligiň kök porrugynda-eýleýji maddalar, sakyzlar, askorbin turşusy, glikozidler (akorin), efir ýaglary we ş.m. tapyldy. Lukmançylykda ösümligiň kök porrugyndan taýýarlanan dermanlary dowamly gastridi, aşgazanyň we 12-barmak içegäniň baş kesellerini, esasan hem aşgazan

turşulygy peselen näsaglarda, şeýle hem dürli görnüşli iç geçmelerde, iýmit siňdirişiniň bozulmalarynda esasy derman serişdesi bolup hyzmat edýär. Ösümligiň kök porrugynyň külkesi "Wikalin" we "Wikair" dermanlarynyň düzümine girýär hem-de aşgazanyň, 12-barmak içegäniň baş keselini bejermekde ulanylýar. Ösümligiň gaýnatmasy we demlemesi iriňli yaralary ýuwmak we daňy goýmak üçin giňden peýdalanylýar. Ondan başga-da ol derman ösümlükleriniň ýygyndylarynyň we beýleki bejeriji çaýlaryň hem düzümine girýär.

Onuň derman görnüşlerinden ulanylýanlary:

1. Ösümligiň kök porrugynyň demlemesi. Taýýar bolan demlemäni ýyly görnüşinde 1/4 bulgurdan, nahardan 30 min öň, günde 3-4 wagtna içmek maslahat berilýär.
2. Ösümligiň kök porrugynyň tinkturasy - 40%-li spirtde (1:5) taýýarlanylýar. Ony 20 damjadan, nahardan öň günde 2 wagtna kabul etmeli.
3. "Wikalin"- gerdejiginiň örtüji, turşulygy peseldiji we içi gowşadyjy täsirine esaslanyp, ony turşulygy ýokary bolan gastritlerde, aşgazanyň we 12-barmak içegäniň baş kesellerini bejermekde peýdalanylýar. Ony içmek üçin 1-2 gerdejikden, nahardan soň, günde 3 wagtna ýarym bulgur ýyly suw bilen kabul etmeli.
4. "Wikair"- gerdejigini nahardan soň 1-2 gerdejikden 1/4 bulgur suw bilen içmeklik maslahat berilýär.

Porsy agaç. Bu boýy 20-25 m ýetýän agaç bolup, gür şahalanyp gidýändir. Ýapraklary iri, çylşyrymly, özboluşly ysly bolup, gezekleýin ýerleşendir. Miwesi togalak ganatlyja çigitjikdir. Onuň ata watany Hytaýdyr. Ol Türkmenistanyň hemme ýerlerine ýaýran we ol bezeg hökmünde ekilýär.

Çyg mal hökmünde onuň gabygy, ýapraklary we miwesi ulanylýar.

Gabygynda aýratyn aýy maddasyny, 12% eýleýji maddalary, laktony, simaburini, saponinleri, flavonoid-leri,

sterinleri, alkaloidleriň köp bolmadyk mukdaryny, organiki maddalary, C witaminini saklaýar. Onuň güllerinde efir ýagy bardyr, tohumyndan bolsa ýag we kwassin ajy maddasy alynandyr. Ýapraklarynda efir ýaglarynyň köp bolmadyk mukdary, eýleýji maddalary (gallotanin we ellagotanin), organiki turşulary we C vitamini saklanýar.

Halk lukmançylygynda porsy agajyc ýapragynyň gaýnatmasyny leýşmaniýozda, gabygyny we ýapragyny dizenteriyada (iç geçmede), miwesini babasil keselinde we ýumşadyjy serişde hökmünde ulanýarlar. Köküniň gabygyndan taýýarlanan gaýnatmasy antibakterial häsýeti, şeýle-de şahalarynyň gabygyndan we ýapraklaryndan taýýarlanan ergin içegedäki gurçuklara garşy güýçli serişdedir.

Ylmy lukmançylygynda porsy agajyc miwesi ulanylyp, onuň tinkturasy anginol serişdesiniň düzümine girýär. Ol serişde bolsa dürli hili gelip çykyşly basygy bejermekde ulanylýar.

Anhuz. Bu köp ýyllyk otjumak ösümlik bolup, onuň baldagy uzyn dyr we şahalanyp göni durandyr. Ýapraklary süýnmek, gülleri çylşyrymly bolup, salkymy emele getirýärler. Miwesi mele reňkli hozjagazdyr. Ol Türkmenistanda Murgap oazisinde, Köýtendagda, Badhyzda, Gündogar Merkezi we Günorta-Günbatar Köpetdagyň daglarynda we dag eteklerinde duş gelýändir.

Onuň oty, köki we gülleri çig mal hökminde ulanylýandyr.

Ösümligiň hemme ýerlerinde saponinler toplanandyr. Köklerinde alkanin hem bardyr.

Halk lukmançylygynda onuň gülleri suwuk demleme görnüşinde gyzgynyňy gaýtarýan we içini sürüji serişde hökmünde ulanylýar. Otunyň demlemesi ýumşadyjy we gakylyk goparyjy serişde hökmünde hem peýdalanylýar.

Göwen. Bu uly bolmadyk tikenli gyrymsy ösümlikdir. Şahalary ýogyn we egri tikenleri bilen gür örtülendir. Süýri goşalanan ýapraklarynyň uçlary tikenlidir, miwesi bolsa kösükdir. Türkmenistanda göweniň 157 görnüşi ösýär we

olaryň 19 tragakantlardyr. Tragakant göwenleri esasan hem Kuren dagyň, uly we kiçi Balkanyň orta we ýokary sebitlerinde, Merkezi we Günorta-Günbatar Köpetdagda ösýärler. Lukmançylykda onuň çig maly bolup _tragakantyň sepbigi ulanylýar.

Adaty nazzbaýgül. Bu boýy 20-50 sm bolan bir ýyllyk otjumak ösümlükdir. Ýapraklary ýumurtga şekilli, gyalary diş-dişdir. Miwesi goňur-gara hozjagazlardan ybaratdyr. Bu ösümligiň ata watany Hindistandyr. Bu ösümlük Türkmenistanda haşal ot görnüşinde duşýar, şeýle-de ony hemme suwarymly ýerlerde ekmek bolýar.

Dermançylyk önümçiliginde onuň gülüniň efir ýagy ulanylýar.

Bu ösümligiň güli efir ýagyny saklaýar, onuň mukdary ösýän ýerine baglylykda üýtgäp durýar. Efir ýagy düzüminde metaniholy, linaloly, sinooly saklaýar. Ondan sowudalyp onuň kamforasy bölünip alynýar. Onuň otunda efir ýaglaryndan başga-da glikozidler, saponinler we eýleýji maddalar hem bardyrlar. Onuň ýapraklarynda P witamin - rutin we A prowitmini tapyldy.

Halk lukmançylygynda nazzbaýgüliň demlemesini basykda, burun dykylanda, gaýnaglama kesellerinde, peşew geçiriji ýollarynyň we böwregiň gaýnaglamagynda ulanmagy maslahat berilýär. Mundan başga-da melhem görnüşinde ýaralary bitiriji serişde edip ulanýarlar. Ylmy lukmançylykda nazzbaýgüli demleme we gaýnatma görnüşinde merkezi nerw ulgamyny gyjyndyryjy hökmünde we gan aýlanylşygynyň bozulmagynda ulanylýar. Köplenç asteniýada umumy gurplandyryjy serişde hökmünde hem ulanylýar. Ony ulanmak bilen iç yellenende we dispepsiýada hem gowy netijelere gelip bolýar.

Gandeper. Bu boýy 20-40 sm köp ýyllyk otjumak ösümlükdir. Onuň kök miwelerine meňzeş, çiş görnüşdäki ýogyn köki bardyr. Güýçli baldagy bardajykly gowaklar bilen

örtülendir. Ýapraklary böleklere bölünip ýitilenip gidýär. Miweleri ýalaňaç, açyk we ýygtylydyr.

Türkmenistanda Köpetdagyň uly we kiçi Balkanyň, Köýteniň daglarynda we dag eteklerinde ösýär.

Lukmançylykda onuň ulanylýan böleklerine köki we oty degişlidir.

Kök miwelerinde 30% gowrak uglewodlar, pet, protein, şeker, kalsiýiň, demiriň we kaliýiň duzlaryndan köp bolmadyk mukdary bardyr. Şeýle-de olarda eýleýji maddalaryň we saponinleriň barlygy anyklandy. Ösümligiň ýer üsti bölegi efir ýaglaryny saklaýar. Efir ýagynyň düzümine 26 sany düzümlü maddalar girip, olar esasanam monoterpen fraksiýasyndaky terpenoidlerdendir.

Halk lukmançylygynda bu ösümligiň köki gan saklaýjy hökmünde we aşgazan içege kesellerinde ulanylýar.

Bürelije. Bu bir ýyllyk ösümlük köki göni ösen, birnäçe gür şahalanýar baldaklary ösümlige togalak görnüş berýär. Baldaklary we şahalary gür ýaprakly. Ýapraklary süýnmek, köp mäjzagazly. Türkmenistanda Kürendagyň uly we kiçi Balkanyň, Köpetdagyň daglarynda we dag eteklerinde we Badhyzda duş gelýär. Lukmançylykda çig mal bolup ýer üsti bölegi hyzmat edýär.

Fitohimiki barlaglaryň esasynda bürelijäniň düzüminde efir ýaglarynyň (0,47%), flavonoidleriň (1,05%), alkaloidleriň (0,07%), glikozidleriň (0,26%), kumarinleriň (0,82%), askorbin turşysynyň (5,83 mg %), eýleýji (5,04%), we şekerli (6,9 %) maddalarynyň, organiki maddalaryň (5,83%) şepbigic (7,8%) bardygy anyklanyldy.

Bejeriji serişde hökmünde ösümligiň gaýnatmalary, tinkturalary, demlemeleri we ekstraktlary ulanylýar. Suwly we spirtli çykyndylardan başga-da onuň wazelin esasda taýýarlanan düzüminde 3-5% efir ýagyny saklaýan melhemleri hem ulanylýar. Onuň dermanlary ýokary antimikrob, peşew kowujy we ýara bitiriji häsýete eýedirler. Bürelijäniň 3-5 %-li melhemi gözüň görejiniň kesellerini

bejermekde has netijelidir, şeýle-de ol agyryly gyjyndyrmany döretmeýär.

Bu ösümligiň dermanlary adam bedeniniň peşew bölüp çykarmagyny 47% çenli ýokarlandyrýar.

Ýandak. Bu köp ýylylyk tikenli otjumak ösümligidir. Baldagy gönü we şahalanýandyr. Ýapraklary süýnmek, gaty hem-de tikenlidir. Gülleri 2-3-den tikenin üstünde ýerleşen, miwesi ýalaňaç (açyk) 4-5 tohumly kösükdir.

Türkmenistanda Köpetdagyň dag eteklerinde, düzlüklerde, suwarymly ýerlerde, boşluklarda duş gelýän, giňden ýaýran haşal otdyr. Lukmançylykda peýdalanylýan çig maly bolup onuň güli, oty we köki ulanylýar.

Otunda saponinler, C, A (karotin), B, K witaminleri, P witamin aktiwligini ýüze çykarýan flawon toparynyň glikozidleri tapyldy. Terenjümeniň düzüminde şepbik, mannit, şeker, limon turşulygyny, eýleýji we aýy maddalary saklaýar. Onuň gülleri efir ýaglaryny saklaýarlar.

Awisenna bu ösümligiň demlemesini derlediji, gowşadyjy, peşew kowujy serişde hökmünde, içege kesellerini bejermekde we kökünden taýýarlanan goýy gaýnatmasyny bolsa babasil keselinde gan saklamak üçin ulanypdyr. Ösümligiň kökünüň we otunyň gaýnatmalary we demlemeleri fitonsit häsiýetli bolup, içgeçme kesellerinde ulanylýar. Ýandagyň çäýy suwsyzlygyňy gandyryýar we deriň bölünip çykmagyny peseldýär.

Üzüm. Bu uly agaç şekilli ýapragyny dökýän liana. Ýapraklary nobatlaýyn ýerleşip, gyralary böleklenendir. Gülleri iki jynsly, köpsanly, maýdajyk sübsejigi emele getirýärler. Miweleri hoşany emele getirýärler. Türkmenistanyň hemme suwarymly ýerlerinde ekilýär. Lukmançylykda ulanylýan bölekleri onuň bişen miweleri we ýapraklarydyr.

Miwelerinde şekerin örän köp mukdary (20%) bolup, olardan in esasylary- glýukoza, fruktoza, flobafen, galla turşusy, kuertetin, enin; glikozidlerden- monodelfinidin we didelfinidin; turşulardan - alma, fosfor, kremniý, salisil,

limon, ýantar, garynja we köp bolmadyk mukdarda - turşuja turşysy; mineral maddalar we mikroelementler (kaliý, kalsiý, magniý, demir, marganes, kobalt); enzimlerden- intertaza, pektinaza, proteaza, lipaza, dürli hili witaminler bardyrlar. Miweleriniň gabygynda 3,4% çenli eýleýji we reňkleýji maddalar bardyr.

Üzümin ýapragyndan şeker, tnozit, kiwersetin, eýleyji maddalar, karotin, holin, betain, alokruz esaslary, protokateh, askorbin, alma, çakyr turşulary; mikroelementlerden-kaliý, natriý, fosfor, demir, kremniý tapyldy.

Halk lukmançylygynda üzümi ýürek- damar, öýken, bagyr kesellerini bejermekde ulanylypdyr. Ylmy lukmançylygynda üzümiň miwesini we şiresini ýürek, bronh, böwrek, bagyr kesellerinde, nerw ulgamynyň gowşamagynda, gipertoniki kesellerde we umumy berkidiji serişde hökmünde ulanylýar.

Umumy berkidiji serişde hökmünde üzümiň şiresini gan azlykda, demgysmada, öýkeniň inçe keselinde, dürli asteniki ýagdaýlarda, mineral we lipid madda çalşygy bozulanda ulanylýar. Üzümiň ýapragynyň demlemesi madda çalşygynyň bozulmasynda goldaýar.

Üzümiň-naturoza dermany köp mukdarda gan ýitirilende ulanylýar.

Turşy üljä. Bu ýapragyny düşürýän, uly bolmadyk agaç ýa-da gyrymsy agaçdyr. Gülleri ak ýa-da açyk gül-güne reňklidir. Ýapraklary inli we dykyz bolýandyr. Miwesi şireli we şäniklidir. Ol Türkmenistanda suwarymly ýerlerde miweli agaç hökmünde ekilýär. Lukmançylyk maksatlary üçin onuň miweleri ulanylýar.

Turşy üljäniň miwelerinde şeker, pektinler, organiki turşulary, eýleýji maddalar, karotin, askorbin turşusy saklanýar. Mikroelementlerden mis, demir, magniý tapyldy. Tohumynda ýaglar, efir ýaglary, amigdalın saklanýandyr.

Halk lukmançylygynda üljäniň miwelerini peşew ýollarynyň kesellerinde, peşew-daş kesellerinde, işdäni açmaklyk üçin we berhiz saklamaklyk üçin serişde hökmünde aşgazan - içege kesellerinde ulanylýar. Madda çalşygy

gowulandyrmak üçin, bagyr we süýji kesellerinde onuň şiresinden peýdalanýarlar.

Ylmy lukmançylygynda ony suwuk derman görnüşlerini süýjütme we tagamyny gowulandyrmak üçin ulanylýar. Üljäniň miwesiniň eti we şiresi antibiotiki serişde hökmünde hem peýdalanylýp biliner.

Göýül. Bu köp ýyllyk, otjumak, ýere ýazylyp ösýän tikenli ösümlükdir. Onuň 10 m çenli çuňluga gidýän göni köki we iri, owadan gülleri bardyr. Miwesi irimiş şekilli, ýaşyl reňklidir. Ol Türkmenistanyň hemme çöllük ýerlerinde, dag eteklerinde, daglarda we derýalaryň kenarlarynda duş gelýär. Lukmançylykda onuň gülleri, miweleri we kökleri ulanylýar.

Onuň gül pyntyklarynda rutin, şeýle-de azotly we pektinli maddalar, efir ýaglary, C witamini toplanandyr. Tohumlarynda linolen we olein doýan turşularyndan durýan ýodyň ýokary sanyny düzüminde saklaýan haýal guraýan ýaglar tapylandyr. Miwelerinde mirozin enzimli steroid glikozidleriniň we gyzyl pigmentiň barlygy anyklanyldy. Onuň köklerinde kapparidin steroid glikozidi bardyr.

Halk lukmançylygynda Awisenna göýüliň kökünün gaýnatmasyny babasyl keselinde ulanypdyr. Göýüliň miwelerinde ýoduň köp mukdarynyň bolandygy sebäpli ony zob keselini bejermekde ulanylýar. Gülleriniň şiresinden agyryny aýyryjy we demgysma garşy serişdäni taýýarlaýarlar.

Ýapraklary demleme görnüşinde deri örgünleri, ýaralary bejermekde ulanylýar. Köki gaýnatma görnüşinde içi ýumşadyjy serişde hökmünde, kökiniň gabyklary owradylan ýagdaýynda gury agyryda we brusellýozda ulanylýar.

Gök daş kekre. Bu boýy 50-60 sm ýetýän bir ýyllyk ýa-da iki ýyllyk otjumak ösümlükdir. Türkmenistanyň dag eteklerinde duş gelýändir. Lukmançylyk maksatlary üçin ösümligiň gülleri ulanylýar.

Onuň gülleri öz düzüminde glikozidleri (sikorin, sitaurin), reňkli maddalary (sianin), pelargonin hloridi we ş.m maddalary saklaýandyr.

Lukmançylykda bu ösümligiň gülleriniň demlemesi we gaýnatmasy böwregiň we peşew ýollarynyň dowamly kesellerinde toplumlaýyn bejergileri geçirmekde giňden ulanylýar. Peşew çykaryjy ýygyndylaryň düzümine girýänligi üçin böwrek-daş kesellerinde, piýelitlerde, uretritlerde we sistitlerde ulanylýar. Gaýnaglama garşy we mikroblary ýok ediji täsirlerine esaslanyp ony göz kesellerini (konýuktivit, blefarit) bejermekde hem ulanmak bolýar. Käbir ylmy synaglaryň esasynda ösümligiň derman görnüşi bagyr we öt ýollarynyň kesellerini bejermekde mümkinçiliginiň barlygy subut edildi. Düzüminde ajylar bolany üçin onuň iýmit siňdiriş ulgamynyň işlerini kadalaşdyryjy täsiri hem bardyr.

Ösümligiň gülleriniň demlemesi umumy görkezilýän düzgüne laýyklykda taýýarlanylýar. Demlemäni ýyly görnüşde 1 nahar çemçesinden günde 3 wagtyna peşew kowujy, öt çykaryjy we mikroblara garşy serişde hökmünde içmek maslahat berilýär.

Kyrkbogun. Bu boýy 30-40 sm ýetýän bir ýyllyk otjumak ösümligidir. Lukmançylykda onuň oty ulanylýar.

Ösümligiň otunda köp mukdarda askorbin turşusy, K-witamini, karotin, glikozidler (awikulýarin), eýleýji maddalar we kremniý turşusynyň birleşmeleri bar.

Lukmançylykda bu ösümligiň galen dermanlary we ýygyndylary peşew çykaryş ýollarynyň dowamly kesellerinde, böwrekde duzlar bolanda, esasan hem turşuja turşusynyň duzlary bolanda bejergi serişdesi hökmünde giňden ulanylýar. Düzüminde eýleýji madda bolany üçin aşgazan-içege ýollarynyň dürli kesellerinde ulanmak örän peýdalydyr. Zäherlere garşy täsirine esaslanyp, ony madda çalşygynyň bozulmasy esasynda bedende toplanan zäherli maddalary çykarmak üçin we bagyr ýetmezçiliginde peýdalanýarlar. Ondan başga-da ösümligiň demlemesi we gaýnatmasy ýatgy we içege gan akmalarynda hem giňden ulanylýar.

Ösümligiň otunyň demlemesini taýýarlamak üçin onuň 3 nahar çemçe çig malyny syrçaly gapda ýerleşdirip,

üstüne 200 ml (1 bulgur) gaýnan suwy goşup 15 minudyň dowamynda suw hammamjygynda gyzdýrýarlar, soňra otag temperaturasynda 45 minutlap sowadyp süzýärler we demlemäniň göwrümini 200 ml çenli ýetirýärler. Taýýar bolan demlemäni 1/2 -1/3 bulgurdan, nahardan öň, günde 2-3 wagtyna içmelidir.

Sarymsak. Bu medenileşdirilen köp ýyllyk otjumak ösümlükdir. Soganlygy iri, ýumurtga şekilli, çylşyrymly bolup, birnäçe böleklerden durýandyr. Ýapraklary ýasyl we ýaý sekillidir. Gülleri maýdajyk, agymtyl saýawanany emele getirýärler. Türkmenistanyň hemme suwarymly ýerlerinde ekilýär. Lukmançylykda onuň soganlygy ulanylýar.

Sarymsagyň soganlygy öz düzüminde dialildisulfid (60%), dialiltrisulfid (20%), dialiltetrasulfid (10%), alilpropildisulfid (6%) saklaýan efir ýagyny toplaýar. Ol askorbin turşysyna, proteine, uglewodlara baýdyr. Uglewodlaryň esasyalary – alilosahar we glýukofruktozadyr. Sarymsak öz düzüminde petden başga ätiýaçlyk maddalaryndan redusirlemeýän turşudan we fruktozadan durýan polisaharidleri hem saklaýandyr. Sarymsaga özboluşly ys berýän – suwda gowy ereýän allisindir. Sarymsakda şeýle-de fitosterinler, enzimler, tioglukozidler, mikroelementler, A,B witaminler we ýaglar hem bardyrlar.

Sarymsak gadymdan bäri keselleriň önüni alyjy serişde hökmünde, deri kesellerini bejermekde, gan basyşy ýokary bolanda, aşgazan içege keselleriň önüni almakda halk lukmançylygynda ulanylypdyr. Ýapgy görnüşde kelle agyryda, siňnillerde, gabarçaklarda dowamly wagty bilen bitmeýän ýaralarda, ýylanlar we içýanlar çakanda ulanylýar.

Sarymsagyň bakteriosid, fungisid, protistosid häsiýetleri bolup, içegedäki gurçuklara garşy hem ulanylýar.

Sarymsagyň güýçli antimikrob häsiýeti hem bardyr. Mundan başga-da ony aterosklerozda, gan basyşy ýokary bolanda we işdäni açmak üçin ulanylýar.

Dermançylyk önümçiliginde şu dermanlar öndürilýär: aterosklerozy we kardiosklerozy bejermekde - allilsat, iriňli ýaralarda, gurçukly kesellerde, gan basyşy ýokary bolanda, aterosklerozyda we öýkeniň inçekesesinde ulanylmagy maslahat berilýän –allilfid we sarymsagyň tinkturasy. Sarymsagyň gury ekstrakty allahol dermanynyň düzümine girýändir.

Düýedaban. Bu tekiz, ýylmanak köp ýyllyk otjumak ösümlükdir. Baldagy otjumak we göni ösýändir. Ýapraklary ýogyn hem-de goýy ýaşyl reňkli bolup, garşylyklaýyn ýerleşendir. Miweleri süýridir hem-de sallanyp durandyr.

Türkmenistanda giňden ýaýrap, has-da Bathyzda we Köpetdagyň eteklerinde köp duş gelýändir. Lukmançylyk maksatlary üçin onuň oty we köki ulanylýandyr.

Ösümligiň hemme ýerinde alkaloidler (2%), saponinler, C witamini we eýleýji maddalar toplanandyr.

Halk lukmançylygynda ýara bitiriji serişde hökmünde onuň ter ýapraklary ulanylýar. Mundan başga-da ýüregiň işjeňligi peselende, ysgyn gaçanda we gurçyklara garşy peýdalanylýar. Kökleriniň gaýnatmasy guryagyryda we ýaralarda ulanylýar.

Üç bölek goşa diş. Bu boýy 15-20 sm bolan, bir ýyllyk otjumak ösümlükdir. Onuň ýapraklary süýnmek bolup, garşylyklaýyn ýerleşendir, gülleri bolsa sary sebedi emele getirýändirler. Türkmenistanda dag eteklerinde düzlüklerde, derýalaryň kenarynda ösýändir, has-da Köpetdagyň we Köýtendagyň eteklerinde, şeýle-de Murgap oazisinde köp duş gelýändir. Lukmançylykda onuň şahalary we ýapraklary ulanylýar.

Ol öz düzüminde efir ýaglaryny, kumarinlerden - umbelliferony we skopoletini, 10%-den az bolmadyk sanda flavanoidleri, askorbin turşusyny, karotini, eýleýji we reňk beriji maddalary, nemleri, laktonlary, aminleri we mikroelementleri saklaýandyr.

Halk lukmançylygynda onuň demlemesini we gaýnatmasy rahatde, bagyr, dalak we deri kesellerinde ulanylypdyr.

Bu ösümligiň gowy gan arassalayjy häsiýeti bolup, ol peşew kowujy we derlediji täsirleri hem ýüze çykarýar. Otunyň gaýnatmasyny ýaralary ýuwmakda we çagalarydaky gijilewükde hem diateziň dürli görnüşlerinde ulanylýar. Marganesiň we askorbin turşusynyň öz düzüminde bolandygy sebäpli bu ösümligiň dermanlary bejeriji täsiri eýeleýärler. Marganesiň ionlary gan lagtalanmaklygyna, gan emele gelmekligine we içki sekresiýalaryň mázlerine täsir edýärler. Üç bölek goşa dişiň oty madda çalşygyny gowulandyrýar, ony dürli diatezlerde, neýrodermitlerde we saç düşme kesellerinde hem ulanýarlar. Onuň deridäki bitmeýän ýaralara guradyjy täsiri hem bardyr. Otynyň demlemesi arterial gan basyşyny hem peseldýändir.

Tilkiçay. Bu gataşan baldakly ýarymgyrymsy ösümlikdir. Onuň tüýjimek ýapraklary garşylyklaýyn ýerleşýärler, şeýlede gapdala gidýän damarlanan ýapraklary bitewidirler. Ol Türkmenistanda Köýten dagynda we Günorta-Günbatar Köpetdagda duş gelýändir.

Otunda flavanoidler, betamisin, stahidrin, iridoidler, efir ýaglary, kalsiý duzlary, şeker, fenolkarbonlar bardyrlar.

Uly Guzygulak. Bu köp ýyllyk otjymak ösümlik bolup, boýy 50-60 sm ýetýändir. Oňa Türkmenistanyň çäklerinde hem duş gelmek bolýar. Lukmançylyk maslahatlary üçin ösümligiň köki we kök porrugy ulanylýar.

Guzygulagyň köki we kök porrugy öz düzüminde efir ýaglaryny (gelenin, alantol, proazulen) we seskwiterpen laktonlarynyň garyndysyny (alantolakton, izoalontolakton, digidroalantolakton) saklaýar. Ondan daşary hem köklerinden witamin E, saponinler, sakyz, şepbikler, nemler, alkaloidleriň köp bolmadyk mukdary we polisaharidler (inulin, psewdoinulin) tapyldy.

Lukmançylykda ony gakylyk goparyjy serişdesi hökmünde ulanýarlar. Dem alyş ýollarynyň ýiti we dowamly keselleri onuň bilen bejerlende, ol bronhlaryň sekresiýasyny azaldýar. Şonuň üçin hem ony köp mukdardaky we goýy gakylykly kesellerde ulanylanda aýratyn gowy netije berýär. Onuň öt

çykaryjy, gaýnaglama garşy we iýmit siňdirişi sazlaýjy täsiri bolany üçin ony aşgazan-içege ýollarynyň kesellerinde ulanmak örän amatlydyr. Bulardan daşary hem guzygulagyň derman görnüşleri aşgazanyň we 12-barmak içegäniň baş kesellerinden ejir çekýän näsaglarynda hem ulanylyp görülende aýratyn gowy netijeleri berýändigini anyklanyldy. Bejergi doly geçirilen näsaglarda ýaralar doly bitýär ýa-da olaryň ölçegleri has-da azalýar. Onuň şeýle derman görnüşleri taýýarlanylýar, ýagny:

Guzygulagyň kökünüň we kök porrugynyň gaýnatmasy. Ony taýýarlamak üçin 1 nahar çemçe çig maly syrçaly gapda ýerleşdirip üstüne 200 ml gyzgyn suwy goşup 30 minudyň dowamynda garyşdyrmak arkaly gyzdyrmaly, soňra otag temperaturasynda 10-minutlap sowadyp, süzmeli. Gaýnatmany ýyly görnüşde 1/2 bulgurdan nahardan 1 sagat öň günde 2-3 wagtyna kabul etmeli.

2) Alanton gerdejigi – 0,1 g günde 3 wagtyna nahardan soň 6-8 hepdäniň dowamynda belleniýär.

Borjak. Bu boýy 1,5 metre çenli ýetýän kiçi gyrymsy agaçdyr. Türkmenistanda giňden ýaýrandyr. Lukmançylyk maksatlary üçin bu ösümligiň ýer üsti böleginden efedrin alynýar.

Ösümligiň otynda alkaloid efedrin we psewdoefedrin bar. Mundan başga-da eýleýji maddalaryndan tanin hem bardyr.

Lukmançylykda ulanylýan borjagyň düzümindäki alkaloid efedriniň farmakologiki aktiwligi onuň α we β resptorlara stimilirleýleýji täsir etmegi bilen baglanşyklydyr. Ol periferiki damarlary we nemli bardalary daraldyjy täsir edip, ýüregiň işleýşini sazlaşdyrýar, arterial basyşy ýokarlandyrýar, göreji we bronhlary giňeldýär, şeýle-de merkezi nerw ulgamyny we dem alyş merkezi gyjyndyrýar.

Borjagyň dermany efedrin gidrohloridi demgysmada, dürli allergiki kesellerde, renit keselinde, arterial basyşy ýokarlandyrmak maksady bilen döwür-ýenjik kesellerde, ýokanç kesellerde, mundan başga-da neşe we uky getiriji

dermanlar bilen zäherlenende we oftalmalogiýa amallarynda göreji giňeltmek üçin ulanylýar.

Bu dermany gipertoniki kesellerde, aterosklerozda, miokardyň infarktynda, süýji keselinde, gipertireozda ulanmak maslahat berilmeýär.

Efedrin gidrohloridi kulke we gerdejik görnüşinde 0,025 g we 5 % ergin, ampulada göýberilýär. Mundan başga-da 5 % efedriniň ergini 1:3, 1:5 natriniň hloridiniň izotoniki ergini bilen garylyp aerosol görnüşinde ulanylýar. Efedriniň dermany teofedriniň (bronholitiki täsirli) hem düzümine girýär.

Waleriana. Bu boýy 1,5-m ýetýän köp ýyllyk otjumak ösümlikdir. Lukmançylyk maksady üçin bu ösümligiň köki we kök porrugy ulanylýar.

Onuň porrugynda 3,5 % golaý efir ýaglary, izowalerian turşusy, bornilizowalerianat, garynja turşysynyň borneol efiri, spirtler we alkaloidler (hatinin, walerin), glikozid birleşmeleri, walepatreatlar, eýleýji maddalar, şepbikler, pet, organiki turşular (palmitin, stearin, sirke, garynja, alma we ş. m.) bardyrlar.

Lukmançylykda bu ösümligiň farmakologiki tasiri onuň kökünde we kök porrugynda bar bolan toplum maddalaryň tasirleri bilen baglanşyklydyr. Waleriana merkezi nerw ulgamyna sedatiw we trankwilizirleýji täsir edip, onuň galen dermanlary, köp düzümlü demlemeleri, tinkturalary, damjalary ýürek - damar ulgamyň işleýşini gowulandyryjy we rahatlandyryjy serişde hökmünde ulanylýar.

Waleriananyň dermanlary nerwi gyjyndyrmalarda, ukusyzlykda, çakyza şekilli kelle agyrylarda hem täsirlidirler. Şeýle-de olary newrasteniýada, psihasteniýada, klimakteriki bozulmalarda, ýürek - damar ulgamynyň nerwozynda hem ulanylýar. Mundan başga-da keseliň önüni almak maksady bilen stenokardiýanyň irki etaplarynda we gipertoniki kesellerinde hem ondan peýdalanylýar.

Bu ösümligiň dermanlarynyň spazmolitiki we öt kowujy häsiýeti hem-de aşgazan-ıçege ulgamynyň mázleriniň sekresiýasyny güýçlendiriji häsiýeti ýüze çykarmagy, aşgazan-ıçege sanjylaryna, şeýle hem onuň sekresiýasynyň ýerine ýetirýän işiniň bozulmagyna alyp barýan bagyr we öt ýollarynyň kesellerinde hem giňden ulanylýar.

Lukmançylykda waleriananyň birnäçe derman görnüşleri ulanylyp, iň esasy hem onuň demlemesidir. Ony taýýarlamak üçin 20 g çig maly 200 ml gaýnan suw bilen 15 minutlap suwly hammamda gaýnatmaly. Soňra 45 minutlap sowatmaly we süzmeli. Alynan erginiň göwrümini gaýnan suw bilen 200 ml çenli dogurlap, günde 2-3 nahar çemçesinden 30 minut nahardan öň içmelidir.

Waleriananyň tinkturasy 70 % spirtde 1:5 taýýarlanylýar. Ony 20-30 damjadan günde 3-4 gezekden içmeli. Waleriananyç goýy ekstrakty dürli dermanlary taýýarlamak üçin ulanylýar.

Gök gülälek. Bu otjumak ösümlikdir. Ony köplenç ýagdaýlarda medenileşdirip ösdürýärler. Lukmançylyk maksatlary üçin bu ösümligiň ýerden ýokarky bölegi ulanylýar.

Bu ösümligiň otunda alkaloidleriň toplumy bolup olaryň has köprägi hem glausinlerdir. Mundan başga-da olarda alkaloidlerden aurotenzin, koridin, helidonin, allokriptopin, helirubin, sangwinarin, heleritrin, protopin we ş. m. bardyrlar.

Onuň lukmançylykdaky ulanylşy düzümindäki alkaloid glausiniň adrenolitiki täsiri ýüze çykarýandygy bilen baglanşyklydyr. Ony ýiti gaýnaglamada, ötüşen bronhitde, öýken absesinde we üsgülewükde, dem alyş ýollarynyň dürli kesellerinde giňden ulanylýar. Bu derman beýleki üsgülewüğe garşy serişdeler ýaly iç gatama we beýleki goşmaça täsirleri ýüze çykarmaýar.

Glausin gidrohlorid gerdejigi - 0,05 g günde 2-3 gezek içmegi maslahat berilýär.

Şir guýruk. Bu köp ýyllyk otjumak ösümlik bolup, onuň boýy 60-120 sm-e ýetýändir. Ony uly meýdanlarda

medenileşdirilýär. Lukmançylyk maksatlary üçin ösümligiň ýer üsti bölegi oty ulanylýar.

Şir guýrugyň oty şekerleri, glikozidleri, alkaloidleri, efir ýagyny, flavanoidleri (kwersetin, rutin, kwinkwelozyd), A prowitmini, askorbin turşusyny, eýleýji we reňkleýji maddalary, ajylary hem-de mineral duzlaryny öz düzüminde saklaýar.

Lukmançylykda şir guýrugyň otynyň tinkturasy, demlemesi we 70% spirtdäki ekstraktlary ulanylýar. Olar sedatiw we gipotenziw, kardiotoniki täsirleri ýüze çykarýarlar. Şol sebäpli bu ösümligiň dermanlary ýüregiň işleýiş ritmini sazlaşdyryjy, ýürek-damar newrozlarynda, stenokardiýada, gipertoniki kesellerinde giňden ulanylýar.

Olardan başga-da bu ösümligiň dermanlary nerw bozulmalarynda, psihasteniýada, newrasteniýada we merkezi nerw ulgamynyň dürli bozulmalarynda, şeýle-de klimaks döwürde ulanylýar.

Şir guýrugyň otunyň demlemesini taýýarlamak üçin 15 g çig malyny 200 ml gyzgyn gaýnan suwa guýup, suwly hammamda 15 minutlap gyzdyrmaly we 45 minudyň dowamynda ony sowatmaly. Süzüp, göwrümini 200 ml-e çenli ýetirmeli. Soňra ony 1/3 bulgurdan günde nahardan 1 sagat öň içmelidir.

Şir guýrugyň tinkturasy 70% spirtde (1:5) taýýarlanylýar. Ony günde 3-4 gezek 30-50 damjadan içmelidir.

Adaty hmel. Bu köp ýyllyk otjumak ösümlikdir. Iýmit senagaty üçin giňden medeniýetleşdirilýär. Lukmançylyk maksatlary üçin ösümligiň gül çogdamlary we miwesi ulanylýar.

Ösümligiň miwesinde ajy madda bolan lupulin, şeýle-de düzümine mirsen, gumulen we farnezen girýän efir ýaglary, alkaloidler (humulin), garmonlar, hlorogen, walerian, flavon glikozidleri, kumarinler, reňkleýji maddalar, witaminler (rutin, B₁, B₃, B₆, PP) we beýleki birleşmeler bardyrlar.

Lukmançylykda ulanylýan bu ösümligiň düzümindäki lupulin merkezi nerw ulgamyna rahatlandyryjy täsir edýär.

Ondaky flavonoidler, gormonlar, witaminler bolsa gaýnaglama we ýara garşy, kapillýar berkidiji, giposensibilizirleýji, agyry aýryjy täsirleri ýüze çykarýalar. Onuň galen dermanlary bedende ýaglaryň, mineral duzlaryň, suwuň çalyşygyna gowy täsir edýärler. Ekstraktlarynyň gözelligi we dermatologiki amallarda ulanylmagy, olaryň saç berkediji, deriň epidermisiniň bitmegini sazlaşdyryjy täsiri ýüze çykarmagy bilen baglanşyklydyr. Onuň bejeriş häsiýetli çalgylary goňagy aýyrmakda, saç berketmekde, dermatitleri, örgünleri bejermekde ulanylýar. Mundan başga-da deriniň gaýnaglama we ýara kesellerinde ulanylýar.

Ösümligiň galen dermanlarynyň bakteriosid täsiri agyz boşlugynyň kesellerini bejermekde ulanylýar. Şeýle-de olar fungusit täsiri we estrogen işjeňligi ýüze çykarýarlar.

Bu ösümligiň yetişen gül çogdamlarynyň suwly demlemesi işdä açyjy, iýmit siňdiriji serişde hökümünde gastritde, gastroenteritde, öt haltanyň we bagyryň kesellerinde ulanylýar. Onuň beýleki derman ösümlikleri bilen ýygýndysy böwrek we peşew ýollarynyň kesellerinde, gaýnaglama garşy, giposensibilizirleýji, peşew kowujy, duzlaryň çalyşygyny sazlaşdyryjy serişdesi hökmünde hem peýdalanylýar.

Onuň sedatiw täsiri dürli nerw näsazlyklarynda, ukysyzlykda, klimakteriki bozulmalarynda ulanylýar. Onuň rahatlandyryjy täsirli ýygýndylary hem lukmançylykda peýdalanylýandyr.

Walokardin dermanynyň düzümine bu ösümligiň ýagy girýär. Ony 5 - 10 we 15- 20 damjadan 2- 3 gezekden günde içilýär. Tahikardiýada bolsa 30- 50 damjadan içmelidir. Onuň miwesinden demlemäni taýýarlamak üçin alynan 1 nahar çemçe çig malynyň üstüne 200 ml gaýnan suwy guýup suwly hammamda 15 minut gyzdyrmaly. Sowadyp, süzmeli, soňra 1/4 bulgurdan günde 3 gezekden nahardan öň içmelidir. Daşky serişde hökümünde ulanylanda ony esgä siňdirip ýapgy etmelidir.

Diş ammissi. Bu boýy 1 metre ýetýän, iki ýyllyk otjumak ösümligidir. Lukmançylyk maksatlary üçin ösüm-ligiň miwesi ulanylýar.

Bu ösümligiň miwesinde 20 % golaý ýaglar, flawanoidler, biologiki işjeň maddalar - wisnamin (furokumarinleriň önümi), wisnadin, wisnagin, samidin, kellinol, kellakton we beýleki birleşmeler bardyrlar.

Lukmançylykda bu ösümligi ulanylanda ondaky furokumarin-wisnamin spazmolitiki, sedatiw we fotosensibilizirleýji täsirleri ýüze çykýarlar. Furokumarin wisnadin bolsa ýürek - damar ulgamyna täsir edip, koronar giňeldiji häsiýeti ýüze çykýar. Bu ösümligiň dermany kellin spazmolitiki täsiri ýüze çykaryp, koronar näsazlyklarynda, kardiosklerozda, bronhial dem gysmada, içege we aşgazan spazmalarynda ulanylýar. Wisnadin käbir ýürek näsazlyklarynda kardiosklerozlarda, ýürek şikesinde we miokardyň infarktynda ulanylýar.

Awisan dermany 0,05 g gerdejik görnüşinde bolup, ony zerur bolanda 2 gerdejikden günde 3-4 gezek içmelidir. Ol böwrek kesellerinde, böwrek-daş kesellerindäki tutgylarda spazmolitiki serişde hökmünde ulanylýar.

Kellin dermany 0,02 g gerdejik we şem görnüşinde bolup, günde 3-4 gezekden stenokardiýada ulanylýar.

Maňyrsak. Bu boýy 1-2 metre ýetýän iki ýyllyk otjumak ösümligidir. Ol Türkmenistanyň çäklerinde giňden ýaýrandyr. Lukmançylyk maksatlary üçin onuň ýapraklary ulanylýar.

Maňyrsagyň ýapraklarynda tropan hatarynyň alkaloidleri - giosiamin, skopolamin we atropin bardyr. Olaryň mukdary dermanlyk çig malyň gury massasynyň 0,04-0,05 % barabardyr.

Lukmançylykda maňyrsagyň galen dermanlarynyň güýçli zäherliligi üçin ulanylşy çäklendirilendir. Onuň gury ekstrakty spazmolitiki we agyry aýryjy serişde hökmünde aşgazan we içege ulgamynyň, öt hem-de peşew ýollarynyň gysylmalarynda giňden ulanylýar. Şol bir wagtyň özünde ol

sülekeyiň nemleriniň we aşgazan şiresiniň bölünip çýkmasyny hem togtadýar.

Dänegerçek. Bu boýy 70-80 sm ýetýän, bir ýyllyk otjumak ösümlükdir. Ol Türkmenistanyň çäklerinde giňden ýaýrandyr. Lukmançylyk maksatlary üçin bu ösümligiň ýapraklary ulanylyp, ol Gorkut we Alp-Arslan aýlarynda taýýarlanylýar.

Bu ösümligiň ýapragynda alkaloidler - skoplamin, giosiamin, atropin, şeýle-de eýleýji maddalary, karotin we efir ýaglary bardyr. Ösümligiň esasy alkaloid - skopolamin bolup, ol trop turşysynyň we skopiniň çylşyrymly efiriniň bromlywodorod duzy görnüşinde ulanylýar.

Bu ösümligiň düzümindäki skopolaminiň merkezi nerw ulgamyny rahatlandyryjy we uky getiriji tasiriniň bolmagy ony lukmançylykda ulanmaga doly mümkinçilik berýär. Ol atropin ýaly midriatiki täsiri hem ýüze çykarýar, käbir gysylmalary aýyrýar, deri - iýmit siňdiris mäsleriň sekresiyasyny togtadýar, ýürek ýygrylmasyny tizleşdirýär.

Dänegerçegiň, maňyrsagyň we belladonnanyň ýapraklary bilelikde dem gysma garşy çilim görnüşinde ulanylýar. Skopolamin bilen giosiamin bolsa deňiz we howa keselleriň önüni almakda we bejermekde ulanylýan "Aeron" gerdejiginiň düzümine girýär. Skopolamin gidrobromid 0,25 % ergin görnüşinde göz kesellerinde göreji giňeltmekde ulanylýar. Şeýle-de bu dermany parkinsonizmde, psihatriýada sedatiw serişde hökmünde peýdalanýarlar.

Adaty Danegerçek. Bu boýy 1,5 metre ýetýän bir ýyllyk otjumak ösümlükdir. Oňa Türkmeistanyň çäklerinde hem duş gelmek bolýandyr. Lukmançylyk maksatlary üçin onuň ýapraklary ulanylýar.

Ösümligiň ýapraklarynda tropan alkaloidleriniň hataryndan bolan giosiamin, skopolamin we atropin bardyr. Olaryň mukdary gury çig malyň agramynyň 0,25 % barabardyr.

Lukmançylykda bu ösümlük giňden ulanylýandyr. Ol atropin ýaly hasiýete eýe bolup, ol m-holinolitiki täsiri ýüze çykarýar. Bu täsir onuň düzümindäki giosiamin bilen hem

baglansyklydyr. Ösümligiň düzümindäki giosiaminiň bronho giňeldiji, tonizirleýji we dem alyş merkezi gyjyndyryjy täsiri bardyr. Mundan başgada ol dürli gysylmalary aýyrýar, deri, sülekey mázleriniň, aşgazan we aşgazan asty mázleriniň sekresiýasyny peseldýär.

Adaty dänegerçeğiň ýapraklary bronhial dem gysmada, bronhitde, üsgülewik tutgaýynda we başgada m-holinolitiki häsiýetli serişde hökmünde birnäçe keselleri bejermekde ulanylýar.

Asmatin - bu dermanyň düzümine adaty dänegerçeğiň we maňyrsagyň ýapraklary hem-de natriniň nitraty (8:2:1) girýär. Bu derman bronhial dem gysmasynda çilim görnüşinde ulanylýar.

Adaty dänegerçeğiň ýapraklary dem gysma keselini bejermekde ulanylýan külkeleriň we çilimleriň düzümine hem girýär.

Saryçöp. Ol boýy 1,5 – 2 metre ýetýän köp ýyllyk otjumak ösümlükdir we Merkezi Aziýanyň çäklerinde hem giňden ösýändir. Lukmançylyk maslahatlary üçin olaryň oty ulanylýar.

Ösümlikleriň ähli görnüşlerinde-de alkaloidler (2-4%) - delsemin, melliktin, elatin, kondelfin, şeýle-de organiki turşular we mineral duzlary bardyrlar.

Lukmançylykda olar giňden ulanylýandyr. Olaryň düzümindäki bar bolan alkaloidler delsemin, elatin, melliktin we kondefin kuraro meňzeş täsiri ýüze çykarýarlar. Melliktin dermany 0,02 g bolup zerur bolanda ondan günde 1-5 gezekden içmelidir. Ol esasan-da dürli newrologiki kesellerinde, parkinson keselinde we dürli hereketleniş synalaryň bozulmalarynda ulanylýar.

Ajy narpyz. Bu boýy 8-100 sm ýetýän otjumak köp ýyllyk ösümlükdir. Ony Türkmenistanyň çäklerinde giňden ekilip ýetişdirilýändir. Lukmançylyk maksatlary üçin onuň ýapraklary ulanylýar.

Narpyzyň ýapraklary 2% golaý efir ýaglaryny saklaýar. Onuň esasy düzüminiň biri-de mentol we onuň efirleri, esasan hem

izowalerian we sirke turşularynyň mentil birleşmeleridir. Mundan başga-da efir ýaglarynyň düzümine β —pinen, limonen, sineol we beýleki terpenoidler hem girýär. Ýapraklarynda ýene-de organiki turşular, eýleýji maddalar, flavonoidler, korotin, betain, mikroelementler (marganes, mis, stronsiý we başgalar) we beýleki birleşmeler bardyrlar.

Lukmançylykda narpyzyň otundan taýýarlanan galen dermanlary rahatlandyryjy, spazmolitiki, öt kowujy, antiseptiki, agyry aýryjy, reflektor koronar giňeldiji täsirleri ýüze çykarýarlar. Onuň ýerli gyjyndyryjy, şeýle-de deriniň hem-de nemli bardalaryň neýroreseptorlaryny sazlaşdyryjy täsiriniň bolmagy esasynda ol kapilýar gan aýlanşygyny we içegäniň işini güýçlendirýär.

Narpyzyň galen görnüşli dermanlary iýmit siňdiriş mázleriniň sekresiýasyny güýçlendirýärler we olar işdäni açýar we olaryň öt kowujy täsirleri hem bardyr. Olar spazmolitiki täsiri ýüze çykaryp, içegäniň, öt we peşew ýollarynyň tutgylaryny aýyrýarlar.

Narpyzyň ýapragy düzümindäki mentolyň hasabyna antiseptiki täsiri ýüze çykarýar. Onuň antimikrob häsiýeti aşgazan we içege ulgamyndaky zyýan ýetiriji täsirli bakteriýalara garşy ulanylýar.

Mundan başga-da narpyzyň dermanlary öt kowujy serişde hökmünde holesistitde, holangitde, gepatitde we öt daş kesellerinde giňden ulanylýar. Ýokary dem alyş ýollarynyň kesellerinde (faringit, laringit, traheit) mentol we onuň dermanlary nemli bardalara çalmak, ingalýasiýa etmek, damja görnüşinde buruna damdyrmak üçin ulanylýar.

Mentoly galam ýa-da 2 % spirtli we 10% ýagly erginlerini çakyza, newralgiýa we newrotiki kesellerinde derä sürtüp ulanylýar.

Mentol içki serişde hökmünde ulanylanda damar giňeldiji täsiri ýüze çykarýar. Ony kelle beýniniň damarlarynyň damar gysylmasy sebäpli ýüze çykan stenokardiýa keselini bejermekde-de giňden ulanylýar.

Narpyzyň ýapraklaryndan we ondan alynan mentoldan lukmançylyk senagatynda köp sanly fitodermanlary we toplumlaýyn bejeriş serişdelerini almakda giňden ulanylýar.

Narpyzyň ýapraklarynyň demlemesini taýýarlamak üçin 5 g çig maly 200 ml gaýnan suw bilen, suwly hammamda 15 minut gyzdyrmaly. Soňra 45 minut sowadyp süzmeli we göwrümini 200 ml-e çenli ýetirmeli. Dümlemäni 1/2 -1/3 bulgurdan günde 2-3 gezek nahardan öň içmelidir. Onuň öt kowujy we spazmolitiki täsiri bardyr.

Narpyz ýagy ösümligiň otundan alynýar we öz düzüminde 50% mentol, 4-9 % walerian we sirke turşylarynyň mentil efirini saklaýar. Bu ýag antiseptiki tämizleýji serişde hökmünde diş ýuwulýan hamyrlaryň, kükleriň düzümine girýär. Mundan başga-da dermanlaryň tagamyny gowulandyryjy serişde hökmünde hem olar ulanylýar. Ol korwalol dermanynyň hem düzümine girýär.

Narpyzly gerdejikleri - narpyz ýagynyň 0,0025 g we 0,5 g gant saklaýar. Rahatlandyryjy we spazmolitiki serişde hökmünde 1-2 gerdejikden diliň aşagyna goýup ulanylýar.

Narpyzyň we narpyzly damjanyň tinkturasy - ol narpyzyň ýapraklarynyň spirtli (90% spirtli 1:20) tinkturasyndan we narpyz ýagynyň deň mukdaryndan durýandyr. Onuň 10-15 damjasyny gaýtarma we ýürek bulama garşy, şeýle-de nerw agyrylarynda agyry aýyryjy serişde hökmünde ulanylýar.

Narpyz suwy - agyz çäykama we miksturalaryň tagamyny gowulandyrmak üçin ulanylýar.

Diş damjalary - düzüminde narpyz ýagynyň 3,1 bölegi-ni, kamforanyň 6,4 bölegini, waleriananyň tinkturasynyň 90,5 bölegini saklaýar.

Mentolyň - daşky serişde hökmünde agyry aýyryjy we rahatlandyryjy täsirleri bardyr. Çakyza keselinde onuň galamy sürtülýär. Ýokary dem alyş ýollarynyň kesellerinde bolsa ony ingalýasiýa edýärler, ýa-da buruna damdyrylýar, ýa-da çalynýar. Mentoly içki derman görnüşinde rahatlandyryjy serişde hökmünde, waleriananyň we belladonanyň tinkturalary bilen utgaşdyrylyp ulanylýar. Stenokardiýa

keselinde ony ganda damdyryp diliň aşagynda goýulýar. Şeýle-de mentol "Zeleniniň damjasynyň" düzümine girýär we onuň 1% hem-de 2% spirtli erginleri taýýarlanylýp ýürek newrozlarynda ulanylýar.

Boromentol - melheminiň düzüminde mentolyň 0,5 bölegi, bor turşysynyň 5 bölegi, wazeliniň 94,5 bölegi bardyr. Ol antiseptiki we agyry aýyryjy serişde hökmünde deri örgünlerinde, newralgiýada hem-de renitde burnuň nemli bardasyna çalmak üçin ulanylýar.

Pektusin –gerdejiginiň düzümine 0,004 g mentol, 0,0008 g ewkalipt ýagy we başgalar girýändirler. Ol ýokary dem alyş ýollarynyň kesellerinde ulanylýar. Ony agyzda doly eräp sorulýança saklamalydyr.

Ewkatol - damjasy - öz düzüminde 0,25 g mentoly, 50 ml ewkaliptiň tinkutarsyny we 100 ml çenli 90 % etil spirtini saklaýar. Ýokary dem alyş ýollarynyň kesellerinde 200 ml suwa onuň 10-15 damjanysyny damdyryp oňa agzyňy çäýkamaly.

Menowazin - öz düzüminde 2,5 g mentoly, 1 g anestezini, 1 g nowokaini, 10 ml-e çenli 70 % etil spirtini saklaýan dury ergindir. Ol daşky we ýerli-agyry aýyryjy serişde höküminde, newralgiýada, mialgiýada, artralgiýada we örgünli dermatozlarda gijemä garşy serişde hökmünde ulanylýar.

Kamfomen –aerozoly öz düzüminde 0,06 g mentoly, ewkalipt ýagynyň, kamfor ýagynyň we çakjagundyz ýagynyň hersinden 0,61 g-ny saklaýandyr. Ol ýokary dem alyş ýollarynyň kesellerinde, esasan hem ýiti rinitde we faringitde ulanylýar. Ondan günde nahardan soň 3-4 gezek ingalyásiya etmelidir.

Efkamon - çalgysy öz düzüminde 14 g mentoly we beýleki maddalary saklaýar. Newralgiýada, artritde, miozitde ondan günde 2-3 gezekden derä sürtmelidir we ony ýyly esgi bilen saramalydyr.

Walidol – dermany düzüminde 25-30 % mentolyň we izowalerian turşusynyň mentil efirindäki erginini saklaýndyr. Ony 4-5 damjasyny stenokardiýada, newrozlar-da, isteriýada,

howa we deňiz kesellerinde ýürek bulanma garşy serişde hökümünde ulanylýar. Ganda damdyryp diliň aşagyna goýmaly Onuň 0,06 g-my - 3 damja gabat gelýändir. Ol gerdejik (0,06 g) görnüşünde göýberilýär.

Olimetin – dermanyň bir örtüginic düzümünde arassalanan narpyz ýagynyň 0,0085 g bardyr. Ol öt - daş we peşew - daş kessellerinde ulanylýar.

Ajy buýan. Bu boýy 50-60 sm ýetýän köp ýyllik otjmak ösümligidir. Ol Türkmenistanda giňden ýaýrandyr.

Lukmançylyk makasatlary üçin bu ösümligiň oty ulanylýar. Ondan pahikarpin gidroýodid dermany taýýarlanylýar.

Ösümligiň düzüminde alkaloidler - pahikarpin, matrin, sofokarpin we beýlekiler bardyrlar.

Lukmançylykda bu ösümligi giňden ulanýandyrlar. Onuň esasy alkaloidi pahikarpin - ganglioblokator hökmünde gipertoniki kesellerinde we periferik damarlarynyň gysylmagy netijesinde ýüze çykýan we akuşer-ginekologiki kesellerinde, çaganyň dogulmagyny tizleşdiriji serişde hökmünde ulanylýar. Pahikarpiniň ýatga tonizirleýji täsir etmegi çaga dogurlandan soň gan saklaýjy täsiri ýüze çykarýar. Pahikarpin gidroýodid - dermany akuşer-ginekologiki amallarda, miopatiýada ulanylýar.

Şorluk sferofizasy. Bu boýy 60-80 sm ýetýän köp ýyllyk otjmak ösümligidir. Ol Türkmenistanyň çäklerinde duş gelýändir.

Lukmançylyk maksady üçin bu ösümligiň otunyň ýokary gülleýän bölegi ulanylyp, ondan sferofizin dermany taýýarlanylýar.

Onuň otunda alkaloid- sferofizin bardyr.

Ony lukmançylykda giňden ulanýandyrlar. Ondaky alkaloid sferofizin - gipotenziv täsiri ýüze çykaryp, gipertoniki keselleriň I we II etaplarynda ulanylýar. Akuşer ginekologiki amallarynda ol ýatgynyň gysylmasyny ýokarlandyryp, tonizirleýji täsir edýär. Şeýlelikde ol bu amallarda çaga dogrulyşynyň gowşaklygynda we çaga dogandan soňky gan akmalarda we ýatgynyň atoniýasynda,

şeyle-de gaty gysylmalaryny tizleşdiriji serişde hökmünde ulanylýar.

Sferofizin dermanynyň 1% ergini sanjym üçin niýetlenen külke görnüşinde goýberilýär.

Saryjaot. Bu boýy 30-90 sm ýetýän iki ýyllyk otjumak ösümligidir. Oňa Türkmenistanyň çäklerinde hem duş gelmek bolýar. Lukmançylyk maksatlar üçin ösümligiň oty ulanylýar.

Ösümligiň köki, baldagy, gülleri we tohumy, ýürek glikozidlerini saklaýar. Onuň otundan we tohumyndan erizimin we erizimozid glikozidleri alynýar. Tohumynda başga-da glikozidler, şeyle-de düzüminde linol, olein we palmitin turşularyny saklaýan yağlar hem bardyrlar.

Lukmançylykda bu ösümligi giňden ulanýandyrlar. Onuň derman görnüşleriniň biri hem erizimin monozid bolup, ol aglikon strofantidinden we gant-digitoksozasyndan durýandyr. Ol ýokary biologiki we kardiotoniki aktiwligi ýüze çykarýar. 1 g madda 48000-60600 GTEB ýa-da 8000-10,000 KTEB deňdir. Glikozid az-kem arterial basyşy ýokarlandyrýar we diurezi güýçlendirýär, koronar gan aýlanşygy sazlaşdyrýar. Onuň täsir ediş mehanizmi strofantine golaý, ýöne az zäherlidir we ýürege gowşak tasir edýändir.

Erizimin dermany ýürek şikesinde, ýürek-damar näsazlyklaryň I-II we III derejelerinde, aterosklerotiki kardiosklerozda, ýürek-öýken näsazlygynda, stenokardiýa we gipotoniýa kesellerinde giňden ulanylýar.

Erizimozidiniň biologiki aktiwligi 1 g 58000-66000 GTEB ýa-da 9500-10500 KTEB deňdir. Ol eriziminden tapawutlylykda bedende köp ýygnaýar. Ýöne ol bedende az dargap, aşgazan - içegede gowy sorulýar. Erizimozid gan aýlanşygynyň bozulmagynda ýürek damar ulgamynyň ýagdaýyny gowulandyrýar, gan akymynyň tizligini kadalasdyrýar. Arterýa we wena basyşyny peseldýär ýa-da kapilýar gan aýlanşygynyň bozulmalaryna ýol bermeýär, diurezi güýçlendirýär we çiş aýyrýar. Häzirki wagtda bu ösümligiň aýratyn dermanlary ulanylmaýar. Şeyle-de onuň şiresi kardiowalen dermanynyň düzmüne hem goşulýar.

Kardiowalen dermanyny ýürek şikesinde, kardiosklerozda, stenokardiýada we newrozlarda 15-20 damjadan günde 1-2 gezek içmeli.

Buýan. Bu güýçli kökli bolan köp ýyllyk otjumak ösümlükdir. Köki ýogyn, döweňde açyk sary reňkli bolýar. Ýeriň astynda kökünden dürli gapdallara ösýän kökýanlary bardyr. Ýapraklary köp mäjzagazly bolup, nobatlaýyn ýerleşendirler. Miwesi ýylmanak, mele kösükdir. Türkmenistanda derýalaryň kenarlarynda, akarlaryň gýralarynda, çygly ýerlerde ýygydan duş gelýändir. Lebab welaýatynda buýan hojalyklarynda köpçülikleýin mukdarda ösdürilip ýetişdirilýär. Türkmenabatda buýan işläp bejerýän “Buýan” agrosenagat toplumy ýerleşýär. Lukmançylykda onuň kökleri we kök porruklary ulanylýar.

Buýanyň kök we kök porruklarynda 23%-e çenli glisirizin, 20% gowurak flawon glikozidlerinden-likwiritin, likwiritozod, likwiritigenin-7%, 4%-dioksiflanon we ş.m., şeýle-de glabrow turşusy, asparagin, efir ýagy, askorbin turşusy, şeker, şepbik, nem we eýleýji maddalar toplanýarlar.

Halk lukmançylygynda buýanyň kökünü hemme bejeriji serişdeleriň düzüminde diýen ýaly ulanypdyrlar.

Awisenna aşgazan, böwrek, peşew ýollarynyň kesellerinde, öýken kesellerinde ulanypdyr. Halk lukmançylygynda aşgazanyň oniki barmak içegäniň ýara kesellerinde, babasilde, çişlerde, bokurdak agyrlarda, üsgülewükde gakylyk goparyjy, işdäni açyjy, dem gysma garşy serişde hökminde ulanylypdyr.

Hytaý lukmançylygynda buýanyň kökünü henşen ýaly hasaplap, ysytmalarda agyry aýryjy, gakylyk goparyjy we ýumşadyjy serişde edip ulanypdyrlar.

Häzirki zaman lukmançylyk we dermançylyk amallarynda buýanyň kökünüň dermanlary (goýy we gury ekstraktlary) we dürli ýygyndylaryň arasynda üsgülewüğe garşy, peşew kowujy, ýumşadyjy, gakylyk goparyjy serişde hökminde

ulanylýar. Düzümindäki glisirrizin turşusy kortikostreoid häsiýetlidir.

Bu ösümliğin glisirrizin we glisiret turşularynyň esasynda taýýarlanan gliseram we gliserant dermanlary dem gysmada, gaýnaglamalarda ulanylýar. Buýanyň kökünden öndürilýän flavonoidli dermanlary-likwiriton we flakarbin aşgazan we oniki barmak içege ýaralarynda, dowamly gastritde ulanylýar. Buýanyň köki gowşadyjy, peşew kowujy, babasilde ulanylýan ýyggyndylaryň we beýleki dermanlaryň düzümüne hem girýär. Onuň gaýnatmalaryny, demlemelerini, ekstarktyny we külkelerini gakylyk goparyjy serişde hökmünde öýkeniň kesellerinde, alawlama garşy hökmünde gastritde, aşgazanyň we oniki barmak içegäniň ýaraly kesellerinde içmekligi maslahat berilýär. Türkmenistanyň Milli derman serişdeleri institutynda buýanyň gury ekstrakty, gerdejigi we örtügi öndürilip başlandy.

Semzek. Bu bir ýyllyk otjumaň ösümlükdir. Ýalaňaç baldaklary şahalanyň gidýär. Ýapraklary etlek we süýnmekdir. Tohumlary maýdajyk, gara reňklidir. Türkmenistanyň hemme ýerlerinde haşal ot görnüşde duş gelýär. Lukmançylykda onuň oty ulanylýandyr.

Semzeğiň oty alkaloidleri (0,02%), glikozidleri (90,03%), aý we eýleýji maddalary, şeker (3,5%), C, K witaminleri, reňkleýji maddalary saklaýandyr. Ter otundan noradrenalin (250 mg %) bölünip alynandyr.

Halk lukmançylygynda semzeği babasil keselinde, gan gusmada, içki gan akmalarda gan saklaýjy serişde hökmünde, şeýle-de bagyr, içege, böwrek kesellerinde, gan azlykda we iç geçmede ulanylýar. Semzeğiň oty we tohumlary merkezi nerw ulgamyny stimilirleýär, ýüregiň işjeňligini we dem alyşy gowulandyýar.

Semzeğiň ekstraktynyň arterial gan basyşynyň ýokary galdyrmagyna düzümindäki köp mukdardaky noradrenaliniň barlygy sebäp bolýar.

Çerkez. Bu boýy 3 m bolan, şahalary çal gabyk bilen örtülen gyrymsy agaçdyr. Sapaň şekilli ýapraklary nobatlaýyn

ýerleşendirler. Maýdajyk gülleri ýaprak goltuklarynda ýerleşendirler, şeýle-de onuň hoza meňzeş miweleri bardyr. Ol Türkmenistanda Garagum çölünde we Hazar sähralyklarynda köp duş gelip, ony ýaşayyş ýerlerinde we ýollaryň ýakalarynda gowy çäge saklaýjy hökmünde köpeldýärler. Lukmançylykda onuň miweleri giňden ulanylýar.

Çerkeziň oty we miweleri öz düzüminde salsolin, salsolidin we salsomin ýaly alkaloidleri saklaýandyr.

Lukmançylykda çerkeziň miweleriniň biologiki ähmiýeti düzüminde saklaýn gipotenziv häsiýeti bolan salsolin we salsolidin alkaloidleriniň barlygy bilen häsiýetlendirilýär. Olar gan damarlaryny giňeldip, gan basyşynyň peselmegine getirýär we umumy rahatlandyryjy täsiri ýüze çykarýar. Lukmançylykda onuň tinktury, salsolin we salsolidin alkaloidleri gan basyşy ýokarlananda ulanylýar.

Böwregiň, bagyryň we ýüregiň agyr kesellerinde çerkeziň dermanlaryny ulanmaklyk maslahat berilmeýär.

Sumah. Bu boýy 3 m bolan gyrymsy ýa-da uly bolmadyk az şahalanýan agaçdyr. Ýapraklary 4-8 sany böleklerden ybarat bolup, nobatlaýyn ýerleşýändirler. Gülleri bir jynsly we ýaşylymytyl-ak reňklidirler. Ol Türkmenistanyň Merkezi we Günorta-Günbatar Köpetdag-ynda köp duş gelýär. Lukmançylykda onuň ýapraklary ulanylýar.

Sumahyň ýapraklary düzüminde 30 % çenli eýleýji maddalaryny, ýagny 15 % çenli arassa tanini, galla turşusynyň tetrasaharidini, erkin galla turşusyny, mirisitrini, kwersetini, ramnetini we beýleki flavonoidleri, efir ýaglaryny hem-de organiki turşularyny saklaýandyrlar.

Halk lukmançylygynda ony gan akmaklarda, öt haltanyň kesellerinde we dowamly suwbaşynda ulanylýar. Ter ýapraklarynyň demlemesini gomeopatiýada, iç geçmede, gury agyryda, kelle agyryda, ysmaz keselinde, öt ýollarynyň kesellerinde ulanýarlar. Ownudylan ýapraklaryny ýanyklara iriňli ýaralara ýapylýar.

Bu ösümligiň ýapraklaryndan arassalanan lukmançylyk tinkurasyny almakda ulanýarlar. Ony gamaşdyryjy serişde hökmünde iç geçmelerde, peşew haltasynyň gaýnaglamalarynda, oniki barmak içegäniň we aşgazanyň kesellerinde gan saklaýjy serişde hökmünde peýdalanýarlar. Bu ösümligiň demlemeleri gaýnaglama garşy serişde hökmünde, agyz boşlugynyň nemli örtüginini kesellerini bejermekde ulanylýar.

Skutellariýa. Bu uzyn, inçe kök porrukly köp ýyllyk ösümlikdir. Onuň şahalanýan baldaklary göni ösýär. Olaryň ýekelikleýin gülleri ýaprak goltuklarynda ýerleşýärler, şeýle-de olaryň miweleri - hozjagazlardan ybaratdyrlar. Bu ösümlik Türkmenistanda Köýtendagyň dag eteklerinde, şeýle-de derýalaryň kenarlarynda ösýändir. Lukmançylykda onuň ýapraklary we kök porruklary ulanylýar.

Ösümligiň ýpraklary efir ýaglaryny we flawon glikozidlerini saklaýar.

Halk lukmançylygynda ony sedatiw we gipotenziw serişde hökmünde ýürek-damar kesellerinde ulanylýar.

Ysmanak. Bu bir ýyllyk otjuma ösümlikdir. Onuň gülleri uç bogunlydyr. Ol Türkmenistanyň hemme ýerinde hem duş gelýär. Lukmançylykda onuň ýapraklary giňden ulanylýar. Onuň otunda B₁, B₂, C witaminleri we karotin bardyr. Ter otundan saponinler bölünip alynandyr.

Halk lukmançylygynda ysmanagyň ýapraklary ýel sürüji serişde hökmünde ulanýarlar. Az ganlylykda, rahatda, berhiz tutmaklykda poli witaminli ösümlik hökmünde ulanmaklygy maslahat berilýär. Ysmanagyň ýapraklarynda gidroliz arkaly şpinat-skretin proteinli maddasy alynýar.

Ehinaseýa. Bu boýy 1 m bolan köp ýyllyk otjuma ösümlikdir. Onuň köp sanly kök porruklary bardyr. Onuň gülleri gyzyly we miweleri çigitjiklerden ybaratdyrlar. Türkmenistanda medenileşdirilen görnüşde seýilgählerde, baglarda we merkezi botaniki bagynda ekilýär. Lukmançylykda onuň gülleri we kökleri ulanylýar.

Bu ösümligiň hemme ýerinde efir ýaglary bardyrlar. Köklerinde ehinakozid glikozidi, betain, eksifinol turşusy we inolin bardyr.

Lukmançylykda antiseptiki serişde hökmünde onuň “Ehinop” dermany ulanulýandyr. Bu ösümligiň dermanlary ýanyklaryň I-III derejilerinde ulanulýar. Onyň ter gülleriniň şiresi ganyň lagtalanmagyny hem tizleşdirýär.

Demirtiken. Bu ýere ýazylyp ösýän bir ýyllyk ösümlükdir. Köki inçedir we onuň maýdajyk ýapraklary garşylyklaýyn ýerleşendir. Ol Türkmenistanyň çöllerinde we dag eteklerinde duş gelýär. Lukmançylykda onuň oty we miweleri ulanylýar.

Onuň oty steroid saponinlerinden-trillin, diosfoin, grasillin, protodiossin, kikubasponin, diosgenin, ruskogenin saklaýarlar. Otunda flawonoidler, alkalloidler-garman, C witamini, ýaglar, reňk beriji we eýleýji madda tapyldy. Miwelerinde eýleýji maddalar we 25% çenli ýaglar toplanandyr.

Halk lukmançylygynda demirtikeni peşew kowujy, tonizirleýji serişde höküminde, şeýle-de gury agyryda ulanylýar. Awisenna ony çişlerde, ýaralarda, peşew kowujy serişde edip ulanmaklygy maslahat beripdir. Bu ösümlükden tribusponin dermany alynýar.

Adaty ýakymlyja. Bu boýy 1 metre ýetyän, köp ýyllyk otjumak ösümlükdir. Oňa Türkmenistanyň çäklerinde hem giňden duş gelinýär. Lukmançylyk maksatlary üçin bu ösümligiň oty ulanylýandyr.

Ýakymlyjanyň otunda – efir ýaglary, fenollar, timol we beýleki uçujy hoşboý ysly birleşmeler duş gelýär. Ondan daşary hem onda suwuk ýaglar, askorbin turşusy we eýleýji maddalar hem tapyldy.

Lukmançylykda ýakymlyjanyň oty beýleki ösümlükleriň çig mallary bilen bilelikde ýygyndylaryň, çaýlaryň we toplumlaýyn derman serişdeleriniň düzümine girýär. Bu derman serişdeleri iç ýellenmelerinde, aşgazan – içege ýollarynyň sekresiýasynyň ýetmezçiliginde iýmit siňdirşi

kadalaşdyrmak, şeýle hem öt ýollarynyň kesellerini bejermekde uly ähmiýete eýedirler.

Ýakymlyja – gakylyk goparyjy serişde hökmünde bronhidiň ýiti we dowamly görnüşinde örän peýdalydyr. Onuň demlemesini rahatlandyryjy we tutgaýa garşy serişde hökmünde hem ulanmak bolýar. Ondan başga-da ýakymlyjanyň derman görnüşleri deri kesellerini bejermekde giňden ulanylýar. Onuň otunyň demlemesini taýýarlamak üçin 2 nahar çemçe çig maly syrçaly gapda ýerleşderip, üstüne 200 ml gyzgyn suwy goşup, 15 minutlap suwly hammamjykda gyzdyrýarlar. Soňra otag gyzgyn görkezijisinde 45 minut sowadyp, süzýärler. Demlemäni ýyly görnüşinde S bulgurdan nahardan 15 minut öň günde 2 wagtna içmek maslahat berilýär.

Boýbodran. Bu boýy 80 – 100 sm ýetýän, köp ýyllyk otjumak ösümlükdir. Ol Türkmenistanyň çäklerinde hem giňden ýaýrandyr. Lukmançylyk maksatlary üçin onuň oty ulanylýar.

Boýbodranyň otunda esasy flawonoidler (giperozid, ritin, kwersetin, izokwersetin), reňk we eýleýji maddalar, efir ýaglary, karotin, askorbin, we nikotin turşulary, P we PP witaminleri, saponinler, spirtler, alkalloidleriň yzlary bardyrlar.

Lukmançylykda boýbodranyň otunyň derman serişdeleri agyz – bokurdak boşlugynyň, aşgazan–içege ýollarynyň, bagyr we böwrek kesellerinde giňden ulanylyar. Agyz – bokurdak boşlugynda ýiti yslar bolanda ýa-da gaýnaglama ýüze çykanda boýbodranyň tinkurasyny çäykamak üçin ulanmaklyk maslahat berilýär. Onuň derman görnüşleri öt ýollarynyň kesellerinde, sary getirmede, öt-daş kesellerinde, iç ýellenmelerinde, böwregiň ähli kesellerinde ulanylanda gowy netijeleri berýär. Boýbodranyň dermany Nowoimaniniň bakteriýalara bakteriostatik täsiri bolany üçin deride duş gelýän köp ýaralary (dokuzdonly, iriňli azma) we ýanyklary bejermekde giňden ulanylýar. Bu derman

operasiýalardan soňky ýagdaýlarda agyrlaşmalaryň önüni almak üçin elektroforez görnüşinde hem peýdalanylýar (kör içegeden we uzyn süňkleriň osteomiýelitinden soň öýkeniň we plewranyň dürli iriňli zeperlenmelerinde we ş.m). Ondan daşary hem bu derman ingalyásiya görnüşinde hem bronhit, pnevmotoraks, ötüşen tonzillit, öýken absesi ýaly keselleriň önüni almakda we bejermekde giňden ulanylýar.

Lukmançylykda boýbodranyň şeýle derman görnüşleri ulanylýar, ýagny:

- 1) Boýbodran otunyň gaýnatmasy. Ony taýýar bolandan soňra 1/3 bulgurdan nahardan 30 minut öň, günde 3 wagtyňa kabul etmeli.
- 2) Boýbodranyň tinkturasy - gaýnaglama garşy we gamaşdyryjy serişde hökmünde diş amalynda giňden ulanylýar, onuň üçin 40 – 50 damjasyny günde 3 – 4 wagtyňa ulanmaklygy maslahat berilýär.
- 3) Nowoimanin – polifenol toplumly dermandyr.

Arnab. Bu boýy 3 sm bolan gyrymsy agaç ýa-da uly bolmadyk tikenli agaçdyr. Ýapraklary süýri we goýy ýaşyl reňklidir. Miwesi etlek we şanıklidir. Ol Türkmenistanda Günorta – Günübatar we Gündogar Köpetdagyň jülgelerinde we dag eteklerinde ösýär.

Lukmançylykda onuň miweleri we ýapraklary ulanylýar.

Arnabyň miweleri 30 %-e çenli şekerli, 2 – 3 % organiki turşulary, eýleýji maddalary (1,5%), C witamini, karotini, rutini, kumarinleri (2,53%) saklaýar. Ýapraklary alkaloidleri, glikozidleri, saponinleri, eýleýji maddalary, organiki turşulary, C witamini, kwersetini, giperozidi, rutini, kumariniň önümlerini toplaýarlar. Arnabyň ýapraklarynyň fitonsid häsiýetleri bar.

Halk lukmançylygynda Awisenna arnabyň miwelerini kükrek agyrylarynda, öýken, peşew haltasynyň we böwregiň kesellerinde ulanmaklygy maslahat beripdir. Ösümligiň gabygyny bolsa iç geçmede gamaşdyryjy serişde hökmünde, gury agyryda, ysytmada ulanylýdyr.

Miweleri antibakterial täsirlidir. Halk lukmançlygynda miweleriniň gaýnatmasyny gan azlykda, döş agyrylarynda, dem gysmada, bagyr we böwrek agyrylarynda ulanylýar. Onuň ýaş pyntyklarynyň we ýapraklarynyň gaýnatmasy peşew kowujy häsiýete eýedir.

Pisse. Bu boýy 3-5 metre çenli bolan seýrek duş gelýän uly bolmadyk gyrymsy agaçdyr. Onuň bölünmedik ýapraklary nobatlaýyn ýerleşendir, sübselige ýygananan gülleri bolsa bir jynslydyr. Olar Türkmenistanda Bathyzda uly meýdanly pisseligi, şeýle-de Köýtendagynda we Köpetdagynynda uly bolmadyk tokaýlary emele getirýärler.

Lukmançlykda onuň ýapraklarynda emele gelýän ösüntgiler - gallalar ulanylýar.

Gallalarda 20-50 % çenli eýleýji maddalar toplanýandyr. Tohumlarynda 60% çenli guramaýan ýaglar tapylandyr. Olaryň ýapraklary köp bolmadyk mukdarda eýleýji maddylary we C witaminini saklaýar.

Pisse halk lukmançlygynda ýokary dem alyş ýollarynyň kesellerinde we inçekeselde üsgülewige garşy we gakylyk gopduryjy serişde hökmünde ulanylýar.

Gallalary tanoform, tanalbin almaklyk üçin ulanylýan lukmançlyk tanininiň çeşmesi bolup durýar. Tanin gamaşdyryjy serişde hökmünde ýanyklarda, stomatitlerde agyz boşlugyny çäýkamakda ulanylýar. Onuň agyr metallary, glikozidleri we alkaloidleri çökdirmeklik ukyby hem bardyr. Ýapraklarynyň demlemesi çagalarda iç agyry bolanda we aşgazan-içege bozulmalarynda, şeýle-de ony peşew kowujy hökmünde-de ulanylýar.

Künji. Bu boýy 110 sm bolan, baldagy göni ösýän, bir ýyllyk otjumak ösümlükdir. Ýapraklary nobatlaýyn ýa-da garşylyklaýyn ýerleşendir. Onuň gülleri iri we ýeke-ýekeden ýapraklaryň goltugynda ýerleşendirler, miweleri bolsa köp tohumly gozajyklardan ybaratdyrlar. Ony Türkmenistanda Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynda suwarymly ýerlerde ekýärler. Lukmançlykda onuň tohumlary ulanylýar.

Künjiniň tohumynda 60% çenli ýaglar, proteinli maddalar, C we E witaminleri bardyrlar. Künji ýagy arahis stearin, palmitin, linolen, olein turşylarynyň gliseridlerinden, fenola meňzeş maddalardan - sezamol, sezamin, sezamolin we şepbiklerden durýandyrlar.

Künji ýagy täsirli serişde hökmünde trombopeniki purpurany, essensial trombopeniýany we gemmoragiki diatezleri bejermeklikde ulanylýar. Künjiniň ýagy ganyň trombositlerini ýokarlandyrmak we onuň lagtalanmaklygyny çaltlandyrmak häsiýetini eýeleýär. Dermançylyk önümçiliginde künjiniň ýagyndan linimentleri, melhemleri, ýelimleri, ýagly emulsiýalary we ýagda ereýän dermanlary, sanjym üçin erginleri öndürmekde ulanylýar. Ösümlik ýaglarynyň arasynda dünýä boýunça öndürmekde künji ýagy dokuzynjy ýeri eýeleýär.

Sogan. Bu topbak kökli, köp ýyllyk otjumak ösümlükdir. Onuň gyzylymtyl, sary ýa-da ak gabyk bilen örtülen togalak görnüşde düýbi bardyr. Soganyň maýdajyk agymtyl-ýaşyl gülleri saýawany emele getirýärler. Onuň miwesi-gozajyk şekilindedir. Ony Türkmenistanda suwarymly ýerleriň hemmesinde ösdürilýär. Lukmançylykda onuň ýer üsti bölegi we soganlygy ulanylýar.

Sogan öz düzüminde ýönekeý kömeleklere we kesel dörediji mikroblara garşy täsiri bolan özboluşly uçujy maddalary - fitonsidler saklaýar. Olarda kükürtli etil ýagy hem bardyr. Soganlygyndan sikloallinin, metiallinin, proilallinin, tiopropional, flavonoidlerden - kemferol, klerletiniň we florglüsiniň önümleri, peptidler, protokatehin we ferulon turşulary, aminoturşular, organiki turşular, sitogormonlar, uglewodlar, pektin, C we B, PP witaminleri, A prowitamini, mikroelementler, glýukoza, saharoza maltoza tapyldy. Ýapraklarynda efir ýaglary, şeker, C, B₂ witaminleri, A prowitamini, limon, alma we beýleki turşular hem bardyrlar.

Halk lukmançylygynda soganyň ulanylmagy onuň fitonsid, bakterisid, antisklerotiki häsiýetleri bilen

düşündirilýär. Soganyň şiresini burun dykylmada, deriniň gijemeginde we deridäki menekleri, tegmilleri, düwürlükleri aýyrmakda ulanylýar. Soganyň sykylan şiresini ary bal bilen birlikde içip, gözüň görüşini gowulandyrmakda, üsgülewükde, bronhitde ulanýarlar. Onuň şiresini böwrekde we peşew haltasynda daş emele gelende günüň dowamynda üç gezek içmekligi maslahat berilýär. Soganyň owradylan bölejiklerini ýa-da şiresini ýaralara we ýanyklara, olaryň dezinfeksiýasy we tiz bitmegi üçin ýapýarlar.

Ösümligiň soganlygyndaky we ýapraklaryndaky kesel dörediji mikrobodenleri gyrýan fitonsidleriniň bolmagy, ony gaýnaglamada, bokurdak agyryda, dowamly tonzilitde ulanylmaklygyna doly mümkinçilik berýär. Soganyň fitonsidleri bilen bejermeklik iki usul arkaly amala aşyrylýar, ýagny: ingalyasion - ownadylan soganlygyň efir ýaglarynyň uçujy böleklerinden dem almak ýoly bilen, şeýle-de onuň ekstraktlaryny, spirtli we suwly demlemelerini içmek ýoly bilen amala aşyrylýar. Soganyň dermanlary iýmitiň siňmegini goldaýar, içegäniň işjeňligini gowulandyrýar.

Ony iýmit siňdirişiň näsazlyklarynda, iç gatamada, içegäniň atoniýasynda we iç geçmelerde, mundan başga-da aterosklerozy we gipertoniki keselleri bejermekde-de ulanylýar. Soganyň guradylan gabygyny suwly gaýnatma görnüşinde ýaralary bitiriji serişde hökmünde we saçlary berkitmek maksady bilen ulanýarlar. Allilçep dermany yaşyl we düýp sogandan alynýar. Ol aterosklerozlarda, iç gatamada, kolitda we içegäniň atoniýasynda ulanylýar. Allilgliser dermany bolsa içegäniň atoniýasynda, trihomonadly kolpitlerde bejeriji serişde hökmünde ulanylýar. Soganyň efir ýagynyň täsiri B we C witamin-leriňkä meňzeşdir.

Uly atgulak. Bu köpýyllyk, uzynlygy 40 sm-e çenli ýetýän otjumak ösümligidir. Ol Türkmenistanyň çäklerinde giňden ýaýrandyr. Lukmançylyk maksatlary üçin onuň ýapraklary ulanylýar.

Onuň ýapragynda glikozid akubin, flawonoid, witamin K, askorbin turşusy, eýleýji we aýy maddalary, alkaloidleriň yzlaryny, polisaharidleri we ş.m. saklaýandyrlar.

Lukmançylykda onuň tinkturasy gakylyk gopdurujy serişdesi höküminde bronhitde, gökbogmada, bronhial demgysmasynda we inçe keselinde ulanylýar. Täze ýygňalan ýapraklaryndan alynan şiresini dowamly gastritde, aşgazan we onki barmak içegäniň baş keselinde, şeýle-de aşgazan turşulygynyň pes bolan ýagdaýynda peýdalanýar-lar. Näsaglarda atgulagyň şiresi berilen wagtynda agyry we dispepsiýa alamatlary bolmaýar, şeýle-de olaryň işdäleri gowulanyp, aşgazan şiresiniň turşulygy ýokarlanýar. Atgulak ýara bitiriji häsiýete hem eýedir. Onuň dermanlary-ny çykyklarda ýapgy hökminde ýa-da onuň bilen ýuwmak üçin ulanylýar. Şeýle-de ony täze kesilen ýaralarda, dowamly baş kesellerinde, çybyn keselinde we iriňli ýaralarda hem ulanylýar. Onuň suwly ekstraktyndan ýara bitiriji häsiýeti bolan “Plantaglýusid” dermany hem alynýar.

Atgulagyň ýapragynyň gaýnatmasyny taýýarlamak üçin onuň 10 g ýapragyny almaly we syrçaly gaba salyp üstüne 200 ml gaýnan suwy guýup hammamjykda 30 minutlap gyzdyrmaly. Soňra 10 minudyň dowamynda sowatmaly we süzmeli. Galyndyny bolsa sykyp alyp alynan erginiň üstüni 200 ml gaýnan suw bilen doldurmaly we ulanmaly.

Atgulakdan alynýan “Plantaglýusid” spazmolitik we gaýnaglama garşy ulanylýan serişdedir. Ony giperasid gastritinde, aşgazanyň we onki barmak içegäniň baş kesellerinde ulanýarlar.

Çopantelpek. Bu bir ýyllyk, uzynlygy 20-40 sm ýetýän otjumak ösümlükdir. Ol Türkmenistanyň çäklerinde hem giňden ekilýändir. Lukmançylyk maksatlary üçin onuň gülleri ulanylýar.

Onuň güllerinde efir ýaglary, homazulen, parahoma-zulen, monoterpenler we seskwiterpenler, flawoniodler, kumarinler, sitosterinler, holinler, karotinler, askorbin turşulary,

izowalerian we organiki turşular hem-de polisaharidler bardyrlar.

Lukmançylykda ulanylýan çopantelpek spazmolitik, gaýnaglama garşy we antiseptiki, sedatiw we käbir agyry aýryjy häsiýetleri ýüze çykarýar. Onuň tinkturasyny ýiti we dowamly gastritde, aşgazanyň we onki barmak içegäniň baş kesellerinde, kolitde we enterokolitde ulanmak maslahat berilýär. Çopantelpegi, dyrnaklyjany we boýbodransy bilelikde ulanylsa näsaglarda agyrynyň tiz ýitmegi, ganyň suwuklanmagy, gan damarlarynyň giňelmegi bolup, olaryň özlerini duýaşy gowylaşýar. Çopantelpek bagyr we öt ýollarynyň kesellerinde öt ýollarynyň spazmasyny aýyrýar, öt bölünip çykmasyny güýçlendirýär, gaýnaglama hadysasyny peselidýär. Içege metiorizminde ony köşeşdiriji serişde höküminde çay görnüşinde ulanýarlar. Onuň üçin çopantelpegiň gülüni, pişik otunyň kökünü, narpyzyň ýapragyny, tminiň we arpabadyýanyň tohumlaryndan deň mukdarda alýarlar we çay ýaly ulanýarlar. Çopantelpegi aýbaşy gelmegi bozulanda hem ulanmaklyk peýdaladyr.

Çopantelpegiň gaýnatmasyny taýýarlamak üçin onuň 10 g gülüni almaly we syrçaly gaba salyp üstüne 200 ml gaýnan suwy guýup hammamjykda 30 minutlap gyzdyrmaly. Soňra 10 minudyň dowamynda sowatmaly we süzmeli. Galyndyny bolsa sykyp alyp alynan erginiň üstüni 200 ml gaýnan suw bilen doldurmaly we ulanmaly.

Çopantelpekden alynýan “Romazulan” dermanynyň düzümine onuň ekstrakty (96 ml), onuň efir ýagy (0,3 ml) we emulgator hökminde tmin (4 g) girýär. Bu derman gaýnaglama garşy häsiýeti ýüze çykarýar. Ony gaýnaglamalarda, gingiwitde, stomatitde, uretritde, sistitde, dermatozda, suwbaşynda, neýrodermitde, artbujagyň gijilewüginde, trofiki ýaralarda çaykamak ýa-da ýuwmak usullary bilen ulanýarlar.

Dyrnaklyja. Bu bir ýyllyk, uzynlygy 50-60 sm ýetýän otjumak ösümlükdir. Ol Türkmenistanyň çäklerinde giňden ekilýär. Lukmançylyk maksatlary üçin onuň gülleri ulanylýar.

Onuň gülleriniň düzüminde karotinoidler (karotin, rubikstantin, likopin, sitroksantin), parafin hatarynyň uglewodlary (gentriakontin we sitosterin), sakyzlar, triterpen glikozidleri, nemli we ajy maddalary, alma, salisil we askorbin turşulary bardyrlar.

Lukmançylykda ony gaýnaglama garşy we ýara bitiriji antiseptik serişdesi hökminde ulanyrlar. Ondan diş we agyz boşlugynyň kesellerinde has-da giňden peýdalanylýar. Onuň tinkurasynyň bir çay çemçesini bir bulgur suwa garyp aýallaryň kesellerinde – ýatgynyň ýaralarynda we trihomonazaly kolpitlerde ýuwmak üçin, şeýle-de ony proktitleri we paraproktitleri bejermek üçin ulanylýar. Dyrnaklyjany ýürek-damar kesellerinde ulanylanda ol rahatlandyryjy, arterial basyşy peseldiji, ýüregiň işjeňligini kadalaşdyryjy täsir edýär we şol sanda çişleri hem aýyrýar. Aşgazan-ichege ýollarynyň, esasan-da oniki barmak içegäniň kesellerinde onuň dermanlary gaýnaglama garşy, ýara bitiriji, spazmalary aýryjy we öt kowujy serişde hökminde ulanylýar. Ony çopantelpek we boýbodran bilen ulanmak örän gowy netijäni berýär. Dyrnaklyjanyň gülünde köp mukdarda karotinoidleriň, flavonoidleriň we askorbin turşusynyň bolmagy bagryň işjeňligini kadalaşdyrmaga we ödüň düzüminiň gowulanmagyna getirýär.

Lukmançylykda onuň esasan-da 70 % spirtde taýýarlanylan tinkurasy ulanylýar. Onuň 1 çay çemçesini 1 bulgur suw bilen garyp, öt çykarjy serişde hökminde 10-20 damjadan içmeli.

Eşekýorunja. Bu iki ýyllyk, uzynlygy 80-100 sm ýetýän otjumak ösümlükdir. Oňa Türkmenistanyň çäklerinde giňden duş gelinýändir. Lukmançylyk maksatlary üçin onuň oty ulanylýar.

Onuň otunyň düzüminde kumarinler, dikumoral, melilotin, puriniň önümleri, ýaga meňzeş maddalar, protein we efir ýaglary bardyrlar.

Eşekýorunja stenokardiýanyň tutgaýynda, ýürek damarlarynyň dykylmalarynda ulanylýar. Ondan daşary hem

ol guryagyryny bejermek üçin ulanylýan, şeýle-de iç ýumşadyjy ýygýndylaryň düzümine hem girýär.

Ösümligiň demlemesini taýýarlamak üçin onuň 2 nahar çemçesini almaly we syrçaly gaba salyp üstüne 200 ml gaýnan suwy guýup hammamjykda umumy düzgün boýunça taýýarlamaly. Taýýar bolan demlemäni $1/2 - 1/3$ bulgurdan günde 2-3 wagtyna gaýnaglama garşy we gakylyk gopduryjy serişde hökminde ulanmak bolar.

Jerebaý. Bu köp ýyllyk, uzynlygy 80-100 sm ýetýän otjumak ösümligidir. Oňa Türkmenistanyň çäklerinde giňden duş gelinýändir. Lukmançylyk maksatlary üçin onuň oty ulanylýar.

Onuň otunyň düzüminde flavonoidler (giperozid, rutin, kwersetin, izokwersetin), reňkli we eýleji maddalar, efir ýaglary, karotin, askorbin we nikotin turşulary, P we PP witaminleri, saponinler, spirtler we alkaloidleriň ujypsyzja mukdary bardyrlar.

Lukmançylykda ösümligiň derman serişdeleri agyz-bokurdak boşlugynyň, aşgazan-içege ýollarynyň, bagyr we böwrek kesellerinde ähmiýetli serişde hökminde giňden ulanylýar. Agyz-bokurdak boşlugynda ýiti yslar bolanda ýada gaýnaglama ýüze çykanda jerebaýyň tinkturasyny çäýkamak üçin ulanmaklygy maslahat berilýär. Onuň derman görnüşleri öt ýollarynyň kesellerinde, sary getirmede, öt-daş kesellerinde, iç ýellenmelerde, böwregiň ähli kesellerinde ulanylanda gowy netijeleri berýär.

Lukmançylykda jerebaýyň esasy ulanylýan derman görnüşlerine onuň gaýnatmasy degişlidir. Ony $1/3$ bulgurdan nahardan 30 minut öň, günde 3 wagtyna kabul etmeli.

Jerebaýyň tinkturasý - gaýnaglama garşy we gamaşdyryjy serişde hökmünde diş amalynda giňden ulanylýar, onuň üçin 40 – 50 damjasyny günde 3 – 4 wagtyna ulanmaklygy maslahat berilýär.

Itburun. Bu köp ýyllyk, baldaklary tikenli gyrymsy agaçdyr. Onuň ýapraklary nobatlaýyn ýerleşendir. Gülleri bolsa iki jynsly, baş ýaprakly, gülgüne-ak reňklidir.

Türkmenistanyň dag eteklerinde tokaýlarynda giňden duş gelinýär. Lukmançylyk maksatlary üçin onuň miwesi ulanylýar.

Onuň miwesiniň düzüminde askorbin turşusy, B₁, K, P, E witaminleri, şeker, karotin, pektin maddalary, organiki turşular we mikroelementler bardyrlar.

Lukmançylykda onuň miwesini poliwitamin serişdesi hökminde ulanylýar. Ol birnäçe ýygymlaryň düzümine hem girýändir. Onuň ekstraktlary, ýaglary, şerbetleri, „holosas“ we „karotolin“ dermanlary ýaralary bitirmekde, anemiýada, singa we şöhle kesellerinde giňden ulanylýandyr.

Böwrek çäýy. Bu boýy 50-70 sm ýetýän, hemişe gök öwsüp oturan otjumak ösümlikdir. Oňa Türkmenistanyň çäklerinde hem duş gelinýär. Lukmançylyk maksatlary üçin onuň ýapraklary ulanylýar.

Onuň ýapraklarynyň düzüminde (ortosifonin) glikozidler, saponinler, eýleýji maddalar, köp mukdarda kaliý duzlary, efir ýaglary we organiki turşulary (limon, çakyr, fenolkarbon) bardyrlar.

Adyndan belli bolşy ýaly bu ösümlik böwregiň ýiti we dowamly kesellerinde (çişlerinde, albuminuriýada, azotemiýada), peşew haltanyň we uretranyň gaýnaglama kesellerinde, bogunlara duz ýygnanmagynda, süýji keselinde, öt-daş kesellerinde iň esasy derman serişdesi hasaplanylýar.

Öt haltanyň ýiti we dowamly kesellerinde we öt-daş kesellerinde böwrek çäýynyň täsirinde agyry azalýar, işdäsi açylýar, aşgazan şiresiniň işjeňligini ýokarlandyrýar. Böwrek çäýy uzak wagtyň dowamynda ulanylanda gowy netijeleri berýär.

Ýaz adonisi. Kxpýlylyk otjumak, boýy 50 sm ýetýän xsümlik. Türkmenistanda kxp duş gelýär. Lukmançylyk maksatlary üçin onuň ýerden ýokarky gülleýän bxlegi ulanylýar. Onuň otunda kardenolid glikozidleri: simarin, adinozid, adoni wernoqid; strofantin- K-β; adonitoksin, şeýlede flavonoidler, saponin, fitosferin, alifatiki spirt adonit bardyr.

Ýaz adonizini esasy kardiotoniki, diureтики we sedatiw täsirleri ýüze çykaryp ýürek damar kesellerinde, ýürek newrozlarynda, ulanylýar. Adinorm – nowogalen preparat suwly ergin gornüşinde günde 30 damja 3 gezek içilýär.

Adonis – brom gerdejik gxrnüşinde gury ekstrakty we kaliniň bromidini saklap, ýürek damar kesellerinde ulanylýar.

Zeýtun agajy. Ýaşyl xwüsüp oturan boýy 15 metre ýetýän agaç. Türkmenistanda Garrygala, Gyzyletrek, Esenguly sebitlerinde medeniýetleşdirip xsüdülýär.

Zeýtun agajynyň miwesi lukmançylyk amalynda zeýtun ýagyny almakda ulanylýar. Xsümligiň miwesi 60%, çigidi 20% -e golaý ýaglary saklaýar. Onuň ýakymly ysy bolup, olein, linol, palmitin, stearin turşularynyň gliseridlerinden durýandyr.

Ýapraklarynda glokozidler, organiki turşulary, mannit, aýy maddalary, flawanoidleri, taninleri saklaýar. Xsümligiň gabygynda olenitol, fitosterol saklanýar. Zeýtun ýagy emulsiýa gornüşinde xrtüji ýumşadyjy, gowşadyjy we xt kowujy serişde hxkmünde iýmit siňdiriş ulgamyň we xt daş kesellerinde giňden ulanylýar. Şeýle-de ol zäherlenmeler sebäpli dxrän nemli bardalardaky ýarany bejermekde, bal arylary çakanda, melhemleri we gxzellik serişdeleri taýýarlamakda ulanylýar. Onuň ýapragyndan taýýarlanan ekstrakty gipotenziw, koronar giňeldiji, antiartmiki, ateroskleroza garşy täsiri ýüze çykaryp, ýaglaryň çalyşygynyň bozulmalarynda giňden ulanylýar. Xsümligiň ýapraklary fitonsit saklaýar.

Maý landyşy. Köp ýyllyk otjumak boýy 20 sm ýetýän ösümlük. Çig mal bolup oty ulanylýar. Onuc otundan ýürek glikozidler: konwallotoksin, konwallozid, wallarotoksin saklanýar. Gülünde konwallotoksin we konwallozid, az mukdarda efit ýaglary, asparagin, krahmal, alma, limon turşulary, steroid saponinleri – konwolorin, konwallarin turşusy saklanýar.

Landyşyň glikozidleri kardiotoniki, gipertenziw, MNU-
rahatlandyryjy täsir edip, ýürek newrozlarynda, ýürek damar
kesellerinde ulanylýar. Landyşyň tinktury (1:10) ulanylýar.
Onuň ýapraklarynda alynan glikozidleriň toplumyny saklaýan
prederat korglikoz ulanylýar.

Zirk. Boýy 2-3 m ýetýän güýçli şahalanan tikenli gyrymsy
agaç. Miwesi süýnmek gyrgyzy gyzyr reňkli. Badhyzda,
Kxpetdagda, Kxýtgendagda we çeşme çaylaryň boýunda kxp
duş gelýär.

Lukmançylyk maksatlary üçin onuň miwesi, ýapragy, kxki
we gabygy ulanylýar.

**Türkmen zirkiniň ýapraklarynda we kxkünde alkaloid
berberin, berbamin, efir ýaglary, eýleýji maddalar
saklanýar. Miwesinde organiki turşular – alma, limon,
çakyr, we askorbin turşusy we karotinoidler saklanýar.**

Lukmançylyk amalynda esasan ol holeretiki, xt kowujy,
uretoniki täsirleri ýüze çykarýar.

Zirkiň kxküniň gaýnatmasy we spirtli çykyndysy xduň,
peşewiň bxlünip çykmagyny sazlaşdyrýar, iýmit siňdiriş
ulgamyň, içegäniň hereketleniş tonusyny, ýatgynyň
ýygrylmasyň güýçlendirýär. Şeýlede arterial basyşy
peseldip, ýürek çalt uranda rahatlandyrýar. Zirkiň çig mallary
we olardan alynýan galen preparatlary esasanam holeretiki
aşgazan içegäni we ýatgyny tonizirleýji täsiri, şeýle-de
antimikrob täsiri ýüze çykarýär. Olary xt daş holesistit, xt
haltanyň atoniýasynda, ýokanç kesellerden soň xduň
ýetmezçiliginde; sistopiýelitte, fibrioma emele gelmelerde,
metroragiýada, çaga dogrulandan soňky ýatgynyň gan
akmalarynda iç geçmelerde) dizenteriyalarda üstünlikli
ulanylýar.

**Ulanlyş: zirkiň gabygy, kxki, demleme taýýarlamak
üçin 2-çemçe çig maly 1 bulgur gaýnan suw bilen
demlemeli we 2 nahar çemçeden günde 3 gezek içmeli.**

**Miwesinden 2 nahar çemçe 1 bulgur gaýnan suwda
demlemeli we 2 nahar çemçeden günde birnäçe gezek**

İçmeli. Şeýlede onuň spirtli çykyndysyny taýýarlap, onuň 30 damjasyny günde 3 gezek içmeli.

Çit-çiti. Boýy 120 sm cenli bolan çit-çitiler maşgalasyndan bolan kxp ýyllyk otjumak xsümlik. Ol ýurdumyzda kxp ýaýrandyr. Lukmançylyk maksatlary üçin onuň ýapraklary ulanylýar. Çit-çitiniň ýapraklarynda eýleýji maddalar, beloklar, garynja turşusy, glikozid urtisín, witamin K we askorbin turşusy, pantoten turşusy, karotinoidler, hlorofil, sitosterin, gistamin, wiolaksantin, demriň duzlary we wosk bardyr.

Çit-çitiniň ýapraklarynda demiriň duzlarynyň we witaminleriň bolmagy bedende lipidleriň çalşygyny sazlaşdyrýar. K- witamininiň bolmagy bolsa bagyrda protrombiniň – ýagny gan lagtalandyryjy serişdänic emele gelmegine ýardam berýär. Onuň demlemesi we ergin ekstrakty xýken, bowrek, ýatgy, içege we beýleki gan akmalarda giňden ulanylýar.

Çit-çitiniň galen preparatlary aterosklerozd, demir ýetmezçiligi, sebäpli dxreýän gan azlykda, holesistitde, gastritde, aşgazanyn we on iki barmak içegäniň baş keselinde giňden ulanylýar. Epitelizasiýalaýjy serişde hxkmünde onuň galen preparatlary trofiki ýaralary bejermekde, dermantitleri, ezemany, ýanygy bejermekde ulanylýar. Çit-çitiniň ýapragy witaminli, gan saklaýjy, ýygyndylaryň düzümine girýär. Onuň ergin ekstrakty, demlemesi şeýlede onuň ýapraklarynyň ownudylan külkesi derman serişde hxkmünde goýberilýär.

Çit-çitiniň ýapraklaryny we rýabinanyň miwesi bilen (3:7) witamin çäýy taýýarlanýar: 1 nahar çemçe 200 ml gaýnan suwda 10 min gaýnatmaly we 4 sagat demläp goýmaly. Soňra süzüp S bulgurdan günde 3 gezek içmeli.

Çit-çitiniň ýapragyny uly gulaklynyň kxki (lopuh) bilen gaýnatma taýýarlamaly: 1 nahar çemçe deň garyşdyrylan ýygyndysyndan 200 ml gaýnatma taýýarlamaly. Soňra ony ýuwulan saçyň düýbüne sürtmeli. Bu serişde saçyň düşmesinden goraýar.

Towşandodak. Boýy 50 sm ýetýän kxpýylyk ýarym gyrymsy agaç. Dodak gülliler maşgalasyňa degişli. Turkmenistanda giňden ýaýrandyr. Lukmançylyk maksatlary üçin onuň ýerden ýokarky bxlegi – oty ulanylýar.

Towşandodagyň otunda eýleýji maddalary, gant, efir ýalary, spirt- logohilin, askorbin turşusy we karotin saklanýar. Bu xsümligiň otunyň spirtli tinkturasy, demlemesi we gury ekstrakty xýken, burun, babasil keselinde ýüze çykyň gan akmalarda, ýatgy we dxwük-ýenjik gan akmalarynda gan saklaýjy serişde hxkmünde ulanylýar.

Bu xsümligiň tinkturalarynyň we demlemeleriniň gemostatiki täsirinden başgada, onuň galen preparatlary MNU kesellerini, gipertoniki, deriniň allergiki keselini, glaukomany, aşgazanyň we on iki barmak içegäniň baş kesellerini bejermekde giňden ulanylýar.

Lagohilusyň gury ekstrakty (0.2) gerdejik gxrnüşinde gan saklaýjy we MNU – kesellerinde sedatiw serişde hxkmünde ulanylýar.

Senaýmekge. Kxsükliler maşgalasyndan bolan uly bolmadyk gyrymsy agaç. Biziň ýurdumyzda-da medeniýetleşdirilen. Lukmançylyk maksatlary üçin onuň ýapraklary we miwesi ulanylýar.

Senaýmekgäniň ýapraklary we miwesi antroglukozidler bolan – sennidiň A we B, renin, aloe-emodin saklaýar. Glukozidleriniň esasy aglikony aloe- emodin hasaplanýlar. Bulardan başgada organiki turşular (palmitin, linol, stearin we başgalar), glukozidler – kemerol we kempferin, alkaloidler, sterinler we başgalar saklanýar.

Senaýmekgäniň gury ekstrakty ýogyn içegäniň atoniýasynda, endik edilen gatamalarda gowşadyjy serişde hxkmünde ulanylýar. Bu ekstraktyň zäherli täsiri ýokdur, ol beýleki gowşadyjy serişdelere (yşgynyň kxki, garatikeniniň gabygy) seredeňde goşmaça täsirleri (içegede agyry) ýüze çykarmaýar we ol ýumşak täsir edýär. Senaýmekgäniň ekstrakty xt bxlüp çykaryjy täsiri we bagyryň zähre garşy

täsirini ýokarlandyrýar. Senaýmekgäniň ýapraklaryndan demleme taýýarlanylýar. Onuň ýapraklary babasyl keselini bejermekde ulanylýan, gowşadyjy täsirli çaýlaryň we toplumlaryň düzümine girýär.

Çopan torba. Boýy 60 sm ýetýän atanak gülliler maşgalasyndan bolan, bir ýyllyk otjumak xsümlük. Türkmenistanda kxp ýaýrandyr. Lukmançylyk maksatlary üçin onuň ýerden ýokarky bxlegi ýagny oty ulanylýar.

Çopan torbanyň otunda askorbin, fumar, alma, limon, çakyr turşulary saklanýar. Şeýle-de ramnoglikozid gisopin, fitonsitler, holin, asetilholin, tiramin, inozid, we ýeleýji maddalar saklanýar. Onuň tohumynda ýaglar, az mukdarda allil we innew ýaglary saklanýar. Çopan torbanyň galen preparatlary fibriniň emele gelmeginiň ýetmezçiligindäki gan akmalarda gemostatiki täsiri ýuze çykarýar. Xsümligiň düzümindäki efir ýaglary we asetil holin ýatgynyň muskullarynyň ýygrylmagyna täsir edýär. Xsümligiň ýapraklarynyň fitonsid işjeňligi bardyr. Suwly we spirtli ekstrakty gipotensiw täsiri ýuze çykarýar.

Şeýlelik-de onuň preparatnlary dürli-xýken, bxwrek, ýatgy, aşgazan içege gan akmalarynda giňden ulanylýar. Meselem ýatgy gan akmasynda çopan torbanyň ergin ekstraktyny, kalinanyň we suw kyrkbogunyň ekstrakty bilen bilelikde utgaşdyryp ulanylýar. Bxwrek gan akmasynda bolsa onuň ergin ekstraktyny meýdan kyrkbogunyň oty bilen utgaşdyryp ulanylýar. Mundan başgada çopan torbanyň oty gan saklaýjy ýygyndylaryň düzümine girýär. Şeýle-de bu xsümligiň 70% spirtde taýýarlanan ergin ekstrakty ýatgy atoniýasynda we ýatgy gan akmasynda ulanylýar.

Demrewot. Boýy 1 m ýetýän kxp ýyllyk otjumak xsümlük. Türkmenistanda kxp ýaýrandyr. Lukmançylyk maksatlary üçin bu xsümligiň oty ulanylýar.

Xsümligiň ähli agzalarynda mämişi reňkli süýtjümeňk şire saklanýar. Onuň düzüminde izohinoliniň xnümleriniň birnäçe toparlaryna degişli alkaloidler saklanýar: protoberberin alkaloidleri (berberin, koptizin); protopin alkaloidlerini

(protopin, allokriptopin); benzofenantridin alkaloidleri (helidonin, heleritrin, sangwinarin we ş.m.) Bulardan başgada otunda saponinler, flawonoidler, askorbin turşusy, karotinoidler we organiki turşular (alma, limon we ýantar) saklanýar. Şeýle-de metil amin, helidon turşusy saklanýar.

Demrewotuň spazmolitiki we MNU- rahatlandyryjy täsiri onuň düzümindäki alkaloid helidoniniň bolmagy bilen baglanşyklydyr. Beýleki bir alkaloid gemogelidonin agyry aýyryjy täsiri; sangiwinarin bolsa antiholinesteraz işjeňligi ýüze çykarýar we xzbaşdak ulanylanda iýmit siňdiriş ulgamyň ýerine ýetirýän motor işini güýçlendirip, tüýküligiň bxlünip çykmagyny güýçlendirýär.

Demrewotuň kxkünde ýene bir alkaloid – berberin anyklandy we ol holeretiki täsiri ýüze çykarýar. Alkaloid protopin bolsa ýatgynyň etiniň tonusyny ýokarlandyrýar.

Ylmy çeşmelerde halk medisinasynda demrewotunyň dürli çykyndylarynyň dürli kesellerde ulanylýandygy barada maglumat bar. Meselem onuň otunyň terje şiresiniň (wirusa garşy täsiriniň bolmagy) siňňili, gabatrçyklary, pigment tegmillerini aýyrmakda; deriniň inçe keselinde, şeýlede bitmesi kyn ýaralaryň etilelizasiýasyny tizlendirmekde we ş.m. giňden ulanylýar.

Demrewotunyň otunyň gaýtanmasy bagyr sirrozynyň assit bilen utgaşmalaryny bejermekde peşew kowujy serişde hxkmünde ulanylýar. Lukmançylyk amalynda alkaloid helidonin we onuň hlorly wodorod duzy agyry aýyryjy serişde hxkmünde ulanylýar.

Ulanylyşy: 1 nahar çemçe oty 0.5 l gaýnag suw bilen 1 sagat demelemeli. Demlemäni 50 ml günde 3-4 gezek içmeli.

Çasaran. Boýy 4-6 m ýetýän şahalanan tikenli gyrymsy ağaç ýa-da ağaçdyr. Türkmenistanda ginden ýaýrandyr. Lukmançylyk maksatlary üçin onuň miwesi ulanylýar.

Miwesinde ýaglar (14%) ýagda ereýän witaminler (karotinoidler, tokoferollar, witaminleriň K- topary; suwda ereýän witaminler (B₁, C) P- işjeň birleşmeler, holin we betain; organiki turşular (alma, çakyr); mono- we

disaharidler; eýleýji maddalar, fenol birleşmeleri (katehinler), flwaonoidler (zutin, kwersetin); fenoloturşular (kofeýa we hlorogen): triterpen turşulary (ursol) we şuna meňzeşler bardyr. Çasalaryň miwesindäki ýaglaryň düzümini palmitin, olein, palmitolein turşularynyň trigliseridleri düzýär. Çasalaryň ownujak miwelileri ýaglara has baý we hasyllydyr. Esasan hem bu xsümlük çasalaryň ýagyny almakda ulanylýar. Bu ýag dokumanyň epitelizasiýasyny we granulýasiýasyny tizleşdirip, agyry aýyryjy täsiri ýüze çykarýar. Şol sebäpli ol baş keselleri, bokurdagyň çiş keselini, bejermekde şeýle-de daşky serişde hxxkmünde ginekologiki kesellerde – ýatgynyň boýunygynyň ýaralarynda ulanylýar. Ýmit senagaty çasalaryň miwesiniň gantly şiresini goýberýär. Bu şire bejeriş serişde hokmünde ulanyp bolýar.

Ak tut. Boýy 15 m ýetýän uzyn açaç, gabygy çatlak goňur reňkli. Miwesi şireli, süýji tagamly. Turkmenistanda gadymdan belli medeni xsümlükdir. Lukmançylyk maksady üçin ak we gara tudyň miwesini, ýapragyny şeýle-de kxxküniň gabygyny ulanylýandygy barada maglumat bar.

Miwesinde 9% gant, saharoza, organiki turşular, boýaglar, witaminler: C, B, eýleýji pektih maddalary, aminoturşular (alanin, walin, leýsin, glýutamin, asparagin turşulary we fenilalanin, prolin, arginin) flawonoid izokwersetin efir ýaglary, korotin bardyr. Çigidinde guraýan ýaglar bar. Ýapraklarynda asparagin turşusy, adenin, glýukoza, witamin C, pepton we glikozid – tutin bardyr.

Tudyň ýapraklarynyň suwly çykyndysy gipotenziv, agyry aýyryjy, sedatiw, üsgülewüge garşy täsiri ýüze çykarýar. Ýapragy we kxxküniň gabygy gaýnaglama garşy täsiri bar. Ýapraklaryndan dxredilen preparat famidol reumatizme, deri inçekeseline, ekzema we beýleki kesellere garşy ulanylýar.

Tudyň gülünden gözelli serişdeleri taýýarlanyp, deri sepgillerini, tegmillerini we dxmmelleri aýyrmakda ulanylýar. Tudyň miwesiniň we ýapraklarynyň gaýnatmasy süýjüli diabet keselini bejermekde ulanylýar. Şeýle häsiýeti onuň

düzümindäki B₁ witamininiň bolmagy we onuň dokumalarda glýukozany saklamagyna esaslanandyr.

Miwesiniň şiresi gakylyk gopduryjy, gowşadyjy täsiri ýüze çykarýär. Şeýle-de tudyň kxküniň gabygynyň gaýnatmasy süýjili diabeti, bxwrek kesellerini bejermekde we jyns impotensiýasynda täsirlidir.

Dermanlyk melissa. Limona mahsus ysly çatrymlaşan porrukly, kxp ýyllyk otjumak osümlik. Ol saýaly gyrymsy agaçlaryň arasynda, otlyk we daşlyk ýerlerde osýär. Ol esasanam Merkezi Kxpetdagda we derýa ýakalarynda ösýär. Lukmançylyk amalynda onuň baldagynyň ýokarky bxlekleri we ýapraklary ulanylýar. Onuň çig malynyc ýakymly limon ysy bolup, xtüji we ýakymly –ajy tagamy bardyr.

Melissanyň ýapraklary we baldaklarynyň ýokarky bxlegi efir ýaglaryny saklap, onuň düzümine sitral, sitranellal, geraniol, sineol, taninler, fenol turşulary (kofeýa turşusy) triterpen turşulary (olein turşusy, ursol turşusy), eýleýji maddalar, askorbin turşusy, ajylar, az mukdarda nemler saklanýar.

Melissanyň ýapraklary we baldaklarynyň ýokarky bölegi demleme we spirtli tinktura (1:5) görnüşinde esasan hem agyry aýyryjy serişde hxkmünde, diş agyryda agyz çaykalýar, reumatizmde, artritde we dürli müçükdirmelerde we ýaralarda spirtli tinkturasy ýapgy edilýär ýa-da sürtülýär.

Bu xsümligiň galen preparatlarynyň iýmit siňdiriş ulgamyň işiniň bozulmalarynda işdä açyjy, fermentasiýa bozulmalaryň xñüni alyp, aşgazan şiresiniň bxlünip çykmagyny sazlaşdyrýar. Melissanyň rahatladýryjy häsiýeti onuň ýeňil uky getirijilik täsiri bilen baglanşyklydyr. Şeýle-de ol antiartmiki täsiri ýüze çykaryp, ýürek ritminiň dürli bozulmalarynda we nerwi sandyramalarynda ulanylýar. Ol arterial gipertenziýany, aterosklerozy, migreni, azganlylygy, podagrany bejermekde-de üstunlikli ulanylýar. Şeýle-de bu xsümligiň güllerinden çay taýýarlanyp, derlediji we madda çalşygyny gowulaşdyryjy serişde we içgi hxkmünde

ulanylýar. Melissanyň efir ýagynyc sedatiw täsiri bar we zäherlilik pesdir. Ol ýürek agyryly näsaglaryň tahikardiýa tutgaýyny aýyrmakda, şeýle-de derman serişdelerine ýakymly ys bermekde giňden ulanylýar.

Tozga. Kxp ýylyk otjumak osümlik bolup, gyrymsy agaçlaryň arasynda, açyk meýdanlarda osüp, kxp ýaýran osümlikdir. Lukmançylyk amalynda onuň kxki ulanylýar. Ylmy çeşmelerde onuň ähli böleklerinde biologiki işjeň birleşmeleriň bardygy barada maglumat bar.

Bu xsümligiň ähli bölegi düzüminde süýtjümek şire saklaýar. Ol şiräniň düzümine triterpenler (tarakserol) sterollar, kauçuga meňzeş maddalar, girýär. Tozganyň ýapragynda we güllerinde karotinoidler, flavonoidler eýeleýji maddalar, proteinler, demir, kalsiý, fosfor, witamin B₂, A, C bardyr. Kxkünde 25% çenli inulin, fenol turşulary, ýaglar, palmitin, olein, linol, melissa we serotonin turşularynyň gliseridleri bardyr. Mundan başga-da demir, kaliý marganes, fosfor bardyr.

Tozga aýy maddalary saklaýan osümliklere degişli bolup, ol iýmit siňdiriş ulgamyň işini sazlaşdyrýar. Tozganyň ähli bxlekleriniň spirtli çykyntgysy xt kowujy täsiri bar. Suwly demlemesiniň we ergin ekstraktynyň peşew kowujy täsiri bar. Şeýle-de tozga iç gatamalarda (gowşadyjy), semizlikde (xt kowujy täsiri) ulanylýar. Onuň terje ýapraklary we kxküniň külkesi holesteriniň mukdaryny peseldýär. Bu häsiýeti bolsa onuň halk lukmançylygynda ateroskleroza garşy ulanylanlygyny subut edýär. Tozganyň ekstarktynyň aýy tagamy bolanlygy, onuň iýmit siňdiriş mázleriniň şire bolup çykmagyny güýçlendirip, pes turşulygy bolan gastrit keselinde peýdalýdyr.

Tozganyň terje ýapraklaryndan taýýarlanan işdä açarlar, iýmitiň witamin bölegi bolup, gurplandyryjy täsiri bardyr. Mundan başga-da halk lukmançylygynda siccilleri, gabarçaklary bejermekde tozganyc süýtjümek şiresi ulanylypdyr. Bu osümlik derlediji serişde hökmünde

ulanylýar, süýt emdirýän eneleric süýdünic köpelmeginde-de täsir edýär.

Tozanyc kökünic gyzgyn demlemesi furunkulýoz, deri örtüklerinde, ekzemada içilýär.

Ulanylyşy. Iki çay çemçe üwelen köki ýa-da ýapraklary bir bulgur sowuk suw bilen 8 sagat demläp goýmaly. Socra 5-8 minut gaýnatmaly, süzüp owurtlap birnäçe gezekde içmeli.

Has gowy täsiri onuň terje wagtky gysylp alnan şiresi ýüze çykarýar. Şiränic 2-3 nahar çemçesini günde bir aýyc dowamynda içmeli. Işdä açyjy ýygynyndync düzümine 2 bölek aýy ýowşan, iki bölek boýbodran we bir bölek tozganyc köki girýär. Bu ýygynyndync bir nahar çemçesini bir bulgur gaýnan suw bilen 20 min demläp goýmaly. Süzüp onuc bir nahar çemçesini nahardan 20 min öc içmeli.

Gara çayyr. Boýy 50 sm ýetýän, köp ýyllyk otjumak, uzyn ýaýrap giden porrukly, ýerasty we ýerüsti ösüntgili ösümlükdir. Ol çägeli, otluk, boşluk ýerlerde haşal ot hökmünde köp duş gelýär.

Lukmançylyk maksatlary üçin ýerasty bölegi ulanylýar. Onuc ýerasty böleginde saponinler, nemli maddalar, gant, pet we polisaharid tritisin bolup onuc gidrolizinde dice d-fruktoza alynýar.

Halk lukmançylygynda gara çayyr peşew kowujy, gowşadyjy serişde hökmünde bellendir. Ylmy lukmançylykda gara çayyryc köki gipotenziv täsiri ýüze çykarýar. Şeýle-de damar giňeldiji täsiri bar. Onuň peşew kowujy tasiri bolsa böwregiň damarlarynyň giňeldilmeginde saponinleri we nemli maddalary saklamagy onuň gowşadyjy täsiri ýüze çykarmagyna mümkinçilik berýär. Bu ösümligi gaýnatma görnüşinde 20 g porrugy 250 ml suwda taýýarlap, 50 ml günde 2-3 gezek içmeli.

Gyzyl burç. Bir ýyllyk otjumak ösümlük. Ýurdumyzda medeniýetleşdirilip ösdürilip ýetişdirilýär, birnäçe görnüşleri bardyr. Lukmançylykda miwesi ulanylýar. Miwesinde alkaloid kapsaisin, karotinoidler, efir ýaglary, steroid saponinleri, ýaglar, witamin B₁ bardyr. Askorbin turşusynyň

mukdary boýunça itburundan we smorodinadan soc üçünji ýerde durýar. Ýapraklarynda-da askorbin turşusy bardyr. Gyzyly burç fitonsid saklaýan ösümlikdir.

Ylmy lukmançylykda onuc ekstrakty içilende köp mukdarda amilaza we mukopolisaharidleri saklaýan tüýkülik we aşgazan şiresi bolünip çykmary güýçlenýär. Onuc demlemesini ýa-da spirtli çykyndysynyc 10-20 damjasyny nahardan öň içmeli. Şeýle-de ekstrakty bakteriýalara, wiruslara garşy täsiri ýüze çykaryp, ýiti aşgazan-içege bozulmalarynda we gaýnaglama kesellerinde ulanylýar.

Daşky serişde hökmünde melhemler, linimentler, plastyrlar görnüşinde ulanylýar. Gyzyly ajynyc ownudylan külkesi gorçıçnikleric ýerini tutýar. Bu maksat üçin gyzyly ajydan taýýarlanan plastyr ulanylyp, ol artrit, radikulit, podagra kesellerini bejermekde ulanylýar. Şeýle-de ýokary dem alyş ýollarynyc kesellerinde we beýleki gaýnaglama kesellerinde ulanylýar. Taýýarlanan plastyryny agyrlý ýere 48 sagadyc dowamynda goýmak bolar.

Kinza. Boýy 40-70 sm bolan bir ýyllyk otjumak ösümlik. Ol ýakymly ysly ösümlik hökmünde medeniýe-tleşdirilip ösdürilýär. Lukmançylykda onuc miwesi we kinza ýagy ulanylýar. Kinzanyc miwesi bişmäňkä ýakymly, miwesi ýetişende bolsa ýakymly ysly bolýar.

Kinzanyc miwesinde efir ýagy (3%) bolup, onuc esasy bölegi geraniol, α we β -pinenler, terpinen, terpinolen, menton bolup durýar. Mundan başga-da miwesinde protein maddalary, kumarinler, witaminler, organiki turşular, streoid birleşmeleri, koriandrol, dürli gantlar, flawonoidler saklanýar. Kinza halk lukmançylygynda gadyndan belli serişdelerinici biri bolup, ol iýmit sicdiriş ulgamyň kesellerinde ulanylypdyr. Şeýle-de onuň miwesiniň şiresini gurçuga garşy, gipertoniki kesellerde, süýjüli diabet keselinde ulanylypdyrlar. Otuny demleme görnüşinde azgan-lylykda, üsgülewüge garşy, öt kowujy, peşew kowujy serişde hökmünde ulanylýar. Kinzanyc otunyc ýokarky böleginiň gülleriniň şiresini çagalara gyzamyga garşy serişde hökmünde berilipdir.

Bu ösümligic ýokarda agzalan täsirleri ylmy lukmançylykda-da tassyklanandyr. Onuc miwesindäki efir ýaglarynyc bakteriýa, mikrobedenjiklere garşy we fungusid täsiri bardyr. Şeýle-de onuc gyzgyn demlemesi öt kowujy, iç ýellenmä garşy, spazmolitiki täsiri, gowşadyjy we babasil keseline garşy täsiri ýüze çykarýar. Kinzanyc miwesi farmasiýada köp sanly galen serişdele-rini – ýakymly ysly suwlary, spirtleri, şerbetleri, çaýlary taýýarlamakda gicden ulanylýar.

IV. LUKMANÇYLYKDAKY IÝMIT ÖSÜMLIKLERI

Häzirki döwürde sagdyn we näsag adamlaryň hemme taraplaýyn doly iýmitlenmeginiň zerurlygynyň örän möhümdigine hiç bir adam şühbelenmeýär. Bu iýmitleniş adamyň bedeniniň islegini kanagatlandyrýar we zerur bolan iýmit maddalary: proteinler, ýaglar, uglewodlar, witaminler, mineral duzlar, mikroelementler we suw bilen doly üpjün etmekligine esaslanýar. Dogry iýmitleniş adamyň bedeniniň şu maddalaryň doly özleşdirmekligini üpjün edýär.

Iýmit çeşmesi bolup haýwan we ösümlik önümleri bolup bilerler. Ösümlikler uglewodlaryň (çylşyrymly polisaharidler, pet ýa-da has ýönekeý birleşmeleriň-şekeriň), witaminleriň, tagam beriji, ýakymly ysly we ş.m. maddalaryň üpjün edijisi bolup durýarlar.

Ösümlik önümleri adamyň bedeniniň ýaşaýşynyň esasy bolup duran wajyp biohimiki we fiziologiki hadysalarynyň amala aşyrylmagyna zerur bolan mineral maddalaryň (natriý, kaliý, kalsiý, magniý, fosfor, demir we ş.m.), hem-de mikroelementleriň (ýod, mis, kobalt we ş.m.) esasy çeşmesi bolup durýarlar. Mikroelementler we mineral maddalar öýjügiň fiziologiki ýagdaýyny goldap, onuň protoplazmasynyň aýrylmaz bir bölegi bolup durýar we bedeniň turşulyk-esas deňagramlylygyny we basyşy sazlap durýarlar. Mineral maddalarynyň ýetmezçiligi we olaryň artykmaç bolmaklygy bedende düýpli bozulmalara getirip bilýär.

Ösümlik iýmitinde şonuň ýaly fitonsidler, okislendiriji fermentler, efir ýaglary, witaminler saklanýar. Suwda ereýän witaminler (B₁, B₂, B₆, C, PP), çylşyrymly organiki maddalar bolup, fermentleriň yzygiderliligine gatnaşyp, aminoturşylar we mineral maddalar bilen özara gatnaşykda örän wajyp orun tutýarlar. Witaminleriň ýetmezçiliginde öýjük fermentleriniň işi we madda çalyşygy bozulýar.

Ösümlik iýmitleri bilen bilelikde iýmit gymmatlylygy uly bolmadyk, ýöne iýmite özboluşly tagam we ýakymly ys

beriji hökmünde goşulýan, tagam beriji we ys beriji maddalar adamyň bedenine düşýärler. Bu maddalar diňe işdäni açman, eýsem-de iýmit siňdiriş mázleriniň işlerine täsir edip iýmit siňdirişi gowulandyryýarlar. Ýakymly ys beriji maddalara efir ýaglary degişlidirler. Efir ýaglary aşgazan-ıçegede bolýan ajama hadysalary togtadyjy bolup, madda çalşygy, sülekeý mázleriniň işlerini we aşgazan-ıçege mázlerini sazlaýarlar. Ýakymly ys beriji maddalaryň bakterisid täsiri hem bar (sogan, sarymsak, turp we ş.m.).

Witaminleri öz düzüminde köp saklaýandygy sebäpli bu önümler diňe bir keselli adam üçin peýdaly bolman eýsem sagdyn adam üçin hem örän ähmiýeti ulydyr. Derman ösümlikleri witaminlere esasan hem ýaz aýlary örän baý bolýarlar. Mysal üçin, çit-çiti ir ýaz aýlary askorbin turşusyny apelsinden we limondan hem köp saklaýar, karotini bolsa kăşiriňki bilen deň mukdarda bolýar. Çit-çitiniň 20 gr-y adam bedeniniň bir günki K witamine bolan islegini kanagatlandyryp bilýär.

Ösümlük önümleri ter görnüşinde ýa-da bişirilýän önümlere tagam we ýakymly ys beriji serişde höküminde ulanylýar. Berhiz saklamak üçin düzüminde köp bolmadyk mukdarda natriý hloridini saklaýan gök önümleri ulanylýar. Bu bolsa öz gezeginde endamynda suw ýagnananda diuretiki täsir edip, we şol bir wagtyň özünde suwa bolan zerurlygyny ujypsyzja bolar ýaly ýagdaýa getirýär. Ter görnüşdäki ösümlük önümlerinde iýmit siňdirişi sazlaýan witaminler, fitonsidler, okislendiriji enzimler doly mukdarda saklanyp galýarlar.

Gök önümler gaýnadylanda olardaky efir ýaglary we mikroelementler köplenç ulanylýan gaýnatma geçýärler.

Hemme ýokarda agzalanlar esasanam näsag adamy iýmitlendirmekde wajypdyr. Adamyň bedeninde madda çalşygyň bozulmasy esasynda hem dürli hili patologiki hadysalar bolup geçýär we netijede kesel döreýär. Şonuň

üçin-de soňky döwürde doly we dogry iýmitlenmä köp üns berilýär.

Diňe ösümlik berhizinde saklanyp kä bir metaboliki bozulmalary sazlap bolýar. Ýagny ýürek ýetmezçilikli näsaglarda madda çalyşygy, suw-duz çalyşygy, kaliý we kalsiý ionlarynyň gatnaşygy bozulan bolýarlar. Ösümlik önümlerinden peşew täsirleşmesine (alkaloza ugurdan) alma, banan, şugundyr, käşir, kartoşka, gawun, limon, şetdaly, apelsin we ş.m. degişlidirler.

Semizlikde az kaloriýaly ter gök önümleri iýmek maslahat berilýär (käşir, pomidor, kelem, hyýar we ş.m.). Gök önümler içegäni arassalap, holesteriniň sorulmagyna päsgel berip, onuň bedenden çykmagyny güýçlendirýärler. Gaýnan kartoşkaň ýokumlylygy pesräk bolsa-da iýeniňde dok edýär. Öz düzüminde kaliýny köp mukdarda saklaýan önümleri (şugundyr, kädi, ter alma we ş.m.) gipertoniki kesellerde iýmekligi maslahat berilýär.

**Bogunlarda duz ýygnanda, peşewturşy diatezde ýaşyl
ösümlikli günleri geçirmeli, başgaça aýdanyňda
düzüminde purin esasly (türşek, ysmanak we ş.m.)
saklaýan ösümlikleri iýmitden aýyryp, näsaglara ter gök
önümleri berýärler.**

Oksalaturiýada düzüminde turşuja turşusyny az mukdarda saklaýan gök önümleri (kelem, nohut, turp, hyýar we ş.m.) iýmeli we düzümi turşuja turşysyna baý bolan (turşuja, ysmanak, şugundyr, kartofel, kösükler, yşgyn we ş.m.) iýmekmaslahat berilmeýär.

Bagyr agyrylarynda düzüminde efir ýaglaryny saklaýan ösümlik önümlerini (sarymsak, turp we ş.m.) iýmeklik maslahat berilmeýär. Süýji keselde şeker baý bolan ösümlikleri iýmeklik maslahat berilmeýär. Belli bir bölegi bakterisid täsirli bolan ýakymly ysly iýmit ösümlikleriniň ulanylmaklygy, olaryň kömegi bilen bejereji ysly maddalaryň garyndylaryny emele getirmeklige esaslanandyr. Tebigatda 150-den hem gowurak dürli ysly ösümlikler duş gelýär. Olardan hemmä belli bolanlary gara burç, ýowşan we ş.m.

Ýowşan sülekeý çykmasyny, aşgazan şiresiniň bölünip çykmasyny ýokarlandyryp, ýagly iýmitleriň täsirini neýtrallaşdyrýar. Çüygül iç geçmede we bagyr kesellerine bejeriji täsir edýär, imbir iç ýellenmäni azaldyp, işdäni açýar, muskat hozy peşew kowujy serişde höküminde ulanylýar, hmel we göknar ukladyjy täsir edýär. Häzirki zamanda göknaryň tebigy önümlerini kanun boýunça ulanmak gadagandyr.

Geljekde-de ösümlik önümleriniň häsiýetlerini öwrenmeklik olary dürli keselleri bejermekde ulanmaga mümkinçilik berer. Mysal üçin, kelemiň şiresi öz düzüminde askorbin turşusyny, B topara degişli witaminleri, kobalty, misi, sinki, magniýnyň, kalsiýnyň, kaliýiň duzlaryny, fosfary köp mukdarda saklaýandygy üçin köp taraplaýyn bejeriji häsiýetleri özünde jemleýär. Şiresinde 16 aminoturşylary, semizligiň önüni alyan häsiýetli bolan tartron turşusyny saklaýar.

Ösümlik önümleri bir görnüşe degişli bolsalar hem düzümindäki mineral duzlarynyň, witaminleriň mukdary boýunça tapawutlanýarlar. Şonuň üçin ösümlik berhizini saklamak maslahat berilende olaryň himiki we biologiki taýdan gymmatlylygyny hökmany suratda hasaba alynmalydyr. Bu ýagdaýy bir gezekleýin dermanlar bilen bejergi geçirilende olaryň himiki gurluşyna baglylykda bozulan metabolizme dürli taraplaýyn täsir edip, ösümlik önümleri bilen özara baglanşyp biljekligini göz önünde tutmaly.

Kesel bejerlende ösümlik iýmitlerini we farmakologiki dermanlarynyň bilelikde bir bada ulanylanda, olar bir-birleriniň täsirlerini ýokarlandyryp, peseldip ýa-da neýtrallaşdyryp bilerler. Adaty iýmit hökmünde ulanylýan ösümlikleri hem bedende derman serişdeleriniň metabolizmini has-da güýçlendirip biler.

Mundan başga-da adamyň iýmitine goşundy hökmünde ulanylýan ösümlik önümleriniň köpüsinden derman serişdeleriniň dürli görnüşleri alynýar. Bular ýaly

ýagdaýlarda derman serişdeleriniň düzümine girýän himiki maddalaryň kesgitli mukdary ösümlük önümleri bilen bilelikde adamyň bedenine düşýärler. Näsaglar bejerlende bu ýagdaýy göz önünde tutmalydyr. Derman serişdeleriniň we iýmit ösümlük önümleriniň özara täsiri dürli hili bolup bilerler. Ilki bilen dermanlaryň farmakokinetikasyna degişlidir, başgaça aýdylanda iýmit siňdiriş ýollarynda iýmit düzümleriniň derman serişdeleriniň metabolizmine edýän täsirini kesgitleýändir.

Mundan başga-da, iýmit önümlerinde farmakologiki işjeň düzümleri bolanda derman serişdeleriniň we iýmit önümleriniň özara täsiri farmakodinamiki häsiýeti eýeläp biler. Bu hadysalar barasynda edebiýatlarda maglumatlar örän azdyr.

Adamyň bedeni ol ýa-da beýleki derman serişdeleriniň täsirini dürli hili kabul edip biler. Şol bir näsaga farmakologiki serişdesi onuň kabul edilýän wagtyna we şertlerine baglylykda dürli hili täsir edip biler. Bu derman serişdeleriniň metabolizminiň tizliginiň genetiki dürlüligi we adama daşky gurşawyň täsirleri bilen düşündirilýär.

Daşky gurşawy (howany, topragy) hapalandyrýan maddalaryň köp mukdary näsagyň bedenindäki derman serişdeleriniň metabolizmine gatnaşýan enzimleriň aktiwligine täsir edýärler. Ekzogen himiki maddalarynyň köp mukdary adamyň bedenine iýmit önümleri bilen bilelikde düşýärler.

Iýmit önümleri derman serişdeleriniň içegede saklanyş wagtyna we gana sorulyş tizligine täsir edýärler. Aşgazan-ıçege we madda çalşyk kesellerini bejermekde we olaryň öňüni almakda ballast maddalaryna baý bolan berhiz iýmit maddalarynyň we derman serişdeleriniň sorulmagyna täsir edýär. Köplenç dermanlaryň özleşdirilmegine polisaharidler täsir edýärler. Mysal üçin, karboksimetilsellýuloza digitoksiniň içegede sorulmagyna päsgel berip dermanyň zäherliligini peseldýär. Metilsellýuloza natriý salisilatynyň özleşdirilişini saklap,

furadoniniň siňişini peseldýär. Bu bolsa iýmit önümleriniň bedenden bölüp çykaryşynyň we aşgazan-ıçege ýollarynda hereketiniň tizliginiň dürliligi bilen düşündirilýär.

Özleşdirilmeyän polisaharidleriň derman serişdeleri bilen kesgitli birleşmeleri emele getirýän bolmaklary mümkin, şonuň üçin, derman serişdeleriniň köpüsini açöze, nahar iýmezden 30 minut öň içmekligi maslahat berýärler. Şonuň bilen iýmit düzümleri bilen derman serişdeleriniň arasyndaky bolup biljek täsirleri we dermanyň sorujulygyny peseltjek sebäpleri aýrlyýar.

Düzüminde organiki maddalary saklaýan gök önümleriň şireleri eritromisin, penisillin ýaly dermanlaryň täsirini gowşadýarlar. Şonuň üçin bu dermanlary turşy şireler bilen bilelikde içmeli dälidir.

Demiriň dermanlary kabul edilende onuň sorulmagyny togtadyp biljek önümleri we tagamlary (şalynyň şiresi, çayyň eýleýji maddalary, düzümi oksalatlara baý bolan önümler) iýmeklikden ýüz öwürmelidir. Askorbin turşusy içegedäki demiriň tiz sorulmagyna goldaw berýär.

Mundan başga-da demiriň dermanlarynyň doly sorulmagyny üpjün etmeklik üçin nahardan öň içmekligi maslahat berilýär.

Şol bir wagtda digitilisiň dermanlary we eýeleji maddalara baý bolan önümleri (yşgyn, ysmanak we ş.m.) iýilende erimeýän çökündiler emele gelip bilerler. Bu bolsa bejeriji täsiri peseldýär. Bugdaý kepeginiň we beýleki birnäçe ösümlik polisaharidleriniň sagdyn adamynyň ganynyň plazmasynda digoksiniň konsentrasiýasyna täsir edýändigini bellidir.

Kelem berhiz tutulanda bilelikde içilýän antipiriniň ganda toplanmagyny azaldýar we onuň metabolizminiň tizligini ýokarlandyrýar.

Derman serişdeleriniň we iýmit önümleriniň özara baglanşygynda dermanlaryň täsirini peselden ýagdaýynda, berhiz tutulanda kesgitli iýmit düzümlerini aýyrmaklygy talap edilýär. Mysal üçin, antikoagulyantlar

bilen bejergi geçirlende iýmit önümleriniň düzüminde K witamine baý bolanlaryny (ýaşyl gök önümler, kelem, kăşir, pomidor we ş.m.) antikoagulyantlaryň garşysyna bolýandygy sebäpli mukdaryny azaltmaly.

Tetrasiklin hataryna degişli dermanlar kalsiýä baý bolan önümler bilen eremeýän birleşmeleri emele getirýärler. Ösümlük önümlerindäki demiriň we beýleki agyr metallaryň kationlary bilen düzüminde kükürt saklaýan derman serişdeleri eremeýän çökündileri emele getirýärler.

Şunuň bilen ösümlük önümleriniň diňe bir näsaglaryň iýmitlenmekligi üçin däl-de, eýsem berhiz tutup we farmakologiki dermanlary bilen bilelikde utgaşdyryp keselleri bejeriş işlerini geçirmekde-de ulanyp boljakdygy barada bar bolan maglumatlar subut edýär.

Şonuň üçin-de bejeriji häsiýeti ýüze çykarýan iýmit ösümlüklerini her hili bejergilerde giňden ulanmak mümkinçiligi bardyr. Olaryň käbirleri barasyndaky anyk maglumatlar aşakda görkezilendir.

Kăşir. Iki ýyllyk otjumak ösümlük, etlek, ýogyn konus şekilli kökli. Ony gök önüm hökmünde dürli ýurtlarda ekýärler. Bejeriji häsiýetli çyg maly hökümünde onuň terje köki we tohumy ulanylýar.

Kăşiriň kökünde karotinoidler, witaminler B₁, B₂, pantoten turşusy, efir ýaglary, kumarinler (umbeliferon), gantlar, flavanoidler we ş.m. bardyrlar.

Lukmançylykda kăşiriň şiresi ýa-da ondan alynan efir ýagy enterobioza, askaridoza garşy serişde hökmünde ulanylýar. Bu serişdeler esasanam çagalary we ysgyndan gaçan näsaglary bejermekde has amatlydyr. Kăşiriň düzüminde karotinoidleriň bolmagy A-witaminiň çeşmesi hasaplanylýar. Ony gyrgyçdan geçirip dürli görnüşli ýanyklary we bitmeýän ýaralary bejermekde ulanylýar.

Adaty kădi. Bu birýyllyk otjumak ösümlük bolup onuň kökleri inçe şahalanandyr. Miwesi 20 kg çenli ýetip bilýän ululykda bolup we onuň içi köp sanly çigitlidir. Ol ýurdumyzyň ähli etraplarynda ösdürilýär.

Bejerjilik häsiýetli çig maly höküminde onuň miwesi we çigidi ulanylýar.

Kadiniň çigidi ýag (30-45%), protein (25%), efir ýaglaryny, lesitin, gant, enzimleri, salisil turşusyny, çigidiniň gögümtil ýaşyl bardasynda bolsa geterozid peporezin saklanýar.

Lukmançylykdaky barlaglaryň netijeleri kädiniň çigidiniň we miwesiniň dürli keselleri bejermekde ähmiýetlidigini subut etdi. Kädiniň çigidiniň soguljan keselleri bolan tenioz we askaridoz kesellerine garşy ulanylýar. Çigidiň maňyzynyň daşyndaky gögümtil-ýaşyl bardada geterozid peporezin bolmagy sebäpli onuň antigelmint täsiri ýüze çykyandyr. Kädiniň çigidi we onuň dermanlary goşmaça ýaramaz täsirleri ýüze çykarmaýarlar. Şonuň üçin-de olar bilen ulylyry we 2-3 ýaşyndaky çagalary, göwrelileri, çaga emdirýän eneleri we 60 ýaşdan geçen, agyr keseli geçiren näsaglary bejermek bolýar.

Tenioz keselini bejermekde 80-100 sany gabygy arassalan kádi çigidini, gowy ýenjip iýmeli. 1 sagatdan soň çakjagundyz ýagyny ýa-da çigidi deň derejede süýt bilen garyp içmeli.

300 g arassalanan we gögümtil-ýaşyl bardasy saklanan kádi çigidini 50-60 ml suw bilen sokuda gowy ýenjip, oňa 1 nahar çemçe bal garyşdyrmaly. Näsag ony 1 sagadyň dowamynda açöze iýmeli. 2 sagatdan soň oňa magniniň sulfatyny (çagalara 15-30 gr) bermeli we 1 sagatdan içegäni ýuwmaly. Ulular üçin – 300 g, 10-12 ýaşly çagalara – 150 g, 5-7 ýaşly çagalara- 100 g, 3-4 ýaşly çagalara- 50g, 2-3 ýaşly çagalara –30-50g kádi çigidini gaýnatma görnüşinde-de bu keseli bejermekde ulanylýar. Näsaga diňe onuň süzüp ergini içirilýär. Çagalardaky askaridoz keselini bejermekde günde 10-15 sany çigidi iýdirmeli we 1 sagatdan 1 çay çemçe çakjagundyz ýagyny içirmeli.

Adaty erik. Boýy 6-8 m ýetýän ağaç. Ýapraklary ýumurtga şekilli, süýnmek ýa-da togalak bolup, gyalary kesim-kesim. Onuň gülleri iri, miwesi ýumşak we şireli

şanikli bolýar. Ol ýabany görnüşde gurak gowy ýagtylyk düşýän ýapgytlarda duşýar. Medeni görnüşde Türkmenistanyň hemme ýerlerindedede ösdürilýär.

Bejeriji häsiýetli çig mal hökmünde onuň tohumy we şepbigi ulanylýar.

Erigin tohumynyň düzüminde olein we linolen turşularynyň glikozidlerini saklaýan guramaýan ýaglaryň 50% , emulsin enzimi, ergin ajy görnüşinde amigdalın –glýukozidi, laktoza we sinil turşusy bardyr. Erigin miwesiniň eti 27% şekerden, 3% organiki (alma, limon, çakyr we ş.m) turşularyndan ybaratdyr. Onuň miwesiniň düzüminde dürli hili mineral duzlary, mikroelementleri, flavonoidleri (kwersetin, izokwersetin), karotin, 20% gowrak proteinler, eýleýji maddalar we ş. m. duş gelýär. Mundan başga-da onuň miweleriniň C witamine we A prowitamine baý bolandygy üçin ony gymmatly diyip hasaplanylýar.

Erigin şepbigi galaktozadan (44%), arabinozadan (41%) glýukozaň turşysyndan (16,44%), mundan başga-da mineral we protein maddalaryndan durýandyr.

Halk lukmançylygynda erigin guradylan miwesinden taýýarlanan serişde peşew we ýel kowujy serişde hökmünde ulanylýar, şeýle-de ony gan basyşy beýgelende, sary getirmede, gan azlylykda ulanmaklyk maslahat berilýär. Onuň tohumy synçgylawukda, üsgülewikde rahatlandyryjy hökmünde, bronhitde, traheitde, laringitde we nefritde ulanylýar.

Ylmy lukmançylygynda erigin ýagy badam ýagynyň çalşyjysy bolup, suwyk melhemleriň esasy hökmünde we sanjym üçin erginleri taýýarlananda kä bir derman maddalarynyň eredijisi hökmünde ulanylýar.

Erigin şepbigi emulsiýalary taýýarlananda emulgator hökmünde ulanýarlar.

Ýer hozy. Bir ýyllyk otjumak, boýy 50 sm ýetýän ösümlikdir. Şahalanýan ok köki bardyr. Göni ösýän baldaklary gür şahalanandyr. Ýapraklary çylşyrymly bolup,

nobatlaýyn ýerleşendir. Miwesi açylmaýan uzynja kösükdir. Ony Türkmenistanda ösdürilip ýetişdirilýär.

Ulanylýan çig maly onuň miwesidir.

Onuň tohumlarynda arahin, lignoserin, steorin, palmitin, gipogeý, oleýin, linolen, laurin, miristin, begen, ekozen we serotin turşularynyň glisiritlerinden durýan ýaglaryň 56% töweregini saklaýarlar. Mundan başga-da 37% çenli proteinler, globulinler, 17 % arahin we konarahin, B we E witaminleri, pantoten turşusy, biotin bardyr. Miweleriniň gabygy arahidozidi, leýkasionidi we leýkodelfinidi saklaýandyr.

Ylmy lukmançylygynda ýer hozunyň ýagy badam ýagy ýaly sanjym üçin derman görnüşlerinde esas hökmünde ulanylýar. Ýer hozunyň tohumlary emulsiýalary taýýarlamakda ulanylýar we süýji badamyň tohumyny çalşygy bolup hyzmat edýär. Emulsiýa içmeklik üçin niýetlenip içni sürüji, yumşadyjy, örtüji, agyryny aýyryjy hökmünde ulanylýar. Ýer hozy ganyň lagtalanmagyna örän gowy täsir edýär.

Ýer hozyny eksudatiw diatez keseli bilen kesellän çagalara bellemek maslahat berilýär.

Dermançylyk önümçiliginde ýer hozunyň gidrogenizirlenen ýagy melhemlerde we şemlerde esas hökmünde ulanylýar.

Garpyz. Bu ýeke öýli, bir ýyllyk otjumak ösümlükdir. onuň ok köki bolup ol gowşakdyr. Baldagy ýukajyk, maýyşgak bolup ýere ýazylyp ösýär. Garpyzyň ýönekeý ýapraklary 3-5 bölege bölünip, nobatlaýyn ýerleşendirler. Gülleri bir jynslydyr. Miwesi – köp tohumly bolup, sary ýa-da gyzyly etlidir. Ata watany Günorta Amerika bolup, Türkmenistanda medeni görnüşde hemme suwarymly ýerlerde ekilýär.

Bejerji häsiýetli çig maly bolup onuň miwesi (eti, gabygy, tohumy) hyzmat edýär.

Garpyz öz düzüminde köp mukdarda suwy, 80% çenli uglewodlary, esasanam şeker – fruktozany, B₁, B₂, PP

witaminleri, askorbin we fol turşularyny, karotin, pektin maddalaryny saklaýar.

Halk lukmançylygynda garpyzyň guradylan gabygynyň suwly demlemesini ýogyn içegäniň dowamly we ýiti sowuklamalarynda içýärler. Onyň tohumlaryny gyzgynyňy peseldiji hökmünde ulanylýar.

Ylmy lukmançylygynda garpyzy böwrek we ýürek-damar keselleri bilen baglanşykly bolan çişmelerde peşew kowujy serişde hökmünde ulanýarlar. Garpyzyň düzümindäki köp mukdarda bar bolan süýümleriniň kömegi bilen iýmit siňdirişi gowulandyrýar, içegeleriň işjeňligini ýokarlandyrýar, bedendäki holesteriniň çykmaklygy has-da çaltlandyrýar. Mundan başga-da garpyzy süýji keselde, gan azlykda, bagyr, öt halta, peşew çykaryjy ýollarynyň kesellerinde ulanmaklyk maslahat berilýär. Böwrekde daş emele gelende, sistitlerde, piýelonefritde garpyzy güniň dowamynda 2-2,5 kg çenli ulanmaklyk peýdalydyr.

Kartoşka. Bu ösümligiň esasy mekany Amerika bolup ol gadymdan belli ösümlükdir. Häzirki wagtda ol dünýäniň köp döwletlerinde ösdürilip ýetişdirilýär.

Lukmançylyk maksatlary üçin onuň ýer asty miwesi ulanylýar.

Kartoşkanyň ýer asty miwesinde 1-2% protein, 0,5-1% gant, süýüm, ýaglar, organiki turşular (limon, alma, şawel turşulary), 1% golaý mineral duzlary (kalsiniň, kaliýniň, fosforyň, demiriň duzlary), witaminler (B₁, B₂, B₆, D, PP, K, E, H, U), aminoturşular we beýleki adam bedeni üçin zerur bolan maddalar bardyr.

Biziň ýurdumyzda has köp ýaýran ýimit ösümligidir. Onuň özüniň ýokumlylygy bilen witaminleriň we beýleki wajyp biogen maddalaryň mukdary boýunça, berhiz we bejeriş hem-de önüni alyş häsiýetleri boýunça ähmiýeti ulydyr. 200 g täzeje kartofel adam bedeni üçin bir gije gündizde gerek bolan askorbin turşusynyň mukdaryny berip biler.

Lukmançylykda onuň ýer asty miwesi witaminleriň çeşmesi hökmünde, ulanylýar. Mundan başga-da ol sowuklama garşy, ýara bitiriji, agyryny gowşadyjy we peşew kowujy täsiri ýüze çykarýar. Onuň arteriýal basyşyny peseltmegi bolsa düzüminde asetilholiniň bolmagy bilen baglanşyklydyr. Onuň ýürek-damar kesellerde ulanylmagy diňe bir düzüminde kaliýniň duzlarynyň bolmagy bilen baglanşykly bolman eýsem-de onuň peşew kowujy, agyryny gowşadyjy täsiriniň bardygyny bilen hem baglanşyklydyr. Kartoşkanyň täzeje şiresiniň aşgazan-ichege kesellerinde (gastrit, baş kesellerinde) ulanylmagy onuň düzmünde iýmit siňdiriş mazleriniň işleýşini togtadyan-asetilholiniň bolmagy bilen düşündirilýär. Kartoşkanyň ½ bulgur şiresini nahardan 30 min. öň içilse iýmit siňdirilýşini we içegäniň işini sazlaşdyrýar.

Kartoşkanyň täzeje kerçilip alynan şiresi käbir deri kesellerini, ýanyklary, ekzema görnüşli keselleri bejermekde-de ulanylýar. Ýokary dem alyş ýollaryň kesellerinde onuň bugundan dem almaly ýa-da täze gaýnadylan kartoşkany sürtmeli.

Gözellik maksatlary üçin gaýnadylan kartoşkany gaýmak bilen garyp ýüze çalgý edýärler. Şeýle çalgylar ýüzüň dersi gury bolsa hem-de gün şöhleleriniň emele getiren ýanygy üçin has-da peýdalydyr.

Innew (Greçiha). Bu otjumak ösümlük bolup, ony ýyly ýurtlarda ösdürüp ýetişdirýärler.

Lukmançylyk maksatlary üçin ösümligiň ýerden ýokarky böleginden (ýapraklaryndan, güllerinden) P-witamin - rutin alýarlar. Iýmit senagaty üçin bolsa onuň ýarmasy ulanylýar.

Rutin gipo we awitominozyň önüni almakda, şeýle-de damarlary berkitmekde, gemorragiki diatezde, gözüň torjagazyna gan ýygnananda, şöhle keselinde, septiki endokarditde, guryagyryda, glomerulonefritde we beýleki kesellerde ulanylýar.

Adaty gawun. Ol uzyn çyrmaşyp ýatan baldakly bir ýyllyk ösümlik. Onuň watany Merkezi Aziýadyr. Ol köp ýurtlarda, esasanam Günorta ýurtlarynda medeniýetleşdirilýär.

Lukmançylyk maksatlary üçin onuň miwesi we çigidi ulanylýar.

Gawunda 10-15% gant, askorbin turşusy, PP witamin, fol turşusy, karotin, pektin we azotly maddalar, ýaglar, uçujy aromat birleşmeleri, mineral maddalary, esasanam demiriň duzlary bardyr.

Gawun gymmat bahaly iýmit we berhizlik önümdir. Onuň miwesi terligine we kakadylyan kak görnüşinde ulanylýar. Ondan toşap, mürepbe we başga-da birnäçe ýokary hilli tagamly iýmitler taýýarlanylýar, çigidinden bolsa ýag alynýar.

Gawuny ýüregiň we kelle beýniň damarlarynyň aterosklerozynda, şeýle-de gowşadyjy serişde hökmünde ulanylýar. Onda demiriň duzlarynyň bolmagy bedende okislenme-gaýtarma hadysalaryny sazlaşdyrýar. Ony ýürek - damar ulgamynyň, bagryň kesellerinde we gan azlykda ulanylýar.

Gawun babasil we käbir böwrek kesellerinde hem peýdalydyr, şeýle-de onuň merkezi nerw ulgamyna sedatiw täsiriniň bardygy hem bellidir.

Böwürslen. Bu boýy 75 sm ýetýän uly bolmadyk ýarym gyrymsy agaçdyr. Ol Türkmenistanda giňden ýaýrandyr.

Lukmançylyk maksatlary üçin onuň köki, ýapragy we miwesi ulanylýar.

Kökinin düzümi doly öwrenilmedikdir. Şeýle-de bolsa onuň ýapragynyň 5-14% taninler, flawonoidler, C vitamini, organiki turşular, nemler we efir ýagyny saklaýarlar. Miwesinde organiki turşular (limon, alma turşulary), gantlar, protein, eýleýji maddalar, pektin maddalary, vitaminleriň B topary, askorbin turşusy we karotinoidler, şeýle-de kaliýniň, margensyň, misiň duzlary bardyr.

Bu ösümligiň miwesi iýmit hökmünde ulanylýar. Senagatda ondan dürli toşaplary, şireleri we dürli görnüşli süýji önümleri taýýarlanylýar.

Böwürsleniň miwesinden terliginde we guradylan görnüşlerinde taýýarlanan demlemeler, gaýnatmalar, gyzgyn peseldiji serişde hökmünde, dürli sowuklama, pnemoniýa kesellerini bejermekde ulanylýar. Mundan başga-da ol belli derlediji we peşew kowujy serişdedir. Böwürsleniň has ötüşip biten miwesiniň gowşadyjy täsiri, bişmedik miwesiniň bolsa tersine iç gatadyjy täsiri bardyr.

Böwürsleniň ýapragyndan we miwesinden taýýarlanan gaýnatmasy agyz boşlugynyň nemli bardasynyň sowuklamasynda, bokurdak kesellrinde agzy çaykamak üçin ulanylýar. Halk lukmançylygynda böwürslenden taýýarlanan çakyr üsgülewige garşy, bokurdak kesellerinde, basykda, faringitde, gripde, bronhitde ulanylypdyr.

Taýýarlamak üçin 2 nahar çemçe ýapragy 500 ml gaýnan suwa atmaly we 1 sagat demine goýmaly. Demlemäni günde 4 wagtyňa 1 bulgurdan nahardan öň içmeli.

Onuň gaýnatmasy has täsirlidir: 2 nahar çemçe ýapragy 500 ml suwa atmaly we 12 sagat saklamaly soňra 3 minut gaýnatmaly we 5 minut sowatmaly. Gaýnatmany günde 150 ml-den 3 wagtyňa açöze içmeli.

Apelsin. Ol hemişe ýaşyl öwüsüp oturan miweli agaçdyr.

Bu ösümlik tropiki we subtropiki howa şertlerinde medeniýetleşdirilýär.

Lukmançylyk maksatlary üçin apelsiniň miwesi we şiresi ulanylýar.

Miwesiniň şiresinde (100g-da 65 mg) askorbin turşusy, B₁, B₂, A we P witaminleri, gantlar (10%), mineral maddalary (kalsiý, fosfor, kaliý), limon turşusy, pektin we reňkleýji maddalar hem-de fitonsitler bardyrlar.

Halkyň arasynda apelsiniň miwesini iýmit hökmünde ulanylýar, ondan şireli içgiler we mürepbeler taýýarlanylýar. Lukmançylykda onuň miwesi gipo we awitominozlaryň önüni almakda ulanylýar. Apelsin şiresi işdäni açýar we iýmiti

siňdirýär, şol sebäpli hem ony gipasid gastritinde, şeýle-de öt kowujy serişde we iç gatamalara garşy serişde hökmünde ulanylýar. Şiresindäki pektin-maddalary zäherli maddalardan arassalaýar we içegäniň işini sazlaşdyrýar.

Apelsin iýmek giperacid gastritli we aşgazanyň we oniki barmak içegäniň baş keselli näsaglary üçin çäklendirilmelidir.

Apelsinden alynan efir ýaglary iýmit önümlerine we dermanlara ýakymly ys bermekde ulanylýar.

Adaty ülje. Ol boýy – 3-7 m ýetýän gyrymsy agaçdyr. Ähli ýerlerde medeniýetleşdirilip, ösdürilip ýetişdirilýär.

Lukmançylyk maksatlary üçin onuň miwesi ulanylýar.

Üljäniň miwesi gant (15%), pektin maddalary (11%) organiki turşulary (alma, limon turşularyny), eýleýji maddalary, karotin, B, PP witaminleri, fol turşusyny, mineral maddalardan misiň, demiriň, kaliýniň, magniniň birleşmelerini saklaýar. Çigdinde bolsa 25-35% ýaglar, amigdalın we efir ýaglary bardyr.

Üljäniň miwesi terligine ýa-da guradylyp toşap we mürepbe görnüşinde ulanylýar. Iýmit senagaty ondan tinkturalary, çakyry we miwe suwuny taýýarlaýar. Ülje işdäni açýar. Ony gany azlykda umumy daýandyryjy serişde hökmünde ulanylýar, şeýle-de lihoradkaly näsaglary bejermekde ulanylýar. Onuň maňzy we şiresi ansiteptiki we içiňi gowşadyjy serişde hökmünde ulanylýar.

Kelem. Boýy 40-60 sm ýetýän oräň port, uly giň ýaprakly iki ýyllyk, atanak gülliler maşgalasyna degişli osümlük. Kelem ähli ýerde medeniýetleşdirilip xsdürilip ýetişdirilýär. Bejeriş maksatlary üçin onuň ýapraklary ulanylýar.

Kelemiň ýapraklary gant, belok, ýaglary, ketçatka, witaminleri (C, P, B₁, B₂, B₆, U, K, D, karotin), fermentleri, mineral duzlary, bakteriýalaryň ýaşayşyny togtadyjy madda – lizosim saklaýar. Şeýle-de täzeje ýapraklarynda kükürt saklaýan tioglikozidler (glikobrassidin, neoglikobrassidin) bardyr.

Kelemin aşgazanyň we on iki barmak içegäniň baş keselinde ulanylmagy onuň düzümindäki “U” witamin bolmagy bilen baglanşyklydyr. Bu witamin tiaminiň we holiniň çalşygyna täsir edip aşgazanyň nemli bardasynyň metabolizmini gowlandyrýar, şeýle-de onuň garşylyk gorkezijilik ukybyny ýokarlandyrýar. Kelemin şiresi lipidleriň çalşygyny sazlaşdyryp, ateroskleroz keselini bejermekde xt daş kesellerini, podagra keselini bejermekde ulanylýar. Onuň düzümindäki pektin zäherli maddalary zähersizlendiriji, holesterini çykaryjy häsiýete eýedir. Kletçatka içegäniň içini sazaşdyrýar, çakyr turşusy bolsa bedende uglewodlaryň ýaglara xwülmegini togtadýar. Süýt turşusynyň bolmagy süýjili diabet keselini bejermekde ulanylýar. Kelemin şeresinde kaliý ionlarynyň bolmagy onuň gipokaliýemiýada, ýürek- damar, bowrek kesellerinde ulanylmaga mümkinçilik berýär.

Mundan başga-da kelemsiz şiresini sary getirmede, dalak kesellerinde, ýokary dem alyş ýollaryň kesellerinde (agyz çaykamak) giňden ulanylýar. Onuň terje ýapragyny bogunlaryň agyrysyny aýyrmak üçin ýapgy edilýär.

Nar. Boýy 4-5 m ýetýän gyrymsy ýa-da pes agaç. Gabygy kaştan reňkli çatlak agaç. Miwesi togalak gyzyň goňur reňkli, içinde kxpsanly çigidi bolup, ol şireli süýji gatlak bilen örtülendir. Turkmenistanda ol medeniýeleşdirilip, miwesi agaç hxxmünde xsdürilýär. Lukmançylykda naryň baldagynyň, şahalarynyň gabygy, kxxküniň gabygy, miwesiniň gabygy we miwesi ulanylýar.

Baldagynyň, şahalarynyň we kxxküniň gabyklarynda alkaloidleriň toplumy pellelerin, izopellelerin, metilizopellelerin bardyr. Esasy güýçli alkaloid – psewdopelleterindir. Ýapraklarynda betulin, ursol turşuslary; güllerinde reňkleýji madda – punisin we tanin bardyr. Miwesiniň gabygynda kxp mukdarda tanin bardyr. Miwesinde witamin C, organiki turşulary, limon turşusy (6%), gant bardyr.

Naryň şahalarynyň gabygy teniý (gurçugyna) garşy serişde hxkmunde gadymdan bellidir. Naryň miwesiniň gabygy (taniniň bolmagy) xrtüji serişde gaýnaglama garşy, iç geçmelere, dizenteriýalara, gastrite garşy ulanylýar. Nar has gadymy halk derman serişdesidir. Onuň güllerini Abu Ali Ibn Sina aşgazan kesellerini, dişiň etinin gan akmalaryny bejermeklikde ulanypdyr. Miwesini bolsa peşew howujy, ýara bitiriji, xrtüji serişde hxkmünde ulanypdyr.

Bxwrekde, aşgazanda agyry peýda bolanda süýji naryň şiresi içilýär. Turşy naryň şiresi süýjili diabet kesellerini bejermekde peýdaly. Naryň miwesiniň şiresi gyzgyn peseldiji, suwsyzlygyny gandyryjy, ýakymlaşdyryjy serişde hxkmünde ulanylýar.

Terje miwesinic gabygy üsgülewükde, gaýnaglama kesellerinde peýdaly.

Gadym wagtlarda naryň miwesiniň gabygy, miwesi we güli, gijelewükde, sary getirmede, üsgülewükde, süňk dxwüklerinde, agyry aýyryjy, dizenteriýa garşy serişde hxkmünde ulanylypdyr.

Alkaloid – pelleterini arassa gornüşinde (0.4-0.5 g) ulanylanda adamlara zäherli täsiri bar. Ylmy lukmançylykda bu alkaloid tanin we kükürt turşusy bilen onuň gabygynyň ekstrakty tasma şekilli gurçuga garşy ulanylýar. Miwesiniň gabygy lukmançylykda ulanylýan tanini almakda çig mal hasaplanýar.

Ulanylyşy. Xrtüji serişde hxkmünde 2 çay çemçe miwesiniň ownudylan gabygyny 1 bulgur suw bilen 15 min gaýnatmaly. Süzüp 2 günüň dowamynda içmeli.

Gurçuga (teniý) garşy 50 g baldagynyň we kxküniň gabygyny 0.5 l suw bilen 15 min gaýnadyp, sowandan soň süzmeli we lukmanyň gxzegçilinde 2-3 sagadyň dowamynda içmeli.

V. KITAPDA GYSGALDYLYP ULANYLAN SÖZLER

Aq. – Aqua – Suw
Bulb. – Bulbus – Sogana meñzeş düýp
Cort. – Cortex – Gabyk
Dec. – Decoctum – Gaýnatma
Extr. – Extractum – Ekstrakt
Fol. – Folium – Ýaprak
Flor. – Flores – Güller
Fruct. – Fructus – Miwe
Gem. – Gemmae – Pyntyklar
GTEB - Gurbaga täsir ediş birligi
Gutt. – Guttae – Damja
Herb. – Herba – Oty
Inf. – Infuzum – Gyzgyn demleme
KTEB - Kepderä täsir ediş birligi
Ol. – Oleum – Ýagy
Pulv. – Pulveratus – Ürgün görnüşinde
Rad. – Radix – Kök
Rhiz – Rhizoma – Porryk
Sem. – Semen – Tohum, çigidi
Sicc. – Siccus (rem) – Gury

Sir. – Sirupus – Şerbet

Sol. – Solutio – Ergin

Spec. – Species – Ýgyndy, garyndy, otlaryň
ýgyndysy

Spir. – Spiritus – Spirt

Spiss. – Spissum – Goýy

Succ. – Succus – Şire

Tinct. – Tinctura – Tinktura

Ung. – Unguentum - çalgy

VI. DERMANLYK ÖSÜMLIKLERİNİN TÜRKMENÇE-LATYNÇA ATLARY

T/b	Türkmençe atlary	- Latynça atlary	Sah.
	Adaty dänegerçek	- Datura stramonium L.	303
	Adaty nazzbaýgöl	- Ocimum basilicum L.	387
	Adaty ýakymlyja	- Origanum vulgare L.	315
	Adaty zirk	- Berberis vulgaris L.	327
	Adaty erik	- Armeniaca Vulgaris Lam	346
	Ahðarhaot	- Dracocephalum subcapitatum [O. Knutze] Lipski	276
	Ajy buýan	- Sophora pachycarpa C. A. Mey.	308
	Alyç	- Crataegus sanguinea. Pall.	280
	Anhuz	- Anchuza italica	286
	Arça	- Juniperus communis L.	278
	Arnap	- Zizyphus jujuba Mill.	317
	Atgulak	- Plantago major L	320
	Atkaşdany	- Aesculus hippocastanum L.	273
	Apelsin	- Citrus sinensis Risso	352
	Barwinok	- Vinca minor L.	279
	Borjak	- Ephedra equisetina Bunge	297
	Böwrek çayy	- Orthosiphon stamineus	325
	Böwürslen	- Rubus Caesius L.	351
	Boýbodran	- Achillea millefolium L.	316
	Bürelje	- Pulicaria gnaphalodes	289
	Buýan	- Glycyrrhiza glabra L.	310
	Çasaran	- Hippocrepis retusa L.	332
	Çerbiýe	- Althaea officinalis L.	272
	Çerkez	- Salsola Richteri Kar. ex Litv.	312
	Çomuç	- Ferula assa-foetida L.	276
	Çopantelpik	- Matricaria inodora L.	321
	Çopan torba	- Capsella bursa pastoris. L. Medic.	330
	Çöpboýa	- Rubia tinctorum L.	277
	Dänegerçek	- Datura innoxia Mill.	303
	Daşkekrek (gök gülälek)	- Centaurea cyanus L.	292

Dařtohumlyja	- <i>Lithospermum officinale</i> L.	274
Demirtiken	- <i>Tribulus terrestris</i> L.	314
Dermanlyk melissa	- <i>Melissa officinalis</i> L.	333
Dermanlyk tozga	- <i>Taraxacum officinale</i> Wigg.	334
Diř ammisi	- <i>Ammi visnaga</i> L.	302
Düýedaban	- <i>Zygophyllum fawago</i> L.	295
Dyrnaklyja	- <i>Calendula officinalis</i> L.	322
Ehinaseýa	- <i>Echinacea purpurea</i> L. Moench.	314
Eřekýoruja	- <i>Melilotus officinalis</i> L. Pall.	323
Gara çayyr	- <i>Cynodon dactylon</i> L. Pers.	336
Gawun	- <i>Cucumis melo</i> L.	350
Garpyz	- <i>Citrullus edulis</i> Pang.	347
Göwen	- <i>Astragalus pulvinatus</i> Bunge	287
Gowaça	- <i>Gossypium</i> L.	269
Göýül	- <i>Capparis spinosa</i> L.	291
Gyzyl burç	- <i>Capsicum annuum</i> L.	336
Hmel	- <i>Humulus lupulus</i> L.	300
Injir	- <i>Ficus carica</i> L.	283
Innew (greçiha)	- <i>Fagopyrum sagittatum</i> Gilib.	350
Itburun	- <i>Roza canina</i> L.	325
Iki öýli çit-çiti	- <i>Urtica dioica</i> L.	328
Jerebaý	- <i>Hypericum perforatum</i> L.	324
Kaşir	- <i>Daucus sativum</i> (hoffm) Rochl.	344
Kädi	- <i>Cucurbita pepo</i> L.	345
Kartořka	- <i>Solanum tuberosum</i> L.	348
Keýit oty	- <i>Ziziphora clinopodioides</i> L.	275
Kelem	- <i>Brassica oleraceae</i> L.	353
Kinza	- <i>Coriandrum sativum</i> L.	337
Künji	- <i>Sesamum indicum</i> L.	318
Lopuh (gulakly)	- <i>Arctium lappa</i> L.	278
Maňyrsak	- <i>Hyoscyamus niger</i> L.	302
Meýdan kyrkbogyn (hwořy)	- <i>Equisetum arvense</i>	284
Maý landyřy	- <i>Convallaria majolis</i> L.	327
Narpyz	- <i>Mentha piperita</i> L.	305
Nar	- <i>Punica granatum</i> L.	354

Omela	- <i>Viscum Album</i> L.	281
Waleriana	- <i>Valeriana officinalis</i> L.	298
Pisse	- <i>Pistacia vera</i> L.	318
Polatly	- <i>Ononis arvensis</i>	269
Porsy agaç	- <i>Ailanthus altissima</i> [Mill.] Swingle	286
Raiwolfiýa	- <i>Rauvolfia serpentina</i>	281
Sabur	- <i>Aloe arborescens</i> Mill.	271
Saryçöp (delfinium)	- <i>Delphinium semibarbatum</i> Bien. ex Boiss	304
Saryja ot (helтуşnik)	- <i>Erysimum canescens</i> Roth.	309
Sarymsak	- <i>Allium sativum</i> L.	294
Semzek	- <i>Portulaca oleraceae</i> L.	312
Senaýmekge	- <i>Cassia acutifolia</i> Del.	329
Şirguýruk	- <i>Leonurus quinquelobatus</i>	300
Sogan	- <i>Allium cepa</i> L.	319
Suw kyrkboguny	- <i>Polygonum persicaria</i> L.	293
Skutillariýa (şlemnik)	- <i>Scutellaria galericulata</i> L.	313
Şorlyk sferofizasy	- <i>Sphaerophysa salsula</i> [Pall.] D.C.	309
Sumah	- <i>Rhus coriaria</i> L.	313
Tanasetum (pihma)	- <i>Tanacetum vulgare</i> L.	270
Towşan dodak	- <i>Lagochilus inebrians</i> Bunge.	329
Tilkiçay	- <i>Stachys lawandulifolia</i> Vahl.	296
Tut agajy	- <i>Morus alba</i> L.	332
Turşy ülje	- <i>Cerasus austera</i> L.	291
Uly demrewot	- <i>Chelidonium majus</i> L.	231
Üç bölek goşa diş	- <i>Bidens tripartita</i> L.	295
Üzüm	- <i>Vitis vinifera</i> L.	290
Ysmanak	- <i>Spinacia oleracea</i> L.	314
Ýandak	- <i>Alhagi persarum</i> Boiss et Buhse	289
Ýaz adonizi	- <i>Adonis vernalis</i> L.	326
Ýeken	- <i>Acorus calamus</i> L.	285
Ýüzärlik	- <i>Peganum harmala</i> L.	274
Zeýtun	- <i>Olea europaea</i> L.	326

DERMANLYK ÖSÜMLÜKLERİNİN LATYNÇA-TÜRKMENÇE ATLARY

T/b	Latynça atlary	- Türkmençe atlary	Sah.
1.	<i>Adonis vernalis</i> L.	- Ýaz adonisi	326
2.	<i>Achillea millefolium</i> L.	- Boýbodran	316
3.	<i>Acorus calamus</i> L.	- Ýeken	285
4.	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	- Atkaşdany	273
5.	<i>Ailanthus altissima</i> [Mill.] Swingle	- Porsy ağaç	269
6.	<i>Alhagi persarum</i> Boiss et Buhse	- Ýandak	289
7.	<i>Allium cepa</i> L.	- Sogan	319
8.	<i>Allium sativum</i> L.	- Sarymsak	294
9.	<i>Aloe arborescens</i>	- Sabur	271
10.	<i>Althaea officinalis</i> L.	- Çerbiýe	272
11.	<i>Ammi visnaga</i> L.	- Diş ammisi	302
12.	<i>Anchuza italica</i>	- Anhuz	287
13.	<i>Archium lappa</i> L.	- Lopuh (gulakly)	278
14.	<i>Armeniaca vulgaris</i> Lam.	- Adaty erik	346
15.	<i>Astragalus pulvinatus</i> Bunge	- Göwen	287
16.	<i>Berberis vulgaris</i> L.	- Adaty zirk	327
17.	<i>Bidens tripartita</i> L.	- Üç bölek goşa diş	295
18.	<i>Brassica oleraceae</i> L.	- Kelem	353
19.	<i>Calendula offisinalis</i> L.	- Dyrnaklyja	322
20.	<i>Capparis spinosa</i> L.	- Göýül	291
21.	<i>Capsella bursa pastoris</i> . L. Medic	- Çopan torba	330
22.	<i>Capsicum annuum</i> . L.	- Gyzyly burç	336
23.	<i>Cassia acutifolia</i> . Del.	- Senaý mekge	329
24.	<i>Centaurea cyanus</i> L.	- Daş kekrek (gök gülälek)	292
25.	<i>Cerasus austera</i> L.	- Turşy ülje	291
26.	<i>Chelidonium majus</i> . L.	- Uly demrewot	231
27.	<i>Citrullus edulis</i> Pang.	- Garpyz	347
28.	<i>Convallaria majalis</i> . L.	- Maý landyşy	327
29.	<i>Coriandrum sativum</i> . L.	- Kinza	337
30.	<i>Crataegus sanguinea</i> . Pall.	- Alyç	280
31.	<i>Cucumis melo</i> L.	- Gawun	350
32.	<i>Cucurbita pepo</i> L.	- Kädi	345
33.	<i>Cynodon dactulon</i> . L. Pers.	- Gara çayyr	336
34.	<i>Datura innoxia</i> Mill.	- Dänegerçek	303
35.	<i>Datura stramonium</i> L.	- Adaty dänegerçek	303

36. <i>Daucus sativum</i> (Hoffm) Rochl.	- Kâşir	344
37. <i>Delphinium semibarbatum</i> Bien. ex Boiss	- Saryçöp (delfinium)	304
38. <i>Dracocephalum subcapitatum</i> [O. Knutze] Lipski	- Ahdarhaot	276
39. <i>Echinasea purpurea</i> L. Moench.	- Ehinaseýa	314
40. <i>Ephedra equisetina</i> . Bunge	- Borjak	297
41. <i>Equisetum arvense</i>	- Meýdan kyrkbogyny (hwoşy)	284
42. <i>Erysimum canescens</i> Roth.	- Saryjaot (Teltuşnik)	309
43. <i>Fagopyrum sagittatum</i> Gilib.	- Innew (Greçiha)	350
44. <i>Ferula assa-foetida</i> L.	- Çomuç	276
45. <i>Ficus carica</i> L.	- İnjir	383
46. <i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	- Buýan	310
47. <i>Gossypium</i> L.	- Gowaça	269
48. <i>Hippophae rhamnoides</i> . L.	- Çasaran	332
49. <i>Humulus lupulus</i> L.	- Hmel	300
50. <i>Hyoscyamus niger</i> L.	- Maňyrsak	302
51. <i>Hypericum perforatum</i> L.	- Jerebaý	324
52. <i>Juniperus communis</i> L.	- Arça	278
53. <i>Leonurus quinquelobatus</i> L.	- Şirguýruk	300
54. <i>Lithospermum officinale</i> L.	- Daştuhumlyja	274
55. <i>Lagochilus inebrians</i> . Bunge.	- Towşandodak	329
56. <i>Matricaria recutita</i> L.	- Çopantelpék	321
57. <i>Melilotus officinalis</i> L. [Pall.]	- Eşekýorunja	323
58. <i>Melissa officinalis</i> . L.	- Dermanlyk melissa	333
59. <i>Mentha piperita</i> L.	- Narpyz	305
60. <i>Morus alba</i> . L.	- Tut agajy	332
61. <i>Ocimum basilicum</i> L.	- Adaty nazzybaýgül	286
62. <i>Olea europaea</i> L.	- Zeýtun	326
63. <i>Ononis arvensis</i>	- Polatly	269
64. <i>Origanum vulgare</i> L.	- Adaty ýakymlyja	315
65. <i>Orthosiphon stamineus</i>	- Bówrek çay	325
66. <i>Peganum harmala</i> L.	- Ýüzärlík	274
67. <i>Pistacia vera</i> L.	- Pisse	318
68. <i>Plantago major</i> L.	- Atgulak	320
69. <i>Polygonum persicaria</i> L.	- Suw kyrkboguny	293
70. <i>Portulaca oleraceae</i> L.	- Semzek	312
71. <i>Pulicaria gnaphalodes</i> [Vent] Boiss.	- Bürelije	289
72. <i>Punica granatum</i> L.	- Nar	354
73. <i>Rauvolfia serpentina</i>	- Rawolfiýa	281

74. <i>Rhus coriaria</i> L.	- Sumah	313
75. <i>Roza canina</i> L.	- Itburyn	325
76. <i>Rubia tinctorum</i> L.	- Çöpboýa	277
77. <i>Rubus Caesins</i> L.	- Böwürslen	351
78. <i>Salsola Richteri</i> Kar. ex Litv.	- Çerkez	312
79. <i>Scutellaria galericulata</i> L.	- Skutellariýa (şlemník)	313
80. <i>Sesamum indicum</i> L.	- Künji	318
81. <i>Sitrus sinensis</i> Risso	- Apelsin	352
82. <i>Solanum Fuberosum</i> L.	- Kartoşka	348
83. <i>Sophora pachycarpa</i> . C. A. Mey	- Ajy buýan	308
84. <i>Sphaerophysa salsula</i> [Pall.] D. C.	- Şorluk sferofizasy	309
85. <i>Spinacia oleracea</i> L.	- Ysmanak	314
86. <i>Stachys lawandulifolia</i> Vahl.	- Tilki çay	297
87. <i>Tanacetum vulgare</i> L.	- Tanasetum (pıhma)	270
88. <i>Taraxacum officinale</i> . Wigg.	- Dermanlyk tozga	334
89. <i>Tribulus terrestris</i> L.	- Demirtiken	314
90. <i>Urtica dioica</i> . L.	- İki öýli çit-çiti	328
91. <i>Valeriana officinalis</i> L.	- Waleriana	298
92. <i>Vinca minor</i> L.	- Barwinok	279
93. <i>Viscum Album</i> L.	- Omelo	281
94. <i>Vitis vinifera</i> L.	- Üzüm	290
95. <i>Ziziphora clinopodioides</i> L.	- Keýik oty	275
96. <i>Zizyphus jujuba</i> Mill.	- Arnap	317
97. <i>Zygophyllum fabago</i> L.	- Düýedaban	295

VII. ULANYLAN EDEBİYATLAR

- Saparmyrat Türkmenbaşy. Ruhnama. Aşgabat, 2001.
- Saparmyrat Türkmenbaşy. Ruhnama ikinji kitap. Aşgabat, 2004.
- Türkmenistanyň Prezidenti Beýik Saparmyrat Türkmenbaşynyň „Türkmenistanda durmuş - ykdysady özgertmeleriniň 2010-njy ýyla çenli döwür üçin baş ugry“ Milli Maksatnamasy. Aşgabat, 1999.
- Abu Ali Ibn Sina. Lukmançylyk ylmynyň kanunlary. Aşgabat, 2003.
- Аширова А.А. Лекарственные растения Туркменистана, применяемые в народной медицине. Ашгабаň, Магарыф, 1992 .
- Акмурадов А. Дerman otlar. Aşgabat, 1993 .
- Волынской В.Г., Венäер К.И., Фрейäман С.Ç. и äр. Лекарственные растения в научной и народной медицине. Сарафов, Сарафовский университети, 1974.
- Гаммерман А.Ф., Äмиров Ш.А., Каррыев М.О., Яковлев Г.П. Лекарственные растения СССР, не включенные в Фармакопею. Ашгабаň. Ылым, 1970.
- Гаммерман А.Ф. Курс фармакогнозия. Москва, Медицина. 1979.
- Гаммерман А.Ф., Каäаев Г.Н., Яöенко-Хмелевский А.А. Лекарственные растения. М.: Высшая школа, 1984.
- Георгиевский В.П., Каçаринов Н.А., Каррыев М.О. Физико-химические методы анализа биологически активных веществ в растительного происхождения. Ашгабаň. Ылым, 1976.
- Gubaýew A.A. Orta Aziýa halk tebigçiliginde ulanylyan ösümlükler we olaryň atlary. Aşgabat: GKP.MK-nuň neşirýaty, 1991.
- Galkin W.A. İç keselleri. Aşgabat. Magaryf, 1995.
- Иванченко В.А. Основные растения в медицине народов Востока. Ашгабаň: Туркменистан, 1985.

Ивашин А.С., Кайина Ç.Ф., Рыбачук М.Ç. и әр.
Справочник по сәгойовкам лекарсйвенных
расйений. Киев: Урожай, 1989.

Каррыев М.О. Лекарсйвенные расйения
Њуркменисйана. Ашгабай. Њуркменисйан, 1996

Каррыев М.О. Арча – лекарсйвенные расйение.
Ашгабай: Ылым, 1971.

Каррыев М.О. Фармакохимия некойорых ўфирно-
маслинных расйения флоры Њуркмении. Ашгабай:
Ылым, 1973.

Каррыев М.О. Лекарсйвенные расйения в научной
и нароайной меаййине. Ашгабай: Çнание, 1988.

Каррыев М.О., Арйемйева М.В., Бабаева Р.Г. и әр.
Фармакохимия лекарсйвенных расйений Њуркме-
нисйана. Ашгабай: Ылым, 1991.

Кербабает Б.Б., Мещеряков А.А. Лекарсйвенные
расйения Њуркмении. Ашгабай: Ылым, 1975.

Kerbabaýew B.B. Ösümlikleriñ türkmen halk we ylmy
atlary. Aşgabat, 1992.

Кушнейова М.А. Лекарсйвенные расйийелйное
сырйе и препарайы. Москва, Высшая школа, 1987.

Лаайнина Е.А., Морозова Р.С. Фиййотерапия. Л.:
Меаййина, 1987.

Машковский М.А. Лекарсйвенные среайсйва. В 2-х
йомах. М.: Меаййина, 1987.

Муравйева А.А. Фармакогносия с основами биохии-
мии лекарсйвенных расйений. М.: Меаййина, 1978.

Муравйева А.А. Фармакогносия. М.: Меаййина,
1991.

Никийин В.В., Кербабает Б.Б. Њуркменские нароай-
ные и научные насвания расйений. Ашгабай, 1962.

Пейков В. Современная фиййотерапия. Меаййина и
фийскульйура. София, 1982.

Раайсинский В.Е., Аннаев Х.А., Аннаева О.М.
Лекарсйвенные расйения Њуркменсйана в пеййаиф-
рии, акушерсйве и гинекологии. Ашгабай, 1994.

Сало Л.П. Лекарственные растения. М.:
Медицина, 1985.

Соколов С.Я., Самофеев И.П. Справочник по
лекарственным растениям. Фитотерапия.
М.: Медицина, 1984.

Нурова А.А., Сапожникова Ю.Н. Лекарственные
растения СССР и их применение. М.: Медицина,
1982.

Ussayew U.D. Balkan melhemleri. Nebit-Dag, 1994.
Халмаев Х.Х., Харламова И.А., Алимбаева П.К.,
Каррыев М.О., Хайров И.Х. Основные лекарственные
растения Средней Азии. Ташкент. Медицина,
1984.

	MAZMUNY	sah
	GIRIŞ	10
I.	FITOTERAPIÝA WE DERMAN	
	ÖSÜMLİK ÇIG MALLARY BARADA	13
1.1.	Fitoterapiýa hakynda	13
1.2.	Derman ösümliklerde saklanýan biologiki işjeň maddalar	20
1.3.	Dermanlyk ösümlikleriň ýygnaşy we guradylşy.	34
1.4.	Derman ösümlik çig malyndan derman görnüşleriniň taýýarlanylşy	48
II.	KÖP ÝAÝRAN KESELLERIC DERMAN	
	ÖSÜMLIKLERI WE FITOSERIŞ-DELERI BILEN BEJERILIŞI	50
2.1.	Ýürek-damar keselleriniň fitoterapiýasy	50
2.2.	Nerw ulgamynyň keselleriniň fitoterapiýasy	81
2.3.	Ýokary dem alyş agzalarynyň keselleriniň fitoterapiýasy	88
2.4.	Aşgazan-ıçege keselleriniň fitoterapiýasy	108
2.5.	Bagyr we öt ýollarynyň keselleri	134
2.6.	Böwrek we peşew ýollarynyň keselleri	160
2.7.	Madda çalşygynyň bozulmalarynda ýüze çykýan keselleriniň fitoterapiýasy	182
2.8.	Endokrin ulgamynyň keselleri	189
2.9.	Soguljan keselleriniň fitoterapiýasy	205
2.10.	Deri keselleri	212
2.11.	Gözellikde ulanylýan derman ösümlikleri	249
2.12.	Diş keselleri	259
2.13.	Ýaralaryň bejerilişi	262
III.	LUKMANÇYLYK AMALYNDA	
	ULANYLYÁN DERMAN ÖSÜMLIKLERI	369
IV.	LUKMANÇYLYKDAKY IÝMIT	
	ÖSÜMLIKLERI	338
V.	KITAPDA GYSGALDYLYP ULANYLAN	

SÖZLER	356
VI. DERMAN ÖSÜMLİKLERİNİN TÜRKMENÇE-LATYNÇA ATLARY	357
DERMAN ÖSÜMLİKLERİNİN LATYNÇA-TÜRKMENÇE ATLARY	360
VII. ULANYLAN EDEBİYATLAR	363
VIII. MAZMUNY	366
IX. FITOTERAPIÝADA ULANYLYÁN DERMAN ÖSÜMLİKLERI	368

FITOTERAPIÝADA ULANYLÝAN DERMAN ÖSÜMLIKLERI

Derm

an ösümlikleriň çig mallarynyň ýygnaýş möwsümleri

1-nji görkeziji

T/b	Derman ösümligiň ady	Ýygnaýan bölegi	Ýygnaýan wagty	Ýygnaýan ýeri
1	Adaty arça	Miwesi	Gorkut	Sosna tokaýlyklary
2	Adaty malina	Miwesi	Gorkut	Saýaly tokaýlary
3	Adaty atgulak	Oty	Magtymguly, Ruhnama	Ýol ýakalarynda, açyk meýdanlarda
4	Adaty rýabina	Miwesi, gülleri	Magtymguly-Alp-Arslan	Tokaýda
5	Adaty hren	Kökiş	Magtymguly, Ruhnama	Çygly çemenliklerde, melleklerde
6	Adaty timin	Oty	Oguz,Ruhnama	Çemenliklerde, ýol ýakalarynda
7	Adaty zygyr	Oty	Gorkut	Gury çemenlikli jülgede
8	At turşujasy	Koki	Ruhnama	Çygly çemenliklerde
9	Ajy ýowşan	Otunyň ýokarky gülleýän bölegi	Gorkut, Ruhnama	Ulanylman ýatan boş meýdanlarda
10	Alyç	Miwesi,gülleri	Magtymguly,Alp-Arslan	Tokaýlarda
11	Berýoza	Ýapragy, pyntygy	Magtymgyly, Gorkut	Tokaýlarda
12	Brusnika	Ýapragy	Gurbansoltan, Magtymguly	Gür tokaýlarda
13	Badýan	Oty, köki	Gorkut,Ruhnama	Melleklerde

14	Buýan	Porrugy	Magtymguly, Ruhnama	Çemenlikli sáhralarda
15	Boýbodran	Oty	Gorkut, Alp-Arslan	Çemenliklerde, açyk meýdanlarda
16	Benewşe	Oty	Oguz-Alp-Arslan	Boz ýerlerde, meýdanlarda
17	Çit-çiti	Ýapragy	Magtymguly, Ruhnama	Melleklerde, boş ýatan ýerlerde
18	Çopan torba	Oty	Magtymguly, Ruhnama	Ulanylmaýan, boş ýatan ýerlerde
19	Çopan telpek	Gülleri	Gorkut, Alp-Arslan	Açyk meýdanlarda, melleklerde
20	Çernika	Ýapragy, miwesi	Gorkut	Sosna tokaýlarda
21	Diri süňk	Oty	Gorkut	Gury ýapgytlarda
22	Dyrnakgül	Gul çogdamy	Gorkut, Ruhnama	Tokaýlarda, ýapgyt baýyrlarda
23	Dermanlyk tozga	Oty, köki	Magtymguly, Ruhnama	Meýdanlarda, çemenliklerde
24	Dermanlyk okopnik	Köki	Magtymguly, Garaşsyzlyk	Çemenli aýlaglarda
25	Demrewot (gançöp)	Oty	Oguz, Alp-Arslan	Melleklerde, tokaýlarda
26	Eşek ýorunja	Oty	Gorkut, Alp-Arslan	Boş ýatan ýerlerde, medeni ekinleriň ýerlerinde
27	Eje-ejelik	Gülleri, ýapragy	Magtymguly, Alp-Arslan	Çygly ýerlerde
28	Erkeklik bisepere (paporotnigi)	porrugy	Gurbansoltan, Garaşsyzlyk	Saýaly tokaýlarda

29	Gara maňyrsak	Ýapragy	Oguz, Gorkut	Meýdanlarda, ulanylmaýan ýerlerde, melleklerde
30	Garatiken	Miwesi	Ruhnama	Jeňňelikde, gyrymsy agaçlarda
31	Gara derek(toraňňy)	Pyntygy	Gurbansoltan, Magtymguly	Çygly tokaýlarda
32	Itburun	Miwesi, gülleri	Gorkut, Garaşsyzlyk	Tokaýlarda, gyrymsy agaçlaryň arasynda
33	Jerebaý	Oty	Gorkut, Alp-Arslan	Meýdanlarda
34	Kelem	Ýerden ýokarsy	Ruhnama, Garaşsyzlyk	Melleklerde
35	Käşir	Ýer asty bölegi, tohumy	Gorkut, Garaşsyzlyk	Mellekde
36	Keçegül	Oty	Oguz, Alp-Arslan	Çygly tokaýlarda
37	Käkilik oty	Oty	Oguz, Gorkut	Gury jülgeli tokaýlarda
38	Lipa	Gülleri	Oguz	Ýaprakly tokaýlarda
39	Meýdan kyrkboguny	Oty	Magtymguly, Ruhnama	Meýdanda, ulanylman ýatan ýerlerde, çemenlikde
40	Narpyz	Oty	Gorkut	Çygly çemenliklerde
41	Waleriana	Köki we porrugy	Alp-Arslan, Ruhnama	Çemenli tokaýlarda, derýa kenarynda
42	Port gara tiken	Gabygy	Gurbansoltan, Magtymguly	Gyrymsy agaçlaryň arasynda, derýa kenarynda
43	Tanasetum (Piňma)	Gul çogdamy	Gorkut, Alp-Arslan	Açyk meýdanda, çemenliklerde

44	Süýji ýeken	Oty	Gorkut, Alp-Arslan	Mellekde,meýdanda
45	Suwly burç	Oty	Gorkut	Derýa kenarynda, köllerde
46	Sary çöp	Oty	Oguz,Alp-Arslan	Çygly tokaýlarda, çeşmelerde
47	Sogan	Ýer asty bölegi	Gorkut, Ruhnama	Melleklerde
48	Sosna	Püri, pyntygy	Magtymguly, Alp-Arslan	Sosna tokaýlarynda
49	Sarymsak	Ýer asty bölegi	Alp-Arslan	Melleklerde
50	Aýy gulak	Ýapragy	Gorkut,Alp-Arslan	Sosna,tundra tokaýlyklarynda
51	Uly gulakly (lopuh)	Köki	Magtymguly, Ruhnama	Melleklerde, boş ýatan ýerlerde
52	Üç bölek goşa diş	Oty	Gorkut, Alp-Arslan	Derýa kenarynda, çemenliklerde
53	Gök daş kekre	Gülleri	Gorkut	Çowdary ekilýän ýerlerde
54	Ýaz adonisi	Oty	Magtymguly, Alp-Arslan	Tokaýly açyk meýdanlarda
55	Ýakymlyja	Oty	Gorkut, Alp-Arslan	Medeniýetleşdirilen ösümlikleriň arasynda

