

TÜRKMEN POLITEHNIKI INSTITUTY

B.Çarygulyýew

**Meýdan geofizikasynyň netijelerini
işläp taýýarlamagyň we san
görnüşli ýazgylaryň nazaryýeti**

Ýokary okuw mekdepleri üçin okuw kitaby

Aşgabat – 2010

B.Çarygulyýew, Meýdan geofizikasynyň netijelerini işläp taýýarlamagyň we san görnüşli ýazgylaryň nazaryýeti.

Ýokary okuw mekdepleri üçin okuw kitaby, Aşgabat – 2010 ý.

GİRİŞ

Sanly filtrleri taslamanyň esasy serişdesi – ýygylýk (spektral) syny. Ýygylýk syny sinuslaryň we kosinuslaryň periodiki funksiýalaryny ulanmaklyga esaslandyr. Esasy boýunça san filtriň spektral häsiýetnamasy – bu ulgamyň inçe içki gurluşydyr, filtr tarapyndan giriş maglumatlaryň özgerdiji esasy doly kesgitleýän maglumatlaryň ýygylýk düzüminiň ugrukdyryp üýtgedýän onuň bir bahaly funksional pasporty.

Maglumatlary differensirlemäniň we integrirlemäniň belli usulyýetlerine ulanmakda filtriň sinteziniň we ýygylýk synynyň meselelerine seredip geçeliň. Rekursiw däl filtrlar iki funksiýanyň dolama algoritmini ýerine ýetirýärler:

$$y_k = h_n \otimes x_{k-n}, (1)$$

bu ýerde x_k – filtriň giriş maglumatlarynyň massiwi, h_n – filtriň operatory (ýadro, impuls seslenme), k we n – maglumatlarynyň massiwiniň san bahalarynyň we filtriň koeffisientleriniň san bahalarynyň numerasiýasy, $k = 0, 1, 2, \dots, K$; $n = 0, 1, 2, \dots, N$; $K \geq N$. Islendik k argument üçin y_k dolamanyň çykyş hasaplamalarynyň bahalary häzirki we “geçen” ($k-N$ çenli) giriş hasaplamalaryň bahalary bilen kesgitlenýär. Munuň ýaly filtr rekursiw däl san filtri diýip atlandyrylýar (NSF). Operatoryň $[0-N]$ aralygy filtriň “penjiresi adyny aldy. Filtriň penjiresi $N+1$ hasaplamany düzýär, filtr kazual hasap edilýär, ýagny häzirki bilen sebäpli şertlendirilen we çykyş signaly girişi önürtilemeýär. Umumy ýagdaýynda kazual filtr signalyň spektrinde garmonikanyň düzümini, onuň amplitudasyny we fazasyny çalyşýar.

Kazual filtri fiziki ýagdaýda wagtyň häzirki wagat ölçeginde özleşdirilip bilner. Filtrlemäniň başlanmagy $k < n$

bolanda $x(k-n)$ nokatlar üçin N hasaplamalar bahalarynyň – kesgitli başlangyç bahalary berlende mümkindir. Adatça başlangyç şertler hökmünde nul bahalary berilýär, hasapalamanyň signalyň trendi ýa – da bahasy $x(0)$, ýagny $x(0)$ hasaplamanyň argument boýunça hasaplamanyň yzyna dowam etdirilmegi. EHM – da maglumatlar işlenip taýýarlanylanda kazual boýunça çäklendirilme aýyrylýar. Filtriň programma dolanşygynda “geçen” we “geljek” k hasaplamalaryň häzirki nokadyna degişlilikde hasaplamalaryň giriş yzygiderlikleriniň bahalary $(k+n, k+N'$ çenli) ýerleşip bilerler, şol bir wagtda dolamany gutarmak üçin (başlangyçdaky ýaly) $(k+n)>K$ bolanda ahyrky şertleriň N' nokatlary gerekdir. $N' = N$ we $h(-n) = h(n)$ bolanda filtr iki taraplaýyn simmetriki filtr diýip atlandyrylýar. Simmetriki filtrlar birtaraplaýyn filtrlerde tapawutlylykda işlenilýän signalyň fazasyny üýtgetmeýärler. Signallaryň san işlenip taýýarlanylşy signallaryň diskret özgertmesi we ulgamlaryň maglumaty işleýän signallary operirleýär. Diskret özgertmeleriň matematikasy analog matematikanyň çäklerinde baryp 18 asyrdan döredi, ýöne 20 asyrdan ilkinji hasaplaýjy maşynlaryň döremegi bilen uly ösüşe eýe boldy. Esasynda özüniň esasy manysynda diskret özgertmeleriniň matematiki apparat analog signallarynyň we ulgamlarynyň özgertmesine meňzeşdir. Ýöne maglumatlaryň diskretlilik bu fakty hasaba almagy talap edýär we ony inkär etmekuly ýalňyşlyklara getirip bilýär. Ondan başga – da diskret matematikasynyň bir giden hatary analitiki matematikasynda analoglara eýe dälär.

Diskret san yzygiderlikleriň giň ýaýran syny hökmünde z – özgertme bolup durýar. Ol diskret diskret signallar we ulgamlar üçin Laplasyň özgertmesi analog signallarda oýnaýan

roly ýaly orna eýedir. Z – özgertme signallary işläp taýýarlamakda rekursiw san ulgamlarynyň hasaby üçin uly baha eýedir, şonuň üçin hem rekursiw filtrleri öwrenip başlamazdan ozal aýratyn mowzuk hökmünde seredilip geçilýär.

DÜRLÜLIK WE INTEGRIRLEÝJI FILTRLER. DÜRLÜLIK OPERATORLARY.

Dürlülük operatorlaryň synynda ýygylýk boýunça çemeleşme meselelerine seredip geçeliň.

1 – nji hataryň **Dürlülük operatory** şeýle görnüşe eýedir:

$$\Delta s_k = s_{k+1} - s_k.$$

Operatoryň yzygiderli n -gezek ulanylşy n -hatarly operator görnüşinde ýazylýar:

$$\Delta^n(s_k) = \Delta[\Delta^{n-1}(s_k)] = \Delta s_k \otimes \Delta^{n-1}(s_k) \quad (2)$$

k	s_k	$\Delta(s_k)$	$\Delta^2(s_k)$	$\Delta^3(s_k)$	$\Delta^4(s_k)$	$\Delta^5(s_k)$	$\Delta^6(s_k)$	k
-7	0	0	0	0	0	0	0	-7
-6	0	0	0	0	0	0	1	-6
-5	0	0	0	0	0	1	-6	-5
-4	0	0	0	0	1	-5	15	-4
-3	0	0	0	1	-4	10	-20	-3
-2	0	0	1	-3	6	-10	15	-2
-1	0	1	-2	3	-4	5	-6	-1
0	1	-1	1	-1	1	-1	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1
K_q		2	6	20	70	252	924	K_q


Kronekeriň birlik impuls signalyna dürlilik operatorlaryň impuls reaksiýalaryň giriş bahalary tablisada görkezilendir. Yzygider dürlüliligiň hatarlary bahaüýtgeýiş binomial koeffisientleri saklaýar. Getirlen görnüşde dürlilik operatorlar kazual faza süýşürji (birtaraply) filtrlr bolup durýarlar., ýöne görşümüz ýaly jübüt derejeli operatorlar operatoryň oknosynyň ýarysyna süýşürilen simmetriki şekile eýe bolup biler. Tablisanyň soňky setirinde sesleriň dispersiýasynyň güýjenme koeffisienti getirilýär, onuň bahasy operatoryň hatarynyň ulalmagy bilen kert ulalýar. Bu 1 – den uly bolan hatarlary dürlilik operatorlary maglumatlaryň massiwinde statistiki ýaýradylan sesleriň ýerleşen ýerlerini kesgitlemäge mümkinçilik berýär. Bu mümkinçiligi has anyk görnüşinde operatorlaryň ýygylk häsiýetnamasynda görmek bolar.

$s(k) = \exp(j\omega k)$ (1) aňlatma goýup we ony ýönekeýleşdirip şuny alarys:

$$\Delta^n s(k) = (j^n) \exp(j\omega n/2) [2 \sin(\omega/2)]^n \exp(j\omega k).$$

$$H(\omega) = (j^n) \exp(j\omega n/2) [2 \sin(\omega/2)]^n \quad (3)$$


(2) aňlatmada ilkinji iki köpeldijileriň moduly 1 deň bolanlygy üçin, dürlilik operatoryň geçirme koeffisientiniň ýygylga baglylygy ikinji köpeldiji $(2 \sin(\omega/2))^n$ bilen kesgitlenýär we sur.1 görkezilendir.



Sur. 1 Dürülük filtrlri.

Signallarda sesleri bölmek. Suratdan görnüşi ýaly dürülük operatorlary Naýkwistiň aralygynyň birinji üçden birinde signalyň hemişelik düzüjisini we onuň garmonikasyny basyp ýatyrýar we operatoryň hatarynyň ulaldygyça aralygyň galan böleginde ýokary ýygylýkly düjileri güýçlendirýär. Adatça signalyň spektriniň esasy aralygynyň bu bölegini ýokary ýygylýkly statistiki sesler eýeleýär.

Maglumatlaryň synynda sesler, kesgitli maglumatlar saklap biler, mysal üçin ölçeg şertleriniň durnuklylygy boýunça we daşky destabilizirleýji faktorlaryň oçegine täsiri boýunça. Sur. 2 görnüşi ýaly akustiki karotažyň maglumatlarynda intensiw sesleriň aralygynyň bölünme mysaly görkezilendir, ol bu aralygyň dag jynslarynyň uly jaýryklylygy barada subut bolýar. Bu maglumat bolsa seslere dälde nebitiň, gazyň we suwuň gözleginde örän peýdaly maglumat bolup durýar.



Sur. 2 akustiki karotažyň tejribe maglumaty.

Ýitirlen maglumatlary düzetmek. Dürülik operatory bir aýratynlyga eýedir: $n+1$ hatarly operator n derejeli polinomy anulirleýär, ýagny $n+1$ operatoryň n derejeli polinom bilen dolamasy $\Delta^{n+1} \otimes P_n(k) = 0$ nul bahalaryny berýär. Bu aýratynlygy bahalaryň göýberilen ýa-da ýitirlen massiwlerinde ýönekeý we örän berk operatorlary ýasamak üçin ýa-da işläp taýýarlaýyşda anulirlenen ululyklary (meselem göze görünüp duran zyňmalary) çalyşmak üçin ulanyp bolar.

~ Mysal $P_2(k) = x_k = 1+2k-k^2$, $k = 0,1,2,\dots$ $x_k = 1,2,1,-2,-$
 ~ $7,-14,-23,-34,\dots$ $y_k = x_k \otimes \Delta^3 = 0,0,0,0,\dots$

Eger – de göýbermeleri saklaýan maglumatlar aralygy käbir derejeli köpagza diýip hasap etsek, onda indiki hatarly dürülik operatorynyň dolamasy nula deň bolmalydyr. Şeýlelikde massiwiň islendik nokadynda üçünji derejeli köpagzanyň maglumatlary approksimirlenende şu aşakdaky deňleme ýerine ýetirilýär:

$$\Delta^4 \otimes (s_k) = s_{k-2} - 4s_{k-1} + 6s_k - 4s_{k+1} + s_{k+2} = 0.$$

Maglumatlaryň ýitirlen merkezi nokadynyň düzelme interpolýasion filtri:

$$s_k = (-s_{k-2} + 4s_{k-1} + 4s_{k+1} - s_{k+2})/6. \quad (4)$$

Değişlilikde, maglumatlaryň düzelme filtrininiň operatory


$h(n) = (-1, 4, 0, 4, -1)/6$. Sesleriň güýjenme koeffisienti $\sigma^2 = 17/18 = 0.944$.

Mysal. Maglumatlar massiwiniň hakyky kesimi: $x_k = \{3, 6, 8, 8, 7, 5, 3, 1\}$.

Kesimde göze görnüp duran zyňylma bolup geçdi diýip aýdalyň: $x_k = \{3, 6, 8, 20, 8, 7, 5, 3, 1\}$.

Zyňylma hasaby annulirlenen. Hasaby çalyşma: $x_3 = (-x_1 + 4x_2 + 4x_4 - x_5)/6 = (-6 + 32 + 28 - 5)/6 \approx 8.17$.

Massiwde 5 – nji hasabat ýitirilen. Düzelme: $x_4 = (-x_2 + 4x_3 + 4x_5 - x_6)/6 = (-8 + 32 + 20 - 3)/6 \approx 6.83$.




Sur.3. dürlülük filtrleri

(4) aňlatmada $k = 0$ diýip kabul edip we $s_k = \exp(j\omega k)$, signaly goýup ýygylýk häsiýetnamasyny alýarys, filtriň bu ýagdaýynda 4 – nji hataryň maglumatlarynyň dikelmegi:


$$H(\omega) = (4 \cos \omega - \cos 2\omega)/3.$$

4 – nji we 6 – nji hataryň göýberlen maglumatlaryň dikeltme filtri üçin ýygylýk häsiýetnamasynyň görnüşi sur. 3 görkezilendir. Grafikler maglumatlary dikeltme dürlilik interpolýasion filtrlerni ulanylmagynyň diňe signalyň ýokary ýygylýk we ses düzüjileri iň bolmanda Naýkwistiň ýygylýgyndan 3 esse pes bolan signallar üçin mümkindigini anyk görkezýär. 4 – nji hatardan uly interpolýasion filtrlere ulanmak ulanmak maslahat berilmeýär, sebäbi olar 1 uly sesleriň güjenme koeffisientine eýedirler.


Sur. 4 we sur. 6 3 – nji hataryň operatory bilen giriş signallarynda göýberilen maglumatlaryň dikeltme mysallary we maglumatlary dikeltmegiň operatorynyň geçiriji funksiýasy deňeşdireniňde signallaryň spektri getirilendir.



Sur.4 Seslenmesik maglumatlary dikeltmek.




Sur. 5 Spektrler.



Sur. 6 Seslenen maglumatlary dikeltmek.

Suratlarda getirilen signallarda maglumatlaryň numerasiýasynyň takt ýygylgy saklanylanda her 10-njy ädim göýberilendir (mysal üçin meglumatlar geçirlende). Giriş signallaryň hemme bahalarynyň položitelidigini göz önüne tutsak operatoryň işi üçin maglumatlary göýberiş indikator hökmünde nul bahalar hyzmat edýär.

Dikeltme operatory üçin islendik beýleki ýagdaýlarda ýörite markeri göz önüne tutmak zerurdyr (mysal üçin annulirlenen maglumatlary ýa-da zyňylmalary hasabyň kesgitli uly ýa-da kiçi bahalary bilen çalyşmak).



Sur. 7 Signallary dikeltme ýalňyşlyklary.

Sur. 5 görnüşi ýaly peýdaly signalyň spektri operatoryň ýygylýk häsiýetnamasynyň birlik koeffisientiniň zonasyna ýatyr we maglumatlary dikeltme doly ýalňyşsyz ýerine ýetirilýär (sur. 4). Signala statistiki ýaýradylan sesleriň goýulmagynda maglumatlary dikeltme ýalňyşlygy ulalýar (sur.6), ýöne doly signalyň maglumat böleginde ol giriş maglumatlarynda bolşy ýaly sesiň flýuktuasiýasynyň ortakwadratik bahasyndan geçmeýär. Bu barada sur. 7 subut edýär, ol sur.7 signallar üçin sesiň standartynyň dürli bahalarynda matematiki modelirlemäniň bahalary boýunça alnandyr (dikelmäniň 10 sany nokady boýunça saýlama).


Önümleriň golaýlaşdyrylmasy – dürlülük operatorlaryň ikinji uly ulanyş ýeri. Birinji, ikinji we üçünji önümleriň bahasyny differensirlemäniň ýönekeý görnüşleri boýunça geçirmek bolar:

$$(s_n)' = (s_{n+1} - s_{n-1}) / 2\Delta t. \quad h_1 = \{-0.5, 0, 0.5\}. \quad (5)$$

$$(s_n)'' = (s_{n+1} - 2s_n + s_{n-1}) / \Delta t. \quad h_2 = \{1, -2, 1\}.$$

$$(s_n)''' = (-s_{n+2} + 2s_{n+1} - 2s_{n-1} + s_{n-2}) / 2\Delta t. \quad h_3 = \{0.5, -1, 0, 1, -0.5\}.$$

Birinji önümiň operatory ták funksiýadyr we hyýaly spektre eýedir. Eger – de $s(t) = \exp(j\omega t)$ diýip alsak, onda birinji önümiň hakyky bahasy $s'(t) = j\omega \exp(j\omega t)$ seň bolmalydyr. $(\omega) = j\omega$ Geçiriji funksiýa. $n = 0$ nokatda birinji önümiň bahalandyrylmasy $\Delta t = 1$ dürlülük operatory boýunça: $s'(0) = (\exp(j\omega) - \exp(-j\omega)) / 2 = j \sin \omega = H_1(\omega)$. Hasaplanylýan bahanyň hakyky baha bolan gatnaşygy şol bir nokatda: $K_1(\omega) = \sin(\omega) / \omega$. Esasy diapazonyň sag tarapyndaky funksiýalaryň grafigi sur. 8 getirilendir.



Sur. 8 signal diapazonlary.


Getirlen aňlatmalar we grafiklerden görnüşi ýaly $K(\omega)$ bahasy diňe $\omega = 0$ ýygylýkda 1 deňdir. Hemme beýleki ýygylýklarda Naýkwistiň aralygynda aňlatma önümiň pes bahalaryny berýär. Ýöne hakyky maglumatlary işlenip taýýarlanylanda soňky faktor položitel roly oýnap biler, eger – de signal pes ýygylýkly bolsa (esasy diapazonyň 1/3) we ýokary ýygylýkly sesleriň derejesinde ýazylyan bolsa. Islendik differensirleme signalyň spektrinde onuň ýokary ýygylýkly düzüjisini ýokarlandyrýar. Differensirlemäniň dürlülük operatorynda sesleriň dispersiýasynyň güýjenme koeffisientigöni onuň spektri boýunça esasy diapazonda:

$$K_q = (1/\pi) \int_0^\pi (\sin \omega)^2 d\omega = 0.5.$$


Esasy diapazonyň hemme ýeri boýunça takyk differensirleme ýagdaýynda:

$$K_q = (1/\pi) \int_0^\pi \omega^2 d\omega = 3.29$$

Diýmek, dürlülük operatory dola esasy diapazon boýunça doly takyk differensirleme operatoryna görä dürlülük operatory hakykatynda 6 esse pes sesleriň dispersiýasynyň güýjenme koeffisientine. Sur. 9 Naýkwistiň ýygylgynyň 0.1 ýygylkly differensirleme garmonikasynyň mysaly görkezilendir (punktir bilen) we şol bir garmonikanyň goýlan sesler bilen (bitewi inçe çyzyk).



Sur.9 Differensirleme mysaly (giriş signallary – ýokarda, çykyş signalla – aşakda).



Sur 10. 2-nji önümlü ýygylk funksiýalar.

Ikinji önümiň operatory jübüt funksiýalara degişli. Operatoryň hususy funksiýasy: $H2(\omega) = -2(1 - \cos \omega)$. Operasiýanyň hususy bahasy $H(\omega) = -\omega^2$. Hakyky bahanyň hususy baha gatnaşygy:

$$K2(\omega) = [\sin(\omega/2)/(\omega/2)]^2, \quad (6)$$

We şonuň ýaly $\omega = 0$ ýyglykda 1 deň. Naýkwistiň aralygynda galan hemme ýyglyklarda aňlatma önümiň pes bahalaryny berýär, ýöne birinji operatoryň deňşililik bahalaryna görä pesdir. Funksiýanyň ýyglyk grafikleri sur. 10 getirilendir. Ikinji önümiň operatorynyň sesleriň dispersiýasynyň güýjenme koeffisienti 19.5 deň bolan differensirlemäniň öz bahasynda 6 deň. Bu bahalar Naýkwistiň aralygynyň birinji üçden bir böleginde signaly esasy energiýasynyň seslerde ýeterlik derejede arassalanan maglumatlar üçin ikileýin differensirleme operasiýasynyň ulanyp bolýandygyny görkezýär.


Esasynda ikinji önümi birinji önümiň operatorynyň maglumatlaryny yzygider ikileýin differensirleme bilen hem alyp bolýar. Ýöne munuň ýaly ýönekeý operatorlar üçin bu iki operasiýa laýyk däl. Yzygider ikileýin differensirleme operatoryny birinji önümiň operatoryny öz – özi bilen dolamak arkaly alyp bolýar:

$${}^2h_1 = h_1 \otimes h_1 = \{0.25, 0, -0.5, 0, 0.25\},$$

we bary – ýogy 0.375 sesleriň dispersiýasynyň güýjenme koeffisentine eýedir. Operatoryň ýyglyk häsiýetnamasy:

$${}^2H_1(\omega) = -0.5[1 - \cos(2\omega)]. \quad (7)$$

${}^2H_1(\omega)$ we laýyklama koeffisientiniň ${}^2K_1(\omega)$ grafiklerisur. 10 punktir bilen berlendir. Olary ikinji önümiň grafiği bilen laýyklamak arkaly yzygider ikileýin differensirlem spektral düzümi diňe esasy diapazonyň başlangyç böleginiň başinji böleginden uly bolmady ýeri eýeleýän we ikinjiönümiň operatorynyň takyklygyndan pes maglumatlar üçin mümkindir.



Sur. 11. $\Delta t=1$ bolanda $\omega=0.2\pi$ garmonikanyň ikinji önümi
(punktir – ikileýin yzygider differensirleme)

Ikinji önümiň iki operatorynyň ulanyş mysaly sur. 11 getirilen.

Şonuň bilen birlikde esasy diapazonyň Naýkwistiň ýygylgy maglumatlaryň diskretlenmeginiň ($\omega_N = \pi/\Delta t$) Δt aralygyna ters praporsionaldyr, diýmek ýönekeý differensirleme operatorlaryny dogry ulanylşy üçin maglumatlaryň diskretizasiýa aralygy hem spektral düzümlü belli predel ýygylkly signallar üçin optimaldan 3-5 esse pesdir.

MAGLUMATLARY INTEGRIRLEMEK

Signallaryň integrirlenmegi rekursiw san filtrlr bilen amala aşyrylýar. Integrirleýji operatorlaryň synynyň mysallaryna serdip geçeliň.

Belli bolşy ýaly finit signallaryň takyk integrirleme operasiýalary üçin şu aşakdaky özgertme deňşlidir:

$$\int_t s(t) dt \leftrightarrow (1/j\omega) S(\omega). \quad (8)$$


Bu aňlatma sag tarapynda $\omega = 0$ bolanda áýratyn nokada eýedir, we laýyklykda nul ýygylkda agram delta –

impulsa eýedir, ol hem signalyň hemişelik düzüjisine praporsionaldyr. $\omega > 1$ bolanda $(1/j\omega)$ ýygylýk oblastynda integrirleýji operator amplituda spektrinde ýokary ýygylýklary gowşadýar, $0 < \omega < 1$ bolanda bolsa pes ýygylýklary güýçlendirýär. Signalyň faza spektri -90° položitel ýygylýklar üçin we 90° otrisatel ýygylýklar üçin süýşýär.

Tejribede has ýönekeý we giň ýaýran integrirleýji algoritmler trapesiýalaryň, gönüburçluklaryň we Simpsonyň aňlatmalarynyň san analoglary bolup durýar.

Nul başlangyç şertlerinde trapesiýalaryň aňlatmasy boýunça integrirleme algoritmi:

$$y_{k+1} = y_k + (s_{k+1} + s_k)/2. \quad (9)$$



Sur. 12 Filtrleriň ýygylýk häsiýetnamasy

$t_k = k\Delta t$, $\Delta t = 1$ bolanda $s_k = \exp(j\omega t)$ we $y_k = H(\omega) \exp(j\omega t)$, diýip alyp signallary (5) goýýarys we $H(\omega)$ degişlilikde çözüäris. Jogaby:

$$H(\omega) = \cos(\omega/2)/[2j \sin(\omega/2)].$$

Beýleki aňlatmalar boýunça filtriň, şeýle hem integrirleýji filtrleriň ýygylýk häsiýetnamasy sur. 12

getirlendir. Jemleme sikliniň hemme öň ýanyndakysy boýunça ýygnama we filtriň häsiýetnamasynyň AÇH modulynyň bahalarynyň uly diapazony bilen baglylykda has gowy, täsirli we maglumatly hakyka görä hasaplanylýan integrirleme laýyklyk koeffisientiniň ýygnylyk funksiýalary bolup durýar:

$$K(\omega) = H(\omega)\exp(j\omega t)/[(1/j\omega)\exp(j\omega t)].$$

$$K(\omega) = \cos(\omega/2)[(\omega/2)/\sin(\omega/2)]. \quad (10)$$

Hemme integrirleme filtrlriň laýyklyk koeffisientleriniň grafikleri sur. 11 getirlendir.

Gönüurluklar aňlatmasy boýunça integrirleme operatory (interpolýasion ortanokatlylyk):

$$y_{k+1} = y_k + s_{k+1/2}. \quad (11)$$

Signalýň meňzeş goýulmalaryndan we özgermelerinden soň alýarys:


$$K(\omega) = (\omega/2)/\sin(\omega/2).$$

Simpsonyň aňlatmasy boýunça san integrirlemesinde filtriň aňlatmasy şu ggörnüşe eýedir:

$$y_{k+1} = y_{k-1} + (s_{k+1} + 4s_k + s_{k-1})/6. \quad (12)$$

Özbaşdak alnan filtriň ýygnylyk syny:

$$K(\omega) = (2 + \cos \omega)/[3 \sin(\omega)/\omega]. \quad (13)$$




Sur.13 Laýyklyk koeffisientleri.

Sanly integrirlemäniň has aňsat aňlatmalary (trapesiýalar we gönüburçlyklar) esasy ýygylýk diapazonynda özüni dürli hili alyp barýarlar. Gönüburçluklar aňlatmasy ýokary ýygylýklarda netijeleri ýokarlandyrýar, trapesiýalar aňlatmasy bolsa peseldýär. Bu aýratynlyklar aňsat düşündirilýär. Ýekelik garmonika üçin iki sany yzygider hasaplama üçin trapesiýanyň meýdany şol iki sany hasaplamanyň arasyndaky toparlan garmaonikaly meýdanyň dugasyndan hemişe pesdir, olaryň tapawudy bolsa ýygylýk bilen artyp gidýär. Naýkwistiň ýygylýkly garmonikanyň predeline hasaplamalar belgiler yzygider hatayna laýyk gelýär (1, -1, 1, -1, ... ýa – da amplituda we başky faza burçuna baglylykda islendik beýleki bahalar) we nul başlangyç şertlerinde (9) aňlatmada iki sany yzygider aňlatmanyň jemlenmegi 0 berer we netijeleriň ýygnanmagy bolmaýar.

Iki sany hasaplamalaryň arasynda merkezi nokat boýunça beýiklikleri hasaplamak bilen gönüburçluklaryň meýdany boýunça integrirleme hemişe germonikanyň toparlan dugasy bilen çäklendirilen meýdana degişlilikde gönüburçlugyň meýdanynyň ulalmagyna getirýär.

Simpsonyň aňlatmasy trapesiýanyň we gönüburçluklaryň aňlatmalarynda birlik bahany has takyk getirmegi bilen tapawutlanýar, ol bolsa esasy diapazonyň birinji ýarymynda integrirlemäniň has ýokary takyklygyny berýär. Ýöne ýokary ýygylýklarda ýalňyşmalar kert ýokarlanyp başlaýar we diapazonyň ahyrynda tükeniksizlige çykýar (Naýkwistiň ýygylýgynda rekursiw filtriň geçirme funksiýasynyň maýdalawjysynda polýus). Integrirlemäniň bu aýratynlyklary goşulan spektral düzümlü maglumatlar işlenip taýýarlanylanda göz önüne tutmak zerurdyr. Signalyň

integrirlemegiň we onuň spektriniň üýtgame mysallary sur. 14 getirilendir.



Sur. 14. Signallaryň amplituda spektrleri.

REKURSIW DÄL ÝYGYLYK SAN FILTRLERI UMUMY MAGLUMATLAR.

Islendik filtriň esasy aýratynlygy – bu onuň ýygylyk (*frequency response*) we faza häsiýetnamalarydyr. Olar filtriň işlenilýän signalynyň dürli garmonikalarynyň amplitudasyna we fazasyna nähili täsir edýändigini görkezýär. Rekursiw däl san filtrleriň has belli görnüşlerine ýygylyk filtrlere degişlidir, olaryň algoritmi simmetriki NSF üçin signalyň fazasyny üýtgedemelik ýagdaýynda şu görnüşe eýedir:


$$y_k = \sum_{n=-N}^N h_n s_{k-n}. \quad (14)$$


Filtrleriň görnüşleri. Ýygylyk häsiýetnamasynyň görnüşine baglylykda ýygylyk filtrleriň üç sany esasy toparlaryny bölýärler: FNC – pes ýygylyklaryň filtri (*low-pass filters*) – giriş signalynda pes ýygylyklary göýberýär we ýokary ýygylyklary aýyrýar, FWÇ – ýokary ýygylyklar filtrleri (*high-pass filters*) – ýokary ýygylyklary göýberýär we pes ýygylyklary aýyrýar we PF – çyzykly filtrlere, kesgitli ýygylyk aralygynda signaly göýberýär (*band-pass filters*) ýa-da aýyrýar

(*band-reject filters*). Soňkylaryň hatarynda aýratyn topara käwagtlar RF – režektor filtrləri, giriş signalynda kesgitli garmonikany aýyrýan filtrləri, SF – selektor filtrləri we RF gaýtarylma filtrləri degişlidirler.

Eger – de giriş signalynda ýygylýyklaryň kesgitli aralygynda aýyрма barada aýdylýan bolsa, munuň ýaly filtrləri böwutleýji filtrlər diýip atlandyryrlar. Olary hasaplamanyň usulyýetlerine nazary bolsun, tejribe bolsun gyzyklandyrma bildirilmeýär, sebäbi olaryň ýygylýk häsiýetnamasy adatça çyzykly filtriň häsiýetnamasynyň inwersiýasy ($1-H_n(\omega)$) bilen berilýär we özüniň taslamasynda hiç – hili üýtgeşiklere eýe dälidirler.

Filtrləriň çyzygylaýyn ýygylýk häsiýetnamalary sur. 15 getrirlendir. Signaly göýbermegiň we aýyrmagyň ýygylýk aralygynyň aralygynda aralyk diýip atlandyrylýan zona bardyr. Aralyk zonanyň giňligi filtriň häsiýetnamasynyň kertligini kesgitleýär. Bu zonada amplituda häsiýetnamasy monoton peselýär (ýa-da ulalýar), göýberme aralygyndan aýyрма aralygyna çenli (ýa-da tersine).





Sur. 15 esasy ýygylklyk filtrleriň häsiýetnamalary.

San filtrleriň taslama tejribesi esasan pes ýygylklyklyrň filtrleriniň sintezine esaslanandyr. Filtrleriň hemme beýleki görnüşleri pes ýygylklykly filtrlerden laýyk özgertme arkaly alyp bolýar. Mysal üçin ýokary ýygylklyklyrň filtrleri pes ýygylklykly filtrleriň inwersiýasy arkaly alyp bolýar – ilkinji signal we ony pes ýygylklykly NSF bilen filtrlemäniň netijesiniň aralygyndaky tapawudy kesgitlemek arkaly:

$$y(k) = s(k) - \sum_{n=-N}^N h(n) s(k-n). \quad (15)$$

Bu ýerden simmetriki pes ýygylklykly filtriň ýokary ýygylklykly inwersiýasynyň şerti:

$$n \neq 0 \text{ bolanda } h_B(0) = 1 - h_H(0), \quad h_B(n) = -h_H(n).$$

Pe ýygylklykly filtrlerden ýokary ýygylklykly filtrleri almagyň pes ýygylklykly filtriň geçiriji funksiýasynyň rewersi usuly hem ulanylýar, ýagny ω üýtgeýän ululygy $\omega' = \pi - \omega$ üýtgeýän ululyga çalyşmak arkaly ($\Delta t = 1$ bolanda). Simmetriki filtrlr üçin geçiriji funksiýasynda ω argumentiniň diňe kosinus agzalaryny sklap, onuň ýaly operasiýanyň netijesinde şu aňlatmany alarys:

$$\cos n(\pi - \omega) = \cos n \pi \cos n \omega = (-1)^n \cos n \omega. \quad (16)$$

Soňkysy filtriň geçiriji häsiýetnamasynda hemme täk garmonikalarynda, diýmek filtriň hemme täk agzalarynyň belgileriniň çalyşmagyny aňladýar. Hemişelik ululygyň her ikinji düzüjisiniň ters belgä üýtgemegi bu hemişelik bahany “byçga” öwürýär, onuň ýygylgy bolsa esasy diapazonyň Naýkwistiň ýygylgyna deňdir (bu ýygylgyň amplituda bahalary boýunça hasaplamalar), tersine hem şonuň ýaly, Naýkwistiň ýygylgynda signalyň garmonikasynyň hasaplamalary (Δ diskretizasiýasynyň aralygy boýunça belgi çalyşan süýşme güýjine) hemişelik düzüjä öwrülýärler. Çyzykly filtrlr FNC we FWÇ yzygiderli ulanyp göýbermäniň ýygylklaryny bekleme arkaly amala aşyrylyp bilner. Matematiki getirmede bu h_H – pes ýygylkly we h_B – ýokary ýygylkly filtrlriň koeffisientleriň massiwleri bilen maglumatlaryň massiwleriniň yzygiderli dolamasyny aňladýar:

$$v_k = h_H(n) \otimes s(k-n),$$

$$y_k = h_B(n) \otimes v_k = h_H(n) \otimes h_B(n) \otimes s(k-n). \quad (17)$$

Dolama operasiýasynyň kommutatiw bolanlygy sebäpli PÝF we ÝÝF koeffisientleriniň aýratyn massiwleriniň deregine olaryň dolamasy bilen $h_n = h_H(n) \otimes h_B(n)$ çyzykly filtriň koeffisientleri göni kesgitlenip bilner.

Çyzykly režektor filtrlri şeýle – de çyzykly filtrlriň inwersiýasy bilen hem alnyp bilner. Bir ýygylkly režektor filtrlri adaty ýönekeý rekursiw san filtrlriň esasynda ýerine ýetirilýär, olar bu maksatlar üçin örän effektiwdir. Köplenç filtrlere has çylşyrymly talapar edilýär. Meselem, filtr dürli güýjenme koeffisientleri bolan birnäçe sany göýberiş aralyklary bolmalydyr, göýbermeýän aralyklar üçin bolsa aýyrmanyň dürli koeffisientleri berlip bilner. Käwagtlar filtriň talap edilýän

ýygylyk häsiýetnamasy özboluşly egri bilen berilýär.

NSF hasaplama usulyýetleri. Adatça signallaryň filtrlenmeginde filtriň talap edilýän ýygylyk häsiýetnamasy berilýär. Maksady berlen talaplara jigap berýän we iltri gurmak we filtrlenmäni geçirmek. Köplenç berlen filtri takyk gurmak mümkin bolmaýar we berleniň häsiýetlerine golaý filtr ýerine ýetirilýär. Berlen ýygylyk häsiýetnamaly filtrleri gurmagyň köp sanly usullary bar. Olardan has ýönekeýi – agram penjireleriniň kömegi bilen çyzykly fazaly filtrleri gurmakdyr. Bu usul uniwersaldyr we islendik berlen ýygylyk häsiýetnamaly filtri almaga mümkinçilik berýär. Bir zady belläp geçmek gerek, ýygylyk häsiýetnamalarynyň talaplaryna laýyk gelýän matematiki has berk we kämil usullar bilen kiçi uzynlykly filtri käwagtlar almak mümkindir.

Girişe degişlilikde çykyş signalynyň fazasyny üýtgetmezden ikitaraply simmetriki filtrleri hasaplamak has ýönekeý usuly bolup durýar. Has umumy ýagdaynda ol şu aşakdakylary öz içine alýar:

1. Filtriň geçiriji funksiýasynyň ideal amplituda – ýygylyk häsiýetnamasyny bermek. Idel termini bu ýerde geçiş zonasy bolmadyk laýyklykda 0 we 1 koeffisientli göýberme we aýyrma ýygylyklar aralyklar häsiýetnamada görkezilmegidir.
2. Ideal filtriň impuls seslenmesiniň funksiýasynyň hasaby (filtriň ýygylyk häsiýetnamasynyň yzyna dolamasy). Göýberme/aýyrma çäklerinde funksiýalaryň bökmesi bolup geçse impuls seslenme tükeniksiz köp sanly agzalary berýär.
3. Seslenme funksiýasyny agzalaryň kesgitli mukdaryna çenli çäklendirilmegi şol bir wagtyň özünde filtriň

geçiriji häsiýetnamasynda Gibbsiň emele gelmesiniň döremegi – beýgelmelerde merkezleri bolan ýygylyk häsiýetnamalarynyň ossilýasiýasy.

4. Gibbsiň emele gelmesini neýtrallaşdyrmak üçin agram funksiýasy saýlanýar we filtriň seslenme funksiýalarynyň koeffisientlerine köpeldilýän onuň koeffisientleri hasaplanylýar. Bu operasiýanyň netijesi hökmünde filtriň operatorynyň koeffisientleriniň bahalary bolup durýar (filtriň iş impuls seslenmesi). Aslynda 3 we 4 operasiýa kesgitli agram funksiýaly (agram funksiýa köpeltmek) filtriň geçiriji funksiýasynyň dinamiki getirilmeginiň (wagt boýunça) Furýeniň hatarynyň gysgaldylmagyny emele getirýär.
5. Filtriň operatorynyň koeffisientleriniň hakyky bahalaryny ulanmak arkaly onuň ýygylyk häsiýetnamasynyň gurulmagy amala aşyrylýar we onuň goýlan meselä laýyklygy barlanýar.

Simmetriki rekursiw däl filtrlar taslanylanda gerek bolan halatynda ýokary ýygylykly filtrlariň ýa – da aralyk filtrlariň, olary soňra özgertmek bilen pes ýygylykly filtrlariň hasabynda esaslanmak zerur däl. Sap aralyk filtriň hasaby ýeterlik derejede ýönekeýdir, NÇ we WÇ filtrlari bolsa bir ýokarky ýa – da bir aşaky çäk ýygylykly aralyk filtriň ýeketäk ýagdaýydyr.

Setirli faza häsiýetnamaly filtrlar. Kazual (bir taraply) ýygylyk filtrlar üçin hasaplama has çylşyrymlydyr. Olar üçin girişine degişlilikde çykyşynda signalyň ýygylyk düzüjileriniň laýyk gelme garmoniýasynyň üýtgemegini aradan aýyrmak üçin faza – ýygylyk häsiýetnamasynyň çyzyklylygyny üpjün

etmek talap edilýär. Filtr çyzykly faza häsiýetnama eýe bolmagyny üpjün etmek üçin şu şertiň ýerine ýetirilmegini üpjün etmelidir.

Onuň ýerine ýetirilişi filtriň impuls häsiýetnamasy položitel simmetriýa eýe bolan halatynda ýerine ýetirilýär:

$$h(n) = h(N-n-1), \quad n = 0, 1, 2, \dots, (N-1)/2,$$

N – ták (görnüş 1);

$$n = 0, 1, 2, \dots, (N/2)-1,$$

N – jübüt (görnüş 2).

Şol bir wagtda faza häsiýetnamasy filtriň uzynlygy bilen kesgitlener:

$$\alpha = (N-1)/2.$$

Filtriň ýygylyk häsiýetnamasy:

$$H(\omega) = |H(\omega)| \exp(j\varphi(\omega)), \quad (18)$$

bu ýerde $|H(\omega)|$ simmetriki filtrleriň AÇX laýyklygynda berler.

Bir zady bellemek gerek 2 görnüşli ýygylyk häsiýetnamany ýokary ýygylyklaryň filtrleri taslanylanda ulanyp bolmaýar, sebäbi ol Naýkwistiň ýygylygynda hemişe nula deňdir. Hususanda kazual filtrleriň hasaplanyş usulyýeti, ýygylyk häsiýetnamasyny bermek üçin hasaplamanymyzda, simmetriki filtrleriň hasaplama usulyýetinden tapawutlanmaýarlar,

Gibbsiň emele gelmesini aradan aýyrmak üçin agram funksiýalaryny ulanmak zerurlygy bilen bilelikde degişlidir. Bu hasaplamalaryň arassa tejribe usulyny ulanmaga mümkinçilik berýär – ilki N – nokatlarda simmetriki filtri (görnüş 1), soňra bolsa ony $(N-1)/2$ nokatlara saga, diňe položitel bahalaryň $n \geq 0$ oblastyna süýşirmek bilen kazual filtre öwürüp hasaplap we işläp bejermäge mümkinçilik berýär.

IDEAL ÝYGYLYK FILTRLERI.

İdeal aralyk filtrleri diýip kesgitli aşaky ýygylykdan ω_H kesgitli ýokarky ýygylyga çenli aralykda birlik amplituda – ýygylyk häsiýetnamasyna we ol aralykdan daşynda nul geçiriji koeffisente (esasy ýygylyk diapazonynda san filtrleri üçin) eýe bolan filtre aýdylýar.

Filtriň impuls reaksiýasy (operatoriň koeffisenti) berlen geçiriji funksiýanyň $H(\omega)$ Furýeniň yzyna özgertmesi bilen tapylýar. Umumy ýagdaýynda:

$$h(n\Delta t) = (1/2\pi) \int_{-\infty}^{\infty} H(\omega) \exp(j \omega n\Delta t) d\omega \quad (19)$$

Filtriň impuls seslenmesiniň jisim funksiýasyny almak üçin geçiriji funksiýanyň hereket ediji bölegi jübüt bolmalydyr, hyýaly bolsa täk bolmalydyr. San filtrleri esasy ýygylyk diapazonynda berilýär, onuň çäkleri (Naýkwistiň ýygylygy $\pm \omega_N$) filtrlenmä degişli maglumatlaryň diskretizasiýa aralygy bilen kesgitlenilýär ($\omega_N = \pi/\Delta t$) we laýyklykda filtriň operatoriň diskretizasiýa aralygyny kesgitleýärler ($\Delta t = \pi/\omega_N$). Nul faza süýşmeli filtrlere üçin geçiriji funksiýanyň hyýaly bölegi nula deň bolmalydyr, şol bir wagtda filtriň operatory Furýeniň kosinus özgertmesi bilen kesgitlenilýär:

$$h(n\Delta t) = (1/\pi) \int_0^{\omega_N} H(\omega) \cos(n\pi \omega / \omega_N) d\omega \quad n=0, 1, 2, \dots \quad (20)$$

İdeal aralyk filtr üçin $H(\omega)=1$ B ω_H we ω_B , ýygylyk aralygynda we (20) integraly şu aralyklarda hasaplanyp çykarylýar. Pes we ýokary ýygylyklaryň ideal filtrlere, ideal PF hususy ýagdaýlary hökmünde, 0 we ω_B aralykda pes ýygylyklar üçin hem – de ω_H we ω_N aralykda ýokary ýygylyklar üçin

integrirlenýärler.

Δt maglumatlaryň diskretizasiýa aralygynda, 1 hökmünde $-\pi$ we π aralygynda Naýkwistiň ýygylýk bahalary bilen çäklendirilen geçiriji funksiýalaryň esasy ýygylýk diapazonyny kabul edýäris, onda ol geçiriji funksiýalaryň ýygylýk şkalasynyň ölçeginiň üýtgemeginde görünýär.

⚙ Mysal 1. $\Delta t = 0.1$ sek. $f_N = 1/2\Delta t = 5 \text{ Гц}$. $\omega_N = \pi/\Delta t = 10 \pi$.

⚙ Mysal 2. $\Delta x = 10$ metr. $f_N = 0.05 \text{ М}^{-1}$. $\omega_N = 0.1 \pi$.

Galan hemme aňlatmalarda Δt baha, eger – de ol ýörite belenilmedik bolsa, 1 deň diýip alýarys. $H(\omega) = A = 1$ bolanda göýberme aralygynda (ω_H, ω_B) , we $H(\omega) = 0$ onuň çäklerinden daşynda, ideal simmetriki aralyk NSF üçin (2) integrirleme çäkleri bilen, degişlilikde ω_H we ω_B aralykda umumy ýagdaýda alýarys:


$$h(n) = (A/\pi) [\omega_B \text{sinc}(n \omega_B) - \omega_H \text{sinc}(n \omega_H)], \quad (21)$$

$$h_0 = (\omega_B - \omega_H)/\pi, \quad h(n) = (\sin n \omega_B - \sin n \omega_H)/(n\pi).$$

bu ýerde $\text{sinc}(n \omega) = \sin(n \omega)/(n \omega)$ – integral sinusyň funksiýasy (hasaplama funksiýasy), ω koordinata boýunça tükeniksizdir.

Ýygylýk häsiýetnamanyň böwetleýji filtre inwersiýasy bolup geçende:

$$h_0 = (1 - (\omega_H - \omega_B))/\pi, \quad h(n) = (\sin n \omega_H - \sin n \omega_B)/(n\pi).$$




Sur. 16 Giriş signallar.

Sur. 17 Signalyň spektri we filtriň
çäkleri.

Sur 16,17. birtonally balans amplituda modulýasiýaly signalyň mysaly getirlerdir (arassa signal ýokarsynda, berkidilen sesler bilen aşagynda, sesleriň güýji signalyň güýjine deňdir). Eger – de informasiýa modulirleýji signalyň ýygylgynda we amplitudasynda ýerleşen bolsa, onda bir modulirleýji ýygylgylky spektri bolan seslerden signaly bölmegiň aralyk filtri sur. 17 getirilen, ideal ýagdaýynda modulirleýji ýygylgyň (ω_H we ω_B aralykda) mümkin bolan modulýasiýa çäklerinde düz ýygylgyk häsiýetnamasyna eýe bolmalydyr.

Filtriň operatorynyň ululygy takmynan şu pikirler bilen kesgitlenilýär. Operatoryň ölçegi näçe uly bolsa geçiş zolagy şonça kert bolar we onuň ölçegi kiçi bolar, ýagny ideala degişlilikde filtriň hakykatda amala aşyrylan geçiriji funksiýasy has golaý bolar. Adatça ilki bilen uly ölçegli filtri gurup görmek zerurdyr, onuň berlen ýygylgyk häsiýetnamasyna laýyklygyny bahalandyrmak we geljekde peseldip görmegi synanyşmakdyr. Simmetriki NSF üçin N baha tāk san bolmalydyr. Sur. 18 ýokarda getirilen şertleriň esasynda (21) boýunça hasaplanylýan operatoryň koeffisientleriniň sany boýunça $N=100$ çäklendirilen aralyk filtriň operatory getirilen. Suratdan görnüşi ýaly operator örän haýal öçýär we görnüşi ýaly gysgaldylan, ol bolsa filtriň ýygylgyk häsiýetnamasynyň

şekilinde görünmelidir. Galan hemme hasaplamalar şu mysalyň dowamynda geçiriler.



Sur. 18 Filtriň operatory.

IDEAL FILTRLERIŇ AHYRKY GOLAÝLATMALARY

Ideal ýygylık NSF operatory, gelip çykyşy ýaly, özünden tükeniksiz öçýän sanyzygiderligini emele getirýär, ol berlen geçiriji funksiýany amala aşyrýar:

$$H(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n) \cos n \omega. \quad (22)$$


Filtrleriniň operatorlarynyň penjiresiniň çäklendirilmegi.

Tejribede 94) tükeniksiz hatary hemişe onuň soňky golaýlatmasynyň agzalarynyň kesgitli mukdary bilen çäklendirmeli bolýar:

$$H'(\omega) = \sum_{n=-N}^N h(n) \cos n \omega, \quad (23)$$

Şol bir wagtda geçiriji funksiýa Gibbsiň emele gelmesi bilen çylşyrymlaşdyrylýar we signaly göýbermäniň we aýyrmanyň aralyklarynda geçiş zonasy emele gelýär ($N=100$ bolanda punktir çyzygy). Gibbsiň emele gelmesi beýgelmelerden (birinji jynsyň bölünmelerinden) $\pi/(2(N+1))$ aralykda geçiriji funksiýanyň ilkinji zyňlymlaryny emele getirýär. Eger – de

geçiş zolagynyň Δ_p giňligini birinji golaýlatmada ilkinji zyňlymlaryň uzynlygy boýunça $H(\omega)$ funksiýanyň zyňlymzsyndan kabul etsek, onda onuň bahasy takmynan $\pi/(N+1)=\Delta_p$ deň bolar.



Sur.19 Arylyk filtriň geçiriji funksiyalary.

Agram funksiyalarynyň ulanylyşy. Gibbsiň emele gelmesi bilen kesgitlenýän, geçiriji funksiyanyň pulsasiýa derejesi maglumatlaryň filtrlenmesiniň goýlan meselelerini kanagatlandyрмаýan bolsa, tekizleýji agram funksiyalaryny ulanmak maslahat berilýär. Agram funksiyalary ulanylanda geçiş zonalary takmynan iki esse ulalýandygyny göz önüne tutsak, geçiş zolagynyň giňelme bahasy $\Delta_p = 2\pi/N$ deň bolar. Bu ýerden berlen geçiş zolagy boýunça gysgaldylan hataryň minimal mukdaryny kesgitläp bolar:


$$N = 2\pi/\Delta_p. \quad (24)$$

Mysal üçin sur4 N bahasy 200 diýip alnan, şol bir wagtda geçiş zolagynyň kertligi ulaldy ($H'(\omega)$, inçe egri çyzyk, $N=200$), onda agram funksiyasynyň indiki tekizlenmegine zapas döredi.

Agram funksiyalarynyň saýlawyny aýyрма aralygynda signaly güýçlendirmegiň mümkin bolan ossilýasiýa ululygy boýunça amala aşyrmak maksada laýykdyr, ýagny agram funksiyalaryň geçiriji häsiýetnamalarynda birinji zyňlymanyň

değişli amplituda bahasy boýunça amala aşyrylmalydyr. Saýlanyp alnan agram funksiýasy üçin agram koeffisientleriniň hasaby geçirilýär., soňra bolsa filtriň operatorynyň ahyrky bahalary bellenilýär:

$$h_n = p_n h(n). \quad (25)$$



Sur. 20 Aralyk filtrenmesi (ýokarda – giriş signaly, aşakda – çykyş).

Koeffisientleri aňlatmalara goýmak bilen filtriň alnan geçiriji häsiýetnamasyny gurmak maslahat berilýär we göni şonuň üsti bilen goýlan meseleler üçin filtriň ýaramlylygyny bahalandyrmak maslahat berilýär. Bu sur. (18) anyk görünýär, ol ýerde biziň mysalymyz üçin Gaussyň agram funksiýasy ulanylan. $H_p(\omega)$ geçiriji funksiýa $N=100$ bolanda $H'(\omega)$ funksiýasy ýaly tejribede kertlige eýedir we signalyň spektriniň aralygynda tejribede tekiz beýiklige eýedir. Sur. 19 getirilen signalyň filtrininiň işleýşiniň hilini sur. 20 görmek mümkindir.

Alnan geçiriji funksiýany has takyk bahalandyрма zerurlygy ýüze çykanda Furýe özgertmesi ýerine ýetirilmäkä onuň ýygylýk çözügüni 2 – 4 esse ulaltma maslahat berilýär, ony h_n operatorynyň nullary goşmak arkaly ölçegini ulaltmak arkaly ýerine ýetirip bolýar.

Esasy agram funksiýalar. Aşaky tablisalarda has giň ýaýran agram penjireleriniň aňlatmalary we esasy spektral häsiýetnamalary getirilendir. Agram penjireleri göterijiler,

esasynda, çäklendirilmedik bolup durýar we agram penjireleri hökmünde ulanylanda diňe penjiräniň çäklerinde hereket edýär we onuň daşynda nula öwrülýär. Ýazgyny ýönekeýleşdirmek üçin aňlatmalar $(0 \pm \tau)$ nula degişlilikde simmetriki bolan 2τ wagt penjireli syn görnüşinde getirilýär. Diskret görnüşine getirlende 2τ penjiresi $2N+1$ penjiresi bilen çalyşylýar, t bahalar bolsa $t = n\Delta t$ diskretler bilen çalyşylýar. Agram funksiýalarynyň köpüsi ($n = \pm N$) penjiräniň çäklerinde nul ýa – da nul baha golaý diýip kabul edilýär. Soňkysy $2\tau = (2N+3)\Delta t$ bolanda aradan aýyrylýar, şol bir wagtda nula golaý bahalar penjiräniň çäkleriniň daşyna geçirilýär.

Esasy agram funksiýalar.

Wagt penjiresi	Agram funksiýasy	Furýe şekili
Adaty (Π)	$\Pi(t) = 1, t \leq \tau; \quad \Pi(t) = 0, t > \tau$	$\Pi(\omega) = 2\tau \operatorname{sinc}[\omega\tau]$
Barlett (Δ)	$b(t) = 1 - t /\tau$	$B(\omega) = \tau \operatorname{sinc}^2(\omega\tau/2).$
Henning, Gann	$p(t) = 0.5[1 + \cos(\pi t/\tau)]$	$0.5\Pi(\omega) + 0.25\Pi(\omega + \pi/\tau) + 0.25\Pi(\omega - \pi/\tau)$
Hemming	$p(t) = 0.54 + 0.46 \cos(\pi t/\tau)$	$0.54\Pi(\omega) + 0.23\Pi(\omega + \pi/\tau) + 0.23\Pi(\omega - \pi/\tau)$
Karre (2-e окно)	$p(t) = b(t) \operatorname{sinc}(\pi t/\tau)$	$\tau \cdot B(\omega) * \Pi(\omega), \Pi(\omega) = 1$ при $ \omega < \pi/\tau$
Laplas-Gauss	$p(t) = \exp[-\beta^2(t/\tau)^2/2]$	$[(\tau/\beta) \sqrt{2\pi} \exp(-\tau^2\omega^2/(2\beta^2))] \otimes \Pi(\omega)$
Kayzer-Bessel	$p(t) = \frac{J_0[\beta \sqrt{1 - (t/\tau)^2}]}{J_0[\beta]}$	Furýeniň özgertmesi bilen hasaplanylýar
	$J_0[x] = \sum_{k=1}^{\infty} [(x/2)^k/k!]^2$	$J_0[x]$ – Nul hatarly Besseliň modifissirlene funksiýasy

Agram funksiýalaryň spektrleriniň häsiýetnamalary

Ölçegleri	Ölç. birl.	II- penjir e	Bartl ett	Lanso ş	Hennin g	Hem ming	Karr e	Lapla s	Kaýz er
Amplituda									
Esasy beýgelme	τ	2	1	1.18	1	1.08	0.77	0.83	0.82
1-nji zyňylma(-)	%Г.л.п.	0.217	-	0.048	0.027	0.0062	-	0.0016	.00045
2-nji zyňylma(+)	- “ -	0.128	0.047	0.020	0.0084	0.0016	-	0.0014	.00028
Esasy beýgelmäniň giňligi	$\omega\tau/2\tau$	0.60	0.89	0.87	1.00	0.91	1.12	1.12	1.15
Ýerleşiş:									
1-nji nul	$\omega\tau/2\tau$	0.50	1.00	0.82	1.00	1.00	-	1.74	1.52
1-nji zyňylma		0.72	-	1.00	1.19	1.09	-	1.91	1.59
2-nji nul	$\omega\tau/2\tau$	1.00	-	1.29	1.50	1.30	-	2.10	1.74
2-nji zyňylma	$\omega\tau/2\tau$	1.22	1.44	1.50	1.72	1.41	-	2.34	1.88
	$\omega\tau/2\tau$								
	$\omega\tau/2\tau$								

Kaýzeriň agram funksiýasy. Ýygylık NSF hasaplamlarynda has giň ýaýrama Kaýzeriň agram funksiýasy eýe boldy:

$$p(n) = \frac{J_0[\beta\sqrt{1-(n/N)^2}]}{J_0[\beta]} . \quad (26)$$

Bu Kaýzeriň funksiýasynyň ululyklary göni taslanylýan filtrleriň geçiriji funksiýalaryna tehniki talaplar boýunça bellenilip bilner – geçiş zonasynyň mümkin bolan giňligine we filtriň sesiniň koeffisient bahasyna (göýberme aralygynyň geçirme koeffisientleriniň birliklerinde geçiriji funksiýanyň ossilýasiýasynyň maksimal bahalaryna).

Kaýzer tarapyndan Δ berlen baha üçin NSF operatorynyň agzalarynyň mukdaryny geçiş zolagynyň giňligine köpeldilmegi hemişelik ululyk bolup durýandygy kesgitlenildi. Ol D – faktor adyna eýe boldy:

$$D = N \cdot \Delta_p / \pi.$$

Beýleki tarapdan D – faktor bilen Kaýzeriň

funksiýasynyň Δ ululygy şu empiriki gatnaşyklar kesgitlenildi:

$$\begin{aligned} D &= (A-7.95)/14.36 && \text{при } A>21. \\ &= 0.9222 && \text{при } A<21. \\ \beta &= 0.1102(A-8.7) && \text{при } A>50. \\ &= 0 && \text{при } A<21. \\ &= 0.5842(A-21)^{0.4} + 0.07886(A-21), && 21<A<50. \end{aligned}$$

Bu ýerde: $A = -20 \log \Delta$ - desibelde ölçme.

Getirlen aňlatmalar sesiň koeffisientiniň berlen bahasy Δ boýunça Kayzeriň funksiýasynyň β ululygyny kesgitlemäge mümkinçilik berýär, D – faktoryň üsti bilen bolsa filtriň agzalaryny kesgitlemäge mümkinçilik berýär:

$$N = \pi D / \Delta_p.$$

Aralyk filtrleri taslanylanda geçiriji funksiýanyň baralgy NSF operatory boýunça alnan sesiň koeffisientiniň bahasy boýunça ilki meselähökmany bolup durýar. Munuň sebäbi aralyk filtriň göýberme aralygy iki sany beýgelme bilen çäklendirilien, geçiriji häsiýetnamasynda ossilýasiýanyň iki sany merkezi ýüze çykýar, şol bir wagtda ossilýasiýanyň goýulmagy mukdar ossilýasiýa amplitudasyny hem peseldip, hem ulaldyp biler. Eger – de goýulmanyň hasabyna ossilýasiýanyň amplitudasynyň ulalmagyna getirse, onda NSF hasabyny Δ başlangyç hasabynyň bahasyny peseltmek arkaly gaýtalamak gerekdir.

~ ~ ~ **Aralyk filtriň hasabynyň mysaly.**

~ ~ ~ AF hasabyny amala aşyrmak üçin indiki başlangyç
~ ~ ~ ölçeglerde:

$$\begin{aligned} \omega_H &= 0.3\pi, \\ \Delta_B &= 0.6\pi, \end{aligned}$$

-
- $\delta_p = 0.1\pi,$
 $\delta = 0.02.$
1. $A = -20 \log \delta. \quad A = 34.$
 2. $N = \tau (A-7.95)/(14.36 \Delta_p).$
 $N = 18.$
 3. $\beta = 0.5842(A-21)^{0.4} + 0.07886(A-21).$
 $\beta = 2.62.$
 4. $h_0 = (\omega_B - \omega_H)/\pi. \quad h_0 = 0.3$
 5. $h(n) = (\sin n\omega_B - \sin n\omega_H)/(n\pi).$
 $h(n) = 0.04521, -0.24490, -0.09515, \dots,$
 $0.02721.$
 6. $p_n = J_0\{\beta \sqrt{1 - (n/N)^2}\} / J_0\{\beta\}.$ $p_n = 1.00, 0.997, 0.9882,$
 \dots
 7. Filtriň operatory: $h_n = p_n h(n),$
 $n = 0, 1, 2, \dots, N.$
 $h_{-n} = h_n.$
 $h_n = 0.3000,$
 $0.04508, -0.2420, \dots$
 8. Aňlatma boýunça barlamak: $H(\omega) = \sum_{n=-N}^N h_n \cos n\omega, \quad 0 \leq \omega \leq \pi.$
- Geçiriji funksiýanyň şekilini bahalandyrmak üçin $0-\pi$ aralykda spektriň nokatlar mukdaryny $2N$ diýip almak ýeterlikdir, ýagny $\Delta\omega \leq \pi/36$ ädimli diýip almak ýeterlikdir.
-

ÝYLMANAK ÝYGÝLYK FILTRLERI.

Käbir ýagdaýlarda (filtrleri yzygider berkidilende, güýçli päsgelçilikler derejesinde signallar bölünende we ş.m.) filtrleriň geçiriji häsiýetnamalarynda ossilýasiýalar olaryň az galyndy ululygynda hem örän zyýanly bolup durýarlar. Mysal üçin filtrleriň ikileýin yzygider ulanylmagy göýberme aralygyndaky ýalňyşlyklar takmynan iki esse köpeliýär., aýyrylma aralygynda bolsa ikinji derejä köpeldilýär, şol bir wagtda ekwiwalent filtriň uzynlygy tejribede uzalýar.

Filtriň sinteziniň prinsipi. Görnüşi ýaly tekiz geçiriji häsiýetnamaly filtrleri diňe geçiriji funksiýany Furýeniň ahyrky hataryna düzmek mümkinçiligi bolanda mümkindir.

Biz simmetriki geçiriji funksiýaly NSF eýe diýip aýdalyň:

$$H(\omega) = h_0 + 2 \sum_{n=1}^N h_n \cos n\omega. \quad (27)$$

Belli bolşy ýaly $\cos n\omega \cos n$ derejeli $\cos \omega$ boýunça polinoma deňdir, şol bir wagtda (6) aňlatmany şu görnüşde ýazmak mümkindir:

$$H(\omega) = \sum_{n=0}^N g_n (\cos \omega)^n = \sum_{n=0}^N g_n x^n, \quad (28)$$


Bu ýerde $x = \cos \omega$ üýtgeýän ululyk 1 we -1 aralykda üýtgeýär (sebäbi ω 0 we π aralykda üýtgeýär). Üýtgeýän ululygyň üýtgemesi abssisanyň okunyň 180° öwrülmesi bilen çyzykly däl özgertmäni emele getriýär (x üýtgeýän ululyk boýunça PÝF geçiriji funksiýalary ÝÝF meňzeşdir we tersine) dereje polinomyň üsti bilen funksiýany aňlatmak arkaly. Soňkysy dereje polinomlarynyň esasynda tekiz funksiýalarynyň sintezi

çylşyrymlyklar döretmeýänligi bilen gyzyklandyrma döredýär.


Mysal üçin FNC gurnamak üçin başlangyç hökmünde şu görnüşli dereje kabul edilip bilner:

$$g(x) = (1+x)^z (1-x)^r, \quad (29)$$

bu ýerde z we r – ululyklar.



Sur. 21 Tekiz filtrleriň sinteziniň mysallary.



Sur.22 Hatara gelmegiň çyzgysy.

(8) funksiýa z we r hatarly nullara laýyklykda $x = -1$ u $x = 1$ nokatlarda eýedir (sur.21), şol bir wagtda z we r ululyklaryň bahalary funksiýanyň absissanyň okuna degme derejesini häsiýetlendirýärler. Hatar näçe uly bolsa, funksiýa şonça – da absissa okundan haýal aýyrylýar.

Eger – de funksiýanyň (8) aňlatmasyny -1 we x çäklerinde integrirlense we integralyň -1 we 1 aralygyndaky bahalara normirlense, onda pes ýygýlykly filtriň tekiz geçiriji häsiýetnamasy alnar. Sur 19. Z we r iki sany goşa ululyklar üçin geçiriji funksiýalar getirler, olar şu aňlatma boýunça hasaplanylandyr:

$$H(x) = \int_{-1}^x g(x)dx / \int_{-1}^1 g(x)dx. \quad (30)$$

$H(x)$ funksiýasy $(z-r)/(z+r)$ nokadynda beýgelmä eýedir we geçiş zonasynyň kertligi z we r bahalary näçe uly bolsa şonça – da ýokarydyr. $x = \cos \omega$ goýmak bilen ω ýygýlyk üýtgeýän ululyga gelmeklik funksiýanyň monotonlygy saklanmagy üpjün edilýär.

Soňlamada h_n filtriň koeffisientlerini kesgitlemek üçin derejeli şekilinden Furýe hataryna çenli yzyna özgertme talap edilýär. Bu operasiýanyň ýerine ýetirilmegi rekursiw usul bilen ýeterlik derejede aňsat ýerine ýetirilýär, sur. 20 görkezilendir.

Tekiz filtriň hasaplama mysaly.

Tekiz ýygýlyk häsiýetnamasy bolan FNC hasabyny amala aşyrmaly, häsiýetnamanyň beýgelmesi $\pi/3$ nokadynda. Esas hökmünde (8) funksiýany kabul etmeli.

1. $x = \cos(\pi/3) = 0.5 = (z-r)/(z+r)$. Kabul edilen: $z=3, r=1$.

Başlangyç köpagzasy: $g(x) = (1-x)(1+x)^3 = 1+2x-2x^3-x^4$.

2. $H(x) = \int_{-1}^x g(x)dx = C+x+x^2-0.5x^4-0.2x^5$. $x = -1, H(-1) =$

0 bolanda, bu ýerde $C=0.3$. $x=1$, $H(1)=1.6$ bolanda.
 Şonda: $H(x) = (3+10x+10x^2-5x^4-2x^5)/16$. $g_n = \{3/16,$
 $10/16, 10/16, 0, -5/16, -2/16\}$.
 3. Rekursiw özgertmäni ulanyp, alýarys: $h_n = \{(98, 70, 20,$
 $-5, -5, -1)/256\}$.

(9) aňlatmada ýokary ýygýlyklaryň tekiz filtrlelerini
 ulanyp integrirleme çaäkleriniň ýerini çalyşmak ýeterlikdir.
 Tekiz aralyk filtrleri göýberme ýygýlyklaryny böwetlemek
 arkaly PÝF we ÝÝF kombinirlemek arkaly alynýar.

DIFFERIRLEÝJI SAN FILTRLERI.

Geçiriji funksiýa. $d(\exp(j\omega t))/dt = j\omega \exp(j\omega t)$ önüm üçin aňlatmadan görnüşi ýaly, massiwiň önüminiň filtri hasaplanylanda $H(\omega) = j\omega$ görnüşli geçiriji funksiýany Furýeniň hatary bilen approksimirlemek zerurdyr. Munuň ýaly filtriň koeffisientleri tak simmetriýa eýe bolýanlygy sebäpli ($h_{-n} = -h_n$) deňlik ýerine ýetrilýär:

$$h_n [\exp(j\omega n) - \exp(-j\omega n)] = 2j h_n \sin n\omega,$$

onda filtriň geçirijilik häsiýetnamasy şu görnüşe eýe bolar:

$$H(\omega) = 2j(h_1 \sin \omega + h_2 \sin 2\omega + \dots + h_N \sin N\omega),$$

Ýagny, hyýaly tak hasap edilýär, filtriň özi bolsa funksiýalaryň bahalarynyň s_k degişlilikde simmetriki ýerleşen dürlülükleriň çyzykly kombinasiýalary bolup durýar. Filtrlenmäniň deňlemesi:

$$y_n = \sum_{k=1}^N h_n (s_{k+n} - s_{k-n}).$$

Eger – de differensirlemä pes ýygyllykly signal täsir edilmeli bolsa, maglumatlar massiwinde bolsa ýokary ýygyllyklar bolsa, esasy ýygyllyk diapazonynda approximasıýa üçin bolsa şu görnüşli geçiriji funksiýa berilýär (hyýalylyk indeksi bolmazdan):

$$H(\omega) = \omega, \quad \omega \leq \omega_B, \quad H(\omega) = 0, \quad \omega_B < \omega \leq \omega_N.$$

Differirleýji filtriň operatory:

$$h(n) = (2/\pi) \int_0^{\omega_B} H(\omega) \sin(n\pi\omega/\omega_N) d\omega, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (31)$$

Adatça $\omega_N = \pi$ ($\Delta t = 1$) kabul edip we (10) $H(\omega) = \omega$, bolanda kabul edip:


$$h_n = (2/\pi) [\sin(n\omega_B)/n^2 - \omega_B \cos(n\omega_B)/n], \quad (32)$$

$$h_0 = 0, \quad h_{-n} = -h_n.$$

Ýyglyk häsiýetnamasy:


$$\text{Im}(H(\omega)) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h_n \sin n\omega = 2 \sum_{n=1}^{\infty} h_n \sin n\omega. \quad (33)$$

Differensirleme takyklygy. Sur. 23 $\Delta t=1$ ($\omega_B = \pi/2$) bolanda $\{0-0.5\}\pi$ ýyglyklar aralygynda differirleýji filtriň koeffisientleriniň hasabynyň mysaly getirlerdir. Differirleýji filtrleriň operatorlary, adatça örän haýal oçýärler we laýyklykda (12) gerekli derejede takyk ýerine ýetirilmegi örän çylşyrymlydyr.



Sur.23 Operatoryň filtriniň koeffisienti.

(12) hatar N agzalara çenli gysgaldylýar we agram funksiýalaryň kömegi bilen Gibbsiň emele gelmesi aradan aýyrylýar. Differensirleýji filtrlr üçin Gibbsiň emele gelmesi örän agramly baha eýedir we maglumatlar işlenip taýýarlanylanda uly ýalňyşlyklara getirip bilýär, eger – de onuň neýtrallaşmagy ýerine ýetirilmese. Operatoryň çäklendirilme mysaly sur. 23 getirlerdir we gysgaldylan operatorlaryň $H'(\omega)$ laýyk geçiriji funksiýalary sur. 24 görkezilendir.



Sur. 24 Filtrləriň ýygylýk funksiýalary.


Gysgaldylan operatorlar bilen mümkin bolan differensirleme ýalňyşlyklary bahalandyrmak üçin $\omega_B = \pi/2$ bolanda filtriň hasabyny geçireliň. (2) aňlatmalar boýunça kesgitleýäris:

$h_{0-10} = 0, 0.3183, 0.25, -0.0354, -0.125, 0.0127, 0.0833, -0.0065, -0.0625, 0.0039, 0.05$.

$s_n = n$ ýönekeý maglumatlar massiwinde filtriň işini barlap göreläň, onuň önümi hemişe 1 deňdir. Hemişelik önümi bolan massiw üçin filtr massiwiň islendik nokadynda barlanyp bilner, şonuň içinde $n=0$ nokatda, onuň üçin alýarys


$$y = \sum_{n=-N}^N h_n \quad s_{0-n} = 2 \sum_{n=1}^N n h_n,$$

şonda $N=10$ bolanda alýarys: $y=0.5512$ при $N=5$, $y=1.53$.



Sur. 25 Differensirleme ýalňyşlyklary.


Önümiň hakyky bahasyna görä munuň ýaly uly tapawut $\omega=0$ bolanda filtriň real geçiriji funksiýasynyň gyşarma burçunyň tangensi, suratda görnüşü ýaly, $H(\omega) = \omega$ approksimirleýji funksiýanyň gyşarma burçunyň tangensinden gowy tapawutlanýandygy bilen düşündirilýär. Sur. 25 $\sigma = H'_H(\omega)/H_H(\omega)$ differensirlemäniň degişli ýalňyşlyklarynyň ýygylýk grafikleri getirler, onda $N \rightarrow \infty$ bolanda funksiýanyň çäkleri boýunça nul ýygylýkda bahalary hasaplamak bilen otnositel differensirleme ýygylýk grafikleri getirler. Sur. 26 s garmonikanyň ω_0 ýygylýkly, $N=10$ operatorly differensirlemäniň mysaly getirler, ds/dk takyk differensirleme bilen deňşdireniňde.



Sur. 26 Differensirleme operasiýasynyň mysaly.

Agram funksiýalaryny ulanmak. Gibbsiň emele gelmesini neýtrallaşdyrmak üçin Hemmingiň agram

funksiýasyny ulanalyň. $N=10$ bolan filtr üçin netije sur. 10 görkezilen. $s_n = n$ massiwinde hasabyny barlap göreliň we $y=1.041$ netijäni alarys, ýagny, differensirleme ýalňyşlygy esli peselýär.



Sur. 27 Agram funksiýasyny ulanmak bilen differensirleme.

Şonuň ýaly ω_n we ω_w integrirleme çäginin laýyk üýtgemegi bilen aralyk differirleýji filtriň hem hasaby geçirilýär. Şonda alarys:

$$h_n = (\omega_H \cos n\omega_H - \omega_B \cos n\omega_B) / (n\pi) + (\sin n\omega_B - \sin n\omega_H) / (n2\pi). \quad (34)$$

Cyzykly topar saklanmaly filtrlr. Differirleýji filtrlr, diýmek hyýaly ýygylk häsiýetnamaly islendik beýleki filtrlr, mysal üçin Gilbertiň özgertme operatory, sinalyň cyzykly topar saklanmasynyň şerti üpjün edilende kazual wariantda ýerine ýetirilip bilner, ol şu görnüşde ýazylyp bilner.

Ol eger – de filtriň impuls häsiýetnamasy položitel simmetriýa eýe bolsa ýerine ýetirilýändir:

$$h(n) = -h(N-n-1), \quad n = 0, 1, 2, \dots, (N-1)/2, \quad N - \text{täk (görnüş 1);}$$

$$n = 0, 1, 2, \dots, (N/2)-1, \quad N - \text{jübüt (görnüş 2).}$$

Şonda faza häsiýetnamasy filtriň uzynlygy bilen kesgitleniler:

$$\alpha(N-1)/2, \quad \beta = \pi/2.$$

Filtriň ýygylk häsiýetnamasy:


$$H(\omega) = |H(\omega)| \exp(j\varphi(\omega)), \quad (35)$$

Bu ýerde $|H(\omega)|$ moduly täk berilýär.

NSF HASABYNYŇ ALTERNATIW USULLARY.

Ýygylýk häsiýetnamasy boýunça NSF göni hasaplama usuly düşnükli we ulanylyş üçin ýönekeýdir. Usulyň ýetmezçiligi – maýyşgalygyň bolmazlygydyr. Ol göýberme we aýyрма aralyklarynda ýygylýk häsiýetnamalarynyň dürli deňölçegsiz derejeli filtrleri taslamaga mümkinçilik bermeýär, deňölçegsiz derejesi bolsa filtriň agzalarynyň mukdaryna bagly dälir we üýtgedilip bolmaýar. Ýygylýk häsiýetnamasynyň maksimal ossilýasiýalary hemişe aralyk çäkleriniň zolaklarynda syn edilýar we ondan daşlaşanda peselýärler, ýöne golaý çäklerde bolsa ossilýasiýalaryň interferensiýalarynyň emele gelmelerini syn edip bolýar. Taslamada alternatiw usullar has maýyşgak bolup durýarlar: optimizirleýjiler.

Optimizirleýji usullar ýygylýk häsiýetnamasynyň optimal ossilýasiýasy bolan (Çebyşew boýunça) ölçegi boýunça ekonom operatorlary taslamaga mümkinçilik berýär. Olar meňzeş yrgyldylaryň aralyklaryna esaslanandyr.




Sur. 28 Pes ýygylýklaryň optimal filtri.

Pes ýgylyklaryň optimal filtriniň ýgylyk häsiýetnamasy sur. 28 getirlerdir. Göýberme aralygynda filtriň real häsiýetnamasy $1-\delta_p$ we $1+\delta_p$ bahalar aralygynda hemişelikler bilen ossilirlenýär. Hemişelik ossilýasiýany aýrma aralygynda amplitudalar $0-\delta_s$ aralygynda tapylýar. Ideal we hakyky häsiýetnamalaryň arasyndaky tapawut özünden $E(f)$ ýalňyşlyklar funksiýasyny emele getirýär. Optimal usul $h(n)$ filtriň koeffisientlerini kesgitlemäge mümkinçilik berýär, olar üçin maksimal ölçenen ýalňyşlyklaryň bahasy minimizirlenýär:

$$\min[\max(E(f))]$$


Filtr hasaplanylanda esasy moment hökmünde ekstremumlaryň ýgylyklarynyň ýerleşişini kesgitlemek bolup durýar, ol Remeziň iterasion algoritmi bilen ýerine ýetirilýär, ondan soňra ekstremumlaryň ýerleşiş boýunça filtriň ýgylyk häsiýetnamasy berilýär we onuň koeffisientleri kesgitlenilýär.

Ýgylyk saýlama usuly agram funksiýalary ulanmazdan ýgylyk häsiýetnamasy boýunça filtriň hasabynyň warianty bolup durýar we ýgylyk – saýlama filtrlere üçin hem, özboluşly ýgylyk häsiýetnamalý filtrlere üçin hem ulanylyp bilner. Usulyň esasynda filtriň ýgylyk häsiýetnamasyny göýberme we aýrma aralyklarynda mümkin bolan ossilýasiýalaryň ululygy boýunça talap edilýän filtriň häsiýetnamasyna görä geçiş zolagyny soňraky üýtgetmek bilen göni san görnüşinde bermeklik ýatyr. Mysal hökmünde sur. 13 pes ýgylykly filtriň hasabyny getireliň :




Sur. 29 NSF ululyklaryň berilmegi.

Filtriň operatorynyň hasabyny Furýeniň özgertmesiniň öwürmek arkaly geçireliň, operatoryň alnan hasaplamalary boýunça bolsa ýygylýk boýunça ädiminiň 4 – 6 esse peselen bu operatoryň hakyky ýygylýk häsiýetnamasyny hasaplaýarys, ol bolsa ossilýasiýany ýüze çykarmaga we filtriň ýalňyşlygyny kesgitlemäge mümkinçilik berýär.



Sur. 30 NSF geçiş zolagynyň hasabyny saýlamak.

Sur. 30 geçiş zolagynyň töwereginde filtriň häsiýetnamasynyň saýlama netijesi görkezilendir (2 nokat), ol bolsa ýygylýk häsiýetnamanyň ossilýasiýasyny 30 esse peletmäge mümkinçilik berýär.



$$c1 = 1.001 \quad \delta1 = 62.308 \quad c2 = 7.402 \times 10^{-4} \quad \delta2 = 62.613$$

Sur.31 Çağında saýlama nokatly NSF.

Bir zady bellemek zerurdyr, filtriň häsiýetnamasynyň ossilýasiýasynyň üýtgemegi göýberme zolagy üçin (çäkten çep tarapda nokat bilen) we aýyrma zolagynda (sag nokat bilen) indiividual geçirilýär, ýokary takyklyk gerekligi we gereksizligine baglylykda. Bu göýberme we aýyrma aralyklarynda merkezi nokadyň ýerleşmegi bilen üç saýlama nokady ulanylanda has effektiwdir, sur. 31 görkezilendir.

Bu usulyň ulanylmagynda kombinirlenen çemeleşme hem ulanylyp bilner: ýygyllyk häsiýetnamasynda nokatlaryň artykmaç mukdarynyň berilmegi, geçiş zolagynda üç we ondan köp nokatlarynda filtriň ululyklarynyň kadalaşdyrylmagy, ondan soňra agram funksiýalary ulanmak arkaly filtriň operatorynyň gysgaldylmagy.

SIGNALLARYŇ Z – TRANSFORMASIÝASY.

Z – özgertmäniň kesgitlenişi. Z – özgertme Furýeniň diskret özgertmesiniň umumylaşdyrylyşy bolup durýar. Ol diskret ulgamlarynyň synynda we hususanda rekursiw san filtrlari taslanylanda has effektiv ulanylýar.

Ilkinji gezek z – özgertme P. Laplas tarapyndan 1779 – nji ýylda ulanylşyga girizildi we 1947 – nji ýylda W. Gurwiç tarapyndan simwolikasynyň z^{-k} çalyşylmagy bilen gaýtadan “açyldy”. Häzirki wagtda tehniki edebiýatda simwolikanyň iki görnüşi hem ulanylýar. Özgertmäni tejribede ulanmaklyga ol täsir etmeýär, sebäbi belginiň üýtgemegi polinomyň agzalaryny diňe zerkal üýtgedýärler (z^0 degişlilikde), san giňişligi umumy ýoagdaýynda $-\infty$ we $+\infty$ aralygynda bolanda. Geljekde esasy hökmünde z derejeleriň položitel simwolikasyny ulanarys, otrisatel simwolikalar bar bolan ýagdaýynda düşündirişler berler.

$s(t)$ üznüksiz özboluşly funksiýanyň, deň diskretizirlenen we $s_k = s(k\Delta t)$ hasaplar bilen görkezilen, şeýle hem göni diskret funksiýanyň, z boýunça dereje polinomyny birmanyly laýyklyga goýup bolar, s_k bahalary yzygider koeffisientleri bolup durýar:

$$s_k = s(k\Delta t) \leftrightarrow TZ[s(k\Delta t)] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s_k z^k = S(z). \quad (36)$$

bu ýerde $z = \sigma + j\omega = r \cdot \exp(-j\varphi)$ – özboluşly toplumlaýyn üýtgeýän ululyk. Görkezme şekilinde $z = r \cdot \exp(-j\varphi)$, где $r = |z| = \sqrt{\sigma^2 + \omega^2}$, $\varphi = \arg(z) = \arctg(\omega/\sigma)$.

Mysal 1: $s_k = \{1, 2, 0, -1, -2, -1, 0, 0\}$.

$$S(z) = 1z^0 + 2z^1 + 0z^2 - 1z^3 - 2z^4 - 1z^5 + 0z^6 + 0z^7 = 1 + 2z - z^3 - 2z^4 - z^5.$$

Kazual ulgamlarynda ulgamlaryň impuls seslenmeleriniň bahalary $k \geq 0$ bolanda bolýarlar we birtaraply wariantda hereket edýärler:

$$H(z) = \sum_{k=0}^{\infty} h_k z^k.$$

Umumy ýagdaýynda z – özgertme – bu agzalarynyň tükeniksiz mukdary bolan dereje hatarydyr, şonuň üçin ol z bahanyň hemme giňişligi üçin birleşip bilmeýärler. Z – özgertmäniň birleşýän we $S(z)$ bahalaryň ahyrky z oblastyna birleşme oblasty diýilýär.

¶¶ **Mysal 2:** Ahyrky uzynlykly yzygiderlilik (signal), sebäpsiz: $s_k = \{1, 2, 3, 2, 1\}$, $k = 0, 1, 2, 3, 4$.

$$S(z) = 1z^0 + 2z^{-1} + 3z^{-2} + 2z^{-3} + 1z^{-4} = 1 + 2/z + 3/z^2 + 2/z^3 + 1/z^4.$$

¶¶ Görnüşi ýaly, $z = 0$ bolanda $S(z) = \infty$. Birleşme oblasty – z hemme bahalary, $z = 0$ hasaba almazdan.

¶¶ **Mysal 3:** Ahyrky uzynlykly yzygiderlilik, sebäpli (kazual ulgamyň impuls seslenmesi ýaly): $s_k = \{1, 2, 3, 2, 1\}$, $k = 0, 1, 2, 3, 4$.

$$S(z) = 1z^0 + 2z^{-1} + 3z^{-2} + 2z^{-3} + 1z^{-4} = 1 + 2z + 3z^2 + 2z^3 + z^4.$$

$z = \infty$ bolanda $S(z) = \infty$. Birleşme oblasty – z hemme bahalary, $z = \infty$ aradan aýyranyňda.

¶¶ **Mysal 4:** Ahyrky uzynlykly yzygiderlilik, iki tarapaly (simmetriki filtriň impuls seslenmesi ýaly): $s_k = \{1, 2, 3, 2, 1\}$, $k = -2, -1, 0, 1, 2$.

$$S(z) = 1z^{-2} + 2z^{-1} + 3z^0 + 2z^1 + 1z^2 = 1/z^2 + 2/z + 3 + 2z + z^2.$$

¶¶ $S(z) = \infty$ при $z = 0$ и $z = \infty$. Область сходимости не включает точки $z = 0$ и $z = \infty$.

¶¶ **Mysal 5:** Tükeniksiz uzynlykly yzygiderlilik, sebäpli (rekursiw integrirleýji filtriň impuls seslenmesi ýaly): $k < 0$

bolanda $s_k = 0$, $k \geq 0$ bolanda $s = 1$.

$$S(z) = z^{-0} + z^1 + z^2 + z^3 + \dots = 1 + z + z^2 + z^3 + \dots = 1/(1-z)$$

Diňe $|z| < 1$ bolanda birleşme şertlerini kanagatlandyryp biler.

$S(z) = \infty$ bolanda z bahalar, polýus diýip atlandyrylýar, $S(z) = 0$ bolanlar üçin $S(z)$ funksiýanyň nullary diýip atlandyrylýar. Mysallardan görnüşi ýaly ahyrky uzynlykly yzygiderlikler üçin z – özgertme ($k \geq 0$) sag tarapky bölüme eýe bolan $z = \infty$ nokat üçin we ($k < 0$) çep tarapky nokatlara eýe bolan $z = 0$ nokatlar islendik kombinasiýalarda hemme ýerde birleşýärler. Tükeniksiz sebäpli yzygiderlikler üçin özgertmeler koordinatlaryň başlangyjynda merkezi bolan birlik radiusly togalagyň içinde birleşýärler.

Islendik ulgamyň syny netijesinde berlen ýa – da alnan z – polinom boýunça üýtgeşsiz şol polinoma laýyk gelýän funksiýa döredilýär, z^k bolanda k – hasaply funksiýaly derejeleriň koeffisientlerini identifisirlemek arkaly.

Mysal. $S(z) = 1 + 3z^2 + 8z^3 - 4z^6 - 2z^7 =$

$$1z^0 + 0z^1 + 3z^2 + 8z^3 + 0z^4 + 0z^5 - 0z^6 - 2z^7.$$

$$s_k = \{1, 0, 3, 8, 0, 0, -4, -2\}.$$

Z – polinomda z ululygyň manysy onuň funksiýalaryň koordinatalary boýunça birlik saklanmanyň operatory bolup durýanlygyndadyr. $s(k)$ signalynyň z – şekiliniň z^n ululyga köpeldilmegi signalyň n aralyga (wagt oky boýunça saga süýşmegini) aňladýar: $z^n S(z) \leftrightarrow s(k-n)$. Bu barada ynamly bolmak üçin ýokarda getirilen mysalda $S(z)$ köpagzany mysal üçin z^2 köpeltmek, yzyna özgertmäni ýerine ýetirmek we $s_k = \{0, 0, 1, 0, 3, 8, 0, 0, -4, -2\}$ signaly almak ýeterlidir.

Položitel z derejeli z – şekiller kazual (fiziki amala

aşyrylýan) prosesser we ulgamlar laýyk gelýär, olar signallaryň häzirki we “geçen” wagt bahalary bilen wagtyň real ölçeglerinde hereket edýär. Maglumat EHM – da işlenip taýýarlanylanda signallaryň kazuallygy çäklendirilmeleriniň hataryna girmeyär we “öňe” signallaryň hasaplaryna laýyk gelýän z otrisatel derejelerini ulanmak mümkin bolýar. Soňkysy mysal üçin filtriň simmetriki operatorynyň sintezinde ulanylýar, ol maglumatyň işlenip taýýarlanylmagyny signala faza ýoýulmalaryny girizmezden amala aşyrmagy mümkinçilik berýär. z^{-1} simwolikasy ulanylanda “geçen” belgilere z otrisatel derejeli bahalary laýyk gelýär, “geljek” belgilere – položitel bahalar laýyk gelýär. Z – özgertmäniň esasy aýratynlygy derejeli polinomly matematiki operasiýalaryň ýönekeýliginde durýar, bu bolsa sanly filtrleriň we spektral synynda uly baha eýedir.

Furýe we Laplasyň özgertmeleriniň arsyndaky arabaglansyk. s_k diskret signalyny Kronekeriň agram impulslarynyň jemi görnüşinde ýazalyň:

$$s_k = s(k\Delta t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} s(n\Delta t) \delta(k\Delta t - n\Delta t). \quad (37)$$

Signalynyň spektrini giçlenme teoremasyny boýunça ýazalyň:

$$S(\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s(k\Delta t) \exp(-j\omega k\Delta t). \quad (38)$$

Üýtgeýän ululyklary çalyşalyň, $z = \exp(-j\omega\Delta t)$, we alýarys:

$$S(\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s(k\Delta t) \cdot z^k = S(z). \quad (39)$$

Bu ýerden Furýeniň diskret özgertmesi $z = \exp(-j\omega\Delta t)$

bolanda z – özgertmäniň hususy ýagdaýy bolup durýandygy görünýär.

Muňa meňzeş goýma bilen $z = \exp(-p)$ Laplasyň diskret özgertmesine geçme amala aşyrylýar. Umumy görnüşinde:

$$S(\omega) = S(z), \quad z = \exp(-j\omega\Delta t);$$

$$S(p) = S(z), \quad z = \exp(-p\Delta t). \quad (40)$$

Yzyna özgertmede:


$$S(z) = S(\omega), \quad \omega = \ln z / j\omega t;$$

$$S(z) = S(p), \quad p = \ln z / \Delta t. \quad (41)$$

Z otirisatel simwolikasýnda getirmeleriň arasyndaky arabaglanşyk laýyklykda $z^{-1} = \exp(j\omega\Delta t)$ we $z^{-1} = \exp(p)$ goýulmalar bilen amala aşyrylýar. $z^k = \exp(-j\omega k\Delta t)$ bolanda z – özgertme diskret signallaryň getirmesiniň aýratyn görnüşini emele getirýär, onda $S(z)$ polinomyna wagtlaýyn funksiýa hökmünde seretmek bolar ($k\Delta t$ koeffisientleriň bahalary boýunça), şeýle hem signalyň ýygylýk spektriniň funksiýasyna (ω argumentiň bahalary boýunça).

Z – özgertmäni ýazmak koordinatlaryň oky boýunça $\text{Re } z$ we $\text{Im } z$ toplumlaýyn z tekizliginde ýerine ýetirilýär (sur. 32). Hususanda ω ýygylýklaryň spektral okunda z – tekizliginde radiusyň aýlawy laýyk gelýär:

$$|z| = |\exp(-j\omega\Delta t)| = \sqrt{\cos^2(\omega\Delta t) + \sin^2(\omega\Delta t)} = 1.$$



Sur. 32 Toplumlaýyn z – tekizlik.

$z = \exp(-j\omega\Delta t)$ islendik ω ýygylgy goýmak togalakda nokat bilen belgilenýär. $\omega = 0$ ýygylgyga abssissa okunyň sag tarapyndaky $\text{Re } z = 1$ we $\text{Im } z = 0$ nokat gabat gelýär. Ýygylk ýokarlananda nokat togalak boýunça sagat strelkasynyň tersine süýşýär we Naýkwistiň ýygylgynda gyraky çep orny eýeleýär $\omega_N = \pi/\Delta t$ ($\text{Re } z = -1$, $\text{Im } z = 0$). Spektriň otrisatel ýygylyklary aşaky ýarym aýlawda şonuň şekillendirilýär. $\pm \omega_N$ nokatlary gabat gelýär, bahanyň ýygylgynyň soňraky beýgelmeginde ýa – da peselmeginde diskret funksiýasynyň spektriniň periodikasyna laýyklykda gaýtalanyp başlaýarlar. Töwerek

boýunça doly hereket spektriň bir periodyna laýyk gelýär, signalyň spektriniň islendik garmonikasy bolsa tekizlikde absissa okuna degişlilikde simmetriki bolan iki sany nokat bilen berilýär. Bu ýerden ýene – de z – tekizliginde durnukly kazual ulgamlaryň galtaşma oblasty birlik radiusyň töweregini emele getirýär. Üznüksiz wagtyň signallary we ulgamlary köplenç Laplasyň özgertmesi bilen ýazylýar. Eger – de $z = \exp(-s\Delta t)$, bu ýerde $s = \sigma + j\omega$, onda:

$$z = \exp(-(\sigma + j\omega)\Delta t) = \exp(-\sigma\Delta t) \exp(-j\omega\Delta t). \quad (42)$$

Diýmek, $|z| = \exp(-\sigma\Delta t)$, $\arg(z) = \omega\Delta t = 2\pi f\Delta t = 2\pi f/f_\Delta$, bu ýerde f_Δ - diskretizasiýa ýygylgy, şol bir wagtda ω oky z – tekizliginde birlik töwerek bilenşekillendirilýär, s tekizligiň sag tarapy töweregiň içinde şekillendirilýär, çep tarapy bolsa töweregiň daşyndan şekillendirilýär. z^{-1} simwolikasy ulanylanda s – tekizligiň z – tekizliginde taraplarynyň şekillendirilmesi ýerlerini çalyşýarlar.

Z – POLINOMLARYŇ GIŇIŞLIGI.

Galtaşma oblasty. $S(z)$ polinomy $s(k\Delta t)$ funksiýanyň z – şekili ýa – da z – şekillendirilmesi diýip atlandyrylýar. Özgertme z bahalaryň $S(z)$ hatarynyň gabat gelýän oblastynda gymmata eýedir, hataryň jemi ýagny polýuslara we aýratyn nokatlara eýe bolmadyk z üýtgeýän ululygyň analitiki funksiýasyny emele getirýär:

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |s_k| |z|^k < \infty \quad (43)$$

Umumy ýagdaýda $S(z)$ polinomlaryň galtaşýan z köplügi z – tekizliginde kesgitli oblastlary emele getirýärler,

olar sur. 28 görkezilendir.



sur. 33. z – tekizlikleri.

Ýokarda getirilen z – özgertme bilen Furýeniň özgertmesiniň arabaglanşygyndan görnüşi ýaly $s(t)$ funksiýasy $S(\omega)$ spektral emele getirilişe eýe bolsa, onda $|z| = |\exp(-j\omega)| = 1$ birlik töweregi $S(z)$ polinomyň galtaşma oblastyna hökman girmelidir we tersine eger – de $S(z)$ polinomyň galtaşma oblasty birlik töweregi alyan bolsa $s(t)$ funksiýasynyň Furýe diskret özgertmesi - $S(z)$ polinomyň şekildeşi, hökman bolmalydyr, tersine bolsa ýok. Bu şundan gelip çykýar, z – özgertme diskret funksiýalaryň özgertmesiniň has umumy ýagdaýy bolup, Furýe özgertmesi bolmadyk funksiýalar üçin hem bolup biler. Onuň mysaly hökmünde birlik bökmäniň funksiýasy hyzmat edip biler:

$$u_n = 1, n \geq 0; \quad u_n = 0, n < 0.$$

Furýe özgertmesi üçin $u(n)$ funksiýalary ýerine ýetirilmeýär, absolýutlar jemlenýär (funksiýanyň energiýasy tükeniksizdir). Ýöne z – özgertme üçin şuny alýarys:

$$|z| < 1 \text{ boalnda } \sum_{k=-\infty}^{\infty} |u_k||z|^k = \sum_{k=0}^{\infty} |z|^k < \infty. \quad (44)$$

Diskret mysallaryň tejribesinde köp duş gelýän z – özgertmäniň mysallary.

Kronekeriň impulsy. Umumy ýagdaýda san okunyň islendik nokadynda Kronekeriň impulsy üçin:

$k=n$ bolanda $\delta(k-n)$, $k \neq n$ bolanda $\delta(k-n) = 0$

$$X_{\delta}(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(k-n) z^k = z^n. \quad (45)$$

Kronekeriň impulsy üçin nul nokatda laýyklykda $X_{\delta}(z) = z^0 = 1$. $X_{\delta}(z)$ hatary z – tekizligiň hemme ýerinde galtaşýar.

Hewisaýdyň funksiýasy (birlik beýgelme, tükeniksiz uzynlygyň sebäpli yzygiderliligi, mysal üçin, rekursiw integrirleýji filtriň impuls seslenmesi).

$x(k) = 0$ $k < 0$ bolanda, $x(k) = 1$ $k \geq 0$ bolanda.

$$X(z) = \sum_{k=0}^{\infty} z^k = z^k.$$

$|z| < 1$ bolanda hatar galtaşýar, şol bir wagtda onuň jemi:

$$X(z) = 1/(1-z) \text{ deň.}$$

Z – özgertme koordinatlaryň başynda merkezi bolan birlik radiusyň töwereginiň içiniň hemme ýerinde degişlidir.

z^{-1} simwolikasy ulanylanda:

$$X(z) = 1/(1-z^{-1}) = z/(z-1), \quad |z| > 1. \quad (46)$$

Analitik oblastynyň çäginde $X(z)$ funksiýasy $z=1$ bolanda bir ýönekeý polýusa eýedir.

Ekspontensial funksiýa:

$k < 0$ bolanda $x(k)=0$, $k \geq 0$ bolanda $x(k) = a^k$.

$$X(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) z^k = \sum_{k=0}^{\infty} a^k z^k = \sum_{k=0}^{\infty} (az)^k. \quad (47)$$

Geçen ýagdaýdakyda bolşy ýaly $|az| < 1$ bolanda hatar galtaşýar, şol bir wagtda:

$$X(z) = 1/(1-az), \quad |z| < 1/a.$$

z^{-1} simwolikasy ulanylanda:

$$X(z) = z/(z-a), \quad |z| > a.$$

Toplum eksponentasy:

$$x(k) = \exp(j\omega k), \quad k \geq 0; \quad x(k) = 0, \quad k < 0.$$

$$X(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \exp(j\omega k) z^k = \sum_{k=0}^{\infty} (z \exp(j\omega))^k = 1/(1 - z \exp(j\omega)), \quad |z| < 1. \quad (48)$$

z – şekilleriň analitik görnüşi derejeli hataryň analitik aňlatma dolamasy mümkin bolanda, z – özgertmeler üçin bolýar. Ýokarda z – özgertmeleriň mysallarynda Hewisaýdyň we eksponensial funksiýalaryň z – şekilleriniň analitik görnüşlerine getirilişi görkezildi. Aşaky tablisada göni we yzyyna özgertmede ulanyp boljak bir hatar giň ýaýran funksiýalaryň z – transformasiýasy getirilýär.

Tablisa 2.1

$s(k), k \geq 0$ funksiýasy	z - şekil $S(z)$	z^{-1} – şekil $S(z)$
β	$\beta/(1-z), \quad z < 1$	$\beta z / (z-1), \quad z > 1$
βk	$\beta z / (1-z)^2, \quad z < 1$	$\beta z / (z-1)^2, \quad z > 1$
βk^2	$\beta z (1+z) / (1-z)^3, \quad z < 1$	$\beta z (z+1) / (z-1)^3, \quad z > 1$
$\beta \alpha^k$	$\beta / (1 - z\alpha), \quad z < 1/\alpha$	$\beta z / (z - \alpha), \quad z > \alpha$
$\beta k \alpha^k$	$\beta \alpha z / (1 - z\alpha)^2, \quad z < 1/\alpha$	$\beta \alpha z / (z - \alpha)^2, \quad z > \alpha$
$\cos \alpha k$	$(1-z \cos \alpha) / (1-2z \cos \alpha + z^2), \quad z < 1$	$z (z - \cos \alpha) / (z^2 - 2z \cos \alpha + 1), \quad z > 1$
$\sin \alpha k$	$z \sin \alpha / (1-2z \cos \alpha + z^2), \quad z < 1$	$z \sin \alpha / (z^2 - 2z \cos \alpha + 1), \quad z > 1$
$\beta \exp(-\alpha k)$	$\beta / (1 - z \exp(-\alpha)), \quad z < 1/\exp(-\alpha)$	$\beta z / (z - \exp(-\alpha)), \quad z > \exp(-\alpha)$
$\beta k \exp(-\alpha k)$	$\beta z \exp(-\alpha) / (1 - z \exp(-\alpha))^2, \quad z < 1/\exp(-\alpha)$	$\beta z \exp(-\alpha) / (z - \exp(-\alpha))^2, \quad z > \exp(-\alpha)$

Tablisada z simwolikasy üçin hem, z^{-1} simwolikasy

üçin hem özgertmeler getirlerdir, olar käwagtlar käbir matematiki operasiýalar üçin peýdaly bolýar. Bir simwolikadan beýleki simwolika geçmek örän ýönekeýdir we z bir simwolikasynda $1/z$ beýleki simwolikasyna çalyşmak arkaly ýerine ýetirilýär.

Z – ÖZGERTMÄNIŇ ÖZBOLUŞLYKLARY.

Z – özgertmäniň esasy özboluşlygy onuň ýeketäklik özboluşlygydyr. $s(k)$ yzygiderliligiň islendigi onuň galtaşma oblastynda z – şekil bilen anyk kesgitlenilýär we tersine z – şekil boýunça anyk dikeldilýär.

Nazaryýete çuňlaşmazdan DPF – ň hemme özboluşlyklary z – özgertme üçin hem degişlidir diýip aýtmak bolar. Olaryň käbirlerini belläp geçeliň.

Czyklylyk: Eger – de $s(k) = a \cdot x(k) + b \cdot y(k)$, onda $S(z) = aX(z) + bY(z)$. Degişlilikde z – özgertme superpozisiýanyň prinsipini kanagatlandyranulgamlaryň we signallaryň syny üçin mümkindir.

Saklanma n taktada: $y(k) = x(k-n)$.

$$Y(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} y(k) z^k = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k-n) z^k = z^n \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k-n) z^{k-n} =$$

$$z^n \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m) z^m = z^n X(z) \quad (49)$$

Laýyklykda, signalyň z – şekilini z^n köpeldijä köpeltmek signalyň diskretizasiýanyň n taktyna süýşmegine getirýär.

Dolamany özgertmek. Filtrlriň birtaraplaýyn operatory bilen rekursiw däl san filtrlmesi ýerine ýetirilende:

$$s(k) = \sum_{n=0}^{\infty} h(n) y(k-n), \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Dolamanyň deňlemesiniň z – özgertmesi:

$$\begin{aligned} S(z) &= \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} h(n) y(k-n) z^k = \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} h(n) z^n y(k-n) z^{k-n} = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} h(n) z^n \sum_{k=0}^{\infty} y(k-n) z^{k-n} = H(z) Y(z). \end{aligned} \quad (50)$$

Şeýlelik bilen, diskret funksiýalaryň dolamasy ol funksiýalaryň z – şekilleriniň köpeldilmegi bilen görkezilýär. Şoňa menzeşlikde z – özgertme üçin z – şekilleriniň özboluşlyklarynyň hemme belli teoremlary subut edilip bilner, ol bolsa adatydyr. Sebäbi $z = \exp(-j\omega)$ bolanda bu özboluşlyklar funksiýanyň spektrleriniň özboluşlyklaryna doly gabat gelýändir.

Signallary yzygiderlilik dolamanyň bloklaryna ýaratmak. Z – özgertme signallaryň we funksiýalaryň bölmekligini üpjün etmäge mümkinçilik berýär, mysal üçin filtrlriň funksiýalarynyň geçirijilerini dolamanyň gysgajyk düzüjilerine bölmek, onuň üçin z – polinomy nula deňlemek ýeterlikdir, onuň a_i köklerini tapmak we polinomy ikiagalyny köpeltmek görnüşinde ýazmak:

$$S(z) = a_0(z-a_1)(z-a_2)\dots,$$

Bu ýerde a_0 - signalyň soňky hasabaty.

Z – oblastyndaky derejä koordinatlar oblastyndaky dolama gabat gelýär, we yzyna özgerdilende $(z-a_i)$ ikiagzalary ikinokatly $\{-a_i, 1\}$ dipollara öwürülýärler, N uzynlykluy signal bolsa dipollaryň $(N-1)$ dolamasy bilen getirilýär:

$$s_k = a_0 \{-a_1, 1\} * \{-a_2, 1\} * \{-a_3, 1\} * \dots$$

Mysal: $s_k = \{1.4464, -2.32, 3.37, -3, 1\}$.

$$S(z) = z^4 - 3z^3 + 3.37z^2 - 2.32z + 1.4464. \quad a_0 = 1.$$

Polinomlaryň kökleri $S(z)$: $a_1 = 0.8 + 0.8j$,

$$a_2 = 0.8 - 0.8j,$$

$$a_3 = 0.7 + 0.8j,$$

$$a_4 = 0.7 - 0.8j,$$

$$S(z) = (z - 0.8 - 0.8j)(z - 0.8 + 0.8j)(z - 0.7 - 0.8j)(z - 0.7 + 0.8j).$$

Polinomlaryň kökleri z – tekizliginde getirilendir.

Polinomlaryň kökleri toplumlaýyndyr we koordinata

tekizliginde dört sany ikiagzalar hem toplumlaýyn bolarlar.

Ýöne olar bileleşendir we jisim funksiýasyny almak üçin

bileleşen ikiagzalary köpeltmelidir we bikwadrat bloklary

almalydyr:

$$S(z) = (z^2 - 1.4z + 1.13)(z^2 - 1.6z + 1.28).$$

Koordinat oblastyna geçilende: $s_k = \{1.13, -1.4, 1\} * \{1.28, -1.6, 1\}.$

Şeýlelik bilen, başdaky signal iki sany üç agzaly

signallaryň dolamasynabölünendir.

Differensirleme. Eger-de $s(k) \leftrightarrow S(z)$ bar bolsa, onda $ks(k)$ funksiýanyň z – şekilini $S(z)$ differensirläp tapyp bolýar, ol bolsaýokary hatarly polýuslary bolan $S(z)$ funksiýanyň yzyna z – özgertmesini hasaplap çykarmak üçin peýdaly bolýar:

$$ks(k) \leftrightarrow z \frac{dX(z)}{dz}.$$

YZYNA Z – ÖZGERTME.

Özgertme usullary. Yzyna z – özgertme z – şekili boýunça diskret funksiýany dikeltmäge mümkinçilik berýär. Ol mysal üçin rekursiw san filtrleriň impuls häsiýetnamalary kesgitlenende giňden ulanylýar. Simwoliki şekilde:

$$x(k) = TZ^{-1}[X(z)].$$

Tejribede $X(z)$ hasaplama prosessinde adatyça z – den iki sany köpagzanyň gatnaşygy bilen aňladylýar:

$$X(z) = (b_0 + b_1 z + b_2 z^2 + \dots + b_N z^N) / (a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \dots + a_M z^M) = x(0) + x(1)z + x(2)z^2 + \dots \quad (51)$$

Bu görnüşden yzyna özgertmäniň has giň ýaýran usullary $X(z)$:

- Çägi boýunça integrirlemek bilen özgertme (aýyrma usuly).
- Elementar droblara bölme usuly.
- Dereje hataryna bölme usuly.

Dereje hataryna bölme usuly has ýönekeý we kompýuterlerde ýerine ýetirmek üçin ýaraýar, ýöne ol analitiki görnüşde netije bermeyär. Yzyna özgertmäniň köp sanly nokatlary berlende onuň algoritminiň rekursiýasy netijesinde san ýalňyşlyklarynyň mümkin bolan artmagyna syn edip durmaly bolýar.

Iki sany başky usullar analitiki görnüşde netije almaga mümkinçilik berýär, ýöne $X(z)$ funksiýanyň polýuslaryny hasaplamagy talap edýär. Polýuslarynyň ýokary hatarlarynda laýyk hatarlaryň differensirlemesini talap eder.

Çägi boýunça integrirlemek bilen özgertme matematiki

çylşyrymly usullara degişlidir. Ol bileleşme oblastynda ýerleşýän we z – şekiliň hemme aýratyn nokatlaryny (nullary we polýuslary) gabaýan C özboluşly ýapyk kontury boýunça integrirlemek bilen ýerine ýetirilýär. Integrirlemäni konturyň içinde ýerleşýän, öz içine koordinatalar ulgamynyň merkezini alýan, polýuslaryň üstünde ýerine ýetirmek has amatlydyr, ýagny z^{-1} simwolikasynnda. Bu simwolikada biz hem şu paragrafy serdip geçäris. Yzany özgertmäniň çäk integraly:

$$s_k = (1/2\pi j) \oint_C S(z) z^{k-1} dz. \quad (52)$$

Aýyрма barada Koşi teoremasyna laýyklykda bu integral integrirleme çäginin içinde ýerleşen funksiýanyň hemme polýuslaryna degişlilikde integralaşaky funksiýanyň aýyрма jemlerine deňdir (Res). Her aýyрма kesgitli p_k polýus bilen baglydyr:

$$\text{Res}[F(z), p_k] = \frac{1}{(m-1)!} \cdot \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z-p_k) F(z)] \text{ bolanda } z=p_k. \quad (53)$$

где $F(z) = z^{k-1} S(z)$, $m - p_k$ nokdynda düzgün hatary. Ýönekeý polýus üçin:

$$\text{Res}[F(z), p_k] = (z-p_k) F(z) = (z-p_k) z^{k-1} S(z) \text{ bolanda } z=p_k. \quad (54)$$

Mysal. $X(z) = z^2 / (z-0.5)(z-1)^2$ funksiýanyň z – şekili.
 $x(k) = \text{Res}[F(z), p_1] + \text{Res}[F(z), p_2]$. $F(z) = z^{k-1} X(z) = z^{k+1} / (z-0.5)(z-1)^2$.

$F(z)$ funksiýasy ýönekeý $p_1 = 0.5$ polýusa eýe we ikinji hataryň polýusy $p_2 = 1$.

$$\text{Res}[F(z), 0.5] = (z-0.5) z^{k+1} / (z-0.5)(z-1)^2 = z^{k+1} / (z-1)^2 \big|_{z=0.5} = 0.5 (0.5)^k / (0.5)^2 = 2(0.5)^k.$$

$$\text{Res}[F(z), 1] = \frac{d}{dz} [(z-1)^2 z^{k+1} / (z-0.5)(z-1)^2] = [(z-$$

$$\frac{0.5)(k+1)z^k - z^{k+1}}{(z-0.5)^2} \Big|_{z=1} = 2(k-1).$$

Netije: $x(k) = 2[(k-1) + (0.5)^k]$.

Droba bölmek bilen özgertme. Bu usulda z – şekil rasional ýönekeý droblara bölünýär, soňra tablisanyň kömegi bilen agzaly yzyna özgertme geçilýär. Has ýönekeý görnüşi, eger – de $S(z)$ funksiýasy z^{-1} simwolikasynda z derejelerinde ýaýratma mümkin bolanda bolýar:

$$S(z) = s(0) + s(1) z^{-1} + s(2) z^{-2} + \dots$$

Değişlilikde, aňlatmada köpagzalaryň gatnaşyklary z^{-1} simwolikasynda bolmalydyr. Eger – de birinji hataryň polýuslary $S(z)$ we $N=M$, onda aňlatmany şu jeplere bölüp bolar:

$$S(z) = B_0 + C_1/(1-p_1z^{-1}) + C_2/(1-p_2z^{-2}) + \dots + C_M/(1-p_Mz^{-M}) =$$

$$B_0 + C_1z/(z-p_1) + C_2z/(z-p_2) + \dots + C_Mz/(z-p_M) = B_0 + \sum_{k=1}^M C_kz/(z-p_k). \quad (55)$$

$$B_0 = b_N / a_N.$$

Bu ýerde C_k – $S(z)$ funksiýanyň aýyrmalary bolan, elementar droblaryň koeffisientleri.

C_k koeffisientleri hasaplamak üçin aňlatmanyň çep we sag taraplaryny $(z-p_k)/z$ köpelderis we $z=p_k$ goýarys, şol bir wagtda sag tarapynda $(z-p_k)=0$ bolanda $z=p_k$ köpeldijiniň hasabyna berlen polýusdan C_k başga jemiň hemme agzalary nula geçirilýär, çep tarapynda bolsa $S(z)(z-p_k)/z$ gatnaşygy galýar, ol bolsa C_k hasabyny hasaplap çykarmaga mümkinçilik berýär:

$$C_k = S(z)(z-p_k)/z \Big|_{z=p_k} \quad (56)$$

Eger – de (4.1) $N < M$ bolsa, onda B_0 baha nula deň

bolýar. Eger – de $S(z)$ funksiýasy $z=p_k$ nokadynda m hatarly polýusa eýe bolsa, C_k koeffisienti koeffisientleriň jemi bilen çalşylýar:

$$\sum_{i=1}^m D_i / (z-p_k)^i, \quad (57)$$

$$D_i = \frac{1}{(m-i)!} \cdot \frac{d^{m-i}}{dz^{m-i}} [X(z) (z-p_k)^m / z], \text{ bolanda } z=p_k. \quad (58)$$

Mysal. $X(z) = z^2 / (z-0.5)(z-1)^2$ funksiýanyň z – şekilini berlen usul bilen özgertme mysalyny gaýtalap geçeliň, ol geçen mysalda ulanyldy. Funksiýa $p_1 = 0.5$ ýönekeý polýusa eýedir we $p_2 = 1$ ikinji hatarly polýusa eýedir.

$$X(z) = Cz/(z-0.5) + D_1z/(z-1) + D_2z/(z-1)^2.$$

$$C = z/(z-1)^2 = 0.5/(0.5-1)^2 = 2.$$

$$D_1 = \frac{d}{dz} [(z-1)^2 X(z)/z] = \frac{d}{dz} [z / (z-0.5)] \big|_{z=1} = -2.$$

$$D_2 = (z-1)^2 X(z)/z = z/(z-0.5) \big|_{z=1} = 2.$$

$$X(z) = 2z/(z-0.5) + D_1z/(z-1) + D_2z/(z-1)^2.$$

Her bir adaty drobyň yzyna özgertmesini 2.1. tablisasy boýunça ýerine ýetireliň.

Netije: $x(k) = 2(0.5)^k - 2 + 2k = 2[(k-1) + (0.5)^k]$. Netije aýyрма usullaryna gabat gelýändir.

Eger – de z – şekil drob – rasional funksiýanyň şekiline eýe bolsa, onda ýönekeý droblara bölmeklik, soňra laýyklyk tablisasyny ulanmak bilen adaty köp zähmet talap etmeýär. Mysal üçin:

$$S(z) = (b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}) / (1 - a z^{-1}) = b_0/(1 - a z^{-1}) + b_1 z^{-1}/(1 - a z^{-1}) + b_2 z^{-2}/(1 - a z^{-1}). \quad (59)$$

Laýyklyklar tablisasy boýunça:

$$X(z) = 1/(1-az^{-1}) \rightarrow x(k) = a^k. \quad (60)$$

Bu ýerden, özgertmäniň çyzyklylygyny we

saklanmanyň özboluşlyklaryny göz öňüne tutmak bilen:

$$x(k) = b_0 a^k + b_1 a^{k-1} + b_2 a^{k-2}. \quad (61)$$

Has ýokary hatarly maýdalawjylary bolan funksiýalar özgerdilende ilki bilen funksiýanyň polýuslaryny tapmak zerurdyr. Mysal üçin, p_1 we p_2 polýuslary bolan ikinji hatarly köpagza üçin:

$$S(z) = 1/(1-a_1 z^{-1}+a_2 z^{-2}) = 1/[(1-p_1 z^{-1})(1-p_2 z^{-1})]. \quad (62)$$

$S(z)$ b_1 we b_2 belli bolmadyk koeffisientli droblaryň jemi görnüşinde getireliň:

$$S(z) = b_1/(1-p_1 z^{-1})+b_2/(1-p_2 z^{-1}) = (b_1 - b_1 p_2 z^{-1}+b_2-b_2 p_1 z^{-1})/[(1-p_1 z^{-1})(1-p_2 z^{-1})]. \quad (63)$$

Maýdalawjylar deň bolan halatynda bu iki aňlatmada sanawjylar hem deň bolmalydyr:

$$(b_1 + b_2) - (b_1 p_2 + b_2 p_1) z^{-1} = 1,$$

Ol bolsa z derejeleriniň bir bahaly bolan halatynda ýerine ýetirilýär. Bu ýerden deňlemeler ulgamyny alyarys:

$$b_1 + b_2 = 1.$$

$$b_1 p_2 + b_2 p_1 = 0.$$

Bu deňlemeler ulgamyny çözüp b_1 we b_2 koeffisientleriň bahalaryny tapýarys, koeffisientleri $S(z)$ goýýarys, droblaryň jemi görnüşinde aňladylan we laýyklyk tablisasy boýunça droblary wagt funksiýasyna geçirýäris.

Derejeler hatarynyň usuly. (4.1) aňlatmasyny göni (4.1') derejeler hataryna ýaýratmak bolar, stolblara bölmek bilen, onuň üçin funksiýanyň sanawjysyny we maýdalawjysyny z derejesiniň beýgelyän y – da peselýän görkezijisi bilen aňladylýar. Dereje hatarynyň yzyna z – özgertmesi anykdyr.

Z beýgelyän derejäniň mysaly. $X(z) = (1+2z+z^2) / (1-z+0.4z^2).$

$$\begin{array}{r} 1 + 2z + z^2 \\ \hline 1 - z + 0.4z^2 \end{array} \quad \begin{array}{r} | 1 - z + 0.4z^2 \\ \hline 1 + 3z + 3.6z^2 + 2.4z^3 + 0.96z^4 + \end{array}$$

... Hatar tükeniksiz bolup bilýär.

$$\begin{array}{r} 3z + 0.6z^2 \\ \hline 3z - 3z^2 + 1.2z^3 \\ \hline 3.6z^2 - 1.2z^3 \\ \hline 3.6z^2 - 3.6z^3 + 1.44z^4 \\ \hline 2.4z^3 - 1.44z^4 \\ \hline 2.4z^3 - 2.4z^4 + 0.96z^5 \\ \hline 0.96z^4 - 0.96z^5 \\ \hline 0.96z^4 - 0.96z^5 + 0.384z^6, \text{ и т.д.} \end{array}$$

Yzyna özgertme z^k bolanda derejeleriň koeffisientleriniň identifikirlenmesi boýunça ýerine ýetirilýär funksiýanyň k-ädimleri: $x(k) = \{1, 3, 3.6, 2.4, 0.96, \dots\}$.

Z derejeleriň peselýän nomerleriniň mysaly. $X(z) = (1+2z+z^2) / (1-z+0.4z^2) \rightarrow$ (polinomyň sanawjysyny we maýdalawjysyny z^N bölmek) $\rightarrow (z^{-2}+2z^{-1}+1) / (z^{-2}-z^{-1}+0.4)$.

$$\begin{array}{r} z^{-2} + 2z^{-1} + 1 \\ \hline z^{-2} - z^{-1} + 0.4 \end{array} \quad \begin{array}{r} | z^{-2} - z^{-1} + 0.4 \\ \hline 1 + 3z + 3.6z^2 + 2.4z^3 + 0.96z^4 + \end{array}$$

... Şol bir netije.

$$\begin{array}{r} 3z^{-1} + 0.6 \\ \hline 3z^{-1} - 3 + 1.2z \\ \hline 3.6 - 1.2z \\ \hline 3.6 - 3.6z + 1.44z^2 \\ \hline 2.4z - 1.44z^2 \\ \hline 2.4z - 2.4z^2 + 0.96z^3 \\ \hline 0.96z^2 - 0.96z^3 \\ \hline 0.96z^2 - 0.96z^3 + 0.384z^4, \text{ и т.д.} \end{array}$$

(4.1) polinomyň bölme usulyny rekursiw ýerine ýetirip

bolar:

$$x(0) = b_0 / a_0,$$

$$x(1) = (b_1 - x(0) a_1) / a_0,$$

$$x(2) = (b_2 - x(1) a_1 - x(0) a_2) / a_0,$$

...

$$x(n) = (b_n - \sum_{i=1}^n (x(n-i) a_i) / a_0, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (64)$$

Z-ÖZGERTMÄNI ULANMAK.

Diskret ulgamlary ýazmak signallar işlenip taýýarlananda nullaryň we polýuslaryň kömegi bilen – z – özgertmäniň has giň ulanylýan oblastydyr. (51) görnüşli ulgamyň geçiriji funksiýasynyň dereje polinomy n_i sanawjynyň nuly bilen we p_j maýdalawjynyň polýuslary bilen hemişe goşmaça köpeldijileriň köpeltmegi görnüşinde getirip bilner:

$$H(z) = K \prod_{i=1}^N (z - n_i) / \prod_{j=1}^M (z - p_j), \quad (65)$$

bu ýerde K – giriş signalynyň geçiriji koeffisienti (güýjenmesi). $H(z)$ polýuslar we nullar hakyky we kompleks bolup bilerler, şol bir wagtda a_i we b_j koeffisientleriň hakyky bahalaryny üpjün etmek üçin (51) kompleks koeffisientler bileleşen jübütler bilen toplumlaýyn getirilen bolmalydyr.

AÇH we FÇH ulgamlaryň geometriki bahalandyrylmasy. $H(z)$ saklanýan informasiýany z – tekizliginde nullaryň (aýlawlaryň) we polýuslaryň (krestikleriň) goýulma görnüşinde görkezmek amatlydyr.

Nullaryň we polýuslaryň diagrammasy ulgamyň özboluşlyklaryny we onuň durnuklylygyny anyk görkezýär. Durnukly ulgamlar üçin hemme polýuslar birlik aýlawyň çäkleriniň daşynda (z^{-1} simwolikasy bolanda aýlawyň içinde) ýa – da birlik aýlawda nullar bilen gabat gelmelidir. Nullaryň ýerleşmegine çäklendirilmeler ýokdur.

Nullaryň we polýuslaryň belli diagrammasynda ulgamyň ýygylýk häsiýetnamasynyň geometriki bahalandyrylmasy ýerine ýetirilip bilner. $z = \exp(-j \omega \Delta t)$ bolanda $|z|=1$ birlik aýlawy $\omega = 0$ ($z=1$) до 2π ($z=-1$) esasy ýygylýk diapazonynyň häsiýetnamasynyň ýygylýk okuny görkezýär. $z_s = \exp(-j \omega_s \Delta t)$ her bir nokadyna laýyklyga ($z_s - n_i$) wektory goýlup bilner, i-e nul, onuň moduly bolsa $U_i = |(z_s - n_i)|$ z_s bilen i –nulyň aralygyny görkezýär, diýmek ($z_s - p_j$) wektory j-polýusa laýyk aralykda $V_j = (z_s - p_j)$ we $\phi_j = \arg(z_s - p_j)$ faza burçly. Şol bir wagtda ulgamlaryň amplituda we faza häsiýetnamalary birlik aýlaw boýunça ω_s nokadynyň süýşmeginde aňlatmalar boýunça bahalandyrylyp bilner:

$$|H(\omega)| = \prod_{i=1}^N U_i / \prod_{j=1}^M V_j, \quad (66)$$

$$\arg(H(\omega)) = \sum_i \phi_i - \sum_j \phi_j. \quad (67)$$

(66) boýunça şeýle netijä gelip bolar, AÇH ýygylýk boýunça üýtgemegine has uly täsiri birlik aýlawyň golaýynda ýerleşen nullar we polýuslar edýändir. Nulyň göni aýlawyň üstünde ýerleşende bu nokatda ω_s garmonikasy doly nullanýar we tersine, birlik aýlawda golaý ω_s polýusa golaýlaşanda ulgamyň güýjenme koeffisientiniň kert ulalmagy bolup geçýär.

Hatarly filtrleme we spektral seljeriş signallary işläp taýýarlamagyň esasy operasiýalary bolup durýar, olar ylmyň

we tehnikanyň hemme oblastlarynda giň ulanyşa eýe boldular. Bu oparesiýalar diskret görnüşinde (san görnüşinde) kompýuterlerde ýerine ýetirilip bilner. Köp ýagdaýlarda signallary we hatarly ulgamlary ýygylýk oblastynda ýazmaklyk uly gyzyklanma döredýär. Şunuň ýaly ýazgy signallary işlemegiň analog görnüşi üçin hem, diskret görnüşi üçin hem adalatlydyr. Ýygylýk oblastyndaky ýazga wagt oblastynda ýazmadan ozal köplenç ýol berilýär, has takygy, haçanda pes ýygylar filtrleme ýa-da hatarly filtrleme, differensirleme, interpolirleme we tekizleme göz önüne tutulanda geçirilýär.

Signallary işlemegiň bu usullaryny telefoniýa, seýsmologiýa, gidrolokasiýa, radiolokasiýa we medisina ýaly ugurlarda ylmy barlaglar üçin ulanylýar.

Häzirki döwürde signallary işlemegiň san görnüşine has uly üns berilýär. Bu ders bolsa san signallary bilen işleýän, bu ugur boýunça bilim alýan, san taýdan işläp taýýarlamagyň maglumatlaryny gündeki senagat işlerinde ulanýan, gofizikler, geologlar we beýleki çalymdaş ugurlaryň hünärmenlerine örän peýdaly bolar.

Has dogrusy, bu ders esasan hatarly san filtrlemesine we diskret spektral seljerilişine bagyşlanandyr, has uly üns bolsa ýygylýk oblastynda signallary we ulgamlary ýazmaklyk eýedir.

DISKRET HATARLY ULGAMYNYN MODELİ

Bu bölümde hatarly dürli deňlemelere esaslanan algoritmleriň esaslaryna seredilip geçiler, mysal üçin:


$$y = (nT) = K_y (nT-T) + x(nT), y(-T) = 0;$$

$$y(nT) = \sum_{k=1}^m K_k y(nT-kT) + \sum_{k=0}^r L_k x(nT-kT). \quad (68)$$

Bu deňlemelere köplenç rekursiw we awtoregressiw diýip atlandyrylar, olar diskret hatarly ulgamlary ýazmagyň dürli usullary üçin başlangyç bolup durýarlar, has takygy ýygrylyk häsiýetnamalaryň, san hatarlarynyň blok-çyzyklarynyň, toplumlaýyn z – tekizlikde geometriki teswirlemäniň we z – özgertmäniň operator usulyň kömegi bilen bolýarlar. Bular barada esasy düzüji maglumatlary Kaýzeriň, Reýderiň we Goldyň edebiýatlarynda bardyr.

Hatarly (analog) zynjyrynyň nazaryýeti induktiliwligiň, göwrümliligiň we garşylyklaryň elektriki özboluşlyklarynda esaslanýar, olar Kirgoffyň kanunynyň üstündenhemişelik koeffisientleri bolan hatarly differensial deňlemeleriň kömegi bilen zynjyrlary ýazyp bilýärler. Mundan tapawutlylykda diskret ýa-da san hatarly ulgamlary hemişelik koeffisienti bolan, ýörite ýa-da uniwersal kompýuterlerde sanlaryň üstünde işläp çözüp boljak hatarly dürlülük deňlemelere esaslanýar. Dürlülük algoritmleri ýerine ýetirilende giriş signallary wagt boýunça diskret hasaplamalaryň toplумы görnüşinde getirilýänligi wajyp pursat bolup durýar.

Köp duş gelýän meseleler üçin şu aşakdaky model ulanylyp bilner:



Bu meselelerde işläp taýýarlama sezewar edilýän signallar analog bolup durýar, ýöne işlenip taýýarlamanýň özi san görnüşinde amala aşyrylmalydyr. Ýöne hemme meseleler bu topara degişli bolmaýar, mysal üçin käbir signallar operatorlaryna giriş analog signallary soramaýar. Bu çyzydan görnüşi ýaly $x(nT)$ yzygiderliligini almak üçin analog signaly T wagt aralyklary boýunça diskretizirlenýär. Şunuň ýaly diskretizasiýa işiň netijesini dürli usullar bilen häsiýetlendirip bolar: oňa şertleýin üstüne goýma diýip atlandyryp bolar. Ýygylýk oblastyna degişli terminlerde bu, analog signalynyň spektrleriniň gapdal spektrleriniň ýokarky we aşaky görnüşlerinde $1/T$, $2/T$, $3/T$ we ş.m. ýygylýklaryň golaýynda gaýtalanyp durýar diýmegi aňladýar. Eger-de diskretizasiýa ýygylýgy Naýkwistiň ýygylýgyndan aşakda bolan bolsa (ýagny $1/T$ sinalyň ininiň ikeldilen ölçeginden pes bolsa), onda goňşy spektrler böwetlenýär, ýygylýk ýoýulmalary ýüze çykýar, olar bolsa analog signallaryň hatarly filtrleme bilen dikeldilmegini mümkin etmeýär.

Çyzgydaky kwantizator islendik häzirkî zaman san prosessoryň hökmany bölegi bolup durýar. Bir zady bellemek zerurdyr, kwantlama effekti çyzgyda görkezilen san maşynynyň içinde hem bolup biler. Olar mysal üçin ahyrky uzynlygynyň registrinde san görnüşinde hatarly dürlülük deňlemäniň hemişelik koeffisienti ýazylanda duş gelýär. Şunuň ýaly effekt dürlülük deňlemeleriň özboluşlyklary hemişelik kesgitlenen bolsa statiki diýip hasaplamak bolar. Şeýle hem dinamiki effektlere bardyr, olar haçan-da signallar koeffisientlere köpeldilende ýa-da beýleki signallara köpeldilende we registriň ahyrky uzynlygyna çenli önüm tegeleklense ýa-da çäklendirilse ýüze çykýar. Eger-de çykyş signalyny üznüksiz almak talap edilýän bolsa, ýokardaky çyzgydaky ýaly, onda $\bar{y}(nT)$ çykyş signalynyň sanawy dekodeerden ýa-da çekiji gurnawdan geçýär, ol impulsaryň yzygiderlilikinden üznüksiz signaly döredýär. Dekoder – bu san-analog özgerdişleri, ondan soňra hatarly analog filtr işledilip, diskretizasiýa işinde ýüze çykan artykmaç ýygylýklar aýyrylýar.

Üznüksiz hatarly dinamiki ulgamlary öwrenmeklik ep-esli derejede Laplasyň we Furýeniň özgertmeleriniň operasion usullarynyň girizilmegi bilen ýeňledi, şeýle hem zynjyrlar nazaryýetini ulanmaklykdyr. Edil şonuň ýaly z – özgertmäni girizmeklik we zynjyrlar nazaryýetini ulanmaklyk hatarly diskret ulgamlaryny öwrenmeklige ýardam edýär.

Z – özgermede - belli bolşy ýaly birinji düzgünli dürlülük deňlemesi sinuniodal täsirde ýygylýga baglylykda ulgamyň özüni alyp barşyny häsiýetlendirýän geçiriji fuksiýa bilen getirip boljakdygy mümknidir. Şonuň ýaly-da geçiriji funksiýany geometriki şekillendirip boljakdygy aýan boldy.

Şonuň ýaly teswirlemäniň umumylaşdyrylan hatarly dürlülük deňlemä ýaýramasynyň formal esasy z – özgertme bolup durýar. Ol, dürlülük deňlemelerinde Lapsanyň differensial deňlemelerde ýerine ýetirýän algebraik işleri ýerine ýetirýär.

Z – özgertmäniň aýratynlyklaryna gysgaça seredip geçeliň, soňra bolsa z – özgertmäniň usullaryny dürlülük deňlemeleriň umumylaşdyrylan çözügütlerini tapmak üçin ulanallyň.

$x(0), x(T), x(2T), \dots, x(nT)$ sanlaryň yzygiderligine seredip geçeliň, olar $x(T)$ üznüksiz yrgyldynyň diskretlenmeginde emele geldiler. Bu yzygiderliligiň z – özgertmesi şu aşakdaky ýaly kesgitlenilýär:

$$x(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x(nT) z^{-n}; \quad (69)$$

bu ýerde: z -toplumlaýyn üýtgeýji, $x(z)$ - şol toplumlaýyn üýtgeýjiniň funksiýasy.

Bu deňlemede üýtgeýjiniň dereje hatary z^{-1} bolanlygy sebäpli, onda bular ýaly hataryň goşulmagy barada sorag ýüze çykýar. Şu aşakda Gurewiçiň bu mesele boýunça geçiren işleriniň käbir esasy netijeleri getirilýär.

Deňleme $|Z| > R$ üçin goşulýarlar we $|Z| < R$ üçin daşlaşýarlar, bu ýerde R goşulma radiusy.

$$|x(nT)|^{1/n}, n=1,2,3,\dots, \quad (70)$$

zyygiderlilik üçin ýokary çäkdir.

Mysal üçin eger-de $x(nT)=K^n$ bolsa, onda deňleme deňleme töweregiň daşynda goşulýşýarlar.

$|Z| > R$ üçin $x(z)$, zynjyryň analitik funksiýasydyr. Şeýlelik bilen ýokardaky deňleme bilen kesgitlenen we analitiki dowam etme bilen bütün z -tekizlige ýaýran funksiýa $x(nT)$ yzygiderliligiň z -özgertmesi diýip atlandyrmak bolar.

Ýzyna z – özgertmede kesgitleme boýunça $x(nT)$, $x(z)$ -den yzyna z -özgertmesidir. Ony Koşiniň integral teoremasynyň kömegi bilen ýokardaky deňleme bilen tapyp bolar. Ilki bilen deňlemäniň iki tarapyny z^{k-1} köpeldeliň, soňra iki toparyny ýapyp çäk boýunça integrirläliň.

Eger-de itnegirleme çägi tükeniksiz hatarly goşulma oblastynyň içinde ýatan bolsa, onda toplama we operariýalarynyň ýerlerini çalşyp bolar:

$$\oint x(z)z^{k-1} \alpha z = \sum_{n=0}^{\infty} x(nT) \oint z^{k-n-1} \alpha z$$

Koşiniň teoremasy şeýle diýýär. Eger-de integrirleme çägi koordinatolaryňbaşyny öz içine alýan bolsa onda $\oint z^{k-n-1} \alpha z = 0$ hemme K üçin degişlidir, ýöne diňe $K=n$ degişli dälendir. $K=n$ üçin integral $2\pi j$ deň bolýar. Ýokarky aňlatma şuny ulanyp yzyna z -özfertme barada teorema alýarys:

$$x(KT) = \frac{1}{2\pi j} \oint x(z)^{K-1} \alpha z.$$

$x(KT) = K^n$ şertinde $x(z)=1/(1-Kz^{-1})=z/(z-K)$

$x(nT)$, $x(z)$ -den yzyna z -özfertmedigini subut etmek üçin alnan deňlemämizi ulanalyň we K uly bolan radiusyň togalagynyň ýanynda integrirleme geçireliň:

$$x(nT) = \frac{1}{2\pi j} \oint \frac{z^n \alpha z}{z - K}. \quad (71)$$

Bu deňleme hasaplap aýyрма teoremasynyň kömegi bilen çözülýär, eger-de $z=K$ bolanda integrirleme çägi polýusy öz içine alýar. Şeýlelik bilen $K+E$ radiusly C_1 tegelegi laýyk bolýar, E bolsa näçe diýseň pes burç bilen alnyp bilner. Ýöne bu ýagdaýda C_2 ýa-da islendik beýleki kontur hem alnyp bilner, ol polýusy öz içine almalydyr.

Eger-de $K > 1$ bolsa, onda goşulyşma toplumlaýyn z-tekizliginde birlik tegeleginiň daşynda ýatandyr. Köp ýagdaýlarda $x(nT) = K^n$ yzygiderliligi $K > 1$ fiziki gyzyklanma döretmeyär, sebäbi şunuň ýaly yzygiderlilik n galmagy bilen tükenikzis ösýär we durnuksyz diýip klasifisirlemek bolar.

Şeýlelik bilen birlik tegelek z-tekizliginde K^n görnüşli durnukly yzygiderlilikler üçin goşulyşma oblastynyň içinde bar bolanlarynyňarasynda iň kiçi tegelek bolar. Birlik tegeleginiň bu häsiýeti hemme yzygiderliliklere ýaýradylýp bilner we şunuň birlik tegeleginiň yzyna z-özürtme üçin integrirleme çägi hökmünde ulanylyp bilner.

DOLAMA BARADA TEOREMA

$x(z)$, $x(nT)$ – ñ z-özürtmesi bolsun a $H(z)$ bolsa, $h(nT)$ – ñ z-özürtmesi bolsun onda $Y(z) = X(z) H(z)$, $y(nT)$ z-özürtmesi bolsa, onda

$$y(nT) = \sum_{m=0}^n x(mT) h(nT-mT) = \sum_{m=0}^n x(nT-mT) h(mT) \quad (72)$$

Bu gatnaşygy subut etmegiň ýönekeý ýoly şu aşakdaky gatnaşygy öwrenilen induksiýa usulyny ulanmakda durýar:

$$\begin{aligned} X(z) H(z) &= \\ [x(0) + x(T)z^{-1} + x(2T)z^{-2} + \dots x(T)z^{-n}] * \\ * \\ [h(0) + h(T)z^{-1} + h(2T)z^{-2} + \dots h(nT)z^{-n}] &= x(0)h(0) + \\ + z^{-1} \end{aligned}$$

$$[x(0)h(T) + x(T)h(0)] + z^2[x(0)h(2T) + x(T)h(T) + x(2T)h(0)] + \dots = y(0) + z^{-1}y(T) + z^{-2}y(2T) + z^{-3}y(3T) + \dots$$

Eger-de $h(nT)$ hatarly diskret zynjyrynyň birlik impulsa bolan seslenmesini göz öňüne getirýän bolsa, onda

$$y(nT) =$$

$$\sum_{m=0}^n x(mT)h(nT - mT) = \sum_{m=0}^n x(nT - mT)h(mT) \quad (73)$$

bu zynjyryň $x(nT)$ özboluşly giriş signalyna seslenmesini kesgitleýär.

Toplumlaýyn dolama barada düşünje.

Iki sany z -özügertmäni köpeltmeklik yzygiderliligiň dolamasyna laýyk gelýär. Şu bölümde iki sany yzygiderliligiň z -özügertmesine seredip geçeliň. Goý,

$$U(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x(nT)y(nT)z^{-n}$$

we $X(z)$, $x(nT)$ z -özügertmesi, $Y(z)$ bolsa $y(nT)$ -ň z -özügertmesi bolsun. Diýmek,

$$y(nT) = \frac{1}{2\pi j} \oint Y(v)v^{n-1}dv$$

$$x(nT) = \frac{1}{2\pi j} \oint X(v)v^{n-1}dv$$

integrirleme çäginini birlik töleg görnüşinde saýlap alalyň. Onda,

$$U(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x(nT)z^{-n} \frac{1}{2\pi j} \oint Y(v)v^{n-1}dv \quad (74)$$

Integrirleme hem-de toplama operasiýalarynyň ýerini çalşyp we netijeleşýän toplumlamany z -özügertme diýip seretsek, şu aşakdaky aňlatma gelýäris:

$$U(z) = \frac{1}{2\pi j} \oint Y(v) X\left(\frac{z}{v}\right) v^{n-1} dv \quad (75)$$

Bu deňlemä käwagtlar topluumlaryn dolamanyň teoremasy diýilýär. Ol dolama şekiline eýe bolanlygy sebäpli, integrirleme çägi birlik tegelegi şerti saklamyzda we

$$V = e^{j\theta}, \quad z = z e^{j\varphi}$$

çalşygyny ýerine ýetirsek, şu aşakdaky deňlemäni alýarys:

$$U(\tau e^{j\varphi}) = \frac{1}{2\pi j} \int_0^{2\pi} Y(e^{j\theta}) X(\tau e^{j(\varphi-\theta)}) d\theta.$$

Öň ýanyndaky aňlatmanyň hususy ýagdaýy gyzyklanma döredýär, haçanda

$$x(nT) = y(nT) \text{ we } z = 1$$

bolsa iki sany aňlatmany ulanyp alýarys:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} y^2(nT) = \frac{1}{2\pi j} \oint Y(v) Y\left(\frac{1}{v}\right) V^{-1} dV. \quad (76)$$

Bu aňlatma signalyň z-özürtmesini amala aşyryp, ortakwadratik bahasyny aňlatmaga mümkinçilik berýär. Bu gatnaşyklar sesler öwrenilende ulanylýar.

EDEBIÝATLAR

1. Gurbanguly Berdimuhamedow. Garaşsyzlyga guwanmak, Watany, halky söýmek bagtdyr. Aşgabat, 2007.
2. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Umumymilli “Galkynyş” Hereketiniň we Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň nobatdaky daşary V gurultaýlarynyň bilelikdäki mejlisinde sözlän sözi. Aşgabat, 2007.
3. Gurbanguly Berdimuhamedow. Eserler ýygyndysy. 1-nji tom. Aşgabat, 2007.
4. Türkmenistanyň Prezidentiniň “Obalaryň, şäherçeleriň, etrapdaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň durmuş-ýaşaýyş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin” Milli maksatnamasy, Aşgabat, 2007.
5. А.А.Никитин “Теоритические основы обработки геофизической информации”, Москва. Недра, 1986г.
6. Э.Р.Канасевич “Анализ временных последовательностей в геофизике”, Москва, Недра, 1985г.
7. Давыдов А. В. “Теория сигналов и систем”.
8. Целевая инструкция «Интерпретация данных геофизических методов исследований”, Недра, Москва, 1990г
9. В. Знаменский, «Полевая геофизика», Москва, Недра, 1990г.
10. В. К. Хмелевский «Геофизика», Москва, Университет, Книжный дом 2009г.
11. Справочник геофизика, книга 1, Москва, Недра, 1990г.

12. В.С. Козырев, А.П. Жуков, И.П. Коротков, А.А. Жуков, М.В. Шнеерсон “Учет неоднородностей верхней части разреза в сейсморазведке”, Недра, Москва, 2003г.

MAZMUNY

1. Giriş.....	7
2. Dürülük we integrirleýji filtrlar Dürülük operatorlary.....	9
3. Maglumatlary integrirlemek.....	20
4. Rekursiw däl ýygylyk san filtrlari. Umumy maglumatlar.....	24
5. Ideal ýygylyk filtrlari.....	31
6. Ideal filtrlariň ahyrky golaýlatmalary.....	34
7. Ýylmanak ýygylyk filtrlari.....	41
8. Differirleýji san filtrlari.....	45
9. NSF hasabynyň alternatiw usullary.....	50
10. Signallaryň z – transformasiýasy.....	54
11. Z – polinomlaryň giňişligi.....	60
12. Z – özgertmäniň özboluşlyklary.....	64
13. Ýzyna z – özgertme.....	67
14. Z -özgertmäni ulanmak.....	73
15. Diskret setirli ulgamynyň modeli.....	76
16. Dolama barada teorema.....	81
17. Edebiýatlar.....	84